
**Diretoria de Atenção Primária
Gerência de Vigilância em Saúde
Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde**

Nota Técnica Conjunta DAPS/UVS/NARAS nº 01/2020

Assunto: Atenção às Gestantes no contexto da Infecção SARS-CoV-2

Este documento tem como objetivo orientar as equipes de saúde quanto ao atendimento as gestantes, no contexto da pandemia do COVID-19, vale ressaltar que estas recomendações estão em contínua atualização. Recomenda-se aos profissionais estarem atentos as atualizações de enfrentamento a pandemia.

Considerando a atual organização da rede de atenção primária à saúde, todas as gestantes que chegarem em qualquer Unidade de Saúde devem ser acolhidas pela equipe presente no local, independente de qual território a gestante pertença.

Considerando a Nota Técnica nº 06/2020 – COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS (Coordenação de Saúde das Mulheres, Coordenação-Geral de Ciclos da Vida, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Ministério da Saúde), que orienta que:

Gestantes sintomáticas:

- *Gestantes que apresentem síndrome gripal, deverão ter seus procedimentos eletivos (consultas e exames de rotina), adiados em 14 dias, e quando necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes (BRASIL,2020a).* E com os demais cuidados e fluxos já organizados pela unidade de saúde.
- Lembrando que a gestante sintomática respiratória deve ser conduzida de acordo com os cuidados da população adulta em geral já descritos em outros protocolos de manejo clínico do COVID-19 na APS sendo avaliada individualmente os riscos da gestação tais como, sífilis, diabetes gestacional entre outros riscos. Sendo este acesso por meio de busca ativa de acordo com as orientações realizar o contato telefônico a cada 48hs entre outras ações.

Gestantes assintomáticas:

- *As demais gestantes, assintomáticas ou sem síndrome gripal, deverão ter preservado seu atendimento, posto o caráter autolimitado da gestação, cujo desfecho em parto é inexorável, de tal modo que a suspensão ou o adiamento despropositado podem culminar em perda de oportunidades terapêuticas de atenção à mulher, ao bebê, e à família, inclusive para eventos graves, como infecções sexualmente transmissíveis.* (BRASIL,2020a)

Desse modo, recomenda-se a continuidade das ações de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, resguardado o zelo com a prevenção de aglomerações, com as melhores práticas de higiene, e com o rastreamento e isolamento domiciliar de casos suspeitos de síndrome gripal.

Importante ressaltar que os procedimentos adiados como consequência do isolamento domiciliar de gestantes que apresentaram sintomatologia compatível com síndrome gripal, deverão ser reagendados em tempo hábil, de modo que não haja prejuízo ao seguimento pré-natal. Sobre o atendimento pré-natal de gestantes que apresentaram sintomatologia compatível com síndrome gripal, parece razoável manter vigilância sobre eventuais restrições de crescimento fetal (RCF).

Amamentação:

As questões relacionadas a amamentação podem ser consultadas na Nota Técnica nº 7/2020-DAPES/SAPS/MS (Diretoria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas), que trata de avaliação de medida para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), sobre questionamento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) respectivo à preservação da amamentação em situação de risco iminente de transmissão do respectivo vírus, em situações que a mãe apresente sintomatologia compatível com síndrome gripal.

Considerando os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher, o Ministério da Saúde na ausência de evidências científicas sobre a transmissão do coronavírus por meio da amamentação e que não há recomendação para a suspensão do aleitamento materno na transmissão de outros vírus respiratórios, recomenda que a amamentação seja mantida em caso de infecção pelo COVID-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. Caso a mulher não se sinta segura em amamentar enquanto estiver com coronavírus, recomenda-se que seu leite seja retirado e ofertado à criança.

São recomendadas ainda as seguintes precauções, tendo em vista que a mãe infectada pode transmitir o vírus através de gotículas respiratórias durante o contato com a criança, incluindo a amamentação:

- *Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno (extração manual ou na bomba extratora);*

- Usar máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação;
- A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. (BRASIL,2020b)

Exames laboratoriais:

Considerando a **Portaria SEI nº 36/2020/SMS – SES.GAB/SES.UAP**, que *normatiza o funcionamento dos serviços de saúde sob gestão da Secretaria da Saúde do Município de Joinville durante o estado de emergência internacional decorrente da pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, provocada pelo agente Novo Coronavírus (SARS-CoV-2).*

Em seu Art. 6º, o Laboratório Municipal deverá suspender a realização de coletas, **excetuadas:**

- I- As consideradas de urgência e emergência;
- II- As relacionadas ao controle de coagulação;
- III- Os casos suspeitos e confirmados de COVID-19; e
- IV- As realizadas em favor de pacientes **gestantes** e portadores de câncer, HIV e tuberculose.

Atendimento em unidades de saúde Sentinela e de Referência:

Considerando a **Portaria SEI nº 42/2020/SMS – SES/GAB/SES.UAP** em seu Art. 2º os serviços de Atenção Primária à Saúde serão prestados em duas formatações: Unidades Sentinela e Unidades de Referência diante desta Portaria DETERMINA-SE que as Equipes de Saúde se organizem com as Unidades de Referência para a manutenção dos atendimentos eletivos das gestantes. Esta organização poderá se dar através de busca-ativa das gestantes de sua área de abrangência as quais já eram acompanhadas pela Equipe de Saúde.

As gestantes das **Unidades Sentinela** deverão ser atendidas preferencialmente pelas Equipes de Saúde das **Unidades de Referência** mais próxima de sua residência.

Sendo assim, toda a gestante que chegar na Unidade de Saúde devem ser acolhidas pela equipe presente no local, independente de qual território a gestante pertença.

Sugere-se que a equipe realize busca ativa de suas gestantes através da avaliação de prontuário com priorização do agendamento do atendimento presencial de acordo com fatores de risco da gestante tanto ligados a fatores obstétricos quanto a fatores de risco e vulnerabilidades sociais.

As questões de vulnerabilidade social onde a gestante não tenha condições de se deslocar para a unidade de Referência devem ser avaliadas de forma individualizada a fim de buscar a melhor forma de realizar o atendimento. Sugere-se também que se faça o contato telefônico com estas gestantes para devidas orientações do fluxo a serem adotados pela equipe de saúde. Fica a critério da equipe se considerar conveniente realizar visita domiciliar.

Esta orientação vale também para acompanhamento de puerpério e avaliação do recém nascido (RN), bem como o atendimento da consulta de puericultura preferencialmente até os 15 dias de vida do RN. Os testes do pezinho deverão ser realizados pelas Unidades de Referência.

No que se refere a realização dos Testes Rápidos para gestantes esta ação dever ser mantida de forma organizada com a unidade de referência de forma eletiva e programada evitando aglomeração conforme orientação já estabelecidas.

REFERÊNCIA

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação-Geral de Ciclos da Vida. Coordenação de Saúde das Mulheres. **Nota Técnica nº 6/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**. Disponível em https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_MS-0014128689-Nota-Te%CC%81cnica.pdf. Acessada em 02/04/2020.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Nota Técnica nº 7/2020-DAPES/SAPS/MS**. Disponível em <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/covid-19-e-amamentacao-nota-tecnica-no-7-2020-dapes-saps-ms/>. Acessada em 02/04/2020.
3. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Portaria SEI nº 42/2020/SMS – SES/GAB/SES.UAP**. Joinville – SC:2020.
4. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Portaria SEI nº 36/2020/SMS – SES.GAB/SES.UAP**. Joinville – SC:2020.