



Projet de recherche sur

## LA REDUCTION DU TAUX DE MORTALITE MERE-ENFANT

cas de BRAZZAVILLE

Groupe

Professeur

OYERE Gloire

Mr. NGakosso

AKOUBA Paule

OMBOULA Rex


YAW-MENSAH

KAZIAMA David

*Template by:@Shinny*

# PLAN

- 1 Introduction
- 2 Objectifs du Projet
- 3 Analyse de la Situation
- 4 Causes des Précédentes Analyses



# PLAN

1

Stratégie d'Intervention ou  
Approche de Solution

2

Budgétisation

3

Plan de Mise en Œuvre

4

Conclusion



Made with Gamma



# Introduction

La République du Congo, spécifiquement Brazzaville, fait face à des défis persistants en matière de santé maternelle et infantile. Malgré les efforts, le taux de mortalité mère-enfant demeure préoccupant. Cette situation souligne la nécessité d'initiatives spécifiques pour réduire ces taux et améliorer la santé globale de la population.

La réduction de la mortalité mère-enfant est cruciale pour le développement durable et le bien-être de la société congolaise. Ce projet vise à sauver des vies, améliorer la qualité des soins maternels et infantiles, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.



# Objectifs du Projet

## *Objectif Principal :*

Réduire le taux de mortalité mère-enfant à Brazzaville de manière significative d'ici à [année cible].

## *Objectifs Spécifiques :*

1. Améliorer l'accès aux soins prénatals de qualité pour les femmes enceintes à Brazzaville.
2. Renforcer les capacités des professionnels de la santé locaux pour la prise en charge des complications obstétricales et pédiatriques.
3. Sensibiliser la population de Brazzaville aux bonnes pratiques en matière de santé maternelle et infantile.

# Analyse de la Situation


## *État Actuel :*

Selon l'enquête MICS 2014-2015, le taux de mortalité néonatale est de 21%, le taux de mortalité infantile est de 36%, et le taux de mortalité infanto-juvénile est de 52% avec un taux brut de natalité de 41,7%. Le taux de mortalité maternelle est de 436 décès pour 100 000 naissances vivantes selon la même enquête.

Le rapport 2020 de la Banque mondiale estime le taux de mortalité maternelle à 378 décès pour 100 000 naissances vivantes. Selon le rapport de surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles (DMNI) de 2022, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 414 décès pour 100 000 naissances vivantes.



## *Facteurs de Risque :*

Les principales causes de décès maternel chez la mère incluent l'hémorragie (55%) et l'éclampsie (19,5%), selon les données du DMNI.




# Analyse de la situation

## Données statistique de la répartition des décès




Ces diagrammes font références à la répartition des décès maternels par département et par tranche d'âge. Sur Brazzaville le nombre de décès est de 48 morts. Faisant ainsi de lui le deuxième départements ayant le plus de décès après Pointe-Noire. Pour une tranche d'âges comprise entre 30 et 34 ans (le pic majorant).



## Diagramme des moments de décès

Ce diagramme présente un taux très élevé de décès durant le post-partum(fait référence à la période qui suit immédiatement l'accouchement d'une femme.


Cette phase englobe les premières heures, jours, voire semaines après la naissance du bébé.)



## Cause des décès

La pathologie se issant au sommet de ce diagramme est l'Hypertension; maladie due à une mauvaise alimentation de la femme enceinte ou d'un cas de stresse,voir autres.





## Causes des Précédentes Analyses

Les analyses antérieures ont identifié plusieurs causes de décès mère-enfant à Brazzaville, notamment l'hémorragie, placenta prævia, HRP, rupture utérine, éclampsie, infection embolie, VIH, l'alimentation, prise d'alcool et cigarette, stupéfiants, hypertension, malnutrition infantile, complication anesthésique, les problèmes émotionnels et autres causes.

Les principales causes de décès maternel sont l'hémorragie (55%) et l'éclampsie (19,5%).

# Stratégie d'Intervention ou Approche de Solution

## *Sensibilisation et Éducation :*

- Développer des programmes éducatifs sur les principales causes de décès maternel, mettant l'accent sur l'hémorragie et l'éclampsie.
- Collaborer avec les écoles, les organisations communautaires et les médias pour diffuser des messages éducatifs ciblés.

## *Renforcement des Systèmes de Santé*

- Investir dans la formation continue des professionnels de la santé pour améliorer la prise en charge des complications obstétricales.



# Stratégie d'Intervention ou Approche de Solution

- Améliorer l'infrastructure des établissements de santé pour garantir des services de qualité.

## *Suivi et Évaluation :*

- Mettre en place des systèmes de suivi pour mesurer l'impact des interventions sur les principales causes de décès maternel.
- Mettre en place un cabinet de psychologue pour le suivi émotionnel des patientes suites à un premier accouchement, une césarienne, ou encore un accouchement à risque.
- Effectuer des évaluations régulières pour ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.





## Budgétisation

Établir un budget détaillé qui prend en compte les coûts spécifiques à Brazzaville, notamment ceux liés à la sensibilisation aux facteurs de risque locaux, à la formation adaptée aux besoins spécifiques de la population, et à l'amélioration des infrastructures en vue de traiter efficacement l'hémorragie et l'éclampsie relève de l'Etat.  
[Par manque d'informations pertinentes ]

# Plan de Mise en Œuvre

L'offre des soins et services de santé maternelle et infantile est organisée à travers les trois niveaux de soins suivant la pyramide sanitaire:

Niveau primaire, secondaire et tertiaire. En fonction du niveau de soin un paquet de soins de services est offert

*Offre de Soins et Services de Santé Maternelle et Infantile :*

- **Niveau Primaire :**
  - Planification familiale.
  - Soins prénatals et postnataux.
  - Accouchement assisté.
  - Vaccination.
  -



# Plan de Mise en Œuvre

- Soins essentiels du nouveau-né.
- Prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant (PCIMNE).
- Soins obstétricaux et néonatals de base (SONUB).
- **Niveau Secondaire :**
  - Renforcement des hôpitaux de base avec un accent particulier sur la prise en charge des complications obstétricales et pédiatriques.
- **Niveau Tertiaire (Hôpitaux Généraux et CHU) :**
  - Mise en œuvre du paquet complémentaire des activités de santé maternelle et infantile.
  - Offre de soins spécialisés, y compris les soins obstétricaux et néonatals d'urgence complets (SONUC).





# Conclusion

Cette étude approfondie sur la réduction de la mortalité mère-enfant à Brazzaville souligne les défis majeurs associés à l'hémorragie et à l'éclampsie. Les interventions, centrées sur la sensibilisation, l'éducation et le renforcement des systèmes de santé, incarnent une stratégie réfléchie et adaptée au contexte local. Les investissements envisagés, couvrant la sensibilisation communautaire et l'amélioration des infrastructures médicales, démontrent une approche holistique.

Le suivi continu et les évaluations régulières seront cruciaux pour ajuster les stratégies en temps réel et maximiser l'efficacité des interventions. Au-delà du projet, l'orientation vers l'évolution des pratiques médicales, le renforcement des infrastructures, les partenariats communautaires, ainsi que la recherche et l'innovation, promettent une durabilité des bénéfices.



MERCI POUR VOTRE AIMABLE  
ATTENTION

*Template by: @Shinny*