

高中数学之旅

(参考答案)

An Excursion through Secondary School
Mathematics: Solutions

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

目录

前言	iii
关于作者	v
第一章 集合和逻辑用语	1
1.1 集合的基本运算	1
1.2 德摩根定律与容斥原理	5
第二章 函数与导数	9
2.1 函数的性质	9
第三章 向量	10
3.1 平面向量的运算	10
第四章 立体几何	12
4.1 空间线面关系	12
第五章 解三角形	13
5.1 取值范围	13
5.2 面积问题	22
5.3 解三角形综合	23
第六章 圆锥曲线	24
6.1 直线与圆	24
6.2 椭圆	25
第七章 数列	26
7.1 数列的性质与运算	26
第八章 概率与统计	27
8.1 统计基础	27
8.2 概率与分布	27

内容简介

本书是《初等数学之旅》系列的配套习题集，覆盖高中数学八大核心章节：集合与逻辑用语、函数与导数、向量、立体几何、解三角形、圆锥曲线、数列、概率与统计。每章以知识框架开篇，随后分为选择题与解答题两组，兼顾基础巩固与综合提升。

本书适合对高中数学有兴趣、正在学习或复习的学生，尤其适合想系统性刷题并追踪解题路径的人。阅读前需要对中学数学有基本的了解。

本书在编写的过程中参考了国内外高中数学教材和历年高考真题。

本书受版权保护。本书的作者保留所有权利，无论涉及的是内容的全部还是部分，特别是翻译权、重印权、图表引用权、朗诵权、广播权、以缩微胶卷或其他任何物理方式复制权、信息传播或存储与检索权、电子改编权、计算机软件相关权利，以及通过当前已知或未来开发的类似或不同方法加以利用的权利。

本书源代码以 GNU General Public License v3.0 发布。任何人可以自由复制、分发和修改本作品的源代码，但任何衍生作品必须在相同许可条款下发布，且必须保留原作者的版权声明和许可声明。本许可要求所有修改后的作品同样以 GPL v3 开源，不得附加额外限制。

本书中使用的通用描述性名称、注册名称、商标、服务标记等，即使未作特别声明，也并不意味着该等名称不受相关法律法规的保护，或可供公众自由使用。

作者及校对者尽力确保本书所含建议与信息在发布之日的真实性与准确性。但是，作者及校对者对本书内容不作任何明示或默示的保证，亦不对其中可能存在的任何错误或疏漏承担责任。

© 2026 Midnight Forever, 知乎 @ 余命数

源代码以 GPL v3.0 许可发布，版权所有。

前言

如果你想要更改 PDF，请不要删改这里的前言和声明，谢谢。如果想了解更多，请访问我的主页<https://rikka.moe>

本书的起点源自我在高中三年学习数学期间用 Obsidian 记下的笔记。写这本书的初衷很简单：我觉得市面上没有一本教辅可以真正满足我。

目前大部分教辅的编排方式是“总结 + 例题”的模式，实质上是让学生做 Pattern Matching——看到类似的题就套上去。这种模式对应试确实有效，但总觉得缺了什么。直到我读了 Springer 出版社的《初等数学之旅》，才意识到好的数学书应该展示清晰的路径图：解题需要追踪一道题背后的逻辑流，从哪个定义或定理出发，经历哪些逻辑分支，最后收敛到答案。

这也是为什么我在《数学之旅》系列中坚持“所有结论都要有证明”：每一个结论都必须伴随路径，没有路径的结论不应存进你的脑子里。而本书作为该系列的配套习题集，则从另一个角度出发——为每一条路径提供练习的机会。知识框架梳理思路，习题集锤炼手感，两者相辅相成。

本书按章节编排，每章以知识框架开篇，梳理核心概念与定理，随后分为选择题和解答题两组。习题册采用双栏排版：左栏为题目，右栏为答题区，方便学习者直接在书上作答。答案册与习题册分册发行，每道题均附详细解析。

本书目前为书稿状态，内容可能尚未完整，文中可能存在笔误或疏漏。若发现错误或有建议，欢迎联系作者。

本版本为 2026 年 6 月 27 日的模块化重构版本，采用了全新的 xsim 题库架构，实现内容与格式的彻底分离。具体更新内容请参见 GitHub Release 页面，或访问本书落地页：<https://rikka.moe/books>。

感谢你阅读本书。

本书属于 Project Akari 系列。Akari 取自日文「あかり」，意为光，寓意是让好的学习材料更容易被找到、更容易被用起来。

Project Akari 的另一部书稿《初等数学之旅》将中学数学内容系统展开，每章从概念到定理、从证明到应用，展示完整的逻辑路径。两本书可以独立阅读，也可以互相参照——一册讲“为什么”，一册练“怎么做”。配套的 Akari Web 平台 (<https://web.chronorise.com>) 提供笔记、记忆卡片和在线练习，与书稿配合使用。

本系列的基础版本免费开放，完整版本以极低价格提供。知识不应该是奢侈品，这是我做这件事的底线。

从写作、排版到软件开发，Project Akari 的每一步都是我一个人完成的。服务器和运营成本靠书的销售收入以及我个人的工作收入来覆盖。这个项目既是学习方法的实践，也是工程能力的验证。

关于作者

余命数

懒惰猫的兴趣书坊 · *Midnight Forever*

2025 届新高考二卷考生，政史地组合，数学 139 分。

这本书是我学习数学过程中的思考与总结。希望它能带你看到数学世界里不一样的风景。感谢阅读。

本书落地页

<https://rikka.moe/books>

更多信息、勘误表、联系方式等均可在此查看

交流与联系

在线平台

个人主页 <https://rikka.moe>
书籍落地页 <https://rikka.moe/books>
知乎 @ 余命数
爱发电 <https://afdian.com/a/writeamathbook>

即时通讯

QQ 2454167821
交流群 659928666
邮箱 me@rikka.moe

欢迎通过以上方式与我交流和研究

第一章 集合和逻辑用语

知识框架

◆ 要点回顾

- 集合的基本概念：元素与集合的关系 ($\in, \notin$)、集合的表示法 (列举法、描述法)、常用数集符号 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$)。
- 集合间的关系：子集 ($\subseteq$)、真子集 ($\subsetneq$)、相等 ($=$)、空集 ($\emptyset$)。
- 集合的基本运算：交集 ($\cap$)、并集 ($\cup$)、补集 ($\complement_U A$)、差集 ($A \setminus B$)。
- 运算律：德摩根定律—— $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$, $\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$ 。
- 容斥原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ，三集合推广公式。
- 逻辑用语：充分条件与必要条件 ($p \Rightarrow q$)、全称量词与存在量词及其否定、命题的四种形式。

1.1 集合的基本运算

A 组

解析 1

◆ 量词命题的否定

答案 C

本题考查全称量词命题与存在量词命题的否定关系。否定一个量词命题，遵循“改量词，否结论”的原则。原命题 p 为一个存在量词命题，其逻辑形式为 $\exists x \in M, P(x)$ 。其否定的一般形式为：

$$\neg(\exists x \in M, P(x)) \iff \forall x \in M, \neg P(x)$$

在本题中，量词 $\exists$ (存在) 的否定是 $\forall$ (任意)。原结论 $P(x)$ 为 $x^2 \leq 0$ ，其否定 $\neg P(x)$ 为 $x^2 > 0$ 。

故 $\neg p$ 为 $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$ 。

注

选项 D 中, $x^2 \geq 0$ 在自然数范围内是恒成立的, 但它并非 $x^2 \leq 0$ 的严格否定. 一个结论的否定是其逻辑补集, 而非简单的反义关系. 对于实数 y , $y \leq 0$ 的否定是 $y > 0$.

解析 2

◆ 集合的补集与交集

答案 B

本题的核心思想是将抽象的集合运算转化为直观的数轴位置关系. 首先, 根据集合 A 的定义, 确定其在全集 $U = \mathbb{R}$ 下的补集.

$$A = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, 2) \cup [4, +\infty)$$

其补集为数轴上未被覆盖的部分:

$$\complement_U A = \{x \mid 2 \leq x < 4\} = [2, 4)$$

集合 B 的定义为:

$$B = \{x \mid x < a\} = (-\infty, a)$$

题目条件为 $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$, 即区间 $[2, 4)$ 与 $(-\infty, a)$ 的交集不为空. 为满足此条件, 区间 $(-\infty, a)$ 的右端点 a 必须大于区间 $[2, 4)$ 的左端点 2. 因此, 可得 $a > 2$.

解析 3

◆ 集合的交集与子集个数

答案 D

解题分为两个步骤: 首先确定交集 $A \cap B$ 的所有元素, 然后利用子集个数公式求解.

第一步, 列举集合 A 的所有元素. A 的元素是满足 $xy = 4$ 的整数坐标点 (x, y) .

$$A = \{(1, 4), (4, 1), (-1, -4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

第二步, 从 A 中筛选出满足集合 B 条件 $(x \leq y)$ 的元素.

$$A \cap B = \{(1, 4), (-4, -1), (2, 2), (-2, -2)\}$$

集合 $A \cap B$ 中含有 4 个元素.

一个含有 n 个元素的有限集合, 其子集的个数为 2^n . 本题中 $n = 4$, 故子集个数为 $2^4 = 16$.

B 组

解析 4

◆ 充分必要条件

答案 D

本题考查充分条件与必要条件的判断. 核心方法是将命题间的逻辑关系转化为集合间的包含关系: 若 $p \Rightarrow q$, 则 p 对应的集合是 q 对应集合的子集.

A. “ $A \cap B = B$ ” 等价于 $B \subseteq A$. “ $B = \emptyset$ ” 能够推出 $B \subseteq A$, 但反之不成立. 因此, “ $B \subseteq A$ ” 是 “ $B = \emptyset$ ” 的必要不充分条件. 该说法正确.

B. “ $x = 3$ ” 对应集合 $\{3\}$. “ $x^2 - 2x - 3 = 0$ ” 对应解集 $\{3, -1\}$. 因为 $\{3\} \subsetneq \{3, -1\}$, 所以前者是后者的充分不必要条件. 该说法正确.

C. “ $|x| = 1$ ” 对应集合 $\{1, -1\}$. “ $x = 1$ ” 对应集合 $\{1\}$. 因为 $\{1\} \subsetneq \{1, -1\}$, 所以前者是后者的必要不充分条件. 该说法正确.

D. 命题 p : “ m 是有理数”, 对应集合 $\mathbb{Q}$. 命题 q : “ m 是实数”, 对应集合 $\mathbb{R}$. 因为 $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, 所以 p 是 q 的充分不必要条件. 原说法颠倒了主次, 故错误.

解析 5

◆ 全称命题的否定

答案 A

一个全称量词命题为假, 其逻辑等价于它的否定形式 (一个存在量词命题) 为真. 设原命题为 $P: \forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$.

由于命题 P 为假, 其否定命题 $\neg P$ 必为真.

$$\neg P: \exists x \in \mathbb{R}, \neg(1 - x^2 \leq m) \implies \exists x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 > m$$

该存在量词命题为真, 意味着 m 必须小于函数 $f(x) = 1 - x^2$ 的最大值. 函数 $f(x) = 1 - x^2$ 是一个开口向下的二次函数, 其顶点为最大值点.

$$f(x)_{\max} = f(0) = 1$$

因此, 实数 m 的取值范围必须是 $m < 1$, 即 $m \in (-\infty, 1)$.

解析 6

◆ 充分不必要条件的应用

答案 B

命题 “ p 是 q 的充分不必要条件” 包含两层含义, 必须同时满足:

- 充分性: $p \Rightarrow q$.
- 不必要性: $q \not\Rightarrow p$.

设 $p: x = 2$, $q: m^2x^2 - (m + 3)x + 4 = 0$.

检验充分性: 将 $x = 2$ 代入方程 q 中, 方程必须成立.

$$4m^2 - 2(m + 3) + 4 = 0 \implies 2m^2 - m - 1 = 0$$

因式分解得 $(2m+1)(m-1)=0$, 解得 $m=1$ 或 $m=-\frac{1}{2}$ 。

检验不必要性: 方程 q 的解集 S 必须真包含 $\{2\}$, 即 $S \neq \{2\}$ 。

- 当 $m=1$ 时, 方程为 $x^2-4x+4=0$, 解集 $S=\{2\}$. 此时 $q \Rightarrow p$ 成立, 不满足“不必要”条件, 故舍去.
- 当 $m=-\frac{1}{2}$ 时, 方程为 $\frac{1}{4}x^2-\frac{5}{2}x+4=0$, 即 $x^2-10x+16=0$. 解集 $S=\{2, 8\}$. 此时 $S \neq \{2\}$, 满足“不必要”条件.

综上, 唯一满足条件的实数 m 的值为 $-\frac{1}{2}$ 。

解析 7

◆ 集合的补集与互异性

答案 D

条件 $\complement_U A = B$ 是解题的关键, 它等价于以下两个条件同时成立:

$$A \cup B = U \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset$$

根据题意: $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $A = \{1, a, b\}$ $B = \{4, a-b\}$

由 $A \cup B = U$, 可得:

$$\{1, a, b\} \cup \{4, a-b\} = \{1, a, b, 4, a-b\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

比较两集合, 可知无序集合 $\{a, b, a-b\}$ 必须与 $\{2, 3, 5\}$ 相等. 同时, 集合 A 和 B 的元素必须满足互异性.

我们通过分类讨论来寻找 a, b 的取值:

- 情况一: 设 $a=5, b=2$. 则 $a-b=3$. 此时 $\{a, b, a-b\} = \{5, 2, 3\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配. 检验: $A = \{1, 5, 2\}, B = \{4, 3\}$. 此时 $\complement_U A = \{3, 4\} = B$, 符合题意.
- 情况二: 设 $a=5, b=3$. 则 $a-b=2$. 此时 $\{a, b, a-b\} = \{5, 3, 2\}$ 与 $\{2, 3, 5\}$ 匹配. 检验: $A = \{1, 5, 3\}, B = \{4, 2\}$. 此时 $\complement_U A = \{2, 4\} = B$, 符合题意.

其他组合 (如 $a=3, b=2$ 时 $a-b=1$, 与 A 中元素重复) 均不满足条件. 因此, a, b 的值为 5,2 或 5,3。

C 组

解析 8

◆ 新定义集合与元素互异性

答案 B

本题综合考查了新定义集合的理解、集合元素的互异性以及子集个数的计算.

1. 构造集合 $A \otimes B$ 根据定义, $A = \{n, -1\}, B = \{\sqrt{2}, 1\}$ 。

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{n^2 + 1^2}, \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{2})^2}, \sqrt{(-1)^2 + 1^2}\}$$

化简得:

$$A \otimes B = \{\sqrt{n^2 + 2}, \sqrt{n^2 + 1}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$$

2. 应用元素个数条件已知 $|A \otimes B| = 3$. 由于上式给出了 4 个表达式, 根据集合元素的互异性, 其中必有两个表达式的值相等. 注意到 $\sqrt{n^2 + 2} > \sqrt{n^2 + 1}$ 且 $\sqrt{3} > \sqrt{2}$, 因此相等的只可能是一个含 n 的项与一个常数项.

分类讨论:

- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 1 \Rightarrow n = \pm 1$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3}$, 集合为 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$, 仅有 2 个元素, 不合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 1} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 2 \Rightarrow n = \pm\sqrt{2}$. 此时 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{4} = 2$, 集合为 $\{2, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{2} \Rightarrow n^2 = 0 \Rightarrow n = 0$. 此时 $\sqrt{n^2 + 1} = 1$, 集合为 $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{2}\}$, 有 3 个元素, 符合题意.
- 若 $\sqrt{n^2 + 2} = \sqrt{3} \Rightarrow n^2 = 1$, 情况同第一类, 不符.

3. 计算子集个数由上可知, 实数 n 的所有取值组成的集合为 $S_n = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$. 该集合有 $k = 3$ 个元素. 非空真子集的个数为 $2^k - 2 = 2^3 - 2 = 6$.

1.2 德摩根定律与容斥原理

A 组

解析 1

◆ 集合的并集与补集运算

答案 $\{-3, 3\}$

本题考查有限集合的补集运算.

方法一: 直接法首先确定全集 U 和并集 $A \cup B$.

$$U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{-2, 1, 2\} \cup \{-1, 0, 1\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$\complement_U(A \cup B)$ 即为在 U 中但不在 $A \cup B$ 中的元素所构成的集合.

$$\complement_U(A \cup B) = \{-3, 3\}$$

方法二：德摩根定律根据德摩根定律， $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ 。

$$\complement_U A = \{-3, -1, 0, 3\}$$

$$\complement_U B = \{-3, -2, 2, 3\}$$

两补集的交集为：

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \{-3, 3\}$$

解析 2

◆ 容斥原理初步应用

本题是容斥原理的直接应用。设参加数学兴趣小组的学生集合为 M ，参加物理兴趣小组的学生集合为 P 。根据题意，已知信息为：

$$|M| = 25, \quad |P| = 22, \quad |M \cap P| = 10$$

(1) 至少参加一个兴趣小组的人数，即求 $|M \cup P|$ 。根据容斥原理公式：

$$|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P| = 25 + 22 - 10 = 37 \text{ (人)}$$

(2) 两个小组都没有参加的人数。设全班学生为全集 U ，则所求人数为 $|\complement_U(M \cup P)|$ 。

$$|\complement_U(M \cup P)| = |U| - |M \cup P| = 50 - 37 = 13 \text{ (人)}$$

B 组

解析 3

◆ 德摩根定律与一元二次不等式

本题将德摩根定律与一元二次不等式的求解相结合.

(1) 求集合 B 解不等式 $x^2 - 3x - 4 < 0$. 因式分解得 $(x-4)(x+1) < 0$, 解得 $-1 < x < 4$.

$$B = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

(2) 求 $\complement_U(A \cap B)$ 直接计算 $A \cap B$ 再求补集较为繁琐, 应用德摩根定律可以简化运算.

$$\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$$

分别计算两个补集:

$$\complement_U A = \{x \mid \neg(x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4)\} = \{x \mid -1 < x < 4\} = (-1, 4)$$

$$\complement_U B = \{x \mid \neg(-1 < x < 4)\} = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\} = (-\infty, -1] \cup [4, \infty)$$

求它们的并集:

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = (-1, 4) \cup ((-\infty, -1] \cup [4, \infty)) = \mathbb{R}$$

因此, $\complement_U(A \cap B) = \mathbb{R}$.

解析 4

◆ 容斥原理的逆向应用

本题是容斥原理的逆向和综合应用. 设数学及格的集合为 M , 物理及格的集合为 P . 已知信息:

$$|U| = 50, \quad |M| = 40, \quad |P| = 31$$

“两科都不及格”的人数为 4, 即 $|\complement_U(M \cup P)| = 4$.

(1) 求两科都及格的人数, 即求 $|M \cap P|$. 首先, 由补集信息计算至少有一科及格的人数 $|M \cup P|$.

$$|M \cup P| = |U| - |\complement_U(M \cup P)| = 50 - 4 = 46$$

再根据容斥原理 $|M \cup P| = |M| + |P| - |M \cap P|$, 可得:

$$46 = 40 + 31 - |M \cap P|$$

$$|M \cap P| = 71 - 46 = 25 \text{ (人)}$$

(2) 求恰好只有一科及格的人数. 这部分学生等于“至少一科及格”的人数减去“两科都及格”的人数.

$$|(M \cup P) \setminus (M \cap P)| = |M \cup P| - |M \cap P| = 46 - 25 = 21 \text{ (人)}$$

C 组

解析 5

◆ 三集合容斥原理

本题是三集合容斥原理的经典应用. 设关注 A, B, C 话题的人构成的集合分别为 A, B, C . 已知信息:

$$|A| = 45, \quad |B| = 55, \quad |C| = 60$$

$$|A \cap B| = 25, \quad |A \cap C| = 20, \quad |B \cap C| = 30$$

$$|A \cap B \cap C| = 10$$

(1) 求至少关注一个话题的人数, 即求 $|A \cup B \cup C|$. 应用三集合容斥原理公式:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\ &= (45 + 55 + 60) - (25 + 20 + 30) + 10 \\ &= 160 - 75 + 10 \\ &= 95 \text{ (人)} \end{aligned}$$

(2) 求恰好只关注一个话题的人数. 这部分人数等于只关注 A, 只关注 B, 只关注 C 的人数之和.

只关注 A 的人数:

$$|A \setminus (B \cup C)| = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 45 - 25 - 20 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 B 的人数:

$$|B \setminus (A \cup C)| = |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 55 - 25 - 30 + 10 = 10 \text{ (人)}$$

只关注 C 的人数:

$$|C \setminus (A \cup B)| = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 60 - 20 - 30 + 10 = 20 \text{ (人)}$$

总人数为 $10 + 10 + 20 = 40$ (人).

第二章 函数与导数

知识框架

◆ 要点回顾

- 函数的奇偶性: $f(-x) = -f(x)$ 为奇函数, $f(-x) = f(x)$ 为偶函数; 定义域必须关于原点对称。
- 函数的单调性: $f'(x) > 0$ 递增, $f'(x) < 0$ 递减; 含参函数需分类讨论。
- 对数函数的定义域: $\lg g(x)$ 要求 $g(x) > 0$; 单调性分析需同时考虑定义域。
- 充分条件与必要条件: 函数性质判断中常用充要条件分析。

2.1 函数的性质

A 组

解析 9

◆ 含参函数的奇偶与单调性

答案 A

待补充解析。

B 组

解析 10

◆ 对数函数的定义域与单调性

待补充解析。

第三章 向量

知识框架

◆ 要点回顾

- 平面向量的线性运算：加法、减法、数乘，及运算的几何意义（三角形法则、平行四边形法则）。
- 平面向量的数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ，可用于求夹角、判断垂直。
- 向量的坐标表示： $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。
- 共线与垂直： $\vec{a} // \vec{b} \iff x_1y_2 = x_2y_1$ ； $\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。
- 空间向量：共面定理—— $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面 $\iff$ 存在实数 x, y 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线时)。
- 三角形的心：外心（到顶点等距）、重心 ($\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$)、垂心 ($\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$)、内心。

3.1 平面向量的运算

A 组

解析 11

◆ 向量的夹角

答案 C

待补充解析。

解析 12

◆ 向量集合的交集

待补充解析。

解析 13

◆ 向量叉积与面积

答案 C

待补充解析。

B 组

解析 14

◆ 向量数量积与条件

答案 B

待补充解析。

解析 15

◆ 向量的垂直与共线

答案 C

待补充解析。

解析 16

◆ 直线方向向量与夹角

待补充解析。

三角形的心

解析 17

◆ 三角形的外心重心垂心

答案 C

待补充解析。

C 组

解析 18

◆ 向量的投影与三角形形状

答案 D

待补充解析。

解析 19

◆ 空间向量的共面条件

答案 C

待补充解析。

第四章 立体几何

知识框架

◆ 要点回顾

- 空间线面关系：线线平行/垂直、线面平行/垂直、面面平行/垂直的判定与性质。
- 充分必要条件：在立体几何中，线面平行/垂直的条件判定是充要条件分析的重点。
- 面面交线： $\alpha \cap \beta = m$ 时，直线与两平面的关系可通过交线传递。
- 线面成角：直线与平面所成的角等于该直线与它在平面内射影所成的角，范围 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。

4.1 空间线面关系

A 组

解析 20

◆ 线面共面与充要条件

待补充解析。

解析 21

◆ 面面平行的判定

答案 B

待补充解析。

解析 22

◆ 线面平行与垂直

答案 C

待补充解析。

B 组

解析 23

◆ 面面交线与线面关系

答案 D

待补充解析。

第五章 解三角形

知识框架

◆ 要点回顾

核心解题思路：多变量 $\rightarrow$ 单变量 $\rightarrow$ 求最值

- **边化角**：若表达式含边或边的比例，优先使用正弦定理 ($a = 2R \sin A$ 等)，将边长转化为角的正弦。
- **边化角（余弦路径）**：若表达式含边的平方，或已知条件为 SAS / SSS，则余弦定理是首选。
- **消元**：利用内角和 $A + B + C = \pi$ 消去多余的角变量。
- **定义域**：三角形内角 $\in (0, \pi)$ ；附加约束如“锐角”“钝角”需额外限制。
- **求最值工具**：辅助角公式、二次函数配方法、求导。

5.1 取值范围

知识回顾

解决问题的第一步，是将题目中多变量换成单变量。这是化繁为简、确立解题方向的关键。

- 若表达式含边或边的比例，优先考虑使用正弦定理 ($a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, \dots$)，将边长转化为对应角的正弦，实现“边化角”。
- 若表达式含边的平方，或已知条件为“两边一夹角” (SAS) / “三边” (SSS)，则余弦定理是构造关系式的不二之选。
- 利用内角和定理 $A + B + C = \pi$ 消去多余的角变量，是实现“变量化归”的最后一步。

牢记定义域，这是最关键也最容易被忽略的一步。三角形中的角并非任意取值，其范围受到严格的内在约束。

- **基本约束**：三角形的任意内角都必须在 $(0, \pi)$ 范围内。

- **结构约束：**例如，若已将其他角用变量角 B 表示为 $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$ ，则必须同时满足 $B > 0, A > 0, C > 0$.

习题集

解析 6

◆ 取值范围

本题的核心数学对象是 $\triangle ABC$ ，回顾我们所学的知识，一个三角形的形状由其三个内角 A, B, C 决定. 由于内角和为 π ，即 $A + B + C = \pi$ ，是为其一之约束，因此，一个三角形的形状本质上只有 **2 个自由度**. 我们可以选择任意两个角（例如 A 和 B ）作为独立的参数，第三个角 C 便随之确定.

题目给出的条件 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 是一个满足式条件，而我们的首要任务，就是将这个不咋好看的等式，翻译成关于角 A, B 的更简洁的关系式.

因此，我们化简下原式，在等式左边，利用半角公：

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - A)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - A)} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})}{2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2})} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right)$$

等式右边，利用二倍角公式：

$$\frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B} = \frac{2 \sin B \cos B}{1 + (2 \cos^2 B - 1)} = \frac{2 \sin B \cos B}{2 \cos^2 B} = \tan B$$

因此：

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$$

由于 $A, B \in (0, \pi)$ ，可知 $\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. 在各自的定义域内，正切函数是单调的，故：

$$\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2} = B \quad \Rightarrow \quad A + 2B = \frac{\pi}{2}$$

这个简洁的关系，就是原复杂三角等式背后隐藏的约束. 它将三角形形状的 2 个自由度削减为了 **1 个自由度**. 接着，我们只需要确定一个角，整个三角形的形状就完全确定了.

对于第 (1) 问：题目给出了构造式条件 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，这提供了消除最后一个自由度的信息. 我们现在有两个关于 A, B, C 的线性约束：

$$\begin{aligned} A + B + C &= \pi \\ A + 2B &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3}$ 代入第一个式子，得到 $A + B = \frac{\pi}{3}$. 联立方程组：

$$\begin{cases} A + 2B = \frac{\pi}{2} \\ A + B = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

解得 $B = \frac{\pi}{6}$. 至此，三角形的所有角都被唯一确定，问题解决.

对于第 (2) 问：此问没有给出额外条件，因此我们需要在由 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$ 所确定的所有可能的三角形形状中，寻找目标表达式的最小值. 这正是用自由度参数表达并求解思想的用武之地.

我们选择角 B 作为描述三角形形状的唯一自由参数. 其他角可以用 B 表示：

$$A = \frac{\pi}{2} - 2B$$

$$C = \pi - (A + B) = \pi - \left(\left(\frac{\pi}{2} - 2B \right) + B \right) = \frac{\pi}{2} + B$$

为了使 $\triangle ABC$ 成立，所有内角必须为正：

$$A > 0 \implies \frac{\pi}{2} - 2B > 0 \implies B < \frac{\pi}{4}$$

$$B > 0 \quad \text{且} \quad C = \frac{\pi}{2} + B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{4})$.

目标函数是 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$. 利用正弦定理，将其从边长语言翻译为角度语言：

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2} - 2B) + \sin^2 B}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + B)} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

问题转化为：求函数 $f(B)$ 在区间 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$ 上的最小值.

为了简化计算，我们进行变量代换. 令 $x = \sin^2 B$. 由于 $B \in (0, \frac{\pi}{4})$, 新变量 x 的取值范围是 $(0, \sin^2(\frac{\pi}{4})) = (0, \frac{1}{2})$.

$$\cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - x \quad \text{且} \quad \cos(2B) = 1 - 2\sin^2 B = 1 - 2x$$

代入得到关于 x 的函数 $g(x)$ ：

$$g(x) = \frac{(1 - 2x)^2 + x}{1 - x} = \frac{4x^2 - 3x + 1}{1 - x}$$

为求 $g(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上的最小值，我们对其求导：

$$g'(x) = \frac{(8x - 3)(1 - x) - (4x^2 - 3x + 1)(-1)}{(1 - x)^2} = \frac{-4x^2 + 8x - 2}{(1 - x)^2}$$

令 $g'(x) = 0$, 即 $2x^2 - 4x + 1 = 0$. 解得 $x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 考虑到定义域 $x \in (0, \frac{1}{2})$, 我们取驻点 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 分析可知，当 $x \in (0, x_0)$ 时， $g'(x) < 0$ ；当 $x \in (x_0, \frac{1}{2})$ 时， $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值. 将 $x_0 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入 $g(x)$. 为简化计算，先对 $g(x)$ 进行代数变形：

$$g(x) = \frac{-4x(1 - x) + (x - 1) + 2}{1 - x} = -4x - 1 + \frac{2}{1 - x}$$

最小值为：

$$\begin{aligned}
 g\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= -4\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 1 + \frac{2}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\
 &= -4 + 2\sqrt{2} - 1 + \frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\
 &= -5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\
 &= 4\sqrt{2} - 5
 \end{aligned}$$

□

解析 7

◆ 取值范围

题目给出的核心约束是关于边和角的满足式条件“ $a = b + 2b \cos C$ ”. 为了得到我们想要的关系，我们先利用正弦定理翻译起手，目的是将边长关系翻译为角度关系.

由正弦定理，设 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 代入原式得：

$$k \sin A = k \sin B + 2k \sin B \cos C$$

由于 $k \neq 0$, 两边同除以 k 得：

$$\sin A = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

在 $\triangle ABC$ 中, $A = \pi - (B + C)$, 故 $\sin A = \sin(\pi - (B + C)) = \sin(B + C)$. 代入上式：

$$\sin(B + C) = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

展开左侧：

$$\sin B \cos C + \cos B \sin C = \sin B + 2 \sin B \cos C$$

移项整理得：

$$\cos B \sin C - \sin B \cos C = \sin B$$

左侧恰为差角公式，即 $\sin(C - B) = \sin B$.

由于 B, C 均为三角形内角，故 $B \in (0, \pi), C \in (0, \pi)$. 同时 $B + C \in (0, \pi)$, 可得 $C - B \in (-\pi, \pi)$. 由 $\sin(C - B) = \sin B$ 可得两种可能：

- $C - B = B$, 即 $C = 2B$.
- $C - B = \pi - B$, 即 $C = \pi$. 矛盾.

因此, $C = 2B$. 至此, 第 (1) 问得证.

第 (1) 问的结论 $C = 2B$ 极大地简化了问题, 它将三角形形状的自由度从 2 降至 1. 我们可以选择角 B 作为唯一的自由参数来描述所有满足条件的三角形.

首先，我们将所有角用参数 B 表示，也即所谓的选定变量，或者说是归一思想：

$$C = 2B, \quad A = \pi - (B + C) = \pi - 3B$$

为保证 A, B, C 构成一个三角形，所有内角必须为正：

$$B > 0$$

$$C = 2B > 0 \quad (\text{当 } B > 0 \text{ 时恒成立})$$

$$A = \pi - 3B > 0 \implies 3B < \pi \implies B < \frac{\pi}{3}$$

综上，自由参数 B 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3})$.

目标函数为 $\frac{a+c}{b}$. 我们再次利用正弦定理，将其翻译为角度的表达式：

$$\frac{a+c}{b} = \frac{k \sin A + k \sin C}{k \sin B} = \frac{\sin A + \sin C}{\sin B}$$

将所有角用参数 B 代入：

$$f(B) = \frac{\sin(\pi - 3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

由于 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$, $\sin B \neq 0$, 我们可以进行化简：

$$f(B) = \frac{\sin(3B) + \sin(2B)}{\sin B}$$

利用和差化积公式或三倍角、二倍角公式展开. 这里使用后者更为直接：

$$\begin{aligned} f(B) &= \frac{(3 \sin B - 4 \sin^3 B) + (2 \sin B \cos B)}{\sin B} \\ &= 3 - 4 \sin^2 B + 2 \cos B \end{aligned}$$

为了求 $f(B)$ 的范围，我们将其转化为关于单一三角函数变量的代数式. 令 $t = \cos B$. 首先确定新变量 t 的范围. 因为 $B \in (0, \frac{\pi}{3})$ 且 $y = \cos x$ 在此区间上单调递减，所以：

$$t = \cos B \in \left(\cos \frac{\pi}{3}, \cos 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, 1 \right)$$

将原表达式中的 $\sin^2 B$ 替换为 $1 - \cos^2 B = 1 - t^2$ ：

$$\begin{aligned} g(t) &= 3 - 4(1 - t^2) + 2t \\ &= 3 - 4 + 4t^2 + 2t \\ &= 4t^2 + 2t - 1 \end{aligned}$$

问题最终转化为：求二次函数 $g(t) = 4t^2 + 2t - 1$ 在开区间 $t \in (\frac{1}{2}, 1)$ 上的值域.

这是一个开口向上的抛物线，对称轴为 $t = -\frac{2}{2 \times 4} = -\frac{1}{4}$. 由于区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 完全位于对称轴的右侧，所以函数 $g(t)$ 在此区间上是严格单调递增的.

因此，值域的边界由区间端点决定：

- 当 $t \rightarrow \frac{1}{2}^+$ 时, $g(t) \rightarrow 4(\frac{1}{2})^2 + 2(\frac{1}{2}) - 1 = 1 + 1 - 1 = 1$.
- 当 $t \rightarrow 1^-$ 时, $g(t) \rightarrow 4(1)^2 + 2(1) - 1 = 4 + 2 - 1 = 5$.

由于 t 的取值范围是开区间, 所以函数值的范围也是开区间.

最终, $\frac{a+c}{b}$ 的取值范围是 $(1, 5)$. □

解析 8

◆ 面积公式与内心

本题通过一个面积与边长的关系式来约束三角形的形状. 我们的策略是利用面积公式、余弦定理来翻译这个关系式, 从而确定一个内角.

1. 求角 B . 一方面, 三角形的面积公式为:

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B$$

另一方面, 题目给出的条件 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 中, 括号内的项 $a^2 + c^2 - b^2$ 与余弦定理结构相似. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 可得:

$$a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$$

将此式代入题目给定的条件中:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(2ac \cos B) = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

于是得到了关于面积 S 的两个等价表达式, 令它们相等:

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}ac \cos B$$

由于在三角形中 a, c 均为正数, 可约去 $\frac{1}{2}ac$:

$$\sin B = \sqrt{3} \cos B$$

因为 $B \in (0, \pi)$, $\cos B = 0$ 时 $\sin B \neq 0$, 故 $\cos B \neq 0$. 两边同除以 $\cos B$ 得:

$$\tan B = \sqrt{3}$$

考虑到 B 是三角形内角, 解得 $B = \frac{\pi}{3}$.

2. 求解 $\triangle AOC$ 周长的取值范围

第 (1) 问确定了角 B 的大小, 多了一个条件, 方便我们弄出第二问, 来看第二问, 其目标对象是 $\triangle AOC$ 的周长, 我们的思路是: 先将周长表达为一个函数的形式, 并确定其定义域, 进而求出值域.

点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心, 即 AO, CO 分别是 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的角平分线. 因此, 在 $\triangle AOC$ 中:

$$\angle OAC = \frac{A}{2}, \quad \angle OCA = \frac{C}{2}$$

其第三个角为:

$$\angle AOC = \pi - \left(\frac{A}{2} + \frac{C}{2} \right) = \pi - \frac{A+C}{2}$$

由于我们已经求出 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以 $A+C = \pi - B = \frac{2\pi}{3}$. 代入上式, 我们得到一个重要的定值:

$$\angle AOC = \pi - \frac{2\pi/3}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$\triangle AOC$ 的周长 $P = AO + CO + AC$. 其中 $AC = b = 2\sqrt{3}$ 是已知定值.

我们选择角 A 作为唯一的自由参数. 在 $\triangle AOC$ 中, 应用正弦定理:

$$\begin{aligned} \frac{AO}{\sin(\angle OCA)} &= \frac{CO}{\sin(\angle OAC)} = \frac{AC}{\sin(\angle AOC)} \\ \frac{AO}{\sin(C/2)} &= \frac{CO}{\sin(A/2)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin(2\pi/3)} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 4 \end{aligned}$$

由此解出 $AO = 4\sin(C/2)$ 和 $CO = 4\sin(A/2)$. 周长表达式为:

$$P(A, C) = 4\sin(A/2) + 4\sin(C/2) + 2\sqrt{3}$$

将 $C = \frac{2\pi}{3} - A$ 代入, 得到关于单参数 A 的函数:

$$P(A) = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{2\pi/3 - A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3} = 4 \left[\sin\left(\frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2}\right) \right] + 2\sqrt{3}$$

首先确定参数 A 的范围. 在 $\triangle ABC$ 中, 各角需为正:

$$A > 0, \quad C = \frac{2\pi}{3} - A > 0 \implies A < \frac{2\pi}{3}$$

故 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$.

我们对括号内的三角函数部分进行化简, 令其为 $g(A) = \sin(\frac{A}{2}) + \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{A}{2})$. 利用和差化积公式:

$$g(A) = 2\sin\left(\frac{A/2 + \pi/3 - A/2}{2}\right)\cos\left(\frac{A/2 - (\pi/3 - A/2)}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{A - \pi/3}{2}\right)$$

由于 $2\sin(\frac{\pi}{6}) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, 所以 $g(A) = \cos(\frac{A}{2} - \frac{\pi}{6})$.

现在求 $g(A)$ 的范围. 因为 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$:

$$\frac{A}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \implies \frac{A}{2} - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$$

余弦函数 $y = \cos x$ 在区间 $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$ 上是偶函数, 且在该区间上从 $\cos(-\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 减到 $\cos(0) = 1$ 再增回 $\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 其值域为 $(\cos(\frac{\pi}{6}), \cos(0)] = (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$. 所以 $g(A) \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

最终, 周长 $P(A) = 4g(A) + 2\sqrt{3}$ 的取值范围是:

$$\left(4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\sqrt{3}, \quad 4 \cdot 1 + 2\sqrt{3} \right] = (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}, \quad 4 + 2\sqrt{3}] = (4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$$

故 $\triangle AOC$ 周长的取值范围是 $(4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$. □

解析 9

◆ 锐角三角形的取值范围

1. 求角 B .

题目给出的条件是一个混合了边与角的复杂比例式. 我们的首要策略是利用正弦定理, 将所有三角函数项统一替换为边长, 从而将问题转化为纯粹的代数关系式, 以揭示约束条件.

由正弦定理, $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 代入原式:

$$\frac{\frac{a}{2R} - \frac{b}{2R}}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\frac{c}{2R}}{a + b}$$

消去公因式 $\frac{1}{2R}$, 我们得到:

$$\frac{a - b}{\sqrt{3}a - c} = \frac{c}{a + b}$$

通过交叉相乘, 将比例式转化为等式:

$$(a - b)(a + b) = c(\sqrt{3}a - c)$$

展开得:

$$a^2 - b^2 = \sqrt{3}ac - c^2$$

移项, 整理成余弦定理的形式:

$$a^2 + c^2 - b^2 = \sqrt{3}ac$$

根据余弦定理, 我们知道 $a^2 + c^2 - b^2 = 2ac \cos B$. 于是:

$$2ac \cos B = \sqrt{3}ac$$

由于 a, c 是三角形的边长, 必为正数, 可约去 $2ac$:

$$\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 B 是三角形内角, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$. 这个值满足锐角三角形中 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的要求.

2. 求解周长的取值范围

第 (1) 问固定了角 $B = \frac{\pi}{6}$, 第 (2) 问又给定了边 $a = 2$. 此时, 三角形的自由度仅剩一个. 我们可以选择一个角 (例如角 A) 作为自由参数, 来表达周长并确定其范围.

我们选择角 A 为参数. $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 因此所有角都必须在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内.

- $A \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $B = \frac{\pi}{6} \in (0, \frac{\pi}{2})$
- $C = \pi - (A + B) = \pi - (A + \frac{\pi}{6}) = \frac{5\pi}{6} - A \in (0, \frac{\pi}{2})$

从 C 的范围我们可以得到对 A 的两个约束：

- $\frac{5\pi}{6} - A > 0 \implies A < \frac{5\pi}{6}$. 此条件被 $A < \pi/2$ 包含.
- $\frac{5\pi}{6} - A < \frac{\pi}{2} \implies \frac{5\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} < A \implies A > \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

综上，参数 A 的取值范围是 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$.

确定完后，我们看看周长 $P = a + b + c = 2 + b + c$ ，利用正弦定理将 b, c 用参数 A 表示.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \implies \frac{2}{\sin A} = \frac{b}{\sin(\pi/6)} = \frac{c}{\sin(5\pi/6 - A)}$$

解得：

$$b = \frac{2 \sin(\pi/6)}{\sin A} = \frac{1}{\sin A}$$

$$c = \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A}$$

所以，周长 P 是关于 A 的函数：

$$\begin{aligned} P(A) &= 2 + \frac{1}{\sin A} + \frac{2 \sin(5\pi/6 - A)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + 2(\sin \frac{5\pi}{6} \cos A - \cos \frac{5\pi}{6} \sin A)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + 2(\frac{1}{2} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A)}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + \cos A + \sqrt{3} \sin A}{\sin A} \\ &= 2 + \frac{1 + \cos A}{\sin A} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

化简，然后分析函数 $g(A) = \frac{1+\cos A}{\sin A}$. 利用半角公式，简单期间，设 $\cot A/2 = \frac{1}{\tan A/2}$ ，这里用到余切函数了，当然你换个元也是一样的效果.

$$g(A) = \frac{2 \cos^2(A/2)}{2 \sin(A/2) \cos(A/2)} = \cot(A/2)$$

因此，周长函数为 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$.

注意到当 $A \in (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$ 时，

$$A \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right) \implies \frac{A}{2} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$$

函数 $y = \cot x$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 上是单减. 因此，函数的值域由区间端点决定：

- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}^+$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$.
- 当 $\frac{A}{2} \rightarrow \frac{\pi}{4}^-$ 时， $\cot(\frac{A}{2}) \rightarrow \cot(\frac{\pi}{4}) = 1$.

所以， $\cot(A/2)$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{3})$.

综上，周长 $P(A) = 2 + \sqrt{3} + \cot(A/2)$ 的取值范围是：

$$(2 + \sqrt{3} + 1, 2 + \sqrt{3} + \sqrt{3}) = (3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$$

故 $\triangle ABC$ 周长的取值范围是 $(3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$. □

5.2 面积问题

习题集

解析 10

◆ 面积问题

1. 求 $\angle ADC$

本题要我们求 $\triangle ADC$. 题目直接给出了这个三角形的三条边长: $AD = 5, DC = 3, AC = 7$. 当一个三角形的三边确定时, 其形状和所有内角也随之完全确定.

先应用余弦定理来求解 $\angle ADC$. 在 $\triangle ADC$ 中:

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2(AD)(DC) \cos(\angle ADC)$$

代入已知数据:

$$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2(5)(3) \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 25 + 9 - 30 \cos(\angle ADC)$$

$$49 = 34 - 30 \cos(\angle ADC)$$

整理得到:

$$15 = -30 \cos(\angle ADC) \Rightarrow \cos(\angle ADC) = -\frac{1}{2}$$

由于 $\angle ADC$ 是三角形的内角, 其范围为 $(0, \pi)$, 因此 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$.

2. 求 $\triangle ABC$ 面积

为求 $\triangle ABC$ 的面积, 我们需要确定更多的边或角. 关键在于利用连接两个三角形的条件 $\angle DAC = \angle ABC$.

令 $\angle ABC = B$, 则 $\angle DAC = B$. 在 $\triangle ADC$ 中, 我们已知三边和一角, 可以利用正弦定理求出 $\sin B$:

$$\frac{AC}{\sin(\angle ADC)} = \frac{DC}{\sin(\angle DAC)}$$

$$\frac{7}{\sin(2\pi/3)} = \frac{3}{\sin B} \Rightarrow \sin B = \frac{3 \sin(2\pi/3)}{7} = \frac{3(\sqrt{3}/2)}{7} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

现在我们的焦点转移到 $\triangle ABD$. 我们知道 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$, 故其补角 $\angle ADB = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. 在 $\triangle ABD$ 中, 我们已知:

- 边 $AD = 5$
- 角 $\angle ABD = B$
- 角 $\angle ADB = \frac{\pi}{3}$

第三个角为 $\angle BAD = \pi - B - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - B$. 应用正弦定理于 $\triangle ABD$:

$$\frac{AB}{\sin(\angle ADB)} = \frac{BD}{\sin(\angle BAD)} = \frac{AD}{\sin(\angle ABD)}$$

$$\frac{AB}{\sin(\pi/3)} = \frac{BD}{\sin(2\pi/3 - B)} = \frac{5}{\sin B}$$

由此可解得边长 BD :

$$BD = \frac{5 \sin(2\pi/3 - B)}{\sin B}$$

为计算此值, 我们需要 $\cos B$. 由于 $\triangle ABC$ 中 D 在 BC 边上, 则 $C = \angle ACD$ 必为锐角 (否则 $C + \angle ADC \geq \pi$), 故 $\angle DAC = B$ 也必为锐角. 因此 $\cos B > 0$.

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{27}{196}} = \sqrt{\frac{169}{196}} = \frac{13}{14}$$

展开 $\sin(2\pi/3 - B)$:

$$\begin{aligned} BD &= \frac{5(\sin(2\pi/3) \cos B - \cos(2\pi/3) \sin B)}{\sin B} \\ &= \frac{5((\sqrt{3}/2)(13/14) - (-1/2)(3\sqrt{3}/14))}{3\sqrt{3}/14} \\ &= \frac{5(13\sqrt{3}/28 + 3\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(16\sqrt{3}/28)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{5(4\sqrt{3}/7)}{3\sqrt{3}/14} = \frac{20\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{14}{3\sqrt{3}} = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

接下来, 计算面积即可, $\triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 的面积之和.

$$S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} AD \cdot DC \sin(\angle ADC) = \frac{1}{2} (5)(3) \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{15}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AD \cdot BD \sin(\angle ADB) = \frac{1}{2} (5) \left(\frac{40}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{100}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{50\sqrt{3}}{3}$$

总面积为:

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle ABD} = \frac{15\sqrt{3}}{4} + \frac{50\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \left(\frac{45 + 200}{12}\right) = \frac{245\sqrt{3}}{12}$$

故 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{245\sqrt{3}}{12}$. □

5.3 解三角形综合

习题集

解析 11

◆ 解三角形综合

待补充解析

第六章 圆锥曲线

知识框架

◆ 要点回顾

- 直线与圆的位置关系: $d < r$ 相交、 $d = r$ 相切、 $d > r$ 相离; 弦长公式 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。
- 抛物线: $y^2 = 2px$ 的焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = -\frac{p}{2}$; 切线问题常转化为联立方程。
- 椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 焦点在长轴上。
- 直线与圆锥曲线: 联立方程后用韦达定理处理弦长、中点、斜率等问题。
- 点与圆的位置关系: 圆上点的切线方程、割线与切线的转化。

6.1 直线与圆

A 组

解析 24

◆ 直线与位置关系

待补充解析。

B 组

解析 25

◆ 等差中项与圆的弦长

答案 C

待补充解析。

C 组

解析 26

◆ 抛物线的切线与割线

答案 A

待补充解析。

6.2 椭圆

习题集

解析 12

◆ 椭圆

待补充解析。

第七章 数列

知识框架

◆ 要点回顾

- 数列的通项与前 n 项和: $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$; $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)。
- 等差数列: $a_n = a_1 + (n-1)d$, $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 。
- 等比数列: $a_n = a_1 q^{n-1}$, $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ($q \neq 1$)。
- 递推关系的处理: 构造辅助数列 (如取倒数) 将递推式转化为等比数列。
- 单调性判断: $a_{n+1} - a_n$ 的符号或 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 1 的大小比较。

7.1 数列的性质与运算

A 组

解析 13

◆ 数列的性质与运算

待补充解析。

B 组

解析 14

◆ 递推数列与等比数列

待补充解析。

C 组

解析 15

◆ 等差数列与等比数列

待补充解析。

第八章 概率与统计

知识框架

◆ 要点回顾

- 相关系数与决定系数： $|r|$ 越大线性相关性越强； R^2 越大拟合效果越好。
- χ^2 独立性检验：适用于抽样数据，不适用于普查数据。
- 正态分布： $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的对称性—— $P(\xi \geq \mu + a) = P(\xi \leq \mu - a)$ 。
- 独立事件的概率：各项目独立时，总概率为各项目概率的乘积。
- 分布列与期望：离散型随机变量 X 的 $E(X) = \sum x_i p_i$ 。

8.1 统计基础

A 组

解析 27

◆ 统计概念辨析

待补充解析。

8.2 概率与分布

B 组

解析 16

◆ 独立事件与分布列

待补充解析。

高中数学之旅（参考答案）

An Excursion through Secondary School Mathematics: Solutions

本书为《高中数学之旅》配套参考答案册，与习题集一一对应，提供每道选择题、填空题和解答题的完整解析过程。答案讲解注重思路拆解与逻辑链条的完整呈现，便于读者在练习后自查订正、加深理解。