

## Renseignements généraux

- *Concours* : ENS CR
- *Matière* : Maths CR
- *NOM Prénom* : ABOU YASSIN Jad

## Énoncé des exercices

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , où  $I$  est un intervalle borné de  $\mathbb{R}$ . Si  $0 < \alpha < 1$ , on pose :

$$H_\alpha(f) = \sup \left\{ \frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|^\alpha}, (x_1, x_2) \in I^2, x_1 \neq x_2 \right\}$$

- 1) Montrer que si  $0 < \beta < \alpha$  et  $H_\alpha(f) < +\infty$ , alors  $H_\beta(f) < +\infty$
- 2) Soit maintenant  $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ . On définit alors :

$$H_\alpha(f) = \sup \left\{ \frac{|f(x_1, u_1) - f(x_2, u_2)|}{\max(|x_1 - x_2|^\alpha, |u_1 - u_2|^\alpha)}, \begin{pmatrix} (x_1, x_2, u_1, u_2) \in I^2 \times J^2 \\ x_1 \neq x_2 \\ u_1 \neq u_2 \end{pmatrix} \right\}$$

Si

$$\begin{array}{ccc} f : & [0, 1]^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & (x, u) & \longmapsto |x - u| \end{array}$$

Calculer  $H_1(f)$ .

- 3) On pose, si  $i \in \{1, 2\}$  :

$$\begin{array}{ccc} f_{u_i} : & [0, 1] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto f(x, u_i) \end{array}$$

Calculer  $H_1(f_{u_1} - f_{u_2})$

- 4) Soit  $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $H_\beta(f) < +\infty$ , où  $0 < \beta < 1$ .  
Montrer que, si  $0 < \alpha < \beta$ , alors

$$\sup \left\{ \frac{H_\alpha(f_{u_1} - f_{u_2})}{|u_1 - u_2|^{\beta-\alpha}}, (u_1, u_2) \in J^2 \right\} < +\infty$$

## Remarques sur l'oral

Examinatrice sympathique qui n'hésite pas à donner des conseils lorsque je suis bloqué. C'était par exemple le cas pour la question 3), où elle m'a demandé de représenter sur un graphique la fonction  $f_{u_1} - f_{u_2}$  puis tout était plus clair ensuite.

Il s'agit d'un exercice où il faut faire très attention aux notations,  $H_\alpha$  ne désignant pas la même chose pour une fonction à une ou deux variables, ce qui m'a un peu embrouillé par moments. L'oral s'est globalement bien déroulé.