

# FONCTIONS PUISSANCE, LOGARITHMIQUES OU EXPONENTIELLES

## Exercice 1

Résoudre les équations suivantes :

- $\ln(x^2 - 1) + \ln 4 = \ln(4x - 1)$
- $\ln|x - 1| + \ln|x + 2| = \ln|4x^2 + 3x - 7|$
- $2x^2 = 3x^3$
- $2^{x+1} + 4^x = 15$

## Exercice 2

Résoudre l'équation  $\alpha^4 - 585\alpha + 584 = 0$  en testant  $\alpha = 8$ .

## Exercice 3

Résoudre l'équation  $\sqrt{x - 4\sqrt{x - 4}} + \sqrt{x + 5 - 6\sqrt{x - 4}} = 1$ .

## Exercice 4

Simplifier les expressions suivantes :

- $(7 + 5\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} - (-7 + 5\sqrt{2})^{\frac{1}{3}}$
- $\left(\frac{13 + 5\sqrt{17}}{2}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{-13 + 5\sqrt{17}}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

## Exercice 5

Soient  $0 < a \leq b$ . On pose :

$$f(x) = \frac{\ln(1 + ax)}{\ln(1 + bx)}.$$

1. Étudier la fonction  $f$ .
2. En déduire l'inégalité :

$$\ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) \times \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right) \leq (\ln 2)^2.$$

## Exercice 6

Soient  $p$  et  $q$  des réels dans  $]1, +\infty[$  tels que :  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

1. Montrer que si  $u$  et  $v$  sont des réels positifs ou nuls, alors :

$$u v \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

2. Soient  $u_1, \dots, u_n$  et  $v_1, \dots, v_n$  des nombres complexes. Montrer que [inégalité de Hölder] :

$$\sum_{k=1}^n |u_k v_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |u_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |v_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

[indication : on commencera par montrer cette inégalité

lorsque  $\sum_{k=1}^n |u_k|^p = \sum_{k=1}^n |v_k|^q = 1$ .]

## Exercice 7

On se donne deux réels  $a \geq 0$  et  $b \geq 0$  et quatre réels  $x, y, u$  et  $v$  tels que :

$$0 < y < v < u < x.$$

Montrer que :  $\sqrt{ax + b} + \sqrt{ay + b} \geq \sqrt{au + b} + \sqrt{av + b}$ .

# FONCTIONS CIRCULAIRES OU CIRCULAIRES INVERSES

## Exercice 8

Déterminer une valeur des nombres suivants :

- $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right), \arccos\left(\sin \frac{7\pi}{15}\right)$
- $\arctan\left(\tan \frac{87\pi}{5}\right)$

## Exercice 9

Démontrer par deux méthodes différentes que :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \arccos\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = 2 \arctan(\sqrt{x}).$$

## Exercice 10

1. Montrer que  $2 \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$ .
2. Montrer que :  $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$ . [formule de Machin]

## Exercice 11

- $\arccos x = 2 \arccos \frac{3}{4}$
- $\arcsin x = \arccos \frac{1}{4} + \arcsin \frac{1}{3}$

## Exercice 12

Tracer les courbes des fonctions  $x \mapsto \arccos(\cos x)$  et  $x \mapsto \arcsin(\sin x)$ .

## Exercice 13

Simplifier  $\arctan\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right)$  et  $\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ .

## Exercice 14

1. Calculer  $\arctan 2 + \arctan 5 + \arctan 8$ .
2. Résoudre l'équation :

$$\arctan(x-3) + \arctan x + \arctan(x+3) = \frac{\pi}{4}.$$

## Exercice 15

Étudier les fonctions suivantes :

- $f : x \mapsto \arccos(4x^3 - 3x)$
- $g : x \mapsto \arcsin\left(\frac{x+1}{\sqrt{2(1+x^2)}}\right)$ .

## FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES HYPERBOLIQUES

## Exercice 16

Résoudre les équations :

- $5\operatorname{ch} x - 3\operatorname{sh} x = 4$
- $3\operatorname{sh} x - \operatorname{ch} x = 1$

## Exercice 17

Calculer en fonction de  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$  les sommes :

$$C = \sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(kx) \text{ et } S = \sum_{k=0}^n \operatorname{sh}(kx).$$

## Exercice 18

1. Montrer que la fonction  $\operatorname{ch}$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  vers  $]1, +\infty[$  et exprimer sa fonction réciproque en fonction des formules usuelles. Exprimer également la dérivée de cette fonction, en utilisant deux raisonnements différents.
2. Montrer que la fonction  $\operatorname{sh}$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  et exprimer sa fonction réciproque en fonction des formules usuelles. Exprimer également la dérivée de cette fonction, en utilisant deux raisonnements différents.
3. Montrer que la fonction  $\operatorname{th} = \frac{\operatorname{sh}}{\operatorname{ch}}$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  vers  $] -1, 1[$  et exprimer sa fonction réciproque en fonction des formules usuelles. Exprimer également

la dérivée de cette fonction, en utilisant deux raisonnements différents.

## THÈMES VARIÉS

## Exercice 19

On pose pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$

1. Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  vers un intervalle que l'on précisera.
2. Déterminer  $f^{-1}$ .

## Exercice 20

Démontrer par deux méthodes différentes que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2 \arctan(\operatorname{th} x) = \arctan(\operatorname{sh}(2x)).$$

## Exercice 21

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^x)^x - x^{2^x}$
- $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x + 1}{(e^x - e^\pi)^2}$

## Exercice 22

Résoudre les équations suivantes :

- $\arctan x + 2 \arctan(\sqrt{1-x^2} - x) = \frac{\pi}{2}$
- $\arccos x = \arcsin 2x$
- $\arccos(\operatorname{th} t) + 2 \arctan(e^t) = \pi$

## Exercice 23

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $\cos(n\theta)$  est une expression polynomiale en fonction de  $\cos \theta$ . Exprimer en fonction de  $n$  le terme dominant (le terme en  $ax^d$  avec  $a \neq 0$  et  $d$  entier maximal dans l'expression développée du polynôme  $P(x)$ ).

## Exercice 24

Déterminer tous les entiers  $p$  et  $q$  strictement positifs tels que :  $p^q = q^p$ .