

OUTILS D'ANALYSE

CORRECTION

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note W_n la n -ème intégrale de Wallis définie par $W_n = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^n dt$.

A. Généralités

1. a) Calculer W_0 et W_1 .

On a

$$W_0 = \int_0^{\pi/2} 1 dt = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin t dt = [-\cos t]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1,$$

donc

$W_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad W_1 = 1.$
--

- b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$.

On a

$$W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} (\cos t) \times (\cos t)^{n+1} dt.$$

On effectue une intégration par parties en choisissant

$$\begin{aligned} u'(t) &= \cos t & v(t) &= (\cos t)^{n+1} \\ u(t) &= \sin t & v'(t) &= (n+1)(-\sin t)(\cos t)^n \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= [(\sin t)(\cos t)^{n+1}]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (\sin t)(n+1)(-\sin t)(\cos t)^n dt \\ &= 0 + (n+1) \int_0^{\pi/2} (\sin t)^2 (\cos t)^n dt. \end{aligned}$$

En utilisant la formule $(\cos t)^2 = 1 - (\sin t)^2$, il vient

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= (n+1) \int_0^{\pi/2} (\cos t)^n - (\cos t)^{n+2} dt \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} (\cos t)^n dt - (n+1) \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+2} dt \\ &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n,$$

c'est-à-dire

$W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n.$

- c) Démontrer que, pour tout $p \geq 0$, $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.

On procède par récurrence.

Initialisation: Au rang 0, on a, sans difficulté, $W_0 = \frac{\pi}{2} = \frac{(2 \times 0)!}{2^{2 \times 0}(0!)^2} \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1 = \frac{2^{2 \times 0}(0!)^2}{(2 \times 0 + 1)!}$.

Hérédité: Supposons que la propriété soit vérifiée au rang $p \geq 0$. Au rang $p+1$, on a

$$\begin{aligned} W_{2p+2} &= \frac{2p+1}{2p+2} W_{2p} & W_{2p+3} &= \frac{2p+2}{2p+3} W_{2p+1} && \text{d'après la question précédente} \\ &= \frac{2p+1}{2p+2} \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2} & &= \frac{2p+2}{2p+3} \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!} && \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{(2p+1)!}{2^{2p+1}p!(p+1)!} \frac{\pi}{2} & &= \frac{2^{2p+1}p!(p+1)!}{(2p+1)!(2p+3)} \\ &= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2} \frac{\pi}{2} & &= \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!} && \text{en multipliant par } \frac{2p+2}{2p+2} \end{aligned}$$

ce qui démontre les propriétés au rang $p+1$.

Conclusion: Le principe de récurrence affirme que, pour tout $p \geq 0$, on a

$$\boxed{W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}}$$

2. a) Démontrer que la suite $(W_n)_{n \geq 0}$ est décroissante.

Soit $n \geq 0$. Sur $[0; \pi/2]$, on a $0 \leq \cos t \leq 1$ donc $(\cos t)^n \geq (\cos t)^{n+1}$. La propriété de croissance de l'intégrale vue en cours permet alors d'affirmer que

$$W_{n+1} = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} dt \leq \int_0^{\pi/2} (\cos t)^n dt = W_n.$$

Cela montre bien que

$$\boxed{(W_n)_{n \geq 0} \text{ est une suite décroissante.}}$$

- b) Démontrer que $(nW_n W_{n-1})_{n \geq 1}$ est constante et préciser la valeur de cette constante. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n\pi/(2n+2) \leq nW_n^2 \leq \pi/2$ puis que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}W_n = \pi/2$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$nW_n W_{n-1} = n \frac{n-1}{n} W_{n-2} W_{n-1} = (n-1)W_{n-1} W_{n-2},$$

donc la suite $(nW_n W_{n-1})_{n \geq 0}$ est constante. Or $1W_1 W_0 = \pi/2$, donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad nW_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La décroissance de W_n nous dit que

$$W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}.$$

En multipliant par nW_n , qui est positif d'après la question A.1.c), on obtient

$$nW_{n+1} W_n \leq nW_n^2 \leq nW_n W_{n-1},$$

c'est-à-dire

$$\frac{n}{n+1} (n+1)W_{n+1} W_n \leq nW_n^2 \leq nW_n W_{n-1}.$$

Or, d'après le résultat établi au début de cette question, on a

$$(n+1)W_{n+1} W_n = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad nW_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2},$$

donc

$$\boxed{\frac{n}{n+1} \frac{\pi}{2} \leq nW_n^2 \leq \frac{\pi}{2}.$$

Comme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

le théorème des gendarmes nous dit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n W_n^2 = \frac{\pi}{2}$$

c'est-à-dire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} W_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

B. Calcul de $\zeta(2)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $M_n = \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos t)^n dt$.

1. a) Justifier que $\forall t \in [0; \pi/2], t \leq (\pi \sin t)/2$.

On considère la fonction f définie pour tout $t \in [0; \pi/2]$ par

$$f(t) = \pi \sin t - 2t.$$

C'est une fonction dérivable et l'on a, pour tout $t \in [0; \pi/2]$,

$$f'(t) = \pi \cos t - 2.$$

Donc

$$f'(t) \geq 0 \iff \pi \cos t - 2 \geq 0 \iff \cos t \geq \frac{2}{\pi} \iff t \in [0; \alpha]$$

où α est le nombre réel de l'intervalle $[0; \pi/2]$ tel que $\cos \alpha = 2/\pi$. On en déduit que

t	0	α	$\frac{\pi}{2}$
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$	0	?	0

On constate ainsi que

$$\forall t \in [0; \pi/2], \quad f(t) \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$\forall t \in [0; \pi/2], \quad t \leq \frac{\pi}{2} \sin t.$$

- b) Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leq M_{2n} \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{W_{2n}}{2n+2}$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M_{2n}}{W_{2n}} = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\forall t \in [0; \pi/2], \quad t^2 (\cos t)^{2n} \geq 0,$$

donc, d'après la positivité de l'intégrale, on a

$$M_{2n} \geq 0.$$

Par ailleurs, le résultat de la question précédente nous dit que

$$\forall t \in [0; \pi/2], \quad t^2 \leq \frac{\pi^2}{4} (\sin t)^2,$$

donc, d'après la croissance de l'intégrale, on a

$$M_{2n} = \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos t)^{2n} dt \leq \int_0^{\pi/2} \frac{\pi^2}{4} (\sin t)^2 (\cos t)^{2n} dt.$$

Or $(\sin t)^2 = 1 - (\cos t)^2$, donc

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} (\sin t)^2 (\cos t)^{2n} dt &= \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{2n} - (\cos t)^{2n+2} dt \\ &= W_{2n} - W_{2n+2} \\ &= W_{2n} - \frac{2n+1}{2n+2} W_{2n} \quad \text{d'après 1. b)} \\ &= \frac{1}{2n+2} W_{2n}, \end{aligned}$$

ce qui donne

$$M_{2n} \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{W_{2n}}{2n+2}.$$

En conclusion, on a

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq M_{2n} \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{W_{2n}}{2n+2}.}$$

Comme $W_{2n} > 0$ d'après A. 1.c), cela implique que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \frac{M_{2n}}{W_{2n}} \leq \frac{\pi^2}{4} \frac{1}{2n+2}.$$

Or

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi^2}{4} \frac{1}{2n+2} = 0,$$

donc, d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M_{2n}}{W_{2n}} = 0.}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $W_{2n} = n(2n-1)M_{2n-2} - 2n^2M_{2n}$ puis que $\frac{1}{n^2} = 2\left(\frac{M_{2n-2}}{W_{2n-2}} - \frac{M_{2n}}{W_{2n}}\right)$.

On a

$$W_{2n} = \int_0^{\pi/2} 1 \times (\cos t)^{2n} dt$$

On effectue une intégration par parties en choisissant

$$\begin{aligned} u'(t) &= 1 & v(t) &= (\cos t)^{2n} \\ u(t) &= t & v'(t) &= 2n(-\sin t)(\cos t)^{2n-1} \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} W_{2n} &= [t(\cos t)^{2n}]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} t 2n(-\sin t)(\cos t)^{2n-1} dt \\ &= 0 + n \int_0^{\pi/2} 2t \times (\sin t)(\cos t)^{2n-1} dt. \end{aligned}$$

On effectue une nouvelle intégration par parties en choisissant

$$\begin{aligned} u'(t) &= 2t & v(t) &= (\sin t)(\cos t)^{2n-1} \\ u(t) &= t^2 & v'(t) &= (\cos t)^{2n} + (\sin t)(2n-1)(-\sin t)(\cos t)^{2n-2} \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} W_{2n} &= n[t^2(\sin t)(\cos t)^{2n-1}]_0^{\pi/2} - n \int_0^{\pi/2} t^2((\cos t)^{2n} - (2n-1)(\sin t)^2(\cos t)^{2n-2}) dt \\ &= 0 - n \int_0^{\pi/2} t^2(\cos t)^{2n} dt + n(2n-1) \int_0^{\pi/2} t^2(\sin t)^2(\cos t)^{2n-2} dt. \end{aligned}$$

Comme $(\sin t)^2 = 1 - (\cos t)^2$, on en déduit que

$$\begin{aligned} W_{2n} &= -nM_{2n} + n(2n-1) \int_0^{\pi/2} t^2(1 - (\cos t)^2)(\cos t)^{2n-2} dt \\ &= -nM_{2n} + n(2n-1) \int_0^{\pi/2} t^2(\cos t)^{2n-2} dt - n(2n-1) \int_0^{\pi/2} t^2(\cos t)^{2n} dt \\ &= -nM_{2n} + n(2n-1)M_{2n-2} - n(2n-1)M_{2n}. \end{aligned}$$

Comme $-n - n(2n-1) = -2n^2$, on en conclut que

$$\boxed{W_{2n} = n(2n-1)M_{2n-2} - 2n^2M_{2n}.}$$

En divisant cette égalité par $n^2 W_{2n}$, qui est non nulle d'après A.1.c), on obtient

$$\frac{1}{n^2} = \frac{2n-1}{n} \frac{M_{2n-2}}{W_{2n}} - 2 \frac{M_{2n}}{W_{2n}}.$$

Or, d'après A.1.b), on a

$$W_{2n} = \frac{2n-1}{2n} W_{2n-2},$$

donc

$$\frac{1}{n^2} = \frac{2n-1}{n} \frac{M_{2n-2}}{\frac{2n-1}{2n} W_{2n-2}} - 2 \frac{M_{2n}}{W_{2n}},$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\frac{1}{n^2} = 2 \left(\frac{M_{2n-2}}{W_{2n-2}} - \frac{M_{2n}}{W_{2n}} \right)}.$$

3. En déduire finalement que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{N^2} \right) = \frac{\pi^2}{6}$.

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, le résultat de la question précédente nous dit que

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{N^2} = 2 \left(\left(\frac{M_0}{W_0} - \frac{M_2}{W_2} \right) + \left(\frac{M_2}{W_2} - \frac{M_4}{W_4} \right) + \dots + \left(\frac{M_{2N-2}}{W_{2N-2}} - \frac{M_{2N}}{W_{2N}} \right) \right)$$

ce qui donne, après télescopage,

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{N^2} = 2 \left(\frac{M_0}{W_0} - \frac{M_{2N}}{W_{2N}} \right).$$

Or la question B.1.b) nous dit que

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{M_{2N}}{W_{2N}} = 0,$$

donc

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{N^2} \right) = 2 \frac{M_0}{W_0}.$$

Comme

$$W_0 = \frac{\pi}{2}$$

et

$$M_0 = \int_0^{\pi/2} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^3}{24},$$

on en déduit que

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{N^2} \right) = \frac{\pi^2}{6}}.$$

C. Calcul de l'intégrale de Gauss

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que, pour tout $u \in [0; \sqrt{n}]$, on a $\left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n \leq e^{-u^2} \leq \left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^{-n}$.

Soit $u \in [0; \sqrt{n}]$. On a

$$\left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n = \exp \left\{ n \ln \left(1 - \frac{u^2}{n}\right) \right\} \leq \exp \left\{ n \times \left(-\frac{u^2}{n}\right) \right\} = e^{-u^2}$$

et

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n} = \exp \left\{ -n \ln \left(1 + \frac{u^2}{n}\right) \right\} \geq \exp \left\{ -n \times \frac{u^2}{n} \right\} = e^{-u^2}$$

où les inégalités découlent de $\forall a > -1, \ln(1+a) \leq a$. Donc

$$\boxed{\forall u \in [0; \sqrt{n}], \quad \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n \leq e^{-u^2} \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n}}.$$

2. a) Effectuer le changement de variable $u = \sqrt{n} \sin t$ dans l'intégrale définissant W_{2n+1} .

Dans l'intégrale

$$W_{2n+1} = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{2n+1} dt$$

on effectue le changement de variable

$$u = \sqrt{n} \sin t.$$

▷ Si $t = 0$, on a $u = 0$.

Si $t = \pi/2$, on a $u = \sqrt{n}$.

▷ L'application $t \mapsto \sqrt{n} \sin t$ est de classe \mathcal{C}^1 sur $[0; \pi/2]$ et

$$\frac{du}{dt} = \sqrt{n} \cos t,$$

d'où

$$dt = \frac{du}{\sqrt{n} \cos t}.$$

▷ On a

$$(\cos t)^{2n+1} dt = (\cos t)^{2n+1} \frac{du}{\sqrt{n} \cos t} = \frac{(\cos^2 t)^n}{\sqrt{n}} du = \frac{(1 - \sin^2 t)^n}{\sqrt{n}} du = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n du.$$

▷ On en conclut que

$$W_{2n+1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n du.$$

- b) Effectuer le changement de variable $u = \sqrt{n} \tan t$ dans l'intégrale $\int_0^{\sqrt{n}} \frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n}$.

Dans l'intégrale

$$\int_0^{\sqrt{n}} \frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n}$$

on effectue le changement de variable

$$u = \sqrt{n} \tan t.$$

▷ Si $u = 0$, on a $t = 0$.

Si $u = \sqrt{n}$, on a $t = \pi/4$.

▷ L'application $t \mapsto \sqrt{n} \tan t$ est de classe \mathcal{C}^1 sur $[0; \pi/4]$ et

$$\frac{du}{dt} = \sqrt{n}(1 + (\tan t)^2),$$

d'où

$$du = \sqrt{n}(1 + (\tan t)^2) dt.$$

▷ On a

$$\frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n} = \frac{\sqrt{n}(1 + (\tan t)^2) dt}{(1 + (\tan t)^2)^n} = \sqrt{n} \frac{dt}{\left(\frac{1}{(\cos t)^2}\right)^{n-1}} = \sqrt{n} (\cos t)^{2n-2} dt.$$

▷ On en conclut que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n} = \sqrt{n} \int_0^{\pi/4} (\cos t)^{2n-2} dt.$$

3. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n}W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{n}W_{2n-2}$ puis que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La question C.1. nous dit que

$$\forall u \in [0; \sqrt{n}], \quad \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n \leq e^{-u^2} \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n}.$$

La croissance de l'intégrale implique alors que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{u^2}{n}\right)^n du \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \int_0^{\sqrt{n}} \frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^n}.$$

Les résultats des questions 2. a) et 2. b) donnent

$$\sqrt{n}W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{n} \int_0^{\pi/4} (\cos t)^{2n-2} dt.$$

Or $\forall t \in [0; \pi/2], (\cos t)^{2n-2} \geq 0$, donc

$$\int_0^{\pi/4} (\cos t)^{2n-2} dt \leq \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{2n-2} dt = W_{2n-2},$$

ce qui donne

$$\boxed{\sqrt{n}W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{n}W_{2n-2}.}$$

On a

$$\sqrt{n}W_{2n+1} = \sqrt{\frac{n}{2n+1}} \sqrt{2n+1}W_{2n+1} \quad \text{et} \quad \sqrt{n}W_{2n-2} = \sqrt{\frac{n}{2n-2}} \sqrt{2n-2}W_{2n-2}.$$

Or

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2n-2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

et, d'après la question 1.2. b),

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n+1}W_{2n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n-2}W_{2n-2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n+1}W_{2n+1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n-2}W_{2n-2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Le théorème des gendarmes implique alors que

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$