

OUTILS D'ANALYSE CORRECTION

Exercice 1.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_n(t) = (t - t^2)^n$ et $I_n = \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt$.

1. a) Calculer I_0 et I_1 .

On a

$$I_0 = \pi \int_0^1 \sin(\pi t) dt = \pi \left[-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right]_0^1 = \pi \left(-\frac{-1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \right) = 2.$$

Par ailleurs, en effectuant des intégrations par parties, on obtient

$$\begin{aligned} I_n &= \pi^3 \int_0^1 \underbrace{(t - t^2)}_u \underbrace{\sin(\pi t)}_{v'} dt \\ &= \pi^3 \underbrace{\left[t(1-t) \left(-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right) \right]_0^1}_{=0} - \pi^3 \int_0^1 (1-2t) \left(-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right) dt \\ &= \pi^2 \int_0^1 \underbrace{(1-2t)}_u \underbrace{\cos(\pi t)}_{v'} dt \\ &= \pi^2 \underbrace{\left[(1-2t) \frac{\sin(\pi t)}{\pi} \right]_0^1}_{=0} - \pi^2 \int_0^1 (-2) \frac{\sin(\pi t)}{\pi} dt \\ &= 2\pi \int_0^1 \sin(\pi t) dt \\ &= 2\pi \left[-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(-\frac{-1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \right) \\ &= 4. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{I_0 = 2 \quad \text{et} \quad I_1 = 4.}$$

- b) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$. Démontrer que $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_n''(t) = -2n(2n-1)f_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t)$ et en déduire que $I_n = 2(2n-1)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}$.

La fonction f_n est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} comme tout bon polynôme qui se respecte. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$f_n'(t) = n(1-2t)(t-t^2)^{n-1}$$

et

$$\begin{aligned} f_n''(t) &= n(-2)(t-t^2)^{n-1} + n(1-2t)(n-1)(1-2t)(t-t^2)^{n-2} \\ &= -2nf_{n-1}(t) + n(n-1)(1-2t)^2(t-t^2)^{n-2} \\ &= -2nf_{n-1}(t) + n(n-1)(1-4(t-t^2))(t-t^2)^{n-2} \\ &= -2nf_{n-1}(t) + n(n-1)((t-t^2)^{n-2} - 4(t-t^2)^{n-1}) \\ &= -2nf_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t) - 4n(n-1)f_{n-1}(t), \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad f_n''(t) = -2n(2n-1)f_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t).}$$

En effectuant des intégrations par parties (là encore, on dérive le polynôme et on primitive les fonctions trigonométriques), on obtient

$$\begin{aligned}
I_n &= \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 \underbrace{f_n(t)}_u \underbrace{\sin(\pi t)}_{v'} dt \\
&= \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \underbrace{\left[f_n(t) \left(-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right) \right]_0^1}_{=0} - \frac{\pi^{2n+1}}{n!} \int_0^1 f'_n(t) \left(-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} \right) dt \\
&= \frac{\pi^{2n}}{n!} \int_0^1 \underbrace{f'_n(t)}_u \underbrace{\cos(\pi t)}_{v'} dt \\
&= \frac{\pi^{2n}}{n!} \underbrace{\left[f'_n(t) \frac{\sin(\pi t)}{\pi} \right]_0^1}_{=0} - \frac{\pi^{2n}}{n!} \int_0^1 f''_n(t) \frac{\sin(\pi t)}{\pi} dt \\
&= -\frac{\pi^{2n}}{n!} \int_0^1 (-2n(2n-1)f_{n-1}(t) + n(n-1)f_{n-2}(t)) \frac{\sin(\pi t)}{\pi} dt \quad \text{d'après ci-dessus} \\
&= \frac{2(2n-1)\pi^{2n-1}}{(n-1)!} \int_0^1 f_{n-1}(t) \sin(\pi t) dt - \frac{\pi^{2n-1}}{(n-2)!} \int_0^1 f_{n-2}(t) \sin(\pi t) dt \\
&= 2(2n-1)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}.
\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{I_n = 2(2n-1)I_{n-1} - \pi^2 I_{n-2}.}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que $\forall t \in [0; 1]$, $0 \leq f_n(t) \sin(\pi t) \leq 1/4^n$ puis que $0 \leq I_n \leq \pi^{2n+1}/(4^n n!)$.

On a vu en cours que $\forall t \in [0; 1]$, $0 \leq t(1-t) \leq 1/4$. Par ailleurs, pour tout $t \in [0; 1]$, on a $0 \leq \sin(\pi t) \leq 1$. En multipliant ces encadrements (ce qui est licite puisque tout est positif), on obtient

$$\boxed{\forall t \in [0; 1], \quad 0 \leq f_n(t) \sin(\pi t) \leq \frac{1}{4^n}.$$

On en déduit tout de suite que

$$\int_0^1 0 dt \leq \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt \leq \int_0^1 \frac{1}{4^n} dt,$$

c'est-à-dire

$$0 \leq \int_0^1 f_n(t) \sin(\pi t) dt \leq \frac{1}{4^n}.$$

En multipliant cet encadrement par la quantité positive $\pi^{2n+1}/n!$, on obtient

$$\boxed{0 \leq I_n \leq \frac{\pi^{2n+1}}{4^n n!}.$$

3. Dans cette question, on utilise les résultats des questions 1 et 2 afin de démontrer que π est un nombre irrationnel. Pour cela, on raisonne par l'absurde en supposant que π est rationnel, c'est-à-dire qu'il existe $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ tel que $\pi = a/b$.

- a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $b^n I_n \in \mathbb{Z}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad b^n I_n \in \mathbb{Z}.$$

Initialisation : On a $b^0 I_0 = 2 \in \mathbb{Z}$ et $b^1 I_1 = 4b \in \mathbb{Z}$ donc $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies.

Hérédité : Fixons $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ tel que $\mathcal{P}(n-2)$ et $\mathcal{P}(n-1)$ sont vraies et démontrons $\mathcal{P}(n)$. D'après le résultat de la question 1. b), on a

$$\begin{aligned}
b^n I_n &= 2b(2n-1)b^{n-1}I_{n-1} - (\pi b)^2 b^{n-2}I_{n-2} \\
&= \underbrace{2b(2n-1)}_{\in \mathbb{Z}} \underbrace{b^{n-1}I_{n-1}}_{\in \mathbb{Z} \text{ par } \mathcal{P}(n-1)} - \underbrace{a^2}_{\in \mathbb{Z}} \underbrace{b^{n-2}I_{n-2}}_{\in \mathbb{Z} \text{ par } \mathcal{P}(n-2)} \\
&\in \mathbb{Z},
\end{aligned}$$

ce qui démontre que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion : D'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad b^n I_n \in \mathbb{Z}.$$

- b) Démontrer que la suite $(b^n I_n)_{n \geq 0}$ tend vers 0. On pourra utiliser le fait que, pour tout $c > 0$, la suite $(c^n/n!)_{n \geq 0}$ tend vers 0 (on dit que la factorielle l'emporte sur toutes les suites géométriques).

En multipliant l'encadrement de la question 2 par la quantité positive b^n , on obtient, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq b^n I_n \leq \pi \frac{(\pi^2 b/4)^n}{n!}.$$

Or

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 \text{ (pardi!)} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\pi^2 b/4)^n}{n!} = 0,$$

où la seconde limite découle du fait que la factorielle l'emporte sur toutes les suites géométriques, donc, d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} b^n I_n = 0.}$$

- c) Justifier que la suite $(I_n)_{n \geq 0}$ stationne à la valeur 0 et aboutir à une contradiction.

La suite $(b^n I_n)_{n \geq 0}$ est une suite d'entiers qui tend vers 0 donc $(b^n I_n)_{n \geq 0}$ stationne à la valeur 0, c'est-à-dire qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $b^n I_n = 0$. Il en découle immédiatement que $\forall n \geq N$, $I_n = 0$. Par conséquent,

$$\boxed{(I_n)_{n \geq 0} \text{ stationne à la valeur } 0.}$$

Notons n_0 le premier rang à partir duquel la suite $(I_n)_{n \geq 0}$ stationne. Comme $I_0 = 2 \neq 0$, on sait que $n_0 \geq 1$. Le résultat de la question 2. b) avec $n = n_0 + 1$ nous dit alors que

$$I_{n_0+1} = 2(2n_0 + 1)I_{n_0} - \pi^2 I_{n_0-1},$$

c'est-à-dire

$$0 = 0 - \pi^2 I_{n_0-1}$$

ou encore

$$I_{n_0-1} = 0.$$

Cela contredit la minimalité de n_0 . Absurde! En conclusion,

$$\boxed{\pi \text{ est un nombre irrationnel.}}$$

Exercice 2.

1. L'équation se réécrit sous la forme

$$(E) \quad p' + \lambda p = \mu r$$

Solutions homogènes: D'après le cours, les solutions de (E_h) : $p' + \lambda p = 0$ sont les fonctions de la forme

$$\forall t \geq 0, \quad p_h(t) = A e^{-\lambda t} \quad (A \in \mathbb{R}).$$

Solution particulière: On constate que (E) admet une solution particulière évidente :

$$p_0 = \frac{\mu r}{\lambda}$$

Solutions générales: Les solutions de (E) sont donc toutes les fonctions de la forme

$$\forall t \geq 0, \quad p(t) = A e^{-\lambda t} + \frac{\mu r}{\lambda} \quad (A \in \mathbb{R}).$$

Condition initiale: À $t = t_0$, on a

$$p(t_0) = A e^{-\lambda t_0} + \frac{\mu r}{\lambda}$$

donc

$$A = \left(p(t_0) - \frac{\mu r}{\lambda} \right) e^{\lambda t_0},$$

ce qui donne

$$\forall t \geq 0, \quad p(t) = \left(p(t_0) - \frac{\mu r}{\lambda} \right) e^{-\lambda(t-t_0)} + \frac{\mu r}{\lambda}.$$

Calcul de l'âge du tableau: À $t = t_1$, on a

$$p(t_1) = \left(p(t_0) - \frac{\mu r}{\lambda}\right) e^{-\lambda(t_1 - t_0)} + \frac{\mu r}{\lambda},$$

c'est-à-dire

$$e^{\lambda(t_1 - t_0)} = \frac{p(t_0) - \frac{\mu r}{\lambda}}{p(t_1) - \frac{\mu r}{\lambda}}$$

d'où

$$t_1 - t_0 = \frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{\lambda p(t_0) - \mu r}{\lambda p(t_1) - \mu r} \right).$$

2. On a

$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = \frac{\ln 2}{22 \times 365 \times 24 \times 60} \approx 6 \times 10^{-8} \quad \lambda p(t_1) \approx 8,5 \quad \mu r \approx 0,8$$

et

$$\lambda p(t_1) \leq 25000$$

donc

$$t_1 - t_0 \leq \frac{1}{6 \times 10^{-8}} \ln \left(\frac{25000 - 0,8}{8,5 - 0,8} \right) \leq 1,35 \times 10^8 \text{ min},$$

c'est-à-dire

$$t_1 - t_0 \leq 257 \text{ ans.}$$

On constate donc que *Les disciples d'Emmaüs* a au grand maximum 257 ans alors que Vermeer est mort en 1675, c'est-à-dire environ 300 ans avant 1968. Par conséquent,

aucun doute, *Les disciples d'Emmaüs* est bien un van Meegeren.