

第 8 周作业参考答案

2022 年 10 月 31 日

周一作业

P106 第 4 题 (1)(2)(3)

- (1) 对函数 $f(x) = x^n, x > 0, n > 1$, 当 $a > b > 0$ 时, 在区间 $[b, a]$ 上, $f(x)$ 满足 Lagrange 中值定理的条件, 所以 $\exists \xi \in (b, a)$, 使得

$$a^n - b^n = f'(\xi)(a - b) = n\xi^{n-1}(a - b)$$

又有 $nb^{n-1} < n\xi^{n-1} < na^{n-1}$ 所以

$$nb^{n-1}(a - b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a - b)$$

- (2) 对函数 $f(t) = \ln(1+t), t > -1$, 当 $x > 0$ 时, 在区间 $[0, x]$ 上 $f(t)$ 满足中值定理的条件, 所以 $\exists \xi \in (0, x)$, 使得

$$\ln(1+x) - \ln(1) = f'(\xi)(x - 0) = \frac{x}{1+\xi}$$

又有 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$ 所以

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

- (3) 对函数 $f(x) = x \ln x, x > 0$, 当 $0 < a < b$ 时, 在区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和区间 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 上分别满足中值定理的条件, 所以 $\exists \xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$, 使得

$$f(\frac{a+b}{2}) - f(a) = f'(\xi_1)(\frac{a+b}{2} - a) \implies \frac{a+b}{2} \ln(\frac{a+b}{2}) - a \ln a = \frac{b-a}{2}(\ln \xi_1 + 1)$$

以及 $\exists \xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使得

$$f(b) - f(\frac{a+b}{2}) = f'(\xi_2)(b - \frac{a+b}{2}) \implies b \ln b - \frac{a+b}{2} \ln(\frac{a+b}{2}) = \frac{b-a}{2}(\ln \xi_2 + 1)$$

又有 $\xi_1 < \frac{a+b}{2} < \xi_2 \implies \ln \xi_1 < \ln \xi_2$, 所以

$$\frac{a+b}{2} \ln(\frac{a+b}{2}) - a \ln a < b \ln b - \frac{a+b}{2} \ln(\frac{a+b}{2}) \implies (a+b) \ln \frac{a+b}{2} < a \ln a + b \ln b$$

P106 第 5 题 (1)

记

$$f(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{1+x^2} \right) - \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \right) \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \left(\sqrt{1+x^2} \cdot \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x) \equiv f(0) = 0$ 为常值函数, 故

$$\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

P106 第 6 题

令 $g(x) = x - f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $g(0) = -f(0) < 0, g(1) = 1 - f(1) > 0 \implies g(0)g(1) < 0$, 由零点定理知 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $g(\xi) = \xi - f(\xi) = 0$, 即存在 $x \in (0, 1)$, 使得 $x = f(x)$. 若存在 $y \neq x$, 同样满足 $y = f(y)$, 不妨设 $y > x$, 则在区间 $[x, y]$ 函数 f 满足中值定理的条件, 存在一点 $\xi \in (x, y)$ 使得 $y - x = f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x)$, 但对 $\forall \xi, f'(\xi) \neq 1$, 即 $y - x \neq y - x$, 矛盾! 所以满足条件的点 x 唯一. 唯一性部分也可以通过证明 $g(x)$ 的单调性来说明.

P106 第 7 题

不妨设 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$.

- (1) 若 $0 < x_2 - x_1 \leq \frac{1}{2}$, 由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足中值定理的条件, 所以存在 $\xi_0 \in (x_1, x_2)$, 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi_0)(x_1 - x_2)| = |f'(\xi_0)|(x_2 - x_1) < \frac{1}{2}$$

- (2) 若 $\frac{1}{2} < x_2 - x_1 \leq 1$, 则 $0 \leq 1 - x_2 + x_1 < \frac{1}{2}$, 此时

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f(1) - f(x_2) + f(x_1) - f(0)| \leq |f(1) - f(x_2)| + |f(x_1) - f(0)|$$

又 $f(x)$ 在 $[0, x_1]$ 和 $[x_2, 1]$ 上分别满足中值定理的条件, 故 $\exists \xi_1 \in (0, x_1)$, 使得

$$f(x_1) - f(0) = f'(\xi_1)(x_1 - 0)$$

$\exists \xi_2 \in (x_2, 1)$, 使得 $f(1) - f(x_2) = f'(\xi_2)(1 - x_2)$, 所以

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f'(\xi_2)|(1 - x_2) + |f'(\xi_1)|x_1 \leq 1 - x_2 + x_1 < \frac{1}{2}$$

也可以通过下面的办法避免分类讨论. 下面的推导中省略了对中值定理条件的验证.

$$\begin{aligned}
 2|f(x_1) - f(x_2)| &= |f(x_1) - f(0) + f(1) - f(x_2) + f(x_1) - f(x_2)| \\
 &\leq |f(x_1) - f(0)| + |f(1) - f(x_2)| + |f(x_1) - f(x_2)| \\
 &= |f(x_1) - f(0)| + |f(1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_1)| \\
 &< |x_1 - 0| + |1 - x_2| + |x_2 - x_1| = x_1 + 1 - x_2 + x_2 - x_1 = 1 \\
 \implies |f(x_1) - f(x_2)| &< \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

P106 第 9 题

由于 $f(x)$ 不恒为常数, 故一定存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) \neq f(a)$. 若 $f(x_0) > f(a)$, 在区间 $[a, x_0]$ 上函数满足中值定理的条件, 故存在 $\xi_1 \in (a, x_0)$, 使得 $f(x_0) - f(a) = f'(\xi_1)(x_0 - a) \implies f'(\xi_1) > 0$. 若 $f(x_0) < f(a) = f(b)$, 在区间 $[x_0, b]$ 上函数满足中值定理的条件, 故存在 $\xi_2 \in (x_0, b)$, 使得 $f(b) - f(x_0) = f'(\xi_2)(b - x_0) \implies f'(\xi_2) > 0$.

P106 第 10 题

(1) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 可知, $\forall \varepsilon > 0, \exists X_0 > 0$ 且 $X_0 > a$, 使得 $x > X_0$ 时, $|f'(x)| < \varepsilon$.

对此 $\varepsilon > 0, \exists X = X_0$, 使得当 $x > X$ 时, 由 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微知, 函数 f 在区间 $[x, x+1]$ 上满足中值定理的条件, 故存在 $\xi \in (x, x+1)$ 且 $\xi > X = X_0$, 使得

$$|f(x+1) - f(x)| = |f'(\xi)| < \varepsilon$$

由定义, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 0$

(2) $f(x)$ 和 x 都在 $[a, +\infty)$ 上可微, $\frac{d}{dx}x = 1 \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = \infty$. 又极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

存在. 故满足 $\frac{\infty}{\infty}$ 型 L'Hospital 法则的条件, 于是得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

周三作业

证明 P117 定理 3.25

只证明对极大值点, 极小值点的证明类似.

x_0 是极大值点是指, $f(x)$ 在 x_0 附近有定义, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 都有 $f(x_0) \geq f(x)$.

$f(x)$ 在 x_0 有二阶导数 $f''(x_0) < 0$ 是指极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$$

存在且其值小于 0. 由极限的保序性可知, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0 \implies (f'(x) - f'(x_0))(x - x_0) < 0$$

又 x_0 是 $f(x)$ 的驻点, 即 $f'(x_0) = 0$, 于是在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f'(x)(x - x_0) < 0$$

这意味着, 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $f'(x) < 0$.

在区间 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上, 对 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, f 在区间 $[x, x_0]$ 上满足中值定理的条件, 故 $\exists \xi \in (x, x_0)$ 使得

$$f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x) > 0 \implies f(x_0) > f(x)$$

对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 成立. 同理在区间 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有 $f(x_0) > f(x)$ 对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 成立. 由极大值的定义, x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极大值点.

注意, 由于只知道 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数, 故不能两次使用微分中值定理得到 $f(x) - f(x_0) = f''(\xi)(\xi - x_0)(x - x_0)$ 来证明.

P107 第 15 题

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{x}}{x}$$

对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 函数 f 在区间 $[0, x]$ 上满足中值定理的条件, 故 $\exists \xi \in (0, x)$, 使得 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) = \frac{f(x)}{x}$, 又 f' 严格单调递增 $\implies f'(\xi) < f'(x)$, 所以

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x} > 0$$

于是 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增.

P107 第 18 题 (3)

对函数求导得到

$$f'(x) = 2x(1+x)(1-x)e^{-x^2}$$

由导函数的正负可判断 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -1), (0, 1)$ 上单调递增, 在区间 $(-1, 0), (1, +\infty)$ 上单调递减. 由 $f'(x) = 0 \implies x = -1$ 或 0 或 1 , 结合单调性可判断 $f(x)$ 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 处取得极大值为 $f(-1) = e^{-1}, f(1) = e^{-1}$, 在 $x = 0$ 处取得极小值为 $f(0) = 0$.

P107 第 19 题 (2)

函数在区间上的最值可能在区间端点和区间内部的极值点处取到. 对于有限个点, 验证区间端点和驻点处的值即可. $f'(x) = 2 \cos 2x - 1 = 0 \implies x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ 或 $\frac{\pi}{6} + k\pi$. 可以得到

$$f(-\frac{\pi}{2}) > 1 > f(\frac{\pi}{6}) > 0 > f(-\frac{\pi}{6}) > -1 > f(\frac{\pi}{2})$$

所以最大值为 $f(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$, 最小值为 $f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$

P107 第 20 题

(2) 对 $f(x) = \tan x - x + \frac{x^3}{3}, x \in (0, \pi/2)$ 求导得 $f'(x) = \tan^2 x + x^2 > 0 \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, \pi/2)$ 上严格单调递增, 于是 $f(x) > f(0) \Rightarrow \tan x > x - \frac{x^3}{3}$ 对 $\forall x \in (0, \pi/2)$ 成立.

(4) 对 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x, x > 0$ 求导得 $f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x^2} > 0 \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 于是 $f(x) > f(0) \Rightarrow \ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$

(7) 注意到

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x-1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{x-1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2$$

而当 $x > 1$ 时, 有

$$0 < \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{x-1} < 1 \quad \text{和} \quad 0 < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 < 4$$

所以

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x-1} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} < 4$$

也可以通过对原本的函数取对数转化, 然后通过讨论取对数后函数的单调性给出.

P115 第 1/5 题

(2) 由于 m, n 是交换反对称的, 所以若 $m = n$, 则极限为 0, 可以先讨论 $n > m \geq 2$ 的情况. 这是 $\frac{0}{0}$ 型的未定式, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nm \left[(1+mx)^{n-1} - (1+nx)^{m-1} \right]}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nm \left[m(n-1)(1+mx)^{n-2} - n(m-1)(1+nx)^{m-2} \right]}{2} \\ &= \frac{nm(n-m)}{2} \end{aligned}$$

中间过程的极限为 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 最后极限存在保证了结果的合理性. 若 $m = 1$, 结果同样可以表示为 $\frac{nm(n-m)}{2}$. 若 $n < m$ 结果不变.

(8) 这是 $\frac{0}{0}$ 型的未定式, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x \left(\ln(a+x) + \frac{x}{a+x} \right) - a^x \ln a}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x \left[\left(\ln(a+x) + \frac{x}{a+x} \right)^2 + \frac{2a+x}{(a+x)^2} \right] - a^x (\ln a)^2}{2} \\ &= \frac{1}{a} \end{aligned}$$

中间过程的极限仍然为 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 最后极限存在保证了结果的合理性. 上述办法思路简单, 但计算

量稍大, 也可以使用等价量替换的方法, 利用 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - 1 \sim x$ 和 $\ln(1+x) \sim x$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{x}{a})^x - 1}{x^2} \cdot a^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(1 + \frac{x}{a})} - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + \frac{x}{a})}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{a} \cdot \frac{\ln(1 + \frac{x}{a})}{\frac{x}{a}} \\ &= \frac{1}{a}\end{aligned}$$

(11)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\arctan^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \arctan^2 x}{x^2 \arctan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \arctan^2 x}{x^4} \cdot \frac{x^2}{\arctan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{2 \arctan x}{1+x^2}}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(1+x^2) - 2 \arctan x}{4x^3} \cdot \frac{1}{1+x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 6x^2 - \frac{2}{1+x^2}}{12x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2 + 6x^4}{12x^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \\ &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

(12)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1-x) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \ln(1-y) \ln y \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} (y \ln y) \cdot \frac{\ln(1-y)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} -\frac{\ln y}{\frac{1}{y}} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} -\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{1}{y^2}} \\ &= 0\end{aligned}$$

(13) 原极限为 ∞^0 型未定式, 取对数转化为求

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln \tan x}{\frac{1}{2x-\pi}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\frac{(2x-\pi)^2}{2 \sin x \cos x} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{4t^2}{2 \sin t \cos t} = 0\end{aligned}$$

于是原极限为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{2x-\pi} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \exp((2x-\pi) \ln \tan x) = 1$$

周五作业

P130 第 3 题

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \implies ad \leq cb \implies \begin{cases} ad + ab \leq cb + ab & (1) \\ ad + dc \leq cb + dc & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \implies \frac{a}{b} \leq \frac{a+c}{b+d} \\ (2) \implies \frac{a+c}{b+d} \leq \frac{c}{d} \end{cases} \implies \frac{a}{b} \leq \frac{a+c}{b+d} \leq \frac{c}{d}$$

P130 第 4 题

由 $f(x)$ 在区间 I 上是凸函数, 考虑区间一点 x_0 , 证明在该点附近成立极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

取区间内部两点 x_1, x , 满足 $x_1 < x_0 < x$, 由凸函数的定义, 得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \implies f(x) \geq f(x_0) + \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1}(x - x_0)$$

再取一点 x_2 , 满足 $x_0 < x < x_2$, 同样由定义, 得到

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \implies f(x) \leq f(x_0) + \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}(x - x_0)$$

所以

$$f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_0 - x_1}(f(x_0) - f(x_1)) \leq f(x) \leq f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0}(f(x_2) - f(x_0))$$

当 $x \rightarrow x_0+$ 时, 上式两端有极限为 $f(x_0)$, 由三明治定理, $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0)$. 对左极限可以类似得到 $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0)$. 所以函数 $f(x)$ 在区间 I 的内点是连续的.

P130 第 5 题

由于 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 此时 $f(x)$ 在 I 上是凸函数等价于其导函数 $f'(x)$ 是单调递增的. 下面用反证法证明这一点.

若导函数不是单调递增的, 则 $\exists x_1, x_2 \in I$, 满足 $x_1 < x_2$ 但 $f'(x_1) > f'(x_2)$. 此时一定存在 $x_1 < a_1 < a_2 < \dots < a_n < x_2$, 使得 $f'(x)$ 在点 $a_j, j = 1, 2, \dots, n$ 上不满足 $f''(a_j) > 0$. 但由区间 $(x_1, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_n, x_2)$ 内部任意点处 $f''(x) > 0$ 可知, $f'(x)$ 在每一个区间 $(x_1, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_n, x_2)$ 内部都是单调递增的, 所以在 $x_1 < x_2$ 但 $f'(x_1) > f'(x_2)$ 的假定下, 只可能在这些分界点 a_j 附近破坏了导函数的单调性, 其必要条件是存在一个点 a_k , 在该点附近不满足单调递增条件, 所以不妨设在区间 (x_1, x_2) 内只有一个点 x_0 处不满足 $f''(x_0) > 0$.

由 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 可导, 满足达布定理的条件, 所以对于 α 满足 $f'(x_1) > \alpha > f'(x_2)$, 一定存在 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使得 $f'(\xi) = \alpha$. 但对 $\forall x \in [x_1, x_0)$, 由区间内部每一点处二阶导大于 0, 导函数在该区间上单调递增, 有 $f'(x) \geq f'(x_1) > \alpha$, 所以 $\xi \notin [x_1, x_0)$, 对 $\forall x \in (x_0, x_2]$, 导函数同样单调递增, 有 $f'(x) \leq f'(x_2) < \alpha$, 于是只可能 $\xi = x_0$. 但再考虑 β 满足 $f'(x_1) > \beta > f'(x_2)$ 且 $\beta \neq \alpha$, 存在 $\eta \in [x_1, x_2]$ 且 $\eta \neq \xi$, 使得 $f'(\eta) = \beta$. 再由同样的步骤得到只可能 $\eta = x_0$, 矛盾. 所以导函数单调递增.

P130 第 7 题

不妨设 $f'''(x_0) > 0$, 即极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0}$$

存在且其值大于 0. 由极限的保序性可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $\frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0} > 0$. 又 $f''(x_0) = 0$, 所以这意味着在 x_0 附近, 成立 $f''(x)(x - x_0) > 0 \implies$ 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, $f''(x) > 0$, f 是凸的, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, $f''(x) < 0$, 函数是凹的, 所以 x_0 是函数的拐点.

P130 第 8 题

(4) 计算一阶、二阶导数得到

$$\begin{aligned} y' &= e^x(x+1)^2 \\ y'' &= e^x(x+1)(x+3) \end{aligned}$$

由二阶导的正负可以判断函数在区间 $(-\infty, -3)$, $(-1, +\infty)$ 上是凸的, 在区间 $(-3, -1)$ 上是凹的, 拐点为 -3 和 -1

(6) 计算一阶、二阶导数得到

$$\begin{aligned} y' &= 1 + \cos x \\ y'' &= -\sin x \end{aligned}$$

由二阶导的正负可判断函数在区间 $(\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi)$ 上是凸的, 在区间 $(2k\pi, \pi + 2k\pi)$ 上是凹的, 拐点为 $k\pi$. ($k \in \mathbb{Z}$)

P130 第 9 题

由点在曲线上和点为拐点的必要条件 $f''(1) = 0$ 可得到方程组

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 6a + 2b = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{9}{2} \end{cases}$$

可以验证此时 $(1, 3)$ 确实是曲线的拐点.


P130 第 10 题 (4)

函数定义域为整个实数轴, 且在定义域内连续, 二阶可导, 由于没有对称性, 直接考虑其单调性和凹凸性. 计算其一阶、二阶导数得到

$$\begin{aligned} y' &= (1-x)e^{-x} \\ y'' &= (x-2)e^{-x} \end{aligned}$$

由一阶导的正负判断函数在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, $(1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $x = 1$ 处有极大值. 由二阶导的正负判断函数在 $(-\infty, 2)$ 上是凹的, $(2, +\infty)$ 上是凸的, 在 $x = 2$ 处有拐点. 再简单分析其渐近行为. 当

$x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$. 据此作出函数的大致图像如下图, 其中蓝色线条为函数的图像, 黑色直线为 x 轴.



P108 第 22 题

设 $f(x) = \frac{x}{1-e^{-x}} - a$, 则迭代格式表为 $b_{n+1} = f(b_n)$.

先考察该数列是否具有单调性.

(1) 当 $n = 1$ 时, $b_2 - b_1 = \frac{b_1}{1-e^{-b_1}} - a - b_1 = \frac{b_1}{1-e^{-b_1}} - 1 > 0$. 其中利用了不等式 $1 - e^{-b_1} \leq b_1$.

(2) 假设当 $n = k \geq 1$ 时, 有 $b_{k+1} - b_k > 0$, 则当 $n = k + 1$ 时, 由 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 可知在区间 $[b_k, b_{k+1}]$ 上满足中值定理条件, 有

$$b_{k+2} - b_{k+1} = f(b_{k+1}) - f(b_k) = f'(\xi_k)(b_{k+1} - b_k)$$

而在区间 $(0, +\infty)$ 上

$$f'(x) = \frac{1 - (x+1)e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2}$$

其分母恒正, 又 e^{-x} 单调递减, 从而分子 $1 - (x+1)e^{-x}$ 单调递增 $\implies 1 - (x+1)e^{-x} > 0$, 于是 $f'(x) > 0$ 对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 成立. 所以

$$b_{k+2} - b_{k+1} = f'(\xi_k)(b_{k+1} - b_k) > 0$$

由 (1)(2) 归纳得, 数列 $\{b_n\}$ 单调递增.

下面试图说明方程 $x = f(x)$ 的解是数列 $\{b_n\}$ 的一个上界.

为说明方程有解, 令

$$g(x) = \begin{cases} x - f(x) & x > 0 \\ a - 1 & x = 0 \end{cases}$$

则由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = a - 1 = g(0)$ 可知 $g(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续. $g(0) = a - 1 < 0$, 当 x 充分大时, $g(x)$ 趋近于 $a > 0$, 由此可知存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $g(x_0) = 0$. 考虑该解是否具有唯一性, 由

$$g'(x) = \frac{1 + (x-1)e^x}{(1 - e^{-x})^2}$$

分母恒正, 分子单调递增, 得到 $1 + (x-1)e^x > 0$, 于是 $g'(x) > 0$ 对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 故 $g(x)$ 单调, 这就说明了解 x_0 的唯一性. 因此, 若 $b_{n+1} = f(b_n)$ 收敛, 其只能收敛到 x_0 . 下面开始证明 x_0 是 $\{b_n\}$ 的上界.

(1) 当 $n = 1$ 时, 利用 x_0 是方程 $x - \frac{x}{1-e^{-x}} + a = 0$ 的根以及不等式 $x_0 > 1 - e^{-x_0}$, 得到

$$x_0 + a = \frac{x_0}{1 - e^{-x_0}} > 1 \implies b_1 = 1 - a < x_0$$

(2) 当 $n = k \geq 1$ 时, 假设 $b_k < x_0$ 成立, 则当 $n = k + 1$ 时, 利用微分中值定理

$$b_{k+1} - x_0 = f(b_k) - f(x_0) = f'(\xi)(b_k - x_0)$$

前已说明 $f'(\xi) > 0$, 由假设有 $b_k - x_0 < 0$, 于是

$$b_{k+1} - x_0 < 0$$

也成立.

由 (1)(2) 归纳得, x_0 是 $\{b_n\}$ 的上界.

数列 $\{b_n\}$ 单调递增, 又有上界, 故其收敛. 设收敛到 β , 则在递推关系 $b_{n+1} = f(b_n)$ 两边取极限得到 (利用了 $f(x)$ 的连续性)

$$\beta = f(\beta) \implies \beta - \frac{\beta}{1 - e^{-\beta}} + a = 0$$

上述超越方程难以解析求解, 但其根即为数列 $\{b_n\}$ 的极限.