

ゼミノート #12

Quotients of Algebraic Spaces

七条彰紀

2019 年 8 月 6 日

目次

1	Notes on Topology	1
1.1	Constructible Topology	1
1.2	Equivalence Relation on Topological Space Induced by Groupoid	3
2	Quotients	3
2.1	Definitions	3
2.2	Propositions : Paraphrase	5

1 Notes on Topology

1.1 Constructible Topology

以下を参考にした.

- [2] §1
- <http://virtualmath1.stanford.edu/~conrad/Perfseminar/Notes/L3.pdf> by B.Conrad
- [4] 08YF <https://stacks.math.columbia.edu/tag/08YF>

定義 1.1

X :: topological space とする.

- X の locally closed subset とは, closed subset と open subset の共通部分で表せる subset である.
- X の constructible set とは, X の有限個の locally closed subset の和集合で表せる subset のことである.
- $U \subseteq X$ が X の locally constructible set であるとは, U のある開被覆 $\{U_i\}$ について, 各 $U \cap U_i$ が constructible set である, ということ.
- X の constructible topology とは, X の constructible set を開基とする位相のことである. X の underlying set に X の constructible topology を与えた位相空間を X_{cons} と書く.

- (v) 有限個とは限らない X の constructible set の, 和集合を ind-constructible subset と呼び, 共通部分を pro-constructible subset と呼ぶ^{†1}.
- (vi) map of topological spaces $:: f: X \rightarrow Y$ について, f^{cons} を constructible topology での map とする. (map of sets としては $f = f^{\text{cons}}$ である.)

命題 1.2

$X :: \text{topological space}$ とする.

- (i) X の open subset と closed subset は constructible set である.
- (ii) 有限個の constructible set の和, 共通部分は constructible set である. constructible set の補集合も constructible set である.
- (iii) X の constructible topology に於ける open subset は ind-constructible subset に限る. 同様に, closed subset は pro-constructible subset に限る.
- (iv) map of topological spaces $:: f: X \rightarrow Y$ について, $f^{\text{cons}} :: \text{continuous}$.

(証明). 自明. ■

命題 1.3 (i) qcqs(=quasi-compact and quasi-separated) scheme の pro-constructible subset は, affine scheme からの射の像に限る.

- (ii) locally of finite presentation morphism は constructible topology において open.
- (iii) quasi-compact morphism は constructible topology において closed.
- (iv) $f :: \text{surjective morphism}$ で $f :: \text{locally of finite presentation or quasi-compact}$ ならば $f^{\text{cons}} :: \text{submersive}$.

(証明). (i) は Rydh10 の Prop1.1 である. (ii) は Chevalley's theorem からの帰結. (iii) は locally に調べれば容易に分かる. (iv) は (ii), (iii) からの帰結である. ■

注意 1.4

constructible topology は spectral space^{†2} と共に扱われることが多い. 例えば qcqs scheme の underlying space は spectral である.

命題 1.5

[2] Prop1.7 morphism of schemes $:: f: X \rightarrow Y, g: Y' \rightarrow Y$ を考え, f の g による pullback を f' と書く.

- (i) P を open, closed, submersive のいずれかとする. g が submersive ならば, $f' :: P$ と $f :: P$ は同値.
- (ii) P を universally open, universally closed, universally submersive, separated のいずれかとする. g が universally submersive ならば, $f' :: P$ と $f :: P$ は同値.
- (iii) g^{cons} が universally submersive ならば, $f' :: \text{quasi-compact}$ と $f :: \text{quasi-compact}$ は同値.

(証明). (TODO) (iii) だけ証明を与える. ■

^{†1} “ind-”は inductive limit を意味し, “pro-”は projective limit を意味する.

^{†2} spectral space とは, 以下の性質をもつ位相空間: sober, quasi-compact, the intersection of two quasi-compact opens is quasi-compact, and the collection of quasi-compact opens forms a basis for the topology ([4] 08FG).

注意 1.6

おそらく, [3] はこの命題を利用するために, topological quotient に「 $q^{\text{cons}} :: \text{universal submersive}$ 」を要求している. より詳しく言うと以下の命題で使われている.

命題 1.7 ([3] Prop2.12 (ii))

$R \rightrightarrows_t^s X :: \text{groupoid}$ とし, $q: X \rightarrow Y$ を topological quotient とする. $j :: \text{quasi-compact}$ と, $Y :: \text{quasi-separated}$ かつ $j/Y :: \text{quasi-compact}$ は同値.

これを経由して, $X \rightarrow S :: \text{quasi-separated}$ ならば GC quotient $:: Y \rightarrow S$ が quasi-separated であることなどを示している (Prop4.7).

1.2 Equivalence Relation on Topological Space Induced by Groupoid

$S :: \text{algebraic space}$ とし, groupoid in algebraic S -space $:: R \rightrightarrows_t^s X$ を考える.

topological space $:: |U|$ に, 次のようにして同値関係 \sim_R を定義する.

定義 1.8

点 $x_1, x_2 \in |X|$ について,

$$x_1 \sim_R x_2 \iff \exists r \in |R|, \quad |s|(r) = x_1, |t|(r) = x_2$$

と定義する.

$|R \times_x R| \rightarrow |R| \times_{|X|} |R|$ が全射であることを用いると, groupoid の定義から, \sim_R が同値関係であることが分かる.

定義 1.9

点 $x \in |X|$ の同値類を orbit と呼び, $R(x)$ と書く. $R(x)$ は $|t|(|s|^{-1}(x))$ と等しい.

また, $W \subseteq |X|$ が R -stable であるとは, W が \sim_R について stable であること. すなわち,

$$\{x \in |X| \mid \exists w \in W, \quad w \sim_R x\} = R$$

となること. これは $|s|^{-1}(W) = |t|^{-1}(W)$ in $|R|$ と同値.

注意 1.10

[4] 04XJ には, $S = |X| \times_{|[X/R]|} |X|$ とすると位相空間として $|[X/R]| = |X|/S$, という命題が有る.

2 Quotients

以降は引き続き $S :: \text{algebraic space}$ とし, groupoid in algebraic S -space $:: R \rightrightarrows_t^s X$ を考える.

2.1 Definitions

定義 2.1 (equivariant morphism)

morphism $:: q: X \rightarrow Y$ について, $q \circ s = q \circ t$ であるとき, q を equivariant morphism という.

定義 2.2 (j, j_Y)

$s, t: R \rightarrow X$ から $X \times_S X$ の普遍性により得られる射 $:: R \rightarrow X \times_S X$ を j と書く.

また, equivariant morphism $:: q: X \rightarrow Y$ について, s, t から $X \times_Y X$ の普遍性により得られる射 $:: R \rightarrow X \times_Y X$ を j_Y と書く.

stabilizer はまたの機会に定義する.

注意 2.3

fiber product の普遍性から, j_Y に $X \times_Y X \rightarrow X \times_S X$ を合成すると j に一致する.

注意 2.4

equivariant morphism $:: R \rightrightarrows_t^s X \rightarrow Y$ は, quotient stack からの射 $[X/R] \rightarrow Y$ に一対一に対応する.
(TODO: proof)

定義 2.5

equivariant morphism $:: q: X \rightarrow Y$ を考える.

Zariski quotient

Constructible quotient

Topological quotient

Strongly topological quotient

Geometric quotient

Strongly geometric quotient

定義 2.6 (universal, uniform quotient)

$q: X \rightarrow Y$ を上記のいずれかの quotient とする.

- 任意の射 $Y' \rightarrow Y$ による pullback $:: q': X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ も同じ種類の quotient であるとき, q は universal であると言う.
- 任意の flat 射 $Y' \rightarrow Y$ による pullback $:: q': X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ も同じ種類の quotient であるとき, q は uniform であると言う.

注意 2.7

$j_Y: X \times_Y X \rightarrow X \times_S X$ が universally submersive であることは, $X \times_Y X$ に適切な位相が入っていることを意味する.

注意 2.8

geometric quotient in [1]

- $q ::$ surjective and equivariant.
- $\mathcal{O}_Y = (q_* \mathcal{O}_X)^R$.
- 任意の点 $y \in Y$ について, $q^{-1}(y)$ はただ一つの orbit からなる.
- $W_1, W_2 \subseteq X ::$ disjoint closed subset について $\text{cl}_Y(q(W_1)), \text{cl}_Y(q(W_2)) ::$ disjoint.

以下のように言い換えても良い.

- $q :: \text{Zariski quotient.}$
- $\mathcal{O}_Y = (q_* \mathcal{O}_X)^R.$
- q の open immersion による pullback も上記を満たす.

ref. E.Viehweg “D. Mumford’s Geometric Invariant Theory”. なお, [1] の初版では $q :: \text{universally submersive}$ を仮定している.

2.2 Propositions : Paraphrase

命題 2.9 ([3], Prop2.3)

R -equivariant morphism $q: X \rightarrow Y$ を考える. 以下の $3 \times 3 = 9$ 個の命題を考える.

- (i) 任意の体 k と射 $y: k \rightarrow Y$ ^{†3} について $|X \times_Y k|$ は,
少なくとも 1 つの / 多くとも一つの / 丁度一つの, $(R \times_Y k)$ -orbit を含む.
- (ii) $q :: \text{surjective}$ / $j_Y :: \text{surjective}$ / $q, j_Y :: \text{surjective.}$
- (iii) 任意の代数閉体 K について, $\bar{q}_K: X(K)/R(K) \rightarrow Y(K)$ ^{†4} は
 surjective / injective / bijective.

この時, (iii) \implies (ii) \iff (i) がそれぞれ成り立つ. さらに $q, j_Y :: \text{locally of finite type or integral}$ ならば, (iii) \impliedby (ii) も成り立つ.

(証明). ■

注意 2.10

したがって quotient の定義の幾つかは次のように書き換えられる.

$$\begin{aligned}
 q :: \text{univ. Zariski} & \iff q :: \text{univ. submersive and } j_Y :: \text{surjective.} \\
 q :: \text{topological} & \iff q, q^{\text{cons}} :: \text{univ. submersive and } j_Y :: \text{surjective.} \\
 q :: \text{strongly topological} & \iff q, q^{\text{cons}}, j_Y :: \text{univ. submersive}
 \end{aligned}$$

補題 2.11

Remark 2.5 when univ. Zariski quot. is top. quot.?

命題 2.12

Prop2.10

参考文献

- [1] David Mumford, John Fogarty, and Frances Kirwan. *Geometric Invariant Theory (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 34)*. Springer-Verlag, 3rd ed. edition, 1992.

^{†3} Spec k を k と略した.

^{†4} $X(K)/R(K)$ は $R(K) \rightrightarrows_{t_K}^{s_K} X(K)$ の coequalizer で, \bar{q}_K は coequalizer による $q_K: X(K) \rightarrow Y(K)$ の一意な分解である.

- [2] David Rydh. Submersions and effective descent of étale morphisms. *Bulletin de la Société Mathématique de France*, Vol. 138, No. 2, pp. 181–230, 2010.
- [3] David Rydh. Existence and properties of geometric quotients. *Journal of Algebraic Geometry*, Vol. 22, pp. 629–669, 08 2013.
- [4] The Stacks Project Authors. *Stacks Project*. <https://stacks.math.columbia.edu>, 2019.