

# 第3章

## Fibered Categories

七条彰紀

2020年3月17日

### 目次

1	Fibered Categories.	2
1.1	Motivation. . . . .	2
1.2	Definitions. . . . .	2
1.3	Examples. . . . .	5
1.4	Propositions. . . . .	6
2	Cleavage	7
2.1	Split Fibration . . . . .	8
3	Fiber of Fibered Categories	9
3.1	Motivation . . . . .	9
3.2	Definition . . . . .	9
3.3	Propositions . . . . .	10
4	Grothendieck Construction	12
5	Category Fibered in Groupoids/Sets	13
5.1	Motivation . . . . .	13
5.2	Definition . . . . .	13
6	Equivalence of Fibered Categories	15
6.1	Definition . . . . .	15
6.2	Propositions . . . . .	15

# 1 Fibered Categories.

## 1.1 Motivation.

“family”あるいは“object on/over a base space”（例えば schemes over a scheme や sheaves on a scheme など）の抽象的な枠組が fibered category である． 今後は fibered category が提供する枠組を sheaves on a site の貼り合わせや stack の定義の為に活用する．

## 1.2 Definitions.


$\mathcal{X}, \mathbf{B} :: \text{category}$  と関手  $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を考える．

- $\pi$  を projection あるいは fibration と呼ぶ．
- $\mathcal{X}$  を fibered category と呼ぶ．
- $\pi(O) = P$  であるとき  $O$  は  $P$  の上にある ( $O$  is over  $P$ ) という．


**定義 1.1** (Cartesian Arrow, Cartesian Lifting, Cartesian Functor, Base Preserving Natural Transformation, [Ols16] and [Noo12])

(i) 以下の性質 (Triangle Lifting という) を満たす  $\mathcal{X}$  の射  $\phi: x \rightarrow y$  を cartesian arrow という:

(1) にあるような対象と射があるとき, (2) の様に射  $z \rightarrow y$  がただ一つ存在し, 可換と成る.



(ii)  $y \in \mathcal{X}, u \rightarrow \pi(y) \in \mathbf{B}$  に対し, 以下の図式を満たす  ${}^{\dagger 1}x \in \mathcal{X}$  と cartesian arrow  $:: x \rightarrow y \in \mathcal{X}$  を, cartesian lifting(or cleavage) of  $u \rightarrow \pi(y)$  と呼ぶ.



- (iii) 任意の  $y \in \mathcal{X}$  と  $u \rightarrow \pi(y) \in \mathbf{B}$  に対して cartesian lifting が存在する  $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category という. fibered category over  $\mathbf{B}$  が成す圏を  $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  とする.
- (iv) 二つの fibered category  $:: \pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}, \pi': \mathcal{X}' \rightarrow \mathbf{B}$  について,  $\mathcal{X}$  と  $\mathcal{X}'$  の間の射 (morphism of fibered categories, cartesian functor) とは, functor  $:: g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$  であって,  $\pi, \pi'$  と整合的<sup>†2</sup>であり, cartesian arrow を cartesian arrow に写すもの.
- (v)

## 注意 1.2

少し圏論の言葉を整理しておく.

対象を 0-morphism (あるいは 0-cell) と呼ぶ時, 非負整数  $k \geq 0$  について,  $k$ -morphism (cell) は  $(k-1)$ -morphism (cell) の間の射と定義できる. こうして  $k$ -morphism (cell) は階層を成す. そこで, ここで定義した性質を階層別にまとめると次のように成る.

arrow	arrow in a fibered category	(i) Cartesian Arrow, (ii) Cartesian Lifting
0-cell	fibered category	(iii) Existence of Cartesian Lifting
1-cell	functor between fibered categories	(iii) Morphism of Fibered Category
2-cell	nat. trans. between functors	(iv) Base-Preserving Natural Transformation

通常の圏同型を 1-iso と呼び  $\overset{1}{\cong}$  と書く. この時, 階層ごとの iso/equiv は以下のようなものである.

iso.	$x \overset{1}{\cong} y$	$\iff$	2 つの arrow $\phi: x \rightrightarrows y: \psi$ が存在し, $\psi \circ \phi = \text{id}_x, \phi \circ \psi = \text{id}_y$ .
1-iso.	$x \overset{1}{\cong} y$	$\iff$	2 つの 1-cell $\phi: x \rightrightarrows y: \psi$ が存在し, $\psi \circ \phi = \text{id}_x, \phi \circ \psi = \text{id}_y$ .
1-equiv.	$x \overset{1}{\simeq} y$	$\iff$	2 つの 1-cell $\phi: x \rightrightarrows y: \psi$ が存在し, $\psi \circ \phi \cong \text{id}_x, \phi \circ \psi \cong \text{id}_y$ .
2-iso.	$x \overset{2}{\cong} y$	$\iff$	2 つの 2-cell $\phi: x \rightrightarrows y: \psi$ が存在し, $\psi \circ \phi = \text{id}_x, \phi \circ \psi = \text{id}_y$ .
2-equiv.	$x \overset{2}{\simeq} y$	$\iff$	2 つの 2-cell $\phi: x \rightrightarrows y: \psi$ が存在し, $\psi \circ \phi \overset{1}{\cong} \text{id}_x, \phi \circ \psi \overset{1}{\cong} \text{id}_y$ .

## 注意 1.3


$\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  は 2-category である. 2-category は 2-morphism ( $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  では natural transformation) に “vertical composition” と “horizontal composition” の二種類の合成が定まる圏である. 詳しくはこのノートでは触れない.

## 定義 1.4 (Base-Preserving Natural Transformation, HOM, Equivalence)

- (i) 二つの fibered category  $:: \pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}, \pi': \mathcal{X}' \rightarrow \mathbf{B}$  の間の 2 つの射  $g, g': \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$  と natural transformation  $:: \alpha: g \rightarrow g'$  を考える.

<sup>†1</sup> すなわち,  $\pi(x) = u, \pi(x \rightarrow y) = u \rightarrow \pi(y)$  を満たす.

<sup>†2</sup> すなわち  $\pi' \circ g = \pi$  を満たす.



任意の  $x \in \mathcal{X}$  について,  $\pi'(\alpha_x): \pi'(g(x)) \rightarrow \pi'(g'(x))$  が恒等射になるとき,  $\alpha$  を base-preserving natural transformation という.

(ii)  $\mathcal{X}, \mathcal{X}' \in \mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  について,  $\mathbf{HOM}_{\mathbf{B}}(\mathcal{X}, \mathcal{X}')$  を次の圏とする.

**Object.** morphism of fibered category  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ .

**Arrows.** base-preserving natural transformation.

(iii) morphism of fibered category  $:: g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$  が equivalence of fibered category であるとは, 別の morphism  $h: \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$  が存在し,  $h \circ g$  と  $\text{id}_{\mathcal{X}}$ ,  $g \circ h$  と  $\text{id}_{\mathcal{X}'}$  の間に base-preserving isomorphism が存在すること<sup>†3</sup>.

$$h \circ g \stackrel{2}{\cong} \text{id}_{\mathcal{X}}, g \circ h \stackrel{2}{\cong} \text{id}_{\mathcal{X}'}$$

二つの fibered category が equivalent であるとは, 二つの間に equivalence of fibered category が存在するということである.

### 注意 1.5

2-morphism (2-cell) を base-preserving natural transformation に制限した fibered category の圏を  $\mathbf{Fib}^{\text{bp}}(\mathbf{B})$  とすると,  $\mathbf{HOM}$  は  $\mathbf{Hom}_{\mathbf{Fib}^{\text{bp}}(\mathbf{B})}$  であるし, equivalence of fibered category は  $\mathbf{Fib}^{\text{bp}}(\mathbf{B})$  での 2-iso である.

## 1.3 Examples.

### 例 1.6

morphism of schemes  $:: f: X \rightarrow Y$  を取る. この  $f$  に対し,  $f$  の pullback が成す圏  $\Pi(f)$  を考えることが出来る. 以下のように定義する.

$$\text{Object. pullback diagram} :: \begin{array}{ccc} P & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \text{p.b.} & \downarrow f \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

**Arrow.** pullback diagram と整合的な射の組  $(Z \rightarrow Z', P \rightarrow P')$ .

$\Pi(f)$  から次のように projection が定まる.

<sup>†3</sup> 基本的には category of equivalence の定義と同じである.

$$\begin{array}{ccc} \pi: & \Pi(f) & \rightarrow \mathbf{Sch}/Y \\ & P \longrightarrow X & \\ & \downarrow \text{p.b.} \downarrow f & \mapsto [Z \rightarrow Y] \\ & Z \longrightarrow Y & \end{array}$$

ここで注意したいのは、 $\Pi(f)$  は pullback of  $f$  の同型類や代表ではなく、pullback of  $f$  全てであることである。したがって  $\pi: \Pi(f) \rightarrow \mathbf{Sch}/Y$  は pullback of  $f$  を選択公理無しに扱う枠組を与えている。

#### 例 1.7

category ::  $\mathbf{C}$  について, arrow category ::  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$  を以下で定める。

Object.  $\mathbf{C}$  の射 ( $[x \rightarrow u]$  の様に表記する)。

Arrow. 射  $[x \rightarrow u] \rightarrow [y \rightarrow v]$  は次の図式を可換にする  $x \rightarrow y, u \rightarrow v$  の組:

$$\begin{array}{ccc} x & \dashrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ u & \dashrightarrow & v \end{array}.$$

すると Cartesian Lifting は  $\mathbf{C}$  が pullback を持つことを意味し, Triangle Lifting は pullback の普遍性を意味する。

#### 例 1.8

以下の関手は fibration である。

$$\begin{array}{ccc} \pi: & \mathbf{Sch}/X & \rightarrow \mathbf{Sch} \\ & [Y \rightarrow X] & \mapsto Y \end{array}$$

### 1.4 Propositions.

**命題 1.9** ([Vis07] Prop3.4)

- (i) cartesian arrow の合成は cartesian arrow である。
- (ii)  $\phi: x \rightarrow y, \psi: y \rightarrow z$  について,  $\psi \circ \phi, \psi :: \text{cartesian arrow}$  ならば  $\psi :: \text{cartesian arrow}$ .

(証明). Triangle Lifting のみを用いて証明できる。簡単なので証明は省略する。 ■


次の命題の証明は Cartesian Lifting と Triangle Lifting の使い方をよく示している。

**命題 1.10**

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category over  $\mathbf{B}$  とする。  $\mathcal{X}$  の射  $x \rightarrow y$  は以下のような二つの射の合成  $x \rightarrow z \rightarrow y$  に分解できる。

- $x \rightarrow z :: \text{over } \text{id}_{\pi(x)}$ .
- $z \rightarrow y :: \text{cartesian, over } \pi(x \rightarrow y)$ .


(証明).  $\pi(\phi)$  の cartesian lifting として以下の図式 (1) の  $z$  と  $z \rightarrow y$  を得る。さらに Triangle Lifting により図式 (2) の通り  $\text{id}_{\pi(x)}$  上の射  $x \rightarrow z$  を得る。



### 命題 1.11

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category とする.  $\mathcal{X}$  の任意の cartesian morphism  $\phi: x \rightarrow y$  について,  $\phi :: \text{iso}$  と  $\Phi := \pi(\phi) :: \text{iso}$  は同値.

(証明). 以下の図式 (1) に Triangle Lifting を用いれば,  $\phi \circ \psi = \text{id}_y$  なる射  $\psi: y \rightarrow x$  を得る. さらに図式 (2) に於いて,  $\phi \circ \text{id}_x = \phi = \phi \circ \psi \circ \phi$  と Triangle Lifting の一意性から  $\psi \circ \phi = \text{id}_x$  を得る.



## 2 Cleavage

Cartesian lifting は普遍性 (Triangle Lifting) で特徴づけられている. なので同型を除いて一意であるが, 厳密な意味で一意であるというものではない. どの Cartesian lifting を用いるか選んだものが Cleavage (分

裂, 劈開). これは Fibered category  $:: \mathcal{X}$  の Cartesian arrow の class を成す. Cleavage と fibration (resp. Fibered category) を併せたものを Cloven fibration (resp. Cloven fibered category) と呼ぶ. 選択公理によって, 我々は常に Fibration を Cloven fibration にできる.

## 2.1 Split Fibration

Cleavage は Cartesian arrow の class であると言ったが, この class が圏を成すと綺麗である. そのような Cleavage を選べる Fibration を Split fibration と呼ぶ.

**定義 2.1** ([Ols16])

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B} ::$  fibered category とする. splitting of  $\pi$  とは, 以下を満たす subcategory  $:: \mathbf{S} \subset \mathcal{X}$  のことである.

- (i)  $\mathbf{S}$  は  $\mathcal{X}$  の任意の対象を持つ.
- (ii)  $\mathbf{S}$  の任意の射は cartesian.
- (iii) 任意の  $\mathbf{B}$  の射  $f: U \rightarrow V$  と  $V$  上の対象  $v \in \mathcal{X}$  について,  $f$  上の射  $u \rightarrow v$  がただ一つ存在する. (すなわち, cartesian lifting が一意に存在する.)

この時, 組  $(\mathcal{X}, \mathbf{S})$  を split fibered category と呼ぶ.

任意の Fibration は Split fibration とは限らないが, Split fibration と圏同値である.

**定理 2.2**

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B} ::$  fibered category とする. この時, split fibered category over  $\mathbf{B} :: (\tilde{\mathcal{X}}, \mathbf{S})$  が存在し, 圏同値  $\tilde{\mathcal{X}} \simeq \mathcal{X}$  が成立する.

(証明). ここでは圏と部分圏  $(\tilde{\mathcal{X}}, \mathbf{S})$  及び関手  $\Phi: \tilde{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$  を構成するにとどめる. (TODO: これらがそれぞれ split fibered category over  $\mathbf{B}$  と equivalence であることはここでは確認しない.)

以下のように  $\tilde{\mathcal{X}}$  を構成する.

**Objects.** object  $:: U \in \mathbf{B}$  と morphism of fibered category  $:: u: \mathbf{B}/U \rightarrow \mathcal{X}$  の組  $(U, u)$ .

**Arrows.** 射  $(V, v) \rightarrow (U, u)$  は  $\mathbf{B}$  の射  $g: V \rightarrow U$  と base-preserving isomorphism  $:: \alpha: v \rightarrow u \circ g$  の組  $(g, \alpha)$ .

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{B}/V & \xrightarrow{g} & \mathbf{B}/U & \xrightarrow{u} & \mathcal{X} \\ & & \uparrow \alpha & & \uparrow \\ & & v & & \end{array}$$

まず projection functor が以下のように定まる.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{\pi}: & \tilde{\mathcal{X}} & \rightarrow \mathbf{B} \\ & (U, u) & \mapsto U \end{array}$$



この関手によって fibered category の構造が入る.

さらに次の関手によって equivalence が与えられる.

$$\begin{aligned}\Phi: \quad \tilde{\mathcal{X}} &\rightarrow \mathcal{X} \\ (U, u) &\mapsto u(\text{id}_U)\end{aligned}$$

これが equivalence であることは 2-Yoneda Lemma による.

最後に, splitting of  $\tilde{\pi} :: \mathbf{S}$  が次で定められる.

Objects.  $\tilde{\mathcal{X}}$  と同じ.

Arrows.  $\tilde{\mathcal{X}}$  の射で,  $(g, \text{id})$  と表されるもの. すなわち, 射  $(V, v) \rightarrow (U, u)$  は  $\mathbf{B}$  の射  $g: V \rightarrow U$  であって  $v = u \circ g$  であるもの.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{B}/V & \xrightarrow{g} & \mathbf{B}/U & \xrightarrow{u} & \mathcal{X} \\ & \searrow & \parallel & \nearrow & \\ & & v & & \end{array}$$

### 定義 2.3

圏  $\mathbf{B}$  に対し,

- Cloven fibration over  $\mathbf{B}$  の圏を  $\mathbf{cFib}(\mathbf{B})$ ,
- Split fibration over  $\mathbf{B}$  の圏を  $\mathbf{sFib}(\mathbf{B})$

と書く. それぞれ忘却関手  $\mathbf{sFib}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{cFib}(\mathbf{B}), \mathbf{cFib}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  をもつ.

## 3 Fiber of Fibered Categories

### 3.1 Motivation

### 3.2 Definition

#### 定義 3.1 (Fiber)

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category とする. 任意の  $b \in \mathbf{B}$  について, 以下で定める圏を  $\mathcal{X}_b$  あるいは  $\mathcal{X}(b)$  と書き, fiber of  $\pi$  at (over)  $b$  と呼ぶ:

Object.  $\pi(x) = b$  となる object  $:: x \in \mathcal{X}$ .

Arrow.  $\pi(\phi) = \text{id}_b$  となる arrow  $:: \phi \in \mathcal{X}$ .

morphism of fibered category  $:: g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  から fiber の間に誘導される射を  $g_B: \mathcal{X}_B \rightarrow \mathcal{Y}_B$  と書く.

標語的には次のように定義されている.

また, morphism of schemes ::  $f: X \rightarrow B$  の fiber が  $f^{-1}(b)$  と表現されることと比較せよ。

**定義 3.3** (Pseudo-functor (weak 2-functor))

(a) 任意の  $c \in \mathbf{C}$  について 2-isomorphism  $\alpha_c: F(\text{id}_c) \rightarrow \text{id}_{F(c)}$  が存在する。

(b) 任意の  $f: c \rightarrow d, g: d \rightarrow e \in \mathbf{C}$  について 2-isomorphism  $\alpha_{g,f}: F(g \circ f) \rightarrow F(g) \circ F(f)$  が存在する。

(c)  $f: x \rightarrow y, g: y \rightarrow z, h: z \rightarrow w$  について以下の等式が成り立つ。

### 3.3 Propositions


$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category とする. 任意の  $\mathbf{B}$  の射  $f: b \rightarrow b'$  と  $x \in \mathcal{X}(b')$  について,  $f$  と  $x$  に対する cartesian lifting は, 同型を除いて一意に存在する.

10

### 補題 3.5

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category とする. このとき, fiber of  $\pi$  は psuedo-functor である.

(証明).  $b \in \mathbf{B}$  について,  $\mathcal{X}(b)$  は既に既に定義した.  $\mathbf{B}$  の射  $\phi: b' \rightarrow b$  について, 関手  $\mathcal{X}(\phi): \mathcal{X}(b) \rightarrow \mathcal{X}(b')$  は次のように定められる. まず  $u \in \mathcal{X}(b)$  について,  $\mathcal{X}(\phi)(u)$  は  $\phi$  による  $u$  の pullback  $:: \phi^*u$  (cartesian lifting of  $\phi$ ) である. 次に  $\mathcal{X}(b)$  の射  $\lambda: u \rightarrow v$  ( $\mathcal{X}(b)$  の定義から  $\pi(\lambda) = \text{id}$  を満たす) について, 下の図式に triangle lifting を用いて  $\phi^*u \rightarrow \phi^*v$  を得る.



定義 (3.3) にある条件 (a) については, 各  $b \in \mathbf{B}$  について, 命題 (1.11) を用いれば同型の存在が分かる. 条件 (b) については, 各  $f: c \rightarrow d, g: d \rightarrow e \in \mathbf{C}$  と各  $b \in \mathbf{B}$  について補題 (3.4) を用いれば  $\mathcal{X}(g \circ f)(b) \cong \mathcal{X}(f) \circ \mathbf{B}(g)(b)$  が得られる. あとはこの同型が自然である (すなわち自然変換を定める) ことを確かめれば良い. ■

この事実は次のセミナーで用いる.

### 定理 3.6 (2-Yoneda Lemma (Fibered Yoneda Lemma))

$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B} ::$  fibered category とする. 以下のように関手を定める.

$$\begin{aligned} Y: \mathbf{B} &\rightarrow \mathbf{Fib}(\mathbf{B}) \\ U &\mapsto \mathbf{B}/U \end{aligned}$$

ここで  $\mathbf{B}/U$  は例 (1.8) にあるとおり fibered category over  $\mathbf{B}$  である.

この時, 圏同値  $\text{HOM}_{\mathbf{U}}(Y(U), \mathcal{X}) \rightarrow \mathcal{X}(U)$  が成り立つ.

(証明). (TODO) ■

### 注意 3.7

この定理から,  $\mathcal{X}(U)$  を「空間」 $\mathcal{X}$  の  $U$ -rational points と考えることが出来る. また, この定理から関手  $Y$  が  $U \in \mathbf{B}$  の fibered category over  $\mathbf{B}$  への「昇格」を与えていることが分かる.

### 系 3.8

圏同値  $U, V \in \mathbf{B}$  について  $Y(U) \simeq Y(V)$  と  $U \cong V$  は同値.

## 4 Grothendieck Construction

今, fibered category から fiber として psuedo-functor を構成した. 実はこの逆が出来る.

**定義 4.1** (Grothendieck Construction, [Ols16], [Noo12])

psuedo-functor  $:: P: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{Cat}/\mathbf{B}$  について, 以下のように圏  $\int P$  を定義する.

**Object.**  $b \in \mathbf{B}$  と  $x \in P(b)$  の組  $(b, x)$ .

**Arrow.**  $\phi: b \rightarrow b'$  と  $\Phi: P(\phi)(x) \rightarrow x'$  の組  $(\phi, \Phi)$ .

射の合成は  $(\psi, \Psi) \circ (\phi, \Phi) = (\psi \circ \phi, \Psi \circ P(\phi)(\Phi))$  で与えられる.

この圏によって以下の関手が定まる.

$$\int: \left\{ \begin{array}{c} \text{psuedo-functor} \\ \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{Cat} \\ P \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{sFib}(\mathbf{B})$$

$$\mapsto \int P$$

### 例 4.2

scheme  $:: S$  について, representable functor  $:: \underline{S}$  は  $\mathbf{Sch}/S$  に対応する.

### 例 4.3

presheaf of set  $:: F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  は  $\bigsqcup_{c \in \mathbf{C}} F(c)$  に対応する.

### 注意 4.4

David I. Spivak “Category theory for scientists” によると, Grothendieck Construction を最初に構成したのは Grothendieck ではない. 例えば MacLane が以前から扱っている.

**定義 4.5** (weak/strict 2-equivalence)

関手  $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  が weak 2-equivalence であるとは, 以下が成り立つこと: 逆向きの関手  $\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{D}: G$  と二つの自然変換  $\alpha: GF \rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}}, \beta: FG \rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$  が存在し,

- 各  $c \in \mathbf{C}, d \in \mathbf{D}$  について  $\alpha_c, \beta_d$  は同型であり,
- 射  $\phi \in \text{Arr}(\mathbf{C}), \psi \in \text{Arr}(\mathbf{D})$  について  $\alpha_\phi, \beta_\psi$  も同型.

$\alpha_\phi, \beta_\psi$  が恒等射であるときは strict 2-equivalence という.

定理 4.6 (Grothendieck Construction give Category Equivalence)

Grothendieck Construction

$$\int: \left\{ \begin{array}{c} \text{psuedo-functor} \\ \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{Cat} \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{cFib}(\mathbf{B})$$

は strict 2-equivalence である。また、このあとに忘却関手  $\mathbf{cFib}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  を続けると、weak 2-equivalence となる。

(証明). [Vis07] §3.1.3 に詳しい証明がある。あるいは、P. T. Johnstone “Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium vol.1 (Oxford Logic Guides 43)” に証明がある。 ■

注意 4.7

$\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$  と “anafunctor” の圏が strict 2-equivalence である、という述べ方もあるようだが、“anafunctor” を用いる理由が特に無いので、このノートでは導入しない。

注意 4.8

この定理から、psuedo-functor の理論と fibered category の理論は殆ど同じ、と言える。また、今後現れる stack などは psuedo-functor に対して定義され、一見、fibered category の理論は扱う必要性がなくなる。

しかし実際には、fibered category の方が psuedo-functor より構成しやすい、あるいは全体の性質を理解しやすいという面がある。また技術的な有利としては、fibered category は cleavage (例えば pullback, fiber product 等) を選択する必要がなく、例えば、pullback の貼り合わせ (貼り合わせの際には同型での変形が必要になる) を自然に扱うことが出来る<sup>†4</sup>。

また、直観としては、fibered category は family である。ここから得られる fiber は正に fiber of family である。そのため fibered category は大域的、psuedo-functor は局所的だと考えられる。

(TODO: あとで分かったらもっと追記する。)

## 5 Category Fibered in Groupoids/Sets

### 5.1 Motivation

Category Fibered in Groupoids は「綺麗すぎる」fibered category であるが、我々が研究する範囲では珍しいものではない。

### 5.2 Definition

定義 5.1 (Groupoid)

任意の射が同型射である圏を groupoid と呼ぶ。

注意 5.2

---

<sup>†4</sup> もう少し具体的な例としては、trivial family の貼り合わせで出来る locally trivial family も扱える。詳しい例は私の Deformation Theory に関するノートを読んで欲しい。

群は対象がただ一つで任意の射が同型であるものとみなせるため、groupoid にはこの名前がある。

群以外の極めて単純な groupoid として、集合を射が恒等射しかない圏（離散圏）とみなしたものがある。そのため、逆に恒等射しか無い圏も set と呼ぶ。

### 定義 5.3 (Category fibered in groupoids/sets)


$\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を fibered category とする。任意の  $b \in \mathbf{B}$  について、 $\pi$  の  $b$  における  $\text{fiber}\mathcal{X}(b)$  が groupoid (set) であるとき、 $\mathcal{X}$  を category fibered in groupoids (sets) と呼ぶ。

category fibered in groupoids は次のように定義しても同値である。


### 定義 5.4 (Category fibered in groupoid (Another Definition))

任意の射が cartesian である fibered category を category fibered in groupoids と呼ぶ。すなわち、以下の 2 条件が成立する圏  $\mathcal{X}$  と関手  $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}$  を category fibered in groupoids と呼ぶ。

- (i) 以下の図式 (1) において、上の箱と下の箱が  $\pi$  で対応し、下の箱にある図式が可換であるとする。この時、図式 (2) のように上の箱にある図式を可換にし、 $\pi$  での対応を保つ射  $z \rightarrow x$  がただ一つ存在する。



- (ii)  $y \in \mathcal{X}, u \rightarrow \pi(y) \in \mathbf{B}$  に対し、以下の図式を満たす  $x \in \mathcal{X}$  と射  $x \rightarrow y \in \mathcal{X}$  が存在する。



(証明). [Sta19] 003V<sup>†6</sup>.

## 6 Equivalence of Fibered Categories

Fibered category の一般論の最後に、この直後に扱うことと成る Equivalence を扱う。

この節では fibered categories  $:: \pi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbf{B}, \pi': \mathcal{X}' \rightarrow \mathbf{B}$  と、これらの間の射  $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$  を考える。

### 6.1 Definition

#### 定義 6.1 (Equivalence)

$g$  が equivalence of fibered categories であるとは、別の射  $h: \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$  が存在し、 $g \circ h, h \circ g$  がそれぞれ恒等関手と base-preserving isomorphic であるということである。

この時、 $\mathcal{X} \simeq \mathcal{X}'$  と書き、 $h$  は psuedo-inverse of  $g$  と呼ばれる。

#### 注意 6.2

比較すれば分かるとおり、equivalence of fibered categories は、通常の圏同値の定義に “base-preserving” という条件が追加されただけである。

### 6.2 Propositions

#### 命題 6.3

fibered とは限らない圏  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  とその間の関手  $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  について、 $F$  が圏同値であることは以下の 2 条件が同時に成立することと同値。

##### Fully Faithfulness.

任意の  $c, c' \in \mathbf{C}$  について、

関手  $F$  が与える class の対応  $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(c, c') \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(c), F(c'))$  は全単射である。

##### Essential Surjectivity.

任意の  $d \in \mathbf{D}$  について、 $F(c) \cong d$  となる対象  $c \in \mathbf{C}$  が存在する。

(証明). [Awo10] Prop7.26 を参照せよ。

#### 命題 6.4 ([Ols16] Prop3.1.18, 3.1.10)

$b \in \mathbf{B}$  について、 $g$  を  $\mathcal{X}(b)$  に制限して得られる関手を  $g_b: \mathcal{X}(b) \rightarrow \mathcal{X}'(b)$  とする。

(a)  $g :: \text{fully faithful} \iff$  任意の  $b \in \mathbf{B}$  について、 $g_b :: \text{fully faithful}$ .

(b)  $g :: \text{equivalence} \iff$  任意の  $b \in \mathbf{B}$  について、 $g_b :: \text{equivalence}$  <sup>†7</sup>.

<sup>†5</sup> すなわち、 $\pi(x) = u, \pi(x \rightarrow y) = u \rightarrow \pi(y)$  を満たす。

<sup>†6</sup> <https://stacks.math.columbia.edu/tag/003V>

(証明). いずれも  $\implies$  は自明なので  $\impliedby$  を示す.

(i) の証明の概略は以下の通り. まず  $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(c, c'), \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(F(c), F(c'))$  を

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(c, c') &= \bigsqcup_{h \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{B}}(\pi(c), \pi(c'))} \left\{ \begin{array}{c} \text{morphisms } c \rightarrow c', \\ \text{over } h \end{array} \right\}, \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(F(c), F(c')) &= \bigsqcup_{h \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{B}}(\pi(c), \pi(c'))} \left\{ \begin{array}{c} \text{morphisms } F(c) \rightarrow F(c'), \\ \text{over } h \end{array} \right\}\end{aligned}$$

と分解する. そして各  $h$  について session 4 の命題 4.2 (射は cartesian arrow と id に写る射の合成に分解できる) を用いる. すると各成分について全単射を構成できる.

(TODO: proof of (ii)) ■

## 参考文献

- [Awo10] Steve Awodey. *Category Theory*. 2nd ed. Oxford Logic Guides. Oxford University Press, U.S.A., Aug. 2010.
- [Noo12] Behrang Noohi. *A Quick Introduction to Fibered Categories and Topological Stacks*. August 23, 2012. URL: <http://www.maths.qmul.ac.uk/~noohi/papers/quick.pdf>.
- [Ols16] Martin Olsson. *Algebraic Spaces and Stacks*. American Mathematical Society Colloquium Publications 62. Amer Mathematical Society, Apr. 2016. ISBN: 978-1-4704-2798-6. URL: <https://doi.org/10.1365/s13291-017-0172-7>.
- [Sta19] The Stacks Project Authors. *Stacks Project*. 2019. URL: <https://stacks.math.columbia.edu>.
- [Vis07] Angelo Vistoli. “Notes on Grothendieck Topologies, Fibered Categories and Descent Theory”. In: (May 24, 2007). arXiv: [math/0412512](https://arxiv.org/abs/math/0412512). URL: <http://arxiv.org/abs/math/0412512> (visited on 02/15/2020).

---

<sup>†7</sup> こちらは通常の圏同値