ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-10-2026

हाथरस(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-31	2026-11-01	2026-11-02	2026-11-03	2026-11-04
वर्षा (मिमी)	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	28.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	19.0	19.0	18.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	92	94	84	73	66
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	54	38	29	32
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	4	6	0	3
पवन दिशा (डिग्री)	79	31	259	90	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	2	0	0	0
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते 31 अक्टूबर, 2026 के आसपास स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 26.0 से 31.0°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1-2°C कम हो सकता है; वहीं न्यूनतम तापमान 18.0 से 20.0°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3-4°C अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता (humidity) का स्तर अधिकतम 73-94% और न्यूनतम 29-65% के बीच रहने का अनुमान है। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पश्चिम रहने की संभावना है, और हवा की गति 0.0 से 8.0 किमी/घंटा के बीच रह सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, तेज़ हवाओं, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी या कटी हुई धान की फसल गिर सकती है। इससे दानों में नमी बढ़ेगी और वे काले पड़ सकते हैं। जिससे धान की तैयार फसल को नुकसान हो सकता है। बुवाई के ठीक बाद बारिश होने से मिट्टी की ऊपरी सतह पर पपड़ी बन जाती है, जिससे सरसों, आलू और अगेती गेहूं के बीजों का अंकुरण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। उच्च आर्द्रता और लगातार बादल छाए रहने से कटी हुई फसलों में फफूंद लगने और सब्जियों व दलहनी फसलों में जड़ सड़न व ब्लास्ट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है तो कटाई कार्य को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दें। जो फसल पहले काटी जा चुकी है, उसे खेतों से

हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाएं या तिरपाल से अच्छी तरह ढकें। सरसों, अगेती गेहूं और आलू के लिए तैयार खेतों में बुवाई का कार्य बारिश के बाद (खेत की मिट्टी छूने लायक होने पर) ही करें। सब्जी, मटर, दलहन वाले खेतों में मेड़-नाली प्रणाली तैयार रखें ताकि भारी बारिश का अतिरिक्त पानी पौधों की जड़ों में जमा न हो और उसे तुरंत बाहर निकाला जा सके। टमाटर, मिर्च और गोभी जैसी सब्जियों में जल निकासी सुचारू रूप से करें।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में संभावित मौसमी बदलाव या हल्की बारिश को देखते हुए कटी हुई फसलों को खेतों से हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रखें अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढकें। तथा सरसों, आलू और अगेती गेहूं की बुवाई करने वाले किसान भाई खेतों में उचित नमी का ध्यान रखें और मौसम के पूरी तरह साफ होने पर ही बीजों की बुवाई करें। फसलों में किसी भी प्रकार की भारी सिंचाई, कीटनाशक या उर्वरकों के छिड़काव को अगले 2-3 दिनों के लिए टाल दें ताकि पानी और लागत का नुकसान न हो। उत्तर-पश्चिमी शुष्क व ठंडी हवाओं से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला (बाड़े) को रात में तिरपाल या टाट की बोरियों से ढककर रखें

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खरीफ की खड़ी फसलों की कटाई/मड़ाई तथा रबी की फसलें जैसे-गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू एवं सब्जियों की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हैं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई के लिए मौसम अनुकूल हैं तथा कटाई के पश्चात लॉक को 2 -3 दिन तक धुप में सूखाने के बाद मड़ाई का कार्य करें। मड़ाई के बाद धुप में 3-4 दिन तक सूखाकर बीज को भण्डारित करें।
मूँगफली	मूँगफली के फसलों की खुदाई तभी करे जब छिलके के ऊपर की नसें उभर आयें तथा भीतरी भाग कत्थई रंग की हो जाय और मूंगफली का दाना गुलाबी हो जाय। मूँगफली की खुदाई के बाद फलियों को धुप में अच्छी तरह सुखाकर भण्डारण करें।
गेहूँ	मौसम के दृष्टिगत सिंचित दशा में गेहूँ की बुवाई के लिए तापक्रम अनुकूल है, अतः गेहूँ की बुवाई का कार्य 10 नवम्बर से प्रारम्भ करें। गेहूं की बुवाई के लिए खेत की तैयारी करें तथा क्षेत्रीय प्रजाति पी.बी.डब्ल्यू.-723, एच.पी.बी.डब्ल्यू.-01, डी.बी.डब्ल्यू.-39, के.-9107, के.-1006, के.-402 ,के.-607, डी.बी.डब्ल्यू.-90, डब्ल्यू.बी.-02, एन.डब्ल्यू.-5054, एच.डी.- 3043, यू.पी.-2382, एच.यू. डब्ल्यू.-468, पी.बी.डब्ल्यू.-443, एच.डी.- 2967 आदि, ऊसर भूमि के लिए संस्तुति प्रजाति :- के.आर.एल.-210, के.आर.एल.-213, के.-1317 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था करें।
रेपसीड	तोरिया की फसल में बालदार सुण्डी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।तोरिया फसल की बुवाई के 20-22 के अन्दर निराई - गुड़ाई करने के साथ ही पौध से पौध की आपसी दूरी 10 - 15 सेंटीमीटर करें । तोरिया की फसल में पहली सिचाई बुवाई के 25-30 दिन के अन्दर करें तथा ओट आने पर 108 किलोग्राम/हेक्टयर की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।
सरसों	सरसों की फसल में आरा मक्खी- अंकुरण के 7 से 10 दिन में ये कीट अधिक हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत या मैलाथियान 5 प्रतिशत या कारबैरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।राई/सरसों की संस्तुति प्रजातियॉ- पूसा सरसों-34, पूसा सरसों-32, सी - 5-64 (सीएस2005-143), पूसा ओओएम-36 (पीडीजेड-15), बीएमपी-II (डीआईएमआर), आजाद महक, सुरेखा (केएमआर-16-02), वरुणा, रोहिणी, नरेंद्र राई- 8501,माया, वैभव आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 3-4 किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई के कार्य साफ मौसम में करें।
फील्ड पी	मटर के फसल की संस्तुति प्रजातियॉ- रचना, मालवीय मटर -15 , सपना आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 100-१२५ किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई करें।
चना	चना के फसल की संस्तुति प्रजातियॉ- अवरोधी, पूसा-256, पूसा-362, के डब्लू आर-108, के -850, के डी जी -1168 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए छोटे दानो का बीज 75-80 किलोग्राम व बड़े दाने की प्रजाति के लिए 90-100 किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की मुख्य किस्में जैसे-कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी सिन्दुरी, कुफरी सतलज, कुफरी लालिमा, कुफरी अरूण, कुफरी सदाबहार और कुफरी पुखराज, कुफरी गरिम, कुफरी लिमा, कुफरी ललित, कुफरी संगम, कुफरी नीलकंठ, कुफरी गंगा, कुफरी थार- 3, कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ, कुफरी सूर्या, कुफरी चिप्सोना-1, कुफरी चिप्सोना-3, कुफरी चिप्सोना-4 और कुफरी फ्राईसोना आदि की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हैं। आलू के फसल में चेचक रोग से बचाव हेतु कन्दो को 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लीन या बोरिक एसिड को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज पर छिड़काव करे तथा अंकुरित बीज को उपचारित न करे।
सब्जी पीईए	सब्जी मटर, सौफ, अजवाइन, चुकन्दर, लहसुन,धनिया, पालक,सोया, मेथी, मूली, गाजर, शलजम एवं पत्तेदार सब्जियों की बुवाई करें। टमाटर, प्याज, मिर्च , फूलगोभी एवं पत्तागोभी की नर्सरी डालें। यदि खेत में पानी रुकने की संभावना है तो फूलगोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च आदि की रोपाई मेड़ों पर करें।सब्जिओ की फसलों में फल छेदक / पत्ती छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहे हो तो इसके निंयत्रण हेतु नीम आयल की 1.5 मिली0/लीटर पानी में घोल बनाकर 3-4 छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर करे।
आम	आम, अमरुद, आँवला, नीबू आदि के नए बागो में नष्ट हुए पौधो के स्थान पर नए पौधों की रोपाई करे। केले/पपीते के बागो की गुड़ाई-करके तने के चारो तरफ 25-३० सेंटीमीटर ऊंची मिटटी चढ़ा दे । केले/ पपीता के फलदार वृक्षों में लकड़ी या बॉस के स्टैण्ड लगायें। आम में पत्ती कटाने वाले कीट की रोकथाम हेतु २%कार्बरिल 1.5 % धूल का बुरकाव करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गर्भवती भैसों /गायों को ढलान वाले स्थान पर न बांधे। गर्भवती भैसों /गायों को पौष्टिक चारा एवं दाना खिलायें तथा नवजात बच्चे को तीन दिन तक खिस अवश्य पिलायें। पशुओं को साफ-सुथरे स्थान पर रखें। गला घोटू रोग से बचाव हेतु पशुओं का टीकाकरण अवश्य करायें। बदलते मौसम को देखते हुए पशुओ को रात्रि के समय खुले स्थान पर न बांधे तथा पशुओं के स्वास्थ्य एवं बिमारी की देखभाल करना सुनिश्चित करे। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओ को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों के रहने के स्थान पर प्रति दिन सफाई करे। मुर्गियों को स्वच्छ पानी तथा सन्तुलित आहार की व्यवस्था करें। अंडे के लिए नये चूजें द्वारा मुर्गियों को पालने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है परंतु ब्रायलर मुर्गियों के लिए यह समय उपयुक्त है। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। पानी का क्लोरीनेशन अवश्य करें।मुर्गियों के पेट में कीड़ों के मारने के लिए (डिवर्मिंग) की दवा दें। मुर्गीखाने को सूखा रखें तथा बिछावन को पलटते रहें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी बारिश मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाता है और यातायात को पूरी तरह बाधित करता है। आकाशीय बिजली गिरने, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन से मानव जीवन और संपत्ति को सीधा खतरा होता है। बारिश के मौसम में शेड में नमी से खुरों का संक्रमण होता है और गीला चारा खाने से पशुओं में पेट की गंभीर बीमारियां होती हैं। कटाई के समय बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें खेतों में गिर जाती हैं और सड़ जाती हैं। अचानक मौसम में बदलाव या उच्च आर्द्रता (नमी) के कारण फसलों में कीटों और फंगस (फफूंद) का प्रकोप तेजी से बढ़ता है।फसल की बर्बादी से किसानों की बीज और खाद की पूरी लागत डूब जाती है, जिससे वे आर्थिक संकट और कर्ज में फंस जाते हैं। चेतावनी के बाद जल निकासी और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में किसानों की परिचालन लागत बढ़ जाती है। मौसम से प्रभावित खराब गुणवत्ता वाले अनाज और सब्जियों को मंडियों में उचित दाम नहीं मिल पाता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

भारी बारिश और आकाशीय बिजली के अलर्ट को देखते हुए आंधी-तूफान के समय सुरक्षित पक्के मकानों के अंदर रहें; पेड़ों, कमजोर दीवारों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। सड़कों पर जलभराव और दृश्यता कम होने की संभावना है, इसलिए गैर-जरूरी यात्राओं से बचें और जलजमाव वाले रास्तों पर वाहन न चलाएं। तेज हवाओं और बारिश से बचाने के लिए मवेशियों को खुले खेतों या पेड़ों के नीचे बांधने के बजाय हवादार और पक्के शेड के अंदर सुरक्षित रखें। बारिश के कारण पशुशाला के फर्श को सूखा व साफ रखें ताकि पैरों का संक्रमण न हो, और मवेशियों को भीगा या फफूंद लगा चारा देने से बचें। इस समय खरीफ फसलों (जैसे धान) की कटाई चल रही है; अतः मौसम साफ होने तक फसलों की कटाई को तुरंत रोक दें। खेतों में पानी जमा होने से रोकने के लिए जल निकासी को तुरंत दुरुस्त करें ताकि फसलों की जड़ें न सड़ें। खेतों में पहले से कटी हुई फसलों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाएं या उन्हें तिरपाल से अच्छी तरह ढक कर रखें ताकि दाने काले न पड़ें। वर्तमान तेज हवाओं और बारिश की स्थिति को देखते हुए फसलों में किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद या कीटना

Farmers are advised to download Unified ﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details