**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

**दिनांक : 20-03-2026**

**खेरी(उत्तर प्रदेश ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-20 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)**

| मौसम कारक | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्षा (मिमी) | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 25.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 88 | 89 | 80 | 71 | 65 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 52 | 56 | 40 | 35 | 35 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 7 | 288 | 96 | 59 | 3 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| चेतावनी | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं |

## पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण, 21-22 मार्च, 2026 को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24.0-31.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 17.0-19.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 65-89% और 35-56% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व से होगी और हवा की गति 4.0-9.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, जो सामान्य से 1-2 किमी/घंटा अधिक रहने की उम्मीद है।

## मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 21-22 मार्च, 2026 को हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

| |
|---|
| मौसम की स्थिति को देखते हुए भिंडी, तरोई, कद्दू लौकी, खीरा, ककड़ी और ग्रीष्मकालीन मक्का, उर्द, मूँग की बुवाई/सिचाई का कार्य स्थगित रखें एवं सरसों और आलू जैसी परिपक्व फसलों की कटाई /खुदाई कर फसल को सुरछित स्थान रखें। |

## सामान्य सलाहकार:

| |
|---|
| किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अत्याधिक बर्षा जल के निकास का उचित प्रबन्ध करें, कटी हुई फसलों को एकत्र कर पॉलीथिन सीट से ढक दें यदि कटी हुई फसल बरसात में भीग गई है तो उसे धुप में अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई करने के पश्चात् दाने को संरछित करें। जायद की खड़ी फसलों में सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशी, रोगनाशी और खरपतवारनाशी स्प्रे न करें। छिड़काव शाम को किया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन अच्छी तरह से धोना चाहिए। |

## लघु संदेश सलाहकार:

| |
|---|
| किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल बरसात में यदि भीग गई है तो उसे धुप में अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई का कार्य करें एवं सिचाई/बुवाई का कार्य स्थगित रखें। |

## फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| गेहूँ | बर्षा की सम्भावना को देखते हुए सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। गेहू की फसल में चूहों का प्रकोप दिखाई देने पर जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की टिकिया का प्रयोग करें। चूहों की रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। |
| सरसों | विगत सप्ताह हुई बर्षा जल के निकास का उचित प्रबन्ध करें, यदि कटी हुई फसल बरसात में भीग गई है तो उसे धुप में अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई का कार्य करें। सरसो की कटी हुई फसलों को एकत्र कर पॉलिथीन सीट से ढ़क कर फसल को संरक्षित करें। सरसो की फसल में ८५% फलिया सुनहरे रंग की दिखाई देने पर फसलों की कटाई करे। |
| चना | विगत सप्ताह हुई बर्षा जल के निकास का उचित प्रबन्ध करें । चने की फसल में दाना भरने की अवस्था में फली छेदक कीट का अत्याधिक प्रकोप होता है। फली छेदक कीटों का प्रकोप होने की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी @ 2 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 180- 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव साफ आसमान में करें। |
| मक्का | बर्षा की सम्भावना को देखते हुए सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। मक्के की फसल में पहली सिंचाई बुवाई के 20-25 दिन बाद करें तथा ओट आने पर निराई - गुड़ाई का कार्य करें। मक्का की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम हेतु बुवाई के 10 -15 दिन बाद फोरेट 10 % जी 10 किलोग्राम अथवा कार्बोफ्यूरान 3 % जी 20 किलोग्राम / हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। |
| काला चना | बर्षा की सम्भावना को देखते हुए सिंचाई /बुवाई का कार्य स्थगित रखें। जायद उर्द की संस्तुति जातियां- टा-9 , नरेन्द्र उर्द-1, आजाद उर्द-1, आजाद उर्द-2, शेखर-2,सुजाता , पी यू-40 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था कर बुवाई का कार्य करें। जायद उर्द के फसल की बुवाई के लिए २५-३० किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बीज की बुवाई करें। |
| मूँग | बर्षा की सम्भावना को देखते हुए बुवाई का कार्य स्थगित रखें। जायद मूँग की संस्तुति जातियां- नरेन्द्र मूँग -1, सम्राट (पी.डी.एम.-139), मालवीय जनप्रिया (एच.यू.एम.-6), मेहा, मालवीय जनकल्याणी, मालवीय जन चेतना, स्वेता, स्वाती, विराट, शिखा, आई पी एम -2-3, आई पी एम -2-14, मालवीय ज्योति आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था कर बुवाई का कार्य करें। जायद मूँग के फसल की बुवाई के लिए 20-25 किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई करें। |

## बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| प्याज | बर्षा की सम्भावना को देखते हुए सिंचाई /बुवाई का कार्य स्थगित रखें। प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा रोग का प्रकोप 28 - 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा 80 - 90 % सापेक्षिक आर्द्रता की स्थिति पर यह रोग अधिक प्रभावित होता है अतः इसके रोकथाम हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 0.3 % (3 ग्राम /लीटर पानी ) अथवा मैंकोजेब 0. 25 % (0. 25 ग्राम /लीटर पानी ) की दर से घोलबनाकर 15 -20 दिन के अन्तराल पर 3-4 छिड़काव साफ आसमान में करें। ग्रीष्म कालीन मौसम में बोई जाने वाली सब्जिओं जैसे- भिण्डी, तोरी, खीरा, करेला, लौकी एवं कद्दू आदि की बुवाई करें। टमाटर , बैगन एवं मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करे। |
| आम | आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें अथवा एसिटिक एसिड के 15 पीपीएम या 4 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स प्रति 9 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बौर में मिज कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु फेनिट्रोथियान 1.0 मिली/लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। |

## पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| भेंस | पशुओ को पेट में कीड़ो की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। पशुओं के व्याने के बाद 750 ग्राम सरसो का तेल, 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सोंठ, 50 ग्राम जीरा , 500 ग्राम गुड़ के मिश्रण की ओटी बनाकर सुबह - शाम तीन दिन तक खिलाये। वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को दिन के समय छाये दार स्थान पर या पेड़ की छाया में बांधे। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओ को साफ एवं ताजा पानी दिन में ३-४ बार अवश्य पिलायें। |

## मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

| मुर्गी पालन | मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| मुर्गी | किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ो की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। |

## मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

| |
|---|
| भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 21 मार्च, 2026 को हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। |

## प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

| |
|---|
| मौसम की स्थिति को देखते हुए भिंडी, तरोई, कद्दू लौकी, खीरा, ककड़ी और ग्रीष्मकालीन मक्का, उर्द, मूँग की बुवाई/सिचाई का कार्य स्थगित रखें एवं सरसों और आलू जैसी परिपक्व फसलों की कटाई /खुदाई कर फसल को सुरछित स्थान रखें। |

**Farmers are advised to download Unified ⁄Mausam⁄ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/**

**Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details**

**Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details**