



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

इटवा(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	24.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	68	62	61	63	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	41	40	39	40	44
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	7	7	11	8
पवन दिशा (डिग्री)	287	238	245	360	254
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों तक आसमान साफ़ रहेगा और बाकी दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35.0-36.0°C के बीच रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से 2-3°C ज्यादा हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 24.0-25.0°C के बीच रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से 1-2°C ज्यादा हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) का अधिकतम और न्यूनतम दायरा क्रमशः 61-68% और 39-44% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम रहेगी और हवा की गति 7.0-11.0 किमी/घंटा के बीच रहने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मिली मौसम की जानकारी के अनुसार, कोई चेतावनी नहीं है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में परिपक्व फसलों की कटाई/मड़ाई एवं बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। पशुओं को खुले स्थान पर न बांधें और न ही उन्हें चरने के लिए बाहर छोड़ें तथा जल भराव वाले स्थान पर पशुओं न जाने दें। पशुओं को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें और पशुओं को साफ़ पानी पिलायें, पशुओं को पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास न बांधें, क्योंकि गिरती हुई टहनियाँ या खंभों से लगने वाले बिजली के झटके से पशुओं की जान जा सकती है।

सामान्य सलाहकार:

परिपक्व फसलों की कटाई, मड़ाई एवं बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हैं। खेत में कटी हुई फसल यदि भीग गई है तो उसे धूप में अच्छी तरह सूखाकर मड़ाई का कार्य करें। पशुओं को बहते हुए पानी/जल भराव वाले स्थान पर जाने से रोकें। पशुओं को बरसात के रुके हुए पानी को न पीने दें। बरसात के मौसम में रात के समय घर से बाहर निकलने पर टार्च लेकर जाय तथा सर्प, बिच्छू आदि से बचने के लिए घर की दीवारों व छिद्रों को बंद कर दें और हल्का सा कैरोसिन या फिनाइल का छिड़काव कर दें जिसकी गंध से सांप चले जाते हैं।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी सप्ताह में वर्षा की कोई सम्भावना नहीं है, अतः परिपक्व फसलों की कटाई, मड़ाई एवं बुवाई के लिए मौसम अनुकूल हैं।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की फसल बालियाँ निकलने तथा फूल खिलने /दुग्धावस्था की अवस्था पर चल रही है जो नमी की कमी के प्रति संवेदनशील हैं अतः आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाये रखें। वर्तमान मौसम कीटों के लिए अनुकूल है अतः धान की फसल में फूल आने के बाद औसतन 2 - 3 गन्धी कीट /हिल दिखाई दे तो इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 % एस.एल. की 350 मिली/हेक्टेयर या बुरफोजिन 25 % एस.पी. 750 मिली/हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम पर करें। धान की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ई.सी. एस. एल. 25 ग्राम/हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में करें।
तिल	परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई के लिए मौसम अनुकूल हैं। खेत में कटी हुई फसल यदि भीग गई है तो उसे धूप में अच्छी तरह सूखाकर मड़ाई का कार्य करें। तिल की फसल में फली की सूण्डी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस.जी. 200 ग्राम / हेक्टेयर या क्यूनालफास 25% ई.सी. 1.25 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम पर करें।
मूँगफली	मूँगफली की फसल में सफेद गिडार/ दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु फिप्रोनिल 0.3 % जी.आर. 20 किलोग्राम/हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें।
काला चना	उर्द/ मूँग की खड़ी फसलों में फली छेदक कीट की सूड़ियाँ, जो फली के अन्दर छेद करके दानों को खाती हैं, इसके रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रीन 10 ई.सी. 750 मिली मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में करें।
रेपसी ड	तोरिया की संस्तुति जातियाँ- टा -36, टा-9 भवानी, पी.टी.-303, पी.टी.-30 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 3-4 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर की दर से खाद एवं बीज की व्यवस्था कर बुवाई का कार्य करें।
गन्ना	यदि गन्ने की लंबाई पांच फुट हो गई हो तो ढाई फुट की ऊँचाई पर प्रथम बँधाई करें। प्रथम बँधाई हेतु गन्ने को लाइनों में एक लाइन के दो झुण्डों को एक साथ नीचे की सूखी पत्तियों से बँधाई करें। लालसड़न रोग से प्रभावित पौधों को जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा थायोफिनेट मिथाइल 0.2 प्रतिशत के घोल से पौधों पर छिड़काव करें। गन्ने की फसल में बैक्टीरियल रॉट बीमारी के लक्षण दिखने पर संक्रमित पौधे को काटकर नष्ट कर दें तथा इसके नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01 प्रतिशत का छिड़काव मौसम अनुकूल होने पर करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी चंद्र मुखी तथा कुफरी अशोका की बुवाई प्रारम्भ करें। बुआई के 7-10 दिन पहले शीत भण्डार से आलू के बीज को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छाँटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व आलू के बीज को उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छाँटने के तुरन्त बाद आलू के कन्दों को बोरेक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सूखा लें।
मिर्च	मूली, गाजर, चुकन्दर, शलजम एवं पत्तेदार सब्जियों की मेड़ों पर बुवाई करें। खरीफ में रोपी जाने वाली सब्जियों जैसे- बैंगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूलगोभी आदि फसलों की तैयार पौध की रोपाई करें। यदि खेत में पानी रुकने की संभावना है तो अगेती फूलगोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि की रोपाई मेड़ों पर करें। सब्जियों की फसलों में फल छेदक / पत्ती छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहे हो तो इसके

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	नियंत्रण हेतु नीम आयल की १.५ मिली/लीटर पानी में घोल बनाकर 3-4 छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर आसमान साफ होने पर करें।
आम	आम, अमरुद, आँवला, नीबू आदि फलों के पौधों की रोपाई शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। नए बागों में नष्ट हुए पौधों के स्थान पर नए पौधों की रोपाई करें। केले/पपीते के बागों की गुड़ाई-करके तने के चारों तरफ 25-30 सेंटीमीटर ऊंची मिटटी चढ़ा दे स्टैंडिंग करें। आम में पत्ती कटाने वाले कीट की रोकथाम हेतु २%कार्बेरिल 1.5 % धूल का बुरकाव आसमान साफ होने पर करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को रात के समय आसमान साफ होने पर ही खुले में बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधें। पशुओं को तालाबों या अन्य जगह के रुके हुए पानी को न पिलाये, इससे पशुओं को लीवर फ्लू व पेट के कीड़े होने की संभावना रहती है। पशुओं के पेट में कीड़ों की रोकथाम हेतु कुमिनाशक दवा देने का सर्वोत्तम समय है। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3 -4 बार अवश्य पिलायें। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए कुमिनाशक दवा देने का उचित समय है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों के रहने के स्थान पर प्रति दिन सफाई करें। मुर्गियों को स्वच्छ पानी तथा सन्तुलित आहार की व्यवस्था करें। अंडे के लिए नये चूँजे द्वारा मुर्गियों को पालने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है परंतु ब्रायलर मुर्गियों के लिए यह समय उपयुक्त है। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। पानी का क्लोरीनेशन अवश्य करें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों के मारने के लिए (डिवर्मिंग) की दवा दें। मुर्गीखाने को सूखा रखें तथा बिछावन को पलटते रहें। मुर्गीखाने में अधिक नमी हो तो पंखा चलायें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

लगातार धूप और उच्च उमस के कारण पशुओं में हीट स्ट्रेस और संक्रामक बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अधिक उमस और गर्मी के कारण भैंस और गायों की भूख कम हो जाती है, जिससे अचानक दूध उत्पादन घट सकता है। हाल की मानसूनी बारिश के बाद रुके हुए पानी और अब बढ़ती गर्मी के कारण चारे व पानी में बैक्टीरिया पनपते हैं। इससे पशुओं में पेट के कीड़े, त्वचा संक्रमण और खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। अचानक उमस भरी गर्मी बढ़ने और फिर धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान गिरने से दिन में तेज गर्मी और रात/सुबह में हल्की ठंडक का माहौल रहेगा। इस दोहरे मौसम से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तेज धूप में निकलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा, इस मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और वायरल फ्लू के मच्छरों व वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

पशुओं को दिन के समय (सुबह 11 से शाम 4 बजे) सीधे धूप में न बांधें। उन्हें हवादार और छायादार शेड में रखें। पीने के पानी के कुंड को साफ रखें और दिन में कम से कम 3-4 बार ताजा व साफ पानी पिलाएं। यदि गलघोंटू (HS) या लंगडिया बुखार (BQ) का टीका न लगा हो, तो टीकाकरण करवाएं। रात के समय पशुशाला में मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए नीम की पत्ती का धुआं करें। बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। ओआरएस (ORS), नीबू पानी या छाछ का सेवन करें ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न हो। घरों के आस-पास या छतों पर हाल की बारिश का पानी जमा न होने दें। सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें। धूप से अचानक आकर फ्रिज का ठंडा पानी पीने या सीधे एसी (AC) में बैठने से बचें। यह सर्दी-खांसी और फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण बनता है। रबी फसलों की तैयारी और खरीफ (जैसे धान) की कटाई व मड़ाई के लिए यह शुष्क सप्ताह बेहद उत्तम है। किसान भाई बिना बारिश के डर के अपनी फसलों को काटकर सुरक्षित सुखा सकते हैं।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>