ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-10-2026

सीतापुर(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-28	2026-10-29	2026-10-30	2026-10-31	2026-11-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	27.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	31.0	30.0	25.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	20.0	21.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	73	73	87	93	93
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	42	56	76	71
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	5	13	9
पवन दिशा (डिग्री)	27	344	74	360	30
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	7	7	8	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 25.0 से 33.0°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1-2°C कम हो सकता है; वहीं न्यूनतम तापमान 18.0 से 21.0°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3-4°C अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) का स्तर 73-93% (अधिकतम) और 32-76% (न्यूनतम) के बीच रहने का अनुमान है। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम रहने की संभावना है, और हवा की गति 4.0 से 13.0 किमी/घंटा के बीच रह सकती है, जो सामान्य से 3-4 किमी/घंटा अधिक होने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने आदि की चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

भारी बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी या कटी हुई धान की फसल गिर सकती है। इससे दानों में नमी बढ़ेगी और वे काले पड़ सकते हैं। जिससे धान की तैयार फसल को नुकसान हो सकता है। बुवाई के ठीक बाद बारिश होने से मिट्टी की ऊपरी सतह पर पपड़ी बन जाती है, जिससे सरसों, आलू और अगेती गेहूं के बीजों का अंकुरण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। उच्च आर्द्रता और लगातार बादल छाए रहने से कटी हुई फसलों में फफूंद लगने और

सब्जियों व दलहनी फसलों में जड़ सड़न व ब्लास्ट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है तो कटाई कार्य को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दें। जो फसल पहले काटी जा चुकी है, उसे खेतों से हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाएं या तिरपाल से अच्छी तरह ढकें। सरसों, अगेती गेहूं और आलू के लिए तैयार खेतों में बुवाई का कार्य बारिश के बाद (खेत की मिट्टी छूने लायक होने पर) ही करें। सब्जी, मटर, दलहन वाले खेतों में मेड़-नाली प्रणाली तैयार रखें ताकि भारी बारिश का अतिरिक्त पानी पौधों की जड़ों में जमा न हो और उसे तुरंत बाहर निकाला जा सके। अगले 3 दिनों तक फसलों में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग या किसी भी कीटन

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में संभावित मौसमी बदलाव या हल्की बारिश को देखते हुए कटी हुई फसलों को खेतों से हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रखें अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढकें। तथा सरसों, आलू और अगेती गेहूं की बुवाई करने वाले किसान भाई खेतों में उचित नमी का ध्यान रखें और मौसम के पूरी तरह साफ होने पर ही बीजों की बुवाई करें। फसलों में किसी भी प्रकार की भारी सिंचाई, कीटनाशक या उर्वरकों के छिड़काव को अगले 2-3 दिनों के लिए टाल दें ताकि पानी और लागत का नुकसान न हो। उत्तर-पश्चिमी शुष्क व ठंडी हवाओं से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला (बाड़े) को रात में तिरपाल या टाट की बोरियों से ढककर रखें

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में संभावित मौसमी बदलाव या हल्की बारिश को देखते हुए कटी हुई फसलों को खेतों से हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रखें अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढकें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्षा की संभावना को देखते हुए कटी हुई फसलों को खेतों से हटाकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रखें अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढकें। धान की बालियाँ 85% सुनहरे रंग दिखाई देने लगे तो फसलों की कटाई करें तथा कटाई के पश्चात लॉक को धुप में सुखाकर मड़ाई का कार्य साफ मौसम पर करें। वर्तमान मौसम कीटो के लिए अनुकूल है अतः धान की फसल में फूल आने के बाद औसतन 2-3 गन्धी कीट /हिल दिखाई दे तो इसके नियंत्रण हेतु इमिडाकोलोरोप्रिड 17.8% एस एल की 350 मिली0/हेक्टेयर या बुरफोजिन 25 % एस पी 750 मिली0 /हेक्टेयर की दर से 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में करें।
रेपसीड	जल निकास का उचित प्रबंध करे। तोरिया की फसल में बालदार सुण्डी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।तोरिया फसल की बुवाई के 20-22 के अन्दर निराई - गुड़ाई करने के साथ ही पौध से पौध की आपसी दूरी 10 - 15 सेंटीमीटर करें । तोरिया की फसल में पहली सिचाई बुवाई के 25-30 दिन के अन्दर करें तथा ओट आने पर 108 किलोग्राम/हेक्टयर की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।
सरसों	वर्षा न होने की दशा में, सरसों की फसल में आरा मक्खी- अंकुरण के 7 से 10 दिन में ये कीट अधिक हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत या मैलाथियान 5 प्रतिशत या कारबैरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।राई/सरसों की संस्तुति प्रजातियॉ- पूसा सरसों-34, पूसा सरसों-32, सी - 5-64 (सीएस2005-143), पूसा ओओएम-36 (पीडीजेड-15), बीएमपी-II (डीआईएमआर), आजाद महक, सुरेखा (केएमआर-16-02), वरुणा, रोहिणी, नरेंद्र राई- 8501,माया, वैभव आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 3-4 किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई के कार्य करे।
फील्ड पी	वर्षा न होने की दशा में, मटर के फसल की संस्तुति प्रजातियॉ- रचना, मालवीय मटर -15 , सपना आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 100-१२५ किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई करें।
चना	वर्षा न होने की दशा में, चना के फसल की संस्तुति प्रजातियॉ- अवरोधी, पूसा-256, पूसा-362, के डब्लू आर-108, के -850, के डी जी -1168 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए छोटे दानो का बीज 75-80 किलोग्राम व बड़े दाने की प्रजाति के लिए 90-100 किलोग्राम बीज/हेक्टयर की दर से बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	जल निकास का उचित प्रबंध करे। वर्षा न होने की दशा में, आलू की मुख्य किस्में जैसे-कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी सिन्दुरी, कुफरी सतलज, कुफरी लालिमा, कुफरी अरूण,

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	कुफरी सदाबहार और कुफरी पुखराज, कुफरी गरिम, कुफरी लिमा, कुफरी ललित, कुफरी संगम, कुफरी नीलकंठ, कुफरी गंगा, कुफरी थार- 3, कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ, कुफरी सूर्या, कुफरी चिप्सोना-1, कुफरी चिप्सोना-3, कुफरी चिप्सोना-4 और कुफरी फ्राईसोना आदि की बुवाई का कार्य करे। आलू के फसल में चेचक रोग से बचाव हेतु कन्दो को 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लीन या बोरिक एसिड को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज पर छिड़काव करे तथा अंकुरित बीज को उपचारित न करे।
सब्जी पीईए	जल निकास का उचित प्रबंध करे। वर्षा न होने की दशा में, सब्जी मटर, सौफ, अजवाइन, चुकन्दर, लहसुन,धनिया, पालक,सोया, मेथी, मूली, गाजर, शलजम एवं पत्तेदार सब्जियों की बुवाई करें। टमाटर, प्याज, मिर्च , फूलगोभी एवं पत्तागोभी की नर्सरी डालें। यदि खेत में पानी रुकने की संभावना है तो फूलगोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च आदि की रोपाई मेड़ों पर करें।सब्जिओ की फसलों में फल छेदक / पत्ती छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहे हो तो इसके निंयत्रण हेतु नीम आयल की 1.5 मिली0/लीटर पानी में घोल बनाकर 3-4 छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर आसमान साफ होने पर करे।
पपीता	आम, अमरुद, आँवला, नीबू आदि के नए बागो में नष्ट हुए पौधो के स्थान पर नए पौधों की रोपाई करे। केले/पपीते के बागो की गुड़ाई-करके तने के चारो तरफ 25-३० सेंटीमीटर ऊंची मिटटी चढ़ा दे । केले/ पपीता के फलदार वृक्षों में लकड़ी या बॉस के स्टैण्ड लगायें। आम में पत्ती कटाने वाले कीट की रोकथाम हेतु २%कार्बरिल 1.5 % धूल का बुरकाव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को दिन के समय (सुबह 11 से शाम 4 बजे) सीधे धूप में न बांधें। उन्हें हवादार और छायादार शेड में रखें। पीने के पानी के कुंड को साफ रखें और दिन में कम से कम 3-4 बार ताजा व साफ पानी पिलाएं। यदि गलघोंटू (HS) या लंगड़िया बुखार (BQ) का टीका न लगा हो, तो टीकाकरण करवाएं। रात के समय पशुशाला में मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए नीम की पत्ती का धुआं करें। बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। ओआरएस (ORS), नींबू पानी या छाछ का सेवन करें ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न हो। घरों के आस-पास या छतों पर हाल की बारिश का पानी जमा न होने दें। सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें। धूप से अचानक आकर फ्रिज का ठंडा पानी पीने या सीधे एसी (AC) में बैठने से बचें। यह सर्दी-खांसी और फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण बनता है। रबी फसलों की तैयारी और खरीफ (जैसे धान) की कटाई व मड़ाई के लिए यह शुष्क सप्ताह बेहद उत्तम है। किसान भाई बिना बारिश के डर के अपनी फसलों को काटकर सुरक्षित सुखा सकते हैं।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों के रहने के स्थान पर प्रति दिन सफाई करे। मुर्गियों को स्वच्छ पानी तथा सन्तुलित आहार की व्यवस्था करें। अंडे के लिए नये चूजें द्वारा मुर्गियों को पालने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है परंतु ब्रायलर मुर्गियों के लिए यह समय उपयुक्त है। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। पानी का क्लोरीनेशन अवश्य करें।मुर्गियों के पेट में कीड़ों के मारने के लिए (डिवर्मिंग) की दवा दें। मुर्गीखाने को सूखा रखें तथा बिछावन को पलटते रहें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तापमान में अचानक गिरावट के कारण दिन का तापमान अचानक 5-6°C तक गिर सकता है। इस बदलाव से मौसमी सर्दी-खांसी और एलर्जी का खतरा बढ़ेगा, इसलिए हल्के गर्म या पूरे ढके कपड़े तैयार रखें। बारिश के दौरान निचले रास्तों और अंडरपास में जलभराव हो सकता है, यात्रा के समय स्थानीय रूट अपडेट देखकर ही निकलें। बारिश को देखते हुए पशुओं के बाड़े को सूखा रखें। फर्श पर गीलापन होने से पशुओं के पैरों में संक्रमण (खुरपका) का खतरा रहता है। बारिश से पहले ही सूखे चारे का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित स्थान पर रख लें। गीला या फफूंद लगा चारा खाने से पशुओं में पेट दर्द और आफरा (Gas) की गंभीर समस्या हो सकती है। दिन-रात के तापमान में 12-15°C के बड़े अंतर के कारण सुबह और देर रात को सर्दी लगने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की ठंडी हवा से बचाएं। गुनगुने पानी का सेवन करें और विटामिन-C युक्त फल खाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है, तो बारिश को देखते हुए कटाई को 1-2 दिन के लिए टालना बेहतर होगा। जो फसलें पहले ही काटी जा चुकी हैं और खेत में सूख रही हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

भारी बारिश और तूफान के दौरान, जैसे ही आपको गरज सुनाई दे या बिजली चमकती दिखे, किसी मजबूत और पक्की इमारत में शरण लें; पेड़ों, बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर या मोबाइल टावरों के नीचे खड़े होने से बचें। पानी से भरी सड़कों, नालों या अंडरपास को पार करने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि पानी का बहाव और गहराई जानलेवा हो सकती है। पानी से होने वाली बीमारियों (जैसे दस्त या हैजा) से बचने के लिए, केवल उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं।

Farmers are advised to download Unified ﷿Mausam﷿ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details