



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-06-2026

लखनऊ(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-06-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-06-26	2026-06-27	2026-06-28	2026-06-29	2026-06-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	42.0	42.0	42.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	30.0	30.0	30.0	30.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	61	63	65	63	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	36	39	43	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	9	12	13	20
पवन दिशा (डिग्री)	360	284	291	282	305
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	3	2	4
चेतावनी	लू	लू	लू	लू	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे, बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 38.0-42.0 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 29.0-30.0 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता की अधिकतम और न्यूनतम सीमा 61-65 और 36-45% के बीच है। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम है और हवा की गति 3.0-20.0 किमी प्रति घंटे के बीच है और हवा की गति सामान्य से 7-8 किमी प्रति घंटे अधिक होने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार, अगले पांच दिनों तक स्थानीय तेज़ हवाएँ और उमस भरी गर्मी जैसी स्थितियाँ बनी रहने की संभावना है। साथ ही लू चलने की भी चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

ज़ायद की परिपक्व फ़सलों की कटाई और मड़ाई कर दाने को संरक्षित करें तथा खरीफ़ मक्का की बुआई और धान की नर्सरी, तैयार पौध की रोपाई के लिए मौसम अनुकूल है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्का, उर्द /मूँग की परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई तथा खरीफ मक्का एवं सब्जियों की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। पशुओं को पेड़ के नीचे न बांधें। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें, छायेदार स्थान पर रखें, 3-4 बार पानी पिलायें। हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशकों का छिड़काव न करें। यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्का, उर्द /मूँग की परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई तथा खरीफ मक्का एवं सब्जियों की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	खरीफ मक्का की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी करने के पश्चात् उन्नतशील संस्तुति संकुल प्रजातियां- कंचन, गौरव, श्वेता, आजाद उत्तम एवं संकर प्रजातियां- ,एच एम एच -3904, पी एम एच -3, एन के -61, प्रकाश,वाई -1402, बायो-9681, प्रो -316 ,डी -9144, दिकाल्ब- 7074, पीएचबी- 8144, दक्कन 115, एम.एम.एच.-133 आदि में से एक किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था कर, मक्के की संकुल प्रजाति की बुवाई के लिए 20 -25 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर तथा शंकर प्रजाति 18 -20 किलोग्राम बीज / हेक्टेयर की दर से बुवाई वर्षा न होने की दशा में करें।
चावल	धान के पौध की रोपाई के लिए खेतों के मेड़ों को मजबूत करें। जिससे बरसात का पानी खेतों में रुका रहे। शीघ्र पकने वाली धान के प्रजातियों की नर्सरी डालें। यदि सामान्य खेतों में धान के पौध की रोपाई 20 से 25 दिन में तथा ऊसर भूमि में 25 से 30 दिन के पौध की रोपाई करें। धान की फसल में चौड़ी एवं संकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए रोपाई के २-३ दिन के अन्दर अनिलोफॉस 30 % ई.सी. या प्रिटलाक्लोर 1.25 लीटर/हे० की दर से 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर 2-3 इंच में पानी छिड़काव करें। नर्सरी में जिक की कमी के कारण होने वाले खैरा रोग जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है एवं बाद में कलरिंग रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, लक्षण दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 5 कि.ग्रा. जिक सल्फेट को 2 प्रतिशत यूरिया के घोल के साथ अथवा 2.5 कि.ग्रा. बुझे चूने को प्रति हे. लगभग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव वर्षा न होने की दशा में करें।
तिल	तिल की उन्नतशील किस्मों यथा गुजरात तिल-6, आर.टी.-346, आर.टी.-351, तरूण, प्रगति, शेखर टाइप-78, टाइप-13, टाइप-4 व टाइप-12, एम.टी.-2013-3 व .यू.ए.टी. तिल-1 की बुवाई करें।
मक्का	किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की परिपक्व भुट्टों की तुड़ाई करे तथा तोड़े गये भुट्टे से दाने को अलग करने के पश्चात् धूप में अच्छी तरह सुखा कर ही भण्डारित करे।
काला चना	उर्द/मूँग की परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई के लिए मौसम अनुकूल है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	खरीफ की सब्जियों के लिए नर्सरी तैयार करें या पौधे बोएँ। बैंगन, मिर्च और जल्दी तैयार होने वाली फूलगोभी की नर्सरी लगाने और भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, खीरा आदि की बुआई करने का यह सही समय है। ज़ायद मौसम में उगाई गई कद्दू, लौकी, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि की तैयार फ़सल की कटाई करें और उन्हें बाज़ार भेजें। सब्जी की फ़सलों में फल छेदक और पत्ती छेदक कीटों से बचाव के लिए, 1.5-2.0 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और 8-10 दिनों के अंतराल पर 3-4 बार छिड़काव करें। खड़ी सब्जी की फ़सलों में निराई-गुड़ाई करें और शाम के समय 8-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। कद्दू-वर्गीय फ़सलों में ग्रीन हॉपर और सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए 1.0 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 30.5% केमिकल का छिड़काव करें, और तना व फल छेदक कीटों को नियंत्रित करने के लिए 1.0 मिलीलीटर फ्लुबेंडियामाइड 39.35%

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	केमिकल को एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फल मक्खी से बचाव के लिए, प्रति हेक्टेयर 8-10 की दर से 'क्यू ल्योर फेरोमोन ट्रैप' लगाएँ।
आम	फलों के बाग लगाने के लिए मई में खोदे गए गड्डों को भरने के लिए, मिट्टी के ऊपरी आधे हिस्से में गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं और गड्डों को ज़मीन की सतह से 15 से 20 cm ऊपर तक भरें। आम और अमरूद को फलों की मक्खियों से बचाने के लिए, प्रति हेक्टेयर 8-10 ट्रैप (फंदे) लगाएं; इसके लिए मिथाइल यूजीनोल और क्यू ल्योर ट्रैप का इस्तेमाल करें और उन्हें 6 से 8 फीट की ऊंचाई पर शाखाओं से बांधें। एक लीटर पानी में 5% नीम का अर्क घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। ल्योर को 20-25 दिनों के अंतराल पर बदलें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	मौजूदा मौसम को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रात में जानवरों को खुली जगह पर बांधें। दिन के समय जानवरों को छायादार जगह पर बांधें। जानवरों को पेड़ के नीचे न बांधें क्योंकि तेज़ हवाओं के कारण इस हफ़्ते पेड़ों की टहनियाँ गिरने की संभावना ज़्यादा है। जानवरों को खुर-मुंह की बीमारी (FMD) से बचाने के लिए टीका लगवाएं और लंगडिया बुखार (BQ) से बचाव के लिए भी टीका लगवाएं। जानवरों को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। जानवरों को दिन में 3-4 बार साफ़ और ताज़ा पानी ज़रूर दें। गर्भवती जानवरों को ढलान वाली जगह पर न बांधें। जानवरों के पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवाएं देने का यह सबसे अच्छा समय है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु गर्मी हाउस में पर्दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए मुर्गी घर में लगे हुए जुट के पर्दों पर पानी के छींटे मारे जिससे ठंडक बनी रहे।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार, अगले पांच दिनों तक स्थानीय तेज़ हवाएँ और उमस भरी गर्मी जैसी स्थितियाँ बनी रहने की संभावना है। साथ ही लू चलने की भी चेतावनी दी गई है।
--

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

ज़ायद की परिपक्व फ़सलों की कटाई और मड़ाई कर दाने को संरक्षित करें तथा खरीफ़ मक्का की बुआई और धान की नर्सरी, तैयार पौध की रोपाई के लिए मौसम अनुकूल है।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>