ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-03-2026

कानपुर-देहात(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-18	2026-03-19	2026-03-20	2026-03-21	2026-03-22
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	34.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	19.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	66	76	96	94
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	48	57	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	6	6	5	5
पवन दिशा (डिग्री)	113	54	68	297	348
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	4	5	5	3
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पाँच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण, 21 मार्च, 2026 को स्थानीय स्तर पर तेज़ हवाओं, गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30.0-35.0°C के बीच रहेगा, जो सामान्य से 2-3°C अधिक होने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 18.0-20.0°C के बीच रहेगा, जो सामान्य से 3-4°C अधिक होने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्रमशः 66-96% और 45-60% के बीच रहेगी। हवा की दिशा दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम से होगी, और हवा की गति 5.0-6.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, जो सामान्य से 1-2 किमी/घंटा अधिक होने की उम्मीद है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 21 मार्च, 2026 के बीच हल्की बारिश, गरज के साथ तूफान, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम की स्थिति को देखते हुए भिंडी, तरोई, कद्दू लौकी, खीरा, ककड़ी और ग्रीष्मकालीन मक्का, उर्द, मूँग की बुवाई एवं सरसों और आलू जैसी परिपक्व फसलों की कटाई /खुदाई कर फसल को सुरछित स्थान रखें।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी फसलों एवं सब्जिओं में आवश्कतानुसार हल्की सिंचाई करें साथ ही जायद मक्का, उर्द , मूंग/ ग्रीष्म कालीन सब्जियों की बुवाई एवं सरसों और आलू जैसी परिपक्व फसलों की कटाई / खुदाई कर फसल को सुरछित स्थान रखें। प्याज में थ्रिप्स कीट एवं बैंगनी धब्बा रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमित रूप से फसलों पर निगरानी रखने की सलाह दी जाती है। कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों के लिए, केवल साफ पानी से उपकरणों को धोने के लिए अलग या उपयोग करें और हवा की विपरीत दिशा में खड़े कीटनाशकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों को स्प्रे या स्प्रे न करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रीष्म कालीन फसलों/सब्जियों की बुवाई/सिंचाई का स्थगित रखें एवं सरसों, आलू आदि परिपक्व फसलों की कटाई/खुदाई कर फसल को सुरछित स्थान पर संरछित करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल दुग्धावस्था / दाना भरने की अवस्था में चल रही है, जो नमी की कमी के प्रति संवेदन शील है अतः किसान भाई आवश्यक्तानुसार हल्की सिचाई कर उचित नमी बनाये रखे। गेहू की फसल में चूहों का प्रकोप दिखाई देने पर जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की टिकिया का प्रयोग करें। चूहों की रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें।
सरसों	बारिश की संभावना को देखते हुए, खेतों में खड़ी पकी हुई फसलों की कटाई और थ्रेसिंग कर लें और अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। सरसो की फलियाँ 85 % सुनहरे रंग की हो जाने पर फसल की कटाई करें। सरसो के फसल की कटाई के बाद फसल को धुप में सूखाकर मड़ाई करने के पश्यात बीज को अलग कर लें।
फील्ड पी	बारिश की संभावना को देखते हुए, खेतों में खड़ी पकी हुई फसलों की कटाई और थ्रेसिंग कर लें और अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। समय से बोई गई मटर की परिपक्व फसलो की कटाई/मड़ाई का कार्य करे। मटर की फसल में फली छेदक कीटों का प्रकोप होने की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी @ 2 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 180- 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
चना	बारिश की संभावना को देखते हुए, खेतों में खड़ी पकी हुई फसलों की कटाई और थ्रेसिंग कर लें और अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। समय से बोई गई चने की परिपक्व फसलो की कटाई/मड़ाई का कार्य करे। चने की फसल में फली छेदक कीटों का प्रकोप होने की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी @ 2 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 180- 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
मक्का	समय पर बोई गई मक्का की फसल में, पहली सिंचाई बुवाई के 20-25 दिन बाद करनी चाहिए और पत्तियां निकलने पर निराई करनी चाहिए। गोभी छेदक कीट के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए, ऑक्सीडेमेटोन-मिथाइल 25 ईसी या क्लोरेंट्रानिलिप्रोले को 500-700 लीटर पानी में घोलकर 375 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
काला चना	समय पर बोई गई उड़द की फसल में, पहली सिंचाई बुवाई के 30-35 दिन बाद करनी चाहिए और पत्तियां निकलने पर निराई करनी चाहिए। यदि उड़द की फसल में हरे हॉपर/थ्रिप्ट कीट का प्रकोप दिखाई दे, तो 500-700 लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की संस्तुत प्रजातियॉ-नरेन्द्र मूँग-1, मालवीय जाग्रंति, सम्राट, मूँग जनप्रिया, मेहा, एच0यू0एम-16, मालवीय ज्योति, टी0एम0वी0-37, मालवीय जन चेतना, आई0पी0एम0- 2-3, आई0पी0एम0- 2-14, कनिका, आज़ाद मूँग -1 हीरा, सूर्या, इत्यादि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था कर, बुवाई का कार्य करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	यदि प्याज की फसल में बैंगनी धब्बे का रोग दिखाई दे, तो इसके नियंत्रण के लिए 0.25% मैनकोजेब का घोल (0.25 ग्राम/लीटर पानी) तैयार करें और इसे 15-20 दिनों के अंतराल पर 3-4 बार छिड़काव करें। भिंडी, तोरी, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू आदि जैसी ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों की बुवाई शीघ्र पूरी करें। कद्दू श्रेणी की सब्जियों में लाल कद्दू कीट के प्रकोप की स्थिति में, सुबह के समय पौधों के तने के

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	आसपास की मिट्टी में 5% मैलाथियन पाउडर का छिड़काव करें और पौधों पर भी छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि जैसी ग्रीष्म ऋतु की फसलों की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और तैयार पौधों की रोपाई भी करें।
आम	आम के बागों में सिंचाई करके उचित नमी बनाए रखें। आम के फूलों में मक्खी कीटों का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए, एक लीटर पानी में 1.0 मिलीलीटर फेनिट्रोथियन घोलकर छिड़काव करें। आम के बागों में लार्वा और लस्सी कीटों का प्रकोप भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए, एक लीटर पानी में 2.0 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफोस 20 ईसी या 3.0 मिलीलीटर फेनिट्रोथियन 50 ईसी घोलकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओं को चारा खिलाने के बाद, 750 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सूखा अदरक, 50 ग्राम जीरा और 500 ग्राम गुड़ का मिश्रण बनाकर तीन दिनों तक सुबह और शाम को दें। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में अनाज के साथ-साथ हरा और सूखा चारा भी दें। पशुओं को दिन में 3-4 बार ताजा पानी जरूर दें। पशुओं को स्वच्छ स्थान पर रखें। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग से बचाव के लिए उन्हें एफएमडी का टीका लगाएं और बीक्यू का टीका लगाएं।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों के आहार में विटामिन और ऊर्जावर्धक पोषक तत्व मिलाएं, साथ ही कैल्शियम युक्त आहार भी दें। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए, एक सप्ताह के चूजों को एफ-1 वैक्सीन और चार सप्ताह के चूजों को आर-2 वैक्सीन लगाएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 21 मार्च, 2026 के बीच हल्की बारिश, गरज के साथ तूफान, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम की स्थिति को देखते हुए भिंडी, तरोई, कद्दू लौकी, खीरा, ककड़ी और ग्रीष्मकालीन मक्का, उर्द, मूँग की बुवाई एवं सरसों और आलू जैसी परिपक्व फसलों की कटाई /खुदाई कर फसल को सुरक्षित स्थान रखें।

Farmers are advised to download Unified ﾟMausamﾟ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details