



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

हरदोई(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	8.0	12.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	36.0	35.0	31.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	27.0	28.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	94	85	88	95	94
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	55	61	76	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	13	3	6	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	81	21	245	193	285
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	7	8	7
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें दिन गरज-चमक, बिजली कड़कने, तेज़ हवाओं और आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि बाकी दिनों में बारिश नहीं होगी और आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31.0-36.0°C के बीच रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक हो सकता है; वहीं न्यूनतम तापमान 26.0-28.0°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता (humidity) का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 85-94% और 55-76% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम रहेगी और हवा की गति 3.0-13.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, जिसमें हवा के झोंकों की गति सामान्य से 4-5 किमी/घंटा अधिक हो सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मिली मौसम की जानकारी के अनुसार, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन आंधी-तूफान, तेज़ हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

बुवाई एवं अन्य कृषि कार्य वर्षा न होने एवं आसमान साफ होने पर करें। उर्वरक एवं कीटनाशी, रोगनाशी का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। जिससे पेड़ के टहनियों के गिरने व बिजली के खम्भों में करन्ट उतरने से पशुओं की मृत्यु हो सकती है।

सामान्य सलाहकार:

धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनायें। जिससे बरसात का पानी खेतों में रुका रहे। उर्द एवं मूँग आदि फसलों की बुवाई, कीटनाशी, रोगनाशी, उर्वरक एवं सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को बरसात के रुके हुए पानी को न पीने दें। पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। बरसात के मौसम में पशुओं में किलनी/जू के संक्रमण की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके बचाव हेतु पशु बाड़े में चूने का छिड़काव करें ताकि किलनी/जू के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाय। बरसात के मौसम में रात के समय घर से बाहर निकलने पर टार्च लेकर जाय तथा सर्प, बिच्छू आदि से बचने के लिए घर की दीवारों व छिद्रों को बंद कर दें और हल्का सा कैरोसिन या फिनाइल का छिड़काव कर दें जिसकी गंध से सांप चले जाते हैं।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्षा के दौरान पेड़, टेलीफोन व बिजली के खम्भों के नीचे कदापि शरण न लें। ऐसी स्थिति में खम्भों में करंट उतरने एवं बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की फसल में चौड़ी एवं संकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए बिसपाइरीबैक सोडियम 10%एस.सी. 0.20 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 15-20 दिन बाद उचित नमी पर 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। धान में खैरा रोग दिखाई दे तो इसके नियंत्रण हेतु 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम चूना 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की टॉपड्रेसिंग करें। ध्यान रहे कि टॉप ड्रेसिंग से पूर्व खरपतवार निकाल दें तथा टॉपड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी न हो। धान की फसल में जड़ की सुड़ी कीट का प्रकोप दिखाई देने पर कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार रसायन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तीन से चार सेंटीमीटर स्थिर पानी में बुरकाव करें।
मक्का	मक्के की फसल में यूरिया की दूसरी टॉपड्रेसिंग नरमंजरी निकलते समय 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वर्षा न होने की दशा में करें। मक्के की फसल में तना बेधक /प्ररोह मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम पर करें।
तिल	तिल के फसल में दूसरी निराई-गुड़ाई बुवाई के 35-40 दिन बाद का कार्य वर्षा न होने की दशा में करें। तिल की फसल में पत्ती व फल की सूण्डी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर या क्यूनालफास 25% ई सी 1. 25 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम पर करें।
मूँगफली	वर्षा न होने की दशा में मूँगफली के फसलों में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई करने के पश्चात 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से डालने के बाद हल्की गुड़ाई कर पौधों पर मिट्टी चढ़ाये। मूँगफली की फसल में सफेद गिडार/ दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु फिप्रोनिल 0.3 % जी.आर. 20 किलोग्राम/हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें।
काला चना	उर्द की फसल में खरपतवार के नियंत्रण हेतु इमैजाथापर १० एस.एल. १.० लीटर /हेक्टेयर की दर से बुवाई के 15-20 दिन बाद 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
मूँग	मूँग की फसल में खरपतवार के नियंत्रण हेतु इमैजाथापर १० एस.एल. १.० लीटर /हेक्टेयर की दर से बुवाई के १५-२० दिन बाद ५००-६०० लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। खरीफ में बोई जाने वाली मूँग की संस्तुति जातियाँ- नरेन्द्र मूँग -1, पन्त मूँग -1, पन्त मूँग -3, पन्त मूँग -4 , सम्राट, मालवीय जनचेतना,मालवीय जनप्रिया , मालवीय जागृति श्वेता, स्वाति, विराट एवं आई पी एम -2 -14 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 12 -15 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर की दर से बुवाई का कार्य वर्षा न होने की दशा में शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें।
गन्ना	यदि गन्ने की लंबाई पांच फुट हो गई हो तो ढाई फुट की ऊँचाई पर प्रथम बँधाई करें। प्रथम बँधाई हेतु गन्ने को लाइनों में एक लाइन के दो झुण्डों को एक साथ नीचे की सूखी पत्तियों से बँधाई करें। लालसड़न रोग से प्रभावित पौधों को जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा थायोफिनेट मिथाइल 0.2 प्रतिशत के घोल से पौधों पर छिड़काव करें। गन्ने में माइट कीट का प्रकोप देखा जा रहा है जिसके नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफॉस 40 प्रतिशत + साइपर 4 प्रतिशत की 750 मि.ली. कीटनाशक को 600 ली. पानी में घोल बनाकर प्रति हे. की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	वर्षा की संभावना को देखते हुए सब्जियों की खड़ी फसल में सिचाई/बुवाई का कार्य स्थगित रखें। खरीफ में रोपी जाने वाली सब्जियों जैसे-पत्ता गोभी, गाठ गोभी, ब्रोकली आदि फसलों की नर्सरी डाले, साथ ही अगेती फूलगोभी, बैंगन, मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करें। यदि खेत में पानी रुकने की संभावना है तो अगेती फूलगोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि की रोपाई मेडों पर करें।सब्जियों की फसलों में फल छेदक / पत्ती छेदक कीट की रोकथाम हेतु नीम आयल 1.5-2.0 मिली०/लीटर पानी में घोल बनाकर 3 -4 छिड़काव 8 -10 दिन के अन्तराल पर करें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई - गुड़ाई का कार्य आसमान साफ होने पर करें।
आम	आम, अमरुद, आँवला, नीबू आदि के पहले से भरे गए गड़दों में नए पौधों की रोपाई का कार्य करें। नए बागों में नष्ट हुए पौधों के स्थान पर नए पौधों की रोपाई करें। केले/पपीते के बागों की गुड़ाई-करके तने के चारों तरफ 25-३० सेंटीमीटर ऊंची मिटटी चढ़ा दें स्टैंडिंग करें। आम में पत्ती कटाने वाले कीट की रोकथाम हेतु २%कार्बरिल 1.5 % धूल का बुरकाव आसमान साफ होने पर करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बरसात के मौसम में पशुओं में किलनी/जूं के संक्रमण की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके बचाव हेतु पशु बाड़े में चूने का छिड़काव करें ताकि किलनी/जूं के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाय। पशुओं को वर्षा के दौरान खुले स्थान/पेड़ के नीचे न बांधें। पशुओं को रात के समय आसमान साफ होने पर ही खुले में बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधें। पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3 -4 बार अवश्य पिलायें। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं०-1962 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	वर्तमान मौसम में मुर्गियों को नमी एवं जलभराव से बचाकर रखें। पोल्ट्री शेड में उचित वेंटिलेशन बनाए रखें। स्वच्छ पेयजल एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराएँ। शेड के आसपास मच्छरों एवं मक्खियों की

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
	रोकथाम के लिए साफ-सफाई बनाए रखें और सभी मुर्गीयों का समयानुसार टीकाकरण सुनिश्चित करें। बीमार अथवा सुस्त दिखाई देने वाली मुर्गीयों को तुरंत अलग रखें तथा आवश्यक होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

निचले क्षेत्रों में जलभराव से दैनिक कार्य एवं स्थानीय आवागमन का प्रभावित होना। दृश्यता कम होने एवं सड़कों पर फिसलन बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना। गरज-चमक, वज्रपात एवं तेज हवाओं से जनहानि, चोट तथा संपत्ति की क्षति। पेड़ों, शाखाओं, होर्डिंग्स एवं बिजली के खंभों के गिरने से जान-माल का नुकसान, बिजली, संचार एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न होना, स्थानीय स्तर पर बाढ़ या जलभराव से आवासीय क्षेत्रों, बाजारों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रभाव, अधिक नमी एवं जलभराव के कारण जलजनित एवं मच्छरजनित रोगों का खतरा बढ़ना। फसलों, बागवानी फसलों, पशु आश्रयों एवं कृषि अवसंरचना को नुकसान। व्यापारिक कार्यों, निर्माण कार्यों एवं बाहरी श्रमिकों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

जारी किए गए मौसम पूर्वानुमानों और चेतावनियों पर नियमित रूप से ध्यान दें। गरज-चमक एवं वज्रपात के समय खुले मैदानों, ऊँचे पेड़ों, बिजली के खंभों तथा जलाशयों के पास जाने से बचें। आवश्यक होने पर ही यात्रा करें तथा जलभराव वाले मार्गों और पुल-पुलियों को पार करने से बचें। तेज हवाओं के दौरान कमजोर संरचनाओं, होर्डिंग्स एवं पेड़ों के नीचे खड़े न हों। घरों की छतों, खिड़कियों एवं जल निकासी व्यवस्था की जांच कर उन्हें सुरक्षित रखें। विद्युत उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में टॉर्च एवं आवश्यक सामग्री तैयार रखें। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों की विशेष देखभाल करें। जलजनित रोगों से बचाव हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें तथा उनके लिए पर्याप्त चारा एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>