

# DM Calcul Numérique

BOUTON Nicolas

November 2, 2020

## Exercice 1

1. Utilisons l'interpolation lagrangienne.

On a :

$$f(t) \approx p(t)$$

On veut maintenant approcher l'intégrale de  $f$ , on va donc utiliser l'intégrale du polynôme de Lagrange :

$$\int_a^b f(t)dt \approx \int_a^b p(t)dt$$

Et on a :

$$\int_a^b p(t)dt = \sum_{i=1}^n f(t_i)w_i$$

Avec  $n$  le nombre de point et  $w_i$  :

$$w_i = \int_a^b L_i(t)dt$$

Essayons donc de calculer les polynôme de Lagrange associés aux points :  $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$ .

Point  $x = 0$  :

$$\begin{aligned}
L_0 &= \frac{(x - \frac{1}{3})(x - \frac{2}{3})(x - 1)}{(0 - \frac{1}{3})(0 - \frac{2}{3})(0 - 1)} \\
&= \frac{(x^2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}x + \frac{2}{6})(x - 1)}{(-\frac{2}{9})} \\
&= \frac{(x^3 - x^2 + \frac{2}{6}x) - (x^2 - x + \frac{2}{6})}{(-\frac{2}{9})} \\
&= \frac{(x^3 - 2x^2 + \frac{8}{6}x - \frac{2}{6})}{(-\frac{2}{9})} \\
&= -\frac{9(x^3 - 2x^2 + \frac{8}{6}x - \frac{2}{6})}{2}
\end{aligned}$$

Point  $x = \frac{1}{3}$  :

$$\begin{aligned}
L_1 &= \frac{(x - 0)(x - \frac{2}{3})(x - 1)}{(\frac{1}{3} - 0)(\frac{1}{3} - \frac{2}{3})(\frac{1}{3} - 1)} \\
&= \frac{(x^2 - \frac{2}{3}x)(x - 1)}{(\frac{1}{3})(-\frac{1}{3})(-\frac{2}{3})} \\
&= \frac{(x^3 - \frac{2}{3}x^2) - (x^2 - \frac{2}{3}x)}{(\frac{2}{27})} \\
&= \frac{(x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{2}{3}x)}{(\frac{2}{27})} \\
&= \frac{27(x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{2}{3}x)}{2}
\end{aligned}$$

Point  $x = \frac{2}{3}$  :

$$\begin{aligned}
L_2 &= \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{3})(x - 1)}{(\frac{2}{3} - 0)(\frac{2}{3} - \frac{1}{3})(\frac{2}{3} - 1)} \\
&= \frac{(x^2 - \frac{1}{3}x)(x - 1)}{(\frac{2}{3})(\frac{1}{3})(-\frac{1}{3})} \\
&= \frac{(x^3 - \frac{1}{3}x^2) - (x^2 - \frac{1}{3}x)}{-\frac{2}{27}} \\
&= \frac{(x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x)}{-\frac{2}{27}} \\
&= -\frac{27(x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x)}{2}
\end{aligned}$$

Point  $x = 1$  :

$$\begin{aligned}
 L_3 &= \frac{(x-0)(x-\frac{1}{3})(x-\frac{2}{3})}{(1-0)(1-\frac{1}{3})(1-\frac{2}{3})} \\
 &= \frac{(x^2 - \frac{1}{3}x)(x - \frac{2}{3})}{(\frac{2}{3})(\frac{1}{3})} \\
 &= \frac{(x^3 - \frac{1}{3}x^2) - (\frac{2}{3}x^2 - \frac{2}{3}\frac{1}{3}x)}{(\frac{2}{9})} \\
 &= \frac{(x^3 - x^2 + \frac{2}{9}x)}{(\frac{2}{9})} \\
 &= \frac{9(x^3 - x^2 + \frac{2}{9}x)}{2}
 \end{aligned}$$

Calculons maintenant leurs intégrale :

Point  $x = 0$  :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 L_0(t) dt &= \int_0^1 -\frac{9(t^3 - 2t^2 + \frac{8}{6}t - \frac{2}{6})}{2} dt \\
 &= -\frac{9}{2} \int_0^1 \left( t^3 - 2t^2 + \frac{8}{6}t - \frac{2}{6} \right) dt \\
 &= -\frac{9}{2} \left[ \frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3 + \frac{8}{12}t^2 - \frac{2}{6}t \right]_0^1 \\
 &= -\frac{9}{2} \left( \frac{1}{4} * 1^4 - \frac{2}{3} * 1^3 + \frac{8}{12} * 1^2 - \frac{2}{6} * 1 \right) \\
 &= -\frac{9}{2} \left( \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{8}{12} - \frac{2}{6} \right) \\
 &= -\frac{9}{2} \left( \frac{3}{12} - \frac{8}{12} + \frac{8}{12} - \frac{4}{12} \right) \\
 &= -\frac{9}{2} \left( -\frac{1}{12} \right) \\
 &= \frac{9}{24} \\
 &= \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$

Point  $x = \frac{1}{3}$  :

$$\begin{aligned}\int_0^1 L_1(t)dt &= \int_0^1 \frac{27(t^3 - \frac{5}{3}t^2 + \frac{2}{3}t)}{2} dt \\&= \frac{27}{2} \int_0^1 \left( t^3 - \frac{5}{3}t^2 + \frac{2}{3}t \right) dt \\&= \frac{27}{2} \left[ \left( \frac{1}{4}t^4 - \frac{5}{9}t^3 + \frac{2}{6}t^2 \right) \right]_0^1 \\&= \frac{27}{2} \left( \frac{1}{4} - \frac{5}{9} + \frac{2}{6} \right) \\&= \frac{27}{2} \left( \frac{9}{36} - \frac{20}{36} + \frac{12}{36} \right) \\&= \frac{27}{2} \left( \frac{1}{36} \right) \\&= \frac{27}{72} \\&= \frac{3}{7}\end{aligned}$$

Point  $x = \frac{2}{3}$  :

$$\begin{aligned}\int_0^1 L_2(t)dt &= \int_0^1 -\frac{27(t^3 - \frac{4}{3}t^2 + \frac{1}{3}t)}{2} dt \\&= -\frac{27}{2} \int_0^1 \left( t^3 - \frac{4}{3}t^2 + \frac{1}{3}t \right) dt \\&= -\frac{27}{2} \left[ \frac{1}{4}t^4 - \frac{4}{9}t^3 + \frac{1}{6}t^2 \right]_0^1 \\&= -\frac{27}{2} \left( \frac{1}{4} - \frac{4}{9} + \frac{1}{6} \right) \\&= -\frac{27}{2} \left( \frac{9}{36} - \frac{16}{36} + \frac{6}{36} \right) \\&= -\frac{27}{2} \left( -\frac{1}{36} \right) \\&= \frac{27}{72} \\&= \frac{3}{7}\end{aligned}$$

Point  $x = 1$  :

$$\begin{aligned}\int_0^1 L_3(t)dt &= \int_0^1 \frac{9(t^3 - t^2 + \frac{2}{9}t)}{2} dt \\&= \frac{9}{2} \int_0^1 \left( t^3 - t^2 + \frac{2}{9}t \right) dt \\&= \frac{9}{2} \left[ \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{18}t^2 \right]_0^1 \\&= \frac{9}{2} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{2}{18} \right) \\&= \frac{9}{2} \left( \frac{9}{36} - \frac{12}{36} + \frac{4}{36} \right) \\&= \frac{9}{2} \left( \frac{1}{36} \right) \\&= \frac{1}{7}\end{aligned}$$

Résultat :

$$w_0 = \frac{3}{8}, w_1 = \frac{3}{7}, w_2 = \frac{3}{7}, w_3 = \frac{1}{7}$$

2. A faire
3. A faire
4. A faire
5. A faire

## Exercice 2

1. (a)  
(b)  
(c)
- 2.

## Exercice 3