SOMMAIRE 1

Composition, Examens et Auto-évaluation

EPREUVE D'ANATOMIE DE L'APPAREILLE DIGESTIF……..3
EPREUVE D'ANATOMIE CELLULE ET TISSUS……..5
EPREUVE D'ANATOMIE-APPAREIL LOCOMOTEUR……..8
EPREUVE D'ANATOMIE CARDIOVASCULAIRE……..11
EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE……..14
EPREUVE DE PEDIATRIE……..16
EPREUVE D'ETUDE DU MILIEU……..21
EPREUVE DE SEMIOLOGIE MEDICALE……..24
EPREUVE DE DIETETIQUE……..27
EPREUVE DE MALADIE INFECTUEUSE……..33
EPREUVE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT……..39
EPREUVE D'INFECTION A VIH ET IST…….. 42
EPREUVE DE SONU……..48
EPREUVE DE NUTRITION……..51
EPREUVE D'EPIDEMIOLOGIE……..55
EPREUVE DE PARASITOLOGIE……..57
EPREUVE DE IECC / CCC……..59
EPREUVE D'UROLOGIE……..61
EPREUVE DE GYNECOLOGIE……..68
EPREUVE D'IMMUNOLOGIE ……..70
EPREUVE DE THEORIE ET CONCEPT……..75
EPREUVE DE RECHERCHE……..79
EPREUVE SYSTHEME NATIONAL DE SANTE……..83
EPREUVE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES ……..86
EPREUVE DE PATHOLOGIE RESPIRATOIRE……..90
EPREUVE DE DEMARCHE DE SOINS SCIENTIFIQUES……..93
EPREUVE D'HEMATOLOGIE……..95
EPREUVE DE TECHNIQUE DE SOINS INFIRMIERS……..99
EPREUVE DE SOINS AUX ENFANTS……..101
EPREUVE DE BIOCHIMIE……..104
EPREUVE DE BA CTERIOLOGIE VIROLOGIE……..106
EPREUVE DE PEV……..108

SOMMAIRE 2

Sujet des examens de fin de semestre 1 et 2 année 2021-2022

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES CELLULES ET TISSUS……..114
EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE……..116
EPREUVE D'ANATOMIE OBSTETRICALE……118
EPREUVE DE SEMIOLOGIE ET PATHOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATROIRE……120
EPREUVE DE SYSTEME NATIONAL DE SANTE / PEV……123
EPREUVE DE SEMIOLOGIE MEDICALE……125
EPREUVE DE SEMIOLOGIE ET PATHOLOGIE CHIRUGICALES……127
EPREUVE DE SONU……129
EPREUVE DE TECHNIQUES DE SOINS DE BASE……131
EPREUVE DE PEDIATRIE BLOC A……133
EPREUVE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DU MILIEU……136

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE OBSTRETICALE……139
EPREUVE DE MALADIES INFECTUSES ET TROPICALES……141
EPREUVE DE TECHNIQUES DE SOINS DE BASE……143
EPREUVE D'ANATOMIE DE L'APPAREIL URINAIRE ET DE LA REPRODUTION……145
EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRES……147
EPREUVE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES……149

COACHING

EPREUVE D'ANATOMIE DE L'APPAREILLE DIGESTIF

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle fausse

1- L'intestin grêle est vascularisé par une seule artère : l'artère mésentérique inférieure **A**☐ **B** ☐
2- Le côlon est composé de cinq segments **A**☐ **B** ☐
3- Le rectum mesure 15 centimètres et non 18 centimètres **A**☐ **B** ☐
4- Le canal anal mesure 5 centimètres chez le cadavre **A** ☐ **B** ☐
5- La bille est sécrétée par les hépatocytes **A**☐ **B**☐
6- L'insuline est sécrétée par les cellules acineuses du pancréas **A**☐ **B** ☐
7- Le plexus solaire fait partie de l'innervation sensitive du pancréas **A**☐ **B** ☐
8- L'estomac est dans le cadran épigastrique de l'abdomen **A**☐ **B** ☐
9- L'artère buccale vascularisée la cavité buccale ; il provient donc de l'artère carotide externe **A** ☐ **B** ☐
10- Le cæcum et l'appendice sont dans le même cadran de l'abdomen **A** ☐ **B**☐
11- Une veine draine tout le tube digestif intra abdominal : la veine porte **A** ☐ **B** ☐
12- L'appareil digestif est l'ensemble des organes assurant la dégradation et la transformation des aliments ingérés et élimination des résidus alimentaires de l'organisme **A** ☐ **B**☐
13- L'appareil digestif est constitué du tube digestif et des glandes hypophysaires **A** ☐ **B** ☐
14- L'appareil digestif assure deux types d'actions : motrice et chimique **A**☐ **B**☐
15- Les veines de la cavité buccale se drainent dans la veine jugulaire externe **A** ☐ **B** ☐
16- Le pharynx est le siège de la déglutition des aliments **A** ☐ **B**☐
17- L'œsophage mesure 25 centimètres de long **A** ☐ **B** ☐
18- L'œsophage est drainé par un système veineux Porto-cave **A**☐ **B** ☐
19- L'estomac est une glande de l'appareil digestif **A** ☐ **B**☐
20- L'estomac à deux orifices : le cardia et l'antre **A** ☐ **B** ☐
21- L'œsophage est un conduit musculo-membraneux et contractile du tube digestif, long de vingt un centimètres, qui relie le pharynx à l'estomac **A**☐ **B** ☐
22- L'estomac est innervé par le nerf vague **A** ☐ **B** ☐
23- Le côlon est divisé en 2 à cause de sa vascularisation, artérielle **A** ☐ **B** ☐
24- Chez le vivant l'intestin grêle mesure 3 mètres et non 5 mètres **A**☐ **B** ☐
25- La vésicule biliaire fait partie de la voie biliaire principale **A** ☐ **B**☐
26- Il existe un système d'anastomose veineuse port-cave au milieu de l'œsophage et non du canal anal **A**☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

27- ***Les portions du rectum sont*** **:**
A. Haut rectum ☐ B. Ampoule rectale ☐ C. Bas rectal ☐ D. Canal anal ☐

28-*Parmis les fonctions suivantes, deux sont assurées par l'anus ; lesquelles ?*
A. Stockage des selle ☐ C. Évacuation contrôlée des selles ☐
B. Continence des selles ☐ D. Évacuation contrôlée de la bile ☐

29-*Parmis les segments du foie, lequel est aussi appelé le lobe caudé ?*
A. Segment I ☐ C. Segment III ☐
B. Segment II ☐ D. Segment IV ☐

30- ***La voie biliaire principale est constituée de*** **:**
A. Canaux hépatiques droit et gauche ☐ C. Canal Cholédoque ☐
B. Canal gastrique ☐ D. Vésicule biliaire ☐

31-*Le foie a une fonction de* **:**
A. Stockage d'enzymes salivaire ☐ C. Métabolisme des protéines ☐
B. Métabolisme d'enzymes salivaires ☐ D. Protection par la détoxication ☐

32- ***Laquelle des portions suivantes ne fait pas partie du pancréas ?***
A. La tête ☐ B. Antre ☐ C. Corps ☐ D. Queue ☐

33- ***Lesquelles des cellules suivantes appartiennent au pancréas ?***

A- Cellule des îlots de Langerhans ☐ C - Cellules mucineuses ☐

B- Cellules des villosités ☐ D- Cellules centro-acineuses ☐

34-*La paroi abdominale antérieure est subdivisée en* :

A- Douze cadrans ☐ C- Trois cadrans ☐

B- Six cadrans ☐ D- Neuf cadrans ☐

35-*La paroi ventro-intérale est constituée des muscles suivants, sauf un : lequel ?*

A- Muscle psoas ☐ C- Muscle oblique ☐

B- Muscle droit ☐ D- Muscle transverse ☐

36-*Dans les organes suivants, il existe un système veineux porto-cave : lequel ?*

A- Glandes salivaires ☐ C- Foie ☐

B- Pancréas ☐ D- Anus ☐

37-*Les nerfs du pharynx sont* :

A- Nerf trijumeau (VI) ☐ C- Nerf glosso-pharyngien (IX) ☐

B- Nerf pneumogastrique (X) ☐ D- Nerf olfactif (I) ☐

38-*Les fonctions des glandes salivaires sont :*

A- Ingérer la nourriture ☐

B- Mastiquer la nourriture ☐

C- Amorcer la digestion des glucides et de graisses ☐

D- Nettoyer la cavité buccale ☐

39-***L'œsophage assure :***

A- Le transport du bol alimentaire à l'estomac par son péristaltisme ☐

B- Le stockage du bol alimentaire ☐

C- La transformation du bol alimentaire en chyme ☐

D- Le système anti-reflux alimentaire ☐

40-*La paroi œsophagienne est composée des tuniques suivantes, sauf une ; laquelle ?*

A- Muqueuse ☐ C- Sous-muqueuse ☐

B- Adventice ☐ D- Séreuse ☐

41-*Les fonctions de l'estomac sont :*

A- Réservoir des aliments ☐ C- Digestion du bol alimentaire ☐

B- Broyage et malaxage des aliments ☐ D- Absorption du bol alimentaire ☐

42-*Le suc gastrique est composée des éléments suivants, sauf deux : lesquels ?*

A- Bile ☐ B- Endorphine ☐ C- Gastrine ☐ D- Acide chlorhydrique ☐

43-*Lequel des éléments suivants n'est pas un segment de l'intestin grêle ?*

A- Duodénum ☐ B- Titanium ☐ C- Iléon ☐

44. ***Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont assurées par l'intestin grêle ?***

A. Brassage du chyme et des enzymes ☐ C. Absorption des nutriments ☐

B. Stockage du chyme et des enzymes ☐ D. Absorption du bol alimentaire ☐

45. ***L'une des artères suivantes ne vascularise pas le côlon ; laquelle ?***

A. Artère mésentérique supérieure ☐ C. Absorption des nutriments ☐

B. Artère du sigmoïde ☐ D. Absorption du bol alimentaire ☐

46. ***Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont assurées par le côlon ?***

A. Fonction motrice par le brassage de chyle. ☐

B. Fonction motrice par le péristaltisme du bol alimentaire. ☐

C. Fo nction de formation du bol alimentaire ☐

D. Fonction de formation du bol fécal ☐

EPREUVE D'ANATOMIE CELLULES ET TISSU

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les séreuses tapissent les cavités et les muqueuses enveloppent certains organes **A** ☐ **B** ☐
2-Le métabolisme cellulaire est constitué de l'anabolisme et du catabolisme **A**☐ **B** ☐
3. Un épithélium stratifié est composé au minimum de trois couches de cellules **A** ☐ **B** ☐
4. Une glande tubuleuse est une glande exocrine **A** ☐ **B** ☐
5. Les glandes sébacées sont des canaux excréteurs **A** ☐ **B** ☐
6. Les cellules anaérobies et aérobies consomment toutes de l'oxygène **A**☐ **B** ☐
7. Une cellule peut vivre indéfiniment **A** ☐ **B** ☐
8. La consommation d'oxygène est réservée aux cellules aérobies **A** ☐ **B** ☐
9. Une cellule nerveuse longue d'un mètre peut être étudiée à l'œil nu **A** ☐ **B** ☐
10. Les cellules cubiques sont des épithéliums simples. **A** ☐ **B** ☐
11. Dans la sécrétion glandulaire, les cellules pancréatiques ont une activité unique pendant que les cellules hépatiques en ont deux **A** ☐ **B** ☐
12. Les 46 chromosomes d'une cellule humaine sont réduits à 23 paires de chromosomes par la méiose Équationnelle **A** ☐ **B** ☐
13. Les séreuses tapissent les cavités et les muqueuses enveloppent certains organes **A** ☐ **B** ☐
14. Le sang et le cartilage sont des tissus conjonctifs **A** ☐ **B** ☐
15. Le métabolisme cellulaire est constitué de l'anabolisme et du catabolisme **A** ☐ **B** ☐
16. un épithélium stratifié est composé au minimum de trois couches de cellules **A** ☐ **B** ☐
17. Une glande tubuleuse est une glande exocrine **A** ☐ **B** ☐
18. Les glandes sébacées ont des canaux excréteurs **A** ☐ **B** ☐
19. Les cellules anaérobies et aérobies consomment toutes de l'oxygène **A**☐ **B** ☐
20. Une cellule peut vivre indéfiniment **A** ☐ **B** ☐
21. La cytologie est la science qui étudie la cellule sous toutes ses formes **A** ☐ **B** ☐
22. Les PROTOZOAIRES ou ÊTRES PLURICELLULAIRES sont constitués d'une seule cellule **A** ☐ **B** ☐
23. La cellule végétale fonctionne difficilement de façon autonome **A** ☐ **B** ☐
24. La taille d'une cellule peut atteindre plus de deux 2cm **A** ☐ **B** ☐
25. La membrane cytoplasmique est un milieu ou baignent les organites cellulaires **A** ☐ **B**☐
26. Le cytosquelette participe à la mobilité de la cellule **A** ☐ **B** ☐
27. Le noyau joue un rôle fondamental dans une cellule PROCARYOTE **A** ☐ **B** ☐
28. Dans une cellule eucaryote, les chromosomes se trouvent dans le noyau **A**☐ **B** ☐
29. La phagocytose et la pinocytose sont des moyens actifs d'absorption des particules par la cellule **A** ☐ **B** ☐
30. La cellule dégrade la matière vivante par l'anabolisme **A** ☐ **B** ☐
31. En histologie, les séreuses et les muqueuses ont la même origine **A** ☐ **B** ☐
32. Le tissu cartilagineux est un tissu conjonctif **A** ☐ **B**☐
33. Le tissu conjonctif est un tissu de remplissage de protection et de soutien. **A** ☐ **B** ☐
34. Les éléments du tissu conjonctif sont les fibres, l'eau, les organes, le fer. **A**☐ **B** ☐
35. Les cellules cubiques sont des épithéliums simples. **A** ☐ **B** ☐
36. Les tissus aréolaires sont des tissus conjonctifs denses. **A** ☐ **B**☐
37. Il existe quatre types de tissus musculaires. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM: cochez la ou les bonnes réponses

38. Dans les différentes activités cellulaires, Le catabolisme signifie

A. Dégradation des aliments ☐ B. Production d'oxygène ☐ C. Production de nutriments ☐

39. Dans les différents tissus ci-dessous énumérés, trois tissus sont appelés tissus à substance conjonctive. **Lesquels?**

A. Les tissus conjonctifs ☐ D. Les tissus glandulaires ☐
B. Les tissus sanguins ☐ E. Les tissus vésicaux ☐
C. Les tissus osseux ☐ F. Les tissus hépatiques ☐

40. Les *éléments ci-dessous font partie des fonctions de la peau, sauf deux.*

A. Protection ☐ C. Sécrétion ☐
B. Réserve sanguin ☐ D. Cicatrisation ☐ E. Esthétique ☐

41. *Les éléments ci-dessous sont des organites cellulaires sauf deux; lesquels?*

A. Mitochondrie ☐ C. Chronaxie ☐
B. Ribosome ☐ D. Axone ☐ E.Centrosome ☐

42. *Les éléments ci-dessous appartiennent à la cellule PROCARYOTE, sauf deux : Lesquels ?*

A. Mitochondrie, Réticulum endoplasmique ☐ D. Nucléoplasme ☐
B. Noyau ☐ E. Lysosome ☐
C. Appareil de Golgi ☐

43. *Les éléments ci-dessous appartiennent aux différentes phases de la mitose sauf un.*

A. Prophase ☐ B. Métaphase ☐ C. télophase ☐ D. Anaphase ☐

44. *Dans les différentes activités cellulaires, l'anabolisme signifie*

A. production de matière vivante ☐ B. production d'énergie ☐ C. production d'oxygène ☐

45. *Les cellules qui utilisent l'oxygène du milieu extérieur pour vivre sont dites:*

A. Oxygénées ☐ B. Anaérobies ☐ C. Aérobies ☐

46. *Les cellules procaryotes se multiplient par* :

A. Mitose ☐ B. Amitose ☐ C- méiose ☐ D-mitose puis amitose ☐

47. *Une cellule procaryote est définie comme une cellule* :

A. a noyau et sans cytoplasme ☐ C. sans cytoplasme ☐
B. sans noyau mais à cytoplasme ☐ D. a noyeau avec cytoplasme ☐

48. *Le caryotype des cellules humaines est de* :

A. 50 chromatides ☐ B. 23 chromosomes ☐ C-46 chromosomes ☐ D-25 chromatides ☐

49. *Concernant le tissu épithélial*

A. Il est formé à la fois de cellules jointives et de cellules disjointes ☐
B. Il assure la fonction de protection immunitaire ☐
C. Il peut être stratifié; dans ce cas, il ne comporte qu'une seule couche de cellules ☐
D. Il comprend des épithéliums de revêtement et des épithéliums glandulaires ☐
E. Les cellules épithéliales sont parfois porteuses de cils vibratiles ☐

50. C*oncernant le tissu épithélial*

A. Il est formé à la fois de cellules jointives et de cellules disjointes ☐
B. Il assure la fonction de protection immunitaire ☐
C. Il peut être stratifié; dans ce cas, il ne comporte qu'une seule couche de cellules ☐
D. Il comprend des épithéliums de revêtement et des épithéliums glandulaires ☐
E. Les cellules épithéliales sont parfois porteuses de cils vibratiles ☐

51. *Concernant les tissus*

A. Le corps humain est composé exclusivement de tissu conjonctif et de tissu épithélial ☐
B. Un organe est un ensemble de tissus identiques qui concourent à la même fonction ☐
C. Le tissu conjonctif présente une absence de vascularisation ☐
D. Dans un tissu conjonctif, les cellules sont disjointes ☐
E. La muqueuse est un tissu qui tapisse la cavité de tous les organes creux ☐

52. *Concernant la mitose*

A. L'ordre chronologique des phases est prophase-métaphase-télophase-cytodiérèse-anaphase ☐
B. L'ordre chronologique des phases est prophase-métaphase-anaphase-télophase-cytodiérèse ☐
C. L'enveloppe du noyau reste intacte pendant la mitose ☐
D. Les deux cellules filles peuvent recevoir un nombre de chromosomes différents ☐

E. La mitose est un mode de reproduction conforme: le même matériel génétique est transmis aux deux cellules filles sans brassage ☐

53. ***Dans l'organisme, on retrouve:***

A. 80 % de tissu conjonctif et 20 % de tissu épithélial ☐
B. 40 % de tissu conjonctif et 60 % de tissu épithélial ☐
C. 50 % de tissu conjonctif et 50 % de tissu épithélial ☐
D. 20 % de tissu conjonctif et 80 % de tissu épithélial ☐
E. 60 % de tissu conjonctif et 40 % de tissu épithélial ☐

54. ***Concernant le cytoplasme :***

A. La chromatine appartient au cytoplasme ☐
B. Le lysosome appartient au cytoplasme ☐
C. Le réticulum endoplasmique appartient au cytoplasme ☐
D. L'appareil de Golgi appartient au cytoplasme ☐
E. Les mitochondries appartiennent au cytoplasme ☐

55. C*oncernant la membrane cellulaire :*

A. Elle ne possède pas de récepteurs ☐
B. Elle sépare la cellule du milieu extérieur ☐
C. Elle est composée d'une triple couche de glucides dans laquelle sont insérées différentes protéines ☐
D. Les échanges entre le milieu extérieur et la cellule nécessitent des transports actifs de substances ☐
E. Elle est formée uniquement de bandes de protéines ☐

56. ***Quel est le composant de la cellule qui permet les échanges cellulaires ?***

A. La membrane nucléaire ☐ B. Le cytoplasme ☐ C. La membrane plasmique ☐

57. ***Qu'appelle -t-on l'ARN :***

A. l'Acide RiboNucléaire ☐ B. l'acide désoxyribonucleaire ☐ C. l'acide nucléique ☐

58. ***Comment appelle-t-on l'étude de cellule ?***

A. la cytology ☐ B. la biologie ☐ C. la dermatologie ☐

59. ***Quel est le tissu humain dont le rôle est de séparer les organes et de les protéger ?***

A. le tissu conjonctif ☐ B. le tissu épithélial ☐ C. le tissu glandulaire ☐

60. ***Le tissu adipeux*** ☐

A. envelope et protège les organes ☐
B. se trouve dans des endroits sujets aux frictions ☐
C. emmagasine les graisses ☐

COACHING

EPREUVE D'ANATOMIE- APPAREL LOCOMOTEUR

Partie 1 : *QCM* (cochez la ou les bonne(s) réponse (s))

1) Quel est le composant de la cellule qui permet les échanges cellulaires ?
A- La membrane nucléaire ☐ B- Le cytoplasme ☐ C- La membrane plasmique ☐

2) Qu'appelle –t-on l'ARN ?
A-l'acide ribonucléaire ☐ B-l'acide désoxyribonucleaire ☐ C-l'acide nucléique ☐

3) quel est le rôle des mitochondries dans la cellule ?
A- la production d'énergie dans la cellule par dégradation des glucides ☐
B- la synthèse des protéines ☐ C- la destruction des déchets grâce aux enzymes ☐

4- une hormone est :
A- une glande ☐
B- une substance chimique déversée dans le sang ☐
C- un organe ☐ D- une substance chimique déversée dans le sang par le canal excréteur d'une glande ☐

5- donnez la définition correcte, Les glandes endocrine :
A- glandes qui déversent leurs sécrétions par un canal excréteur ☐
B- glandes qui déversent leurs sécrétions dans le sang ☐

6- Que sécrètent les glandes endocrines ?
A- des enzymes ☐ B- des hormones ☐

7- Qu'Appelle –t-on des muqueuses ?
A- ce sont des membranes qui tapissent les organes creux ☐
B- ce sont des membranes faites de deux épaisseurs qui entourent les viscères et les poumons ☐

8- comment appelle-t-on l'étude de cellule ?
A- la cytologie ☐ B- la biologie ☐ C- la dermatologie ☐

9- Quel est le tissu humain dont le rôle est de séparer les organes et de les protéger ?
A- le tissu conjonctif ☐ B- le tissu épithélial ☐ C- le tissu glandulaire ☐

10- parmi ces propositions concernant les tissus conjonctifs, lesquelles sont vraies ?
A- un tissus conjonctif dense est pauvre en fibres ☐ C- l'os est un tissu conjonctif ☐
B- ils ont un rôle de maintien et de liaison des organes ☐ D- le tissus conjonctif est un tissu moins abordant ☐
E- ils sont majoritairement vascularisés contrairement aux épithéliums ☐

11- parmi les propositions concernant l'épithélium glandulaire, lesquelles sont vraies ?
A- la glande endocrine sécrète une substance libérée par les canaux à la surface de l'épithélium ☐
B- le pancréas est une glande amphicrine ☐
C- la glande amphicrine est une glande à la fois endocrine et exocrine ☐
D- les glandes sudoripares sont des glandes endocrines ☐
E- les glandes surrénales sont des glandes endocrines ☐
F- les glandes mixtes sont les glandes qui sont uniquement endocrines ☐

12- Quelles sont les fonctions des tissus épithéliaux ?
A-protection ☐ B- maintien et liaison des organes ☐ C- défense ☐ D- filtration ☐

13- parmi ces propositions concernant les tissus, lesquelles sont vraies ?
A- le tissu simple est constitué de cellules aux fonctions différentes ☐
B- ces tissus s'associent en des combinaisons multiples pour former un organe ☐
C- le tissu composé est constitué de cellule d même types ☐
D- le matériel extracellulaire est fait de fibre de collagène et élastique ☐
E- les cellules s'organisent selon une organisation spécifique pour former des tissus ☐

14) associe chaque tissus à sa définition
Ex : k-30
1- ensemble des cellules qui bordent les cavités de l'organisme
2- tissus de soutien qui comble les espaces
3- permettent une communication entre différentes régions de l'organisme et une réponse adaptée aux différentes informations reçus
4-tissus conjonctifs particuliers composés de myocytes
5-tisus tapissant l'intérieur des organes creux et es orifices naturels de l'organisme
A-tissus épithéliaux ☐ C-tissus musculaires ☐
B-tissus nerveux ☐ D-tissus conjonctifs ☐ E-muqueuses ☐

15- le tissu adipeux
A- enveloppe et protège les organes ☐

B- se trouve dans des endroits sujets aux frictions ☐ C- emmagasine les graisses ☐

16- le tissu osseux

A- contient les chondrocistes et les chondroblestes ☐

B- est continuellement remanié ☐ C-est constitué de matrice calcifiée ☐

17- le tissu sanguin :

A- est un tissu conjonctif ☐ B- n'est pas un véritable tissu ☐ C- est constitué d'une matrice nommée sérum ☐

18- lequel de ces tissus n'est pas conjonctif ?

A- Le sang ☐ B- muscle ☐ C- l'os ☐

19- Le tissu épithélial


A- tapisse les cavités ouvertes vers l'extérieur et la surface du corps ☐

B- joue le rôle de barrière ☐ C-n 'a pas de rôle dans la sécrétion des substances ☐

20- ***On classe les épithéliums***

A- suivant le mode de sécrétion ☐ B- suivant la forme des cellules ☐

Partie 2 : ***QCM*** (cochez la bonne réponse)



1-***Le N^0 16 désigne :***

A- Tarse ☐ B- Phalanges ☐ C- Métatarse ☐

2- ***Le N^0 11 désigne :***

A- ischion ☐ B- Pubis ☐ C- Symphyse pubienne ☐

3- ***Le N^0 15 désigne :***

A- Métatarse ☐ B- Phalanges ☐ C-Tarse ☐

4- ***Le N^0 1 désigne :***

A- Frontal ☐ B- tête ☐ C- Crane ☐

5- ***Le N^0 6 désigne :***

A- ilion ☐ B- iliaque ☐ C- Vertèbres Lombaires ☐

6- ***Le N^{0}23 désigne :***

A- ilion ☐ B- iliaque ☐ C- Bassin ☐

7- ***Le N^{0}14 désigne :***

A- Péroné ☐ B- Tibia ☐ C- Rotule ☐

8- ***Le N^{0}7 désigne :***

A- ilion ☐ B- iliaque ☐ C- bassin ☐

9- ***Le N^{0}19 désigne :***

A- Sternum ☐ B- Manubrium sternal ☐ C- Acromion ☐

10- ***Le N^{0}26 désigne :***

A- Ulna ☐ B- Radius ☐ C- Rotule ☐

11- ***Le N^{0}12 désigne :***

A-Métacarpe ☐ B-Carpe ☐ C- Phalanges ☐

12- ***Le N^{0}3 désigne :***

A-Clavicule ☐ B-Omoplate ☐ C-Acromion ☐

13- ***Le N^{0}17 désigne :***

A- Clavicule ☐ B- Omoplate ☐ C- Acromion ☐

14- ***Le N^{0}30 désigne :***

A- Rotule ☐ B- Péroné ☐ C- Tibia ☐

15- ***Le N^{0}9 désigne :***

A- ischion ☐ B- Pubis ☐ C- Symphyse pubienne ☐

16- - ***Le N^{0}8 désigne :***

A- Sacrum ☐ B- Sarcomère ☐ C-Sacromate ☐

17- ***Le N^{0}10 désigne :***

A- ischion ☐ B- Pubis ☐ C- Symphyse pubienne ☐

18- ***Le N^{0}2 désigne :***

A- Vertèbre cervical ☐ B- Colonne vertébrale ☐

19- ***Le N^{0}4 désigne :***

A- Clavicule ☐ B- Acromion ☐ C- Pubis ☐

20- ***Le N^{0}27 désigne :***

A- Métacarpe ☐ B- Carpe ☐ C- Phalanges ☐

21- ***Le N^{0}22 désigne :***

A-Coude ☐ B- Humérus ☐ C- Coccyx ☐

22- ***Le N^{0}24 désigne :***

A-Coude ☐ B- Humérus ☐ C- Coccyx ☐

23- ***Le N^{0}21 désigne :***

A-Coude ☐ B- Humérus ☐ C- Coccyx ☐

24- ***Le N^{0}25 désigne :***

A- Ulna ☐ B- Radius ☐ C- Rotule ☐

25- ***Le N^{0}29 désigne :***

A-Coude ☐ B- Humérus ☐ C- Fémur ☐

26- ***Le N^{0}31 désigne :***

A- Métatarse ☐ B- Phalanges ☐ C-Tarse ☐

27- ***Le N^{0}20 désigne :***

A- Côte ☐ B- vertèbre ☐ C- Vertébrale ☐

28- ***Le N^{v}13 désigne :***

A- Péroné ☐ B- Tibia ☐ C- Rotule ☐

29- ***Le N^{0}18 désigne :***

A- Sternum ☐ B- Manubrium sternal ☐ C- Acromion ☐


30- ***Le N^{0}5 désigne :***

A-Clavicule B- Apophyse coracoïde C-Acromion

31- ***Le N^{0}28 désigne :***


A-Métacarpe ☐ B-Carpe ☐ C- Phalanges ☐

32- Il s'agit de la coupe……



1- ***Que désigne le N^{0}1 ?***
A- Pariétal ☐ B- Occipital ☐
2- ***Que désigne le N^{0}9 ?***
A- Ethmoïde ☐ B- Lacrymal ☐
3- ***Que désigne le N^{0}3 ?***
A- Sphénoïde ☐ B-Temporal ☐
4- ***Que désigne le N^{0}5 ?***
A- Frontal ☐ B- Zygomatique ☐
5- ***Que désigne le N^{0}11 ?***
A- Maxillaire ☐ B- Mandibule ☐
6- ***Que désigne le N^{0}2 ?***
A- Pariétal ☐ B- Occipital ☐

7- ***Que désigne le N^{0}4 ?***
A- Sphénoïde ☐ B- Zygomatique ☐
8- ***Que désigne le N^{0}10 ?***
A- Maxillaire ☐ B- Mandibule ☐
9- ***Que désigne le N^{0}7 ?***
A- Ethmoïde ☐ B- Lacrymal ☐
10- ***Que désigne le N^{0}6 ?***
A- Sphénoïde ☐ B-Temporal ☐
11- ***Que désigne le N^{0}8 ?***
A- Maxillaire ☐ B- Nasal ☐
12- De quelle s'agit-il ? ……
……



1- ***Que représente l'élément N^{0}5 ?***
……

2- ***Que représente l'élément N^{0}2 ?***
……

3- ***Que représente l'élément N^{0}9 ?***
……

4- ***Que représente l'élément N^{0}6 ?***
……

5- ***Que représente l'élément N^{0}7 ?***
……

6- ***Que représente l'élément N^{0}1 ?***
……

7- ***Que représente l'élément N^0 3 ?***
……

8- ***Que représente l'élément N^{0}4 ?***
…… ……

9- ***Que représente l'élément N^{0}8 ?***
……

10- ***De quelle coupe s'agit-il ?***
……

EPREUVE D'ANATOMIE CARDIOVASCULAIRE

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Le ventricule est une cavité, localisée dans la partie supérieure droite du cœur. **A**☐ **B**☐
2. L'artère pulmonaire un vaisseau qui éjecte, à partir du ventricule droit, le sang vers les poumons. **A**☐ **B**☐
3. Le ventricule droit est une cavité, localisée dans la partie inférieure gauche du cœur, point de départ de la circulation systémique. **A**☐ **B**☐
4. Le cœur est constitué de quatre cavités. **A**☐ **B**☐ ☐ ☐
5. Les valves auriculo-ventriculaires sont des structures qui permettent au sang de circuler entre les ventricules et les vaisseaux. **A**☐ **B**☐
6. Le ceur est de forme pyramidale rectangulaire. **A**☐ **B**☐
7. L'innervation extrinsèque du cœur est assurée par le tissu nodal. **A**☐ **B**☐
8. Le tssu nodal est responsable des activités mécaniques du cœur. **A**☐ **B**☐
9. La contraction dans la révolution cardiaque correspond à la dépolarisation. **A**☐ **B**☐
10. Les phénomènes électriques du cœur sont appréciés à l'électrocardiogramme. **A**☐ **B**☐
11. La quantité de sang éjectée par chaque ventricule en une minute est le débit cardiaque. **A**☐ **B**☐
12. Le volume de sang éjecté par un ventricule à chaque battement est la pression artérielle. **A**☐ **B**☐
13. La force par unité de surface que le sang exerce sur la paroi d'un vaisseau sanguin et qui s'exprime en mm de mercure (Hg) est la résistance vasculaire périphérique. **A**☐ **B**☐
14. Le myocarde ventriculaire ne reçoit pas d'innervation parasympathique. **A**☐ **B**☐
15. L'action du sympathique sur le cœur se fait à travers l'acétylcholine. **A**☐ **B**☐
16. Le coœur a une forme pyramidale triangulaire. **A**☐ **B**☐
17. L'aorte un vaisseau qui sort du ventricule droit. **A**☐ **B**☐
18. Le septum inter auriculaire sépare les deux ventricules. **A**☐ **B**☐
19. Les phénomènes mécaniques du cœur sont appréciés à l'électrocardiogramme. **A**☐ **B**☐
20. Le cœur est constitué de cing (05) cavités. **A**☐ **B**☐
21. Les valves auriculo-ventriculaires sont situées entre les ventricules et les artères. **A**☐ **B**☐
22. L'innervation extrinsèque du cœur est assurée par le tissu nodal. **A**☐ **B**☐
23. Le tissu nodal est responsable des activités électriques du cœur. **A**☐ **B**☐
24. La contraction dans la révolution cardiaque est un phénomène électrique. **A**☐ **B**☐
25. Le débit cardiaque est la quantité de sang éjectée par chaque ventricule en une minute. **A**☐ **B**☐
26. Le parasympathique est un nerf cardio-modérateur. **A**☐ **B**☐
27. Le cœur peut étre situé dans l'abdomen d'un organisme vivant. **A**☐ **B**☐
28. L'action du sympathique sur le cœur se fait à travers l'acétylcholine. **A**☐ **B**☐
29. Le potentiel membranaire de repos d'une cellule contractile est toujours stable à cause de l'ouverture partielle des canaux sodiques. **A**☐ **B**☐
30. Dans le tissu nodal, on distingue 2 types de cellules selon la vitesse de dépolarisation, les fibres à réponse lentes et les fibres à réponse rapide. **A**☐ **B**☐
31. La dépolarisation de la cellule cardiaque est un phénomène électrique du cycle cardiaque. **A**☐ **B**☐
32. La systole ventriculaire est un phénomène aussi bien électrique que mécanique dans le cycle cardiaque. **A**☐ **B**☐
33. L'électrocardiogramme peut permettre l'enregistrement des phénomènes mécaniques du Coeur. **A**☐ **B**☐
34. L'innervation extrinsèque du cœur est assurée par le tissu nodal. **A**☐ **B**☐
35. Le tissu nodal est responsable des activités mécaniques du cœur. **A**☐ **B**☐
36. La contraction dans la révolution cardiaque correspond à la dépolarisation. **A**☐ **B**☐

37. Les phénomènes électriques du cœur sont appréciés à l'électrocardiogramme. **A** ☐ **B** ☐
38. La dépolarisation de la cellule cardiaque est un phénomène électrique du cycle cardiaque. **A** ☐ **B** ☐
39. L'électrocardiogramme peut permettre l'enregistrement des phénomènes mécaniques du ceur. **A** ☐ **B** ☐
40. Les activités électriques du cœur précèdent obligatoirement et autorisent les activités mécaniques du cœur. **A** ☐ **B** ☐
41. La contraction dans la révolution cardiaque correspond à la dépolarisation. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2</u>: ***QCM*** cochez la ou les bonnes réponse (s)

42. ***Le débit sanguin est :***

A. La force par unité de surface que le sang exerce sur la paroi d'un vaisseau sanguin et qui s'exprime en mm de mercure (Hg). ☐
B. le volume de sang qui s'écoule dans un vaisseau, dans un organe ou dans le système vasculaire entier en une période donnée. Au repos, il est relativement constant. Cependant, suivant les besoins d'un organe, il peut varier. ☐
C. est la force qui s'oppose à l'écoulement du sang, friction du sang sur la paroi des vaisseaux. Elle est influencée par la viscosité du sang, la longueur et le diamètre des vaisseaux. ☐

43. ***La pression artérielle systolique (PAS) est une conséquence de la contraction du ventricule gauche, qui tente de comprimer le sang. Elle est*** **:**

A. la pression qui s'exerce lorsque le ventricule gauche se contracte et expulse le sang dans l'aorte. ☐
B. la pression qui s'exerce lorsque le sang avance dans le lit artériel et que le ventricule se décontracte. ☐
C. dépendante de la fréquence des battements (FC) et la quantité de sang éjectée par les ventricules ou volume systolique (VES) . ☐

44. Le Myocarde

A. est une enveloppe à double paroi, fibreux et séreux. ☐
B. protège le cœur et l'amarre au diaphragme, au sternum et aux vaisseaux. ☐
C. est une paroi intermédiaire ayant la capacité de se contracter car elle est composée de cellules musculaires cardiaques. C'est l'essentiel de la masse cardiaque. ☐

45. Les éléments suivants constituent le tissu nodal sauf un. Lequel ?

A. les réseaux de Purkinje. ☐ C. le neud sinusal. ☐
B. le faisceau de His. ☐ D. le muscle cardiaque. ☐ E. le neud auriculo-ventriculaire. ☐

46. La valve cardiaque qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit est :

A. la valve mitrale. ☐ B. la valve tricuspide. ☐ C. la valve aortique. ☐

47. Les veines pulmonaires s'abouchent dans :

A. l'oreillette droite. ☐ B. l'oreillette gauche. ☐ C. le ventricule droit. ☐ D. le ventricule gauche. ☐

48. Le gros tronc artériel issu du ventricule gauche est :

A. l'aorte. ☐ B. l'artère pulmonaire. ☐ C. la veine cave supérieure. ☐ D. la veine cave inférieure. ☐

49. Les deux phénomènes mécaniques du cœur sont :

A. la contraction ou systole. ☐ B. la relaxation ou diastole. ☐ C. la dépolarisation. ☐ D. la repolarisation. ☐

50. Un des éléments ne fait pas partie des tuniques du cœur. Leguel ?

A. le myocarde . ☐ C. l'endocarde. ☐
B. le péricarde . ☐ D. les valves auriculo-ventriculaires. ☐

51. Quels sont les deux propositions justes relatives à l'innervation sympathique ?

A. elle est cardio-accélératrice. ☐
B. elle n'innerve que le myocarde. ☐
C. elle agit sur le cœur à travers l'acétylcholine. ☐
D. elle agit sur le cœur à travers la noradrénaline. ☐
E. elle est responsable du rythme cardiaque au repos. ☐

52. Sur un électrocardiogramme, la dépolarisation auriculaire correspond à quelle letter ?

A- T. ☐ B- Q. ☐ C- P. ☐ D- R. ☐

53. La valeur normale du débit sanguin est de:

A. 4 litres par minute. ☐ B. 5 litres par minute. ☐ C. 6 litres par minutes. ☐ D. 7 litres par minutes. ☐

54. La valeur normale de la pression artérielle est :

A. <140 /90 mmHg. ☐ B. <130/90 mmHg. ☐ C. <140/80 mmHg. ☐ D. <130/80 mmHg. ☐

55. La valve cardiaque qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit est :

A. la valve mitrale. ☐ B. la valve tricuspide. ☐ C. la valve aortique. ☐

56. Un élément différentie l'artère de la veine périphérique:

A. la valvule. ☐ B. l'adventice. ☐ C. la media. ☐ D. l'intima. ☐

57. Les deux phénomènes mécaniques du cœur sont :

A. la contraction ou systole. ☐ C. la dépolarisation. ☐

B. la relaxation ou diastole. ☐ D. la repolarisation. ☐

58. Un des éléments ne fait pas partie des tuniques du cœur. Lequel ?

A. le myocarde. ☐ B. le péricarde. ☐ C. l'endocarde. ☐ D. les valves auriculo-ventriculaires. ☐

59. Quels sont les deux propositions justes relatives à l'innervation sympathique ?

A. elle est cardio-accélératrice. ☐

B. elle n'innerve que le myocarde. ☐

C. elle agit sur le cœur à travers l'acétylcholine. ☐

D. elle agit sur le cœur à travers la noradrénaline. ☐

E. elle est responsable du rythme cardiaque au repos. ☐

60. Les éléments suivants constituent le tissu nodal sauf un. Lequel ?

A. les réseaux de Purkinje. ☐

B. le faisceau de His. ☐

C. le nceud sinusal. ☐

D. le muscle cardiaque. ☐

E. le nœud auriculo-ventricule. ☐

COACHING

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1.Le poumon droit est divisé en trois lobes et deux scissures. **A**☐ **B**☐

2. Le poumon gauche plus volumineux pèse environ 650g. **A**☐ **B**☐

3. L'oxygène est transporté dans le sang sous 2 formes qui sont dissoute 1,5% et combinée à l'Hb 98,5% . **A**☐ **B**☐

4. L'expiration est un phénomène actif. **A**☐ **B**☐

5. Le poumon gauche et le poumon droit sont de masse égale. **A**☐ **B**☐

6. Le sac alvéolaire est la portion structurale importante dans la respiration. **A**☐ **B**☐

7. La trachée, les poumons et le pharynx font partir des voies respiratoires inferieures. **A**☐ **B**☐

8. La plèvre est une membrane qui amarre le poumon à la paroi thoracique. **A**☐ **B**☐

9. Le diaphragme est un muscle accessoire de la respiration. **A**☐ **B**☐

10. Le diamètre des bronches s'accroit du hile vers la périphérie du poumon. **A**☐ **B**☐

11. Le poumon admet une double vascularisation : systémique et bronchique. **A**☐ **B**☐

12. L'apnée correspond à une fréquence respiratoire inférieure à 12 cycles par minute chez l'adulte. **A**☐ **B**☐

13. L'arbre trachéo -bronchique est un réseau de conduit dans lequel circule l'air inspiré et expiré. **A**☐ **B**☐

14. Le lobule est Il'unité fonctionnelle du poumon. **A**☐ **B**☐

15. L'équivalent du lobe moyen à droite est appelé lingula au niveau du poumon gauche. **A**☐ **B**☐

16. Le poumon gauche comprend deux scissures. **A**☐ **B**☐

17. Le gaz carbonique est transporté dans le sang sous 4 formes . **A**☐ **B**☐

18. Les bronches terminales appartiennent à la zone respiratoire. **A**☐ **B**☐

19. La ventilation pulmonaire est le premier maillon de la chaine respiratoire. **A**☐ **B**☐

20. L'hypoanemie est la baisse de la Pa02 dans les tissus. **A**☐ **B**☐

21. Le CO2 est principalement transporté sous la forme dissoute dans les plasmas. **A**☐ **B**☐

22. L'hypoxie est la conséquence de l'hypoxémie. **A**☐ **B**☐

23. La pleurésie est l'augmentation d'air dans la cavité pleurale. **A**☐ **B**☐

24. Le poumon droit est segmenté en trois lobes pulmonaires. **A**☐ **B**☐

25. Au cours de l'inspiration, la pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphériaue. **A**☐ **B**☐

26. Les pneumocytes de type I produisent une substance tensio-active appelée surfactant. **A**☐ **B**☐

27. Le dioxygène est transporté essentiellement sous la forme liée à l'hémoglobine . **A**☐ **B**☐

28. Le poumon gauche est divisé en deux lobes et deux scissures. **A**☐ **B**☐

29. La scissure est une invagination de la plèvre pariétale entre les lobes pulmonaires . **A**☐ **B**☐

30. Les échanges gazeux se font au travers de la membrane alvéolo-capillaire. **A**☐ **B**☐

31. L'hypoxémie désigne le manque d'oxygène dans les cellules. **A**☐ **B**☐

32. La respiration est régulée en fonction des besoins de l'organisme en oxvgèn. **A**☐ **B**☐

33. Le reflex de la toux est un moyen de défense de l'appareil respiratoire . **A**☐ **B**☐

34. Le poumon gauche est plus volumineux que le poumon droit. **A**☐ **B**☐

35. La respiration consiste à utiliser l'oxygène pour produire le dioxyde de carbone. **A**☐ **B**☐

36. L'épuration de l'air inspiré n'est pas une fonction du poumon. **A**☐ **B**☐

37. La respiration est une fonction secondaire du poumon. **A** ☐ **B** ☐

38. Le poumon est un organe intra thoracique, pair et symétrique. **A** ☐ **B** ☐

39. La deuxième étape de la respiration assure l'hématose. **A** ☐ **B** ☐

40. Le poumon est situé dans le thorax dont la fonction est d'apporter le CO2 et de rejeter l'02. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM: cochez la ou les bonnes réponses

41. Les phénomènes suivants sont observés au cours de l'expiration calme (de repos)

A. Contraction du diaphragme. ☐

B. Relâchement du diaphragme. ☐

C. Contraction des muscles abdominaux. ☐

D. Contraction des muscles intercostaux externes. ☐

E. Contraction des muscles intercostaux internes. ☐

42. Les muscles de l'inspiration sont :

A- Le diaphragm. ☐ C- Les intercostaux externes. ☐

B- Les muscles abdominaux. ☐ D-Les intercostaux internes. ☐

43. Le pH normal de l'organisme humain est compris entre :

A. 7,37 et 7,43. ☐ B. 7,28 et 7,34. ☐ C. 7,52 et 7,63. ☐ D. Aucune bonne réponse. ☐

44. Dans le sang l'oxygène est transporté sous :

A- La forme dissoute 20% de forme de transport. ☐ C- La forme d'ion bicarbonate. ☐

B-La forme liée à l'hémoglobine. ☐ D- PaO2. ☐

45. Ces éléments influencent la saturation de l'hémoglobine en oxygène

A- La PO2. ☐ C- Des émotions. ☐ E- Taux d'hémoglobine. ☐

B- PCO2 . ☐ D- La fièvre. ☐ F- La concentration en 2,3 DPG dans les globules rouges. ☐

46- Ces éléments des voies aériennes font partie de la zone d'échange des gaz respiratoires sauf deux. Lesquels ?

A- La trachée. ☐ D- Les canaux alvéolaires. ☐

B- Les bronchioles respiratoires. ☐ E- Sacs alvéolaires. ☐

C- Les bronchioles terminales. ☐

47. Les voies respiratoires supérieures sont :

A- Les fosses nasals. ☐ B- Les bronchioles. ☐ C- La trachée. ☐ D- Le pharynx. ☐

48. Ces éléments sont des muscles de l'expiration sauf un ; lequel ?

A- Muscles intercostaux. ☐ D- Muscles obliques externes et internes. ☐

B- Muscles transverse de l'abdomen. ☐ E- Les muscles grands droits. ☐

C- Sterno-cléido-mastoidiens

49. La respiration se déroule en quatre étapes qui sont sauf un ; lequel ?

A- La ventilation. ☐ D- Les échanges alvéolo-capillaires. ☐

B- Les échanges d'oxygène . ☐ E- La respiration cellulaire. ☐

C- Le transport des gaz respiratoires. ☐

50. Le gaz carbonique est transporté dans le sang sous trois formes sauf 1 ; lequel ?

A- Dissoute dans le plasma 7-10%. ☐ C- Dissoute 1,5%. ☐

B- Combinée à l'Hb 20%. ☐ D- ions bicarbonates (+++GR) 70%. ☐

51. Les maladies de l'appareil respiratoire sont:

A- Tuberculose pulmonaire. ☐ B- Pneumopathies. ☐ C- La myocardite aigue. ☐ D- Cancer du poumon. ☐

52. Les fonctions du poumon respiratoire sont :

A- La ventilation. ☐ C- Les échanges gazeux. ☐

B- Fonction métabolique. ☐ D- Fonction d'éruption pulmonaire. ☐

EPREUVE DE PEDIATRIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. En général le retard statural est difficilement perceptible. **A** ☐ **B** ☐
2. La talle se mesure une fois par mois entre 0 et 3 mois. **A** ☐ **B** ☐
3. De 12 mois à 4 ans l'enfant augmente sa taille. **A** ☐ **B** ☐
4. À l'âge de 3 ans I 'enfant mesure 93 cm. **A** ☐ **B** ☐
5. Un enfant ayant une taille à 50 cm à la naissance aura une taille à 100 cm à trois ans . **A** ☐ **B** ☐
6. Le périmètre crânien est estimé à 40 cm chez un nourrisson qui a une taille à 60 cm. **A** ☐ **B** ☐
7. un nouveau-né pesant 2.500g à la naissance est appelé (nouveau-né de petit poids) . **A** ☐ **B** ☐
8. À 6 mois le nourrisson est capable de faire bravo et au revoir. **A** ☐ **B** ☐
9. L'hyperglycémie est la principale complication métabolique du nouveau-né prématuré. **A** ☐ **B** ☐
10. Le trismus, la contracture et le paroxysme sont des signes de la période d'invasion du tétanos néonatal. .**A** ☐ **B** ☐
11. La principale complication respiratoire du prématuré est le retard de résorption du liquide pulmonaire. .**A** ☐ **B** ☐
12. le nouveau-né eutrophique a un poids compris entre 2500g et 4000g .**A** ☐ **B** ☐
13. Le tétanos ombilical représente 80% de l'ensemble des tétanos enregistrés dans le monde.**A** ☐ **B** ☐
14. la fréquence cardiaque normale du nouveau-né est comprise entre 100 et 120 pulsations par minute. .**A** ☐ **B** ☐
15. La forme de fontanelle antérieure ressemble à un losange. **A** ☐ **B** ☐
16. KJ est un nouveau-né de sexe féminin allaité. Au 2é jour de vie, elle présente un gonflement des seins accompagné d'un écoulement blanchâtre provenant du vagin. L'agent de santé conseille au parent de consulter un spécialiste (pédiatre ou gynécologue). Le conseil de l'agent de santé est très pertinent. **A** ☐ **B** ☐
17. PJ vient de naitre avec une surface corporelle de 0,22 m2. PJ a une croissance normale. À 9 mois la surface corporelle de PJ sera de 0,66 m2. **A** ☐ **B** ☐
18. La pesée chez I 'enfant a pour seul but de suivre son évolution. **A** ☐ **B** ☐
19. La distance du sommet du crâne au à la pointe du pied chez l'enfant dépend de l'hérédité. **A** ☐ **B** ☐
20. Entre 0 et 3 mois I 'enfant prend 2 cm/mois. **A** ☐ **B** ☐
21. Un nourrisson de neuf (9) mois marche à quatre pattes. **A** ☐ **B** ☐
22. À la naissance l'enfant mesure 49 à 52 cm. **A** ☐ **B** ☐
23. La taille de I 'enfant est la hauteur du bregma au talon. **A** ☐ **B** ☐
24. Le déficit mental est une séquelle de la grande maturité. **A** ☐ **B** ☐
25. Le périmètre crânien est estimé à 40 cm chez un nourrisson qui a une taille à 60 cm. **A** ☐ **B** ☐
26. Le poids de l'enfant par rapport à la taille est très sensible aux facteurs externes. **A** ☐ **B** ☐
27. Entendre le son de la voix de son bébé, stimule chez la femme allaitante la production d'ocytocine. **A** ☐ **B** ☐
28. La principale complication métabolique du prématuré est l'hypoglycémie. **A** ☐ **B** ☐
29. Le petit prématuré sans signes de danger est pris en charge en unité de néonatologie. **A** ☐ **B** ☐
30. la prolactine est I 'hormone sécrétion du lait. **A** ☐ **B** ☐
31. Le problème d'hygiène est une complication des vomissements. **A** ☐ **B** ☐
32. Je collabore avec le médecin à la réalisation de la radiographie du thorax pour rechercher la cause des vomissements chez le nourrisson. **A** ☐ **B** ☐
33. L'erreur diététique est une cause de vomissements aigus du nourrisson. **A** ☐ **B** ☐
34. La « Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant et du Nouveau-né (PCIMEN) » par l'agent de santé limite les pratiques familiales et communautaires. **A** ☐ **B** ☐
35. L'analyse du carnet de santé est la première étape de l'examen du nouveau-né en salle de naissance. **A** ☐ **B** ☐
36. Lorsque la mère allaitante regarde son enfant avec attention et écoute le son émis par son enfant, cela déclenche chez elle la production du lait dans les seins. **A** ☐ **B** ☐
37. La mise au sein précoce signifie que la mère met son enfant au sein durant les 24 premières heures de vie. **A** ☐ **B** ☐
38. En Côte d'ivoire le taux d'allaitement exclusif est de 36%. **A** ☐ **B** ☐
39. En Côte d'ivoire la proportion des mères qui suivent la recommandation de la mise au sein précoce est de 23%.

A ☐ **B** ☐

40. Le nourrisson présentant des signes évidents de déshydratation boit avec avidité.
41. L'électrophorèse des protéines fait partie du bilan prénatal recommandé . **A** ☐ **B** ☐
42. Dame JJ, gestante est de condition socio-économiques défavorables. Je priorise chez elle les examens biologiques dans le cadre du bilan prénatal. **A** ☐ **B** ☐
43. Les stries plantaires sont < 2/3 antérieurs chez le nouveau-né normal. **A** ☐ **B** ☐
44. Le nouveau-né prématuré a le lobule de l'oreille bien ourlé. **A** ☐ **B** ☐
45- Chez le nouveau-né normal, les « Soins Mère-Kangourou », font partie des soins propres de l'agent de santé. **A** ☐ **B** ☐
46. L'entérocolite ulcéro nécrosante est une complication du nouveau-né prématuré. **A** ☐ **B** ☐
47. Le Kwashiorkor est une complication du sevrage précoce du nourrisson avant 24 mois. **A** ☐ **B** ☐
48. KL a 3 mois et nourri exclusivement au sein. Il émet de 3 à 4 selles par jour. Je conclue que KL a une diarrhée. **A** ☐ **B** ☐
49. PO, nourrisson de 10 mois, consulte pour diarrhée. À l'examen les yeux sont enfoncés, boit avec avidité, agitation, bouche sèche, pli cutané abdominal s'efface lentement. Je réhydrate PO selon le plan C. **A** ☐ **B** ☐
50. Lors de la diarrhée aiguë, le nourrisson de plus de 6 mois reçoit en plus de la réhydratation et l'alimentation un comprimé de Zinc dosé à 10 mg par jour pendant 10jours. **A** ☐ **B** ☐
51. La vomique est à une expectoration brutale par la bouche de pus ou de sérosité provenant de l'estomac. **A** ☐ **B** ☐
52. Le mérycisme correspond à un retour volontaire des aliments en cours de digestion et qui ensuite sont avalés de nouveau. **A** ☐ **B** ☐
53. La régurgitation est l'émission par la bouche d'une petite quantité de liquide gastrique prédigéré accompagnant un rot. **A** ☐ **B** ☐
54. Le stress et le manque d'affection sont des facteurs protégeant le nourrisson des vomissements. **A** ☐ **B** ☐
55. À 4 ans, l 'enfant avec un bon développement psychomoteur est capable de faire de la bicyclette sans roues latérales. **A** ☐ **B** ☐
56. L'effet indésirable survenant chez l 'enfant après administration d'antiémétisant se traite avec du diazépam. **A** ☐ **B** ☐
57. Le nourrisson de 9 mois avec une croissance normale et une surface corporelle à 0,6m². Sa surface corporelle à la naissance était de à 0,3m². **A** ☐ **B** ☐
58. La fontanelle antérieure est de forme rectangulaire. **A** ☐ **B** ☐
59. La fontanelle postérieure se ferme à 1 mois. **A** ☐ **B** ☐
60. DS, nourrisson de 12 mois, ne présente aucune dent dans la bouche. Je conclue que DS a un retard d'éruption dentaire. **A** ☐ **B** ☐
61. Le stress et le manque d'affection sont des facteurs environnementaux limitant la croissance harmonieuse de l'enfant. **A** ☐ **B** ☐
62. La fréquence respiratoire normale du nouveau-né à terme est comprise entre 50 et 60 cycles par minute. **A** ☐ **B** ☐
63. La fréquence cardiaque normale du nouveau-né à terme est comprise entre100 et 120 pulsations par minute. **A** ☐ **B** ☐
64. Les principales maladies du nouveau-né sont l'infection bactérienne, tétanos, malnutrition, anémie. **A** ☐ **B** ☐
65. On dit qu'il y'a retard d'éruption des dents si aucune dent n'apparaît après 15 mois. **A** ☐ **B** ☐
66. La principale complication métabolique du prématuré est l'hypomagnésémie. **A** ☐ **B** ☐
67. L'urée et la créatinine du sang font partie du bilan prénatal recommandé . **A** ☐ **B** ☐
68. Avant la mise sous photothérapie, l'agent de santé protège les yeux et les organes génitaux du nouveau-né. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2</u>: ***QCM*** cochez la ou les bonnes réponses

69. Les cellules souches suivantes interviennent dans le développement des organes de l'embryon humain sauf un. Quel est ce feuillet ?

A. Ectoblaste B. Mésoblaste. ☐ C. Endoblaste. ☐ D. Leucoblaste. ☐

70. Les signes suivants sont observés chez le nouveau-né normal à la naissance, sauf un. Quel est ce signe ?
A. Coloration rose. ☐ B. Nodule mammaire à 5mm. ☐ C. Clitoris saillant. ☐ D. Bourses striées. ☐

71. Chez le nouveau-né normal, les quatre membres sont en
A. Extension. ☐ B. Pronation. ☐ C. Flexion. ☐ D. Supination. ☐

72. L'âge gestationnel du nouveau-né moyen prématuré est compris entre
A. [33-35] semaines d'aménorrhée. ☐ C. [33-35] semaines d'aménorrhée. ☐
B. [33-35] semaines d'aménorrhée. ☐ D. [33-35] semaines d'aménorrhée. ☐

73. Le nouveau-né prématuré rattrape son retard pondéral entre
A. 9 et 12 mois. ☐ B. 6 et 9 mois. ☐ C.3et 6 mois. ☐ D. 1 et 3 mois. ☐

74. Les observations suivantes sont des critères de sortie d'hospitalisation du nouveau-né prématuré, sauf une. Laquelle?
A. Température 36,8^0 Celsius. ☐ C. Fréquence cardiaque 120 batt/ min. ☐
B. Coloration rose . ☐ D. Fréquence respiratoire 67 cycles/ min. ☐

75. La principale cause de détresse respiratoire du nouveau-né normal né par césarienne avant le travail est
A. Retard de résorption liquide alvéolaire. ☐ C. Infection bactérienne néonatale. ☐
B. Maladie des membranes hyalines. ☐ D. Inhalation du liquide amniotique. ☐

76. Le lait mature est produit chez la mère allaitante à partir de
A. 1 semaine. ☐ B. 2 semaines. ☐ C. 3 semaines. ☐ D. 4 semaines. ☐

77. Les affirmations suivantes ont un lien avec la prolactine au cours de l'allaitement, sauf une. Laquelle ?
A. Produit au niveau de la posthypophyse. ☐ C. Favorise la sécrétion du lait. ☐
B. Produit lors de la succion du mamelon. ☐ D. Agit au niveau des acini. ☐

78. Au cours de la surveillance de l'enfant allaité, la prise de poids normale est comprise entre
A. 25 à 30 grammes/jour. ☐ C. 15 à 20 grammes/jour. ☐
B. 20 à 25 grammes/jour. ☐ D. 10 à 15 grammes/jour. ☐

79. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à
A. 10 mois. ☐ B. 12 mois. ☐ C.14 mois. ☐ D.16 mois. ☐

80. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa taille de naissance à :
A. 48 mois. ☐ B. 60 mois. ☐ C. 24 mois. ☐ D. 36 mois. ☐

81. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa surface corporelle à:
A. 10 mois. ☐ B.12 mois. ☐ C.9 mois. ☐ D.3 mois. ☐

82. CG a développement psychomoteur normal. À 3mois CG
A. Maintien sa tête dans l'axe. ☐ C. Pince pouce indexe. ☐
B. Porte les objets à la bouche. ☐ D. A peur de l'étranger. ☐

83. À 15 mois le nourrisson a les acquisitions psychomotrices suivantes, sauf une. Laquelle ?
A. Tape le pied dans un ballon. ☐ C. Gribouille. ☐
B. S'agenouille et se relève seul. ☐ D. Monte les escaliers à 4 pattes. ☐

84. Un nourrisson de 24 mois né à terme et correctement nourri a comme acquisition psychomotrice
A. Copie un rond. ☐ C. Dessine une croix. ☐
B. Fait du tricycle. ☐ D. Apparition du complexe d'Œdipe. ☐

85. Les complications des vomissements chez le nourrisson sont les suivantes, sauf une. Laquelle ?
A. Fausse route. ☐ C. Déshydratation. ☐
B. Dénutrition. ☐ D. Septicémie. ☐

86. L'effet secondaire à craindre lors de l'administration d'un antiémétisant chez le nourrisson qui vomit est
A. Syndrome métabolique. ☐ C. Syndrome pyramidale. ☐
B. Syndrome extrapyramidal. ☐ D. Syndrome péritonéal. ☐

87. Les facteurs suivants, liés à l'environnement, favorisent la diarrhée sauf un. Quel ce facteur
A. Retard à la consultation. ☐ C. Pauvreté. ☐
B. Sevrage précoce. ☐ D. Substitut de lait maternel. ☐

88. TG, 12 mois, consulte pour diarrhée. Vous retrouvez chez lui des signes évidents de déshydratation. Le plan de réhydratation pour la prise en charge de TG est :
A. Plan A. ☐ B. Plan B. ☐ C. Plan C. ☐

89. Expliquer à Mme Kouadio pourquoi son nouveau-né, né le 16 Février 2020, est passé de 3250g à 3015g au bout de 04 jours. La bonne réponse.
A. L'élimination des selles uniquement. ☐
B. La déperdition d'eau par la peau. ☐

C. La faible alimentation des premiers jours, due à la montée laiteuse abondante. ☐

90. Les précautions à prendre avant l'examen du nouveau-né sont :

A. Un environnement calme et apaisant. ☐ D. Porter les gants stériles. ☐

B .L'installer sur une lampe chauffante. ☐ E. une salle bien éclairée. ☐

C. Ouvrir portes et fenêtres. ☐

91.Le périmètre crânien à la naissance est de 35 et 36 cm pus il augmente :la bonne réponse

A. De 2 cm de la naissance à 3 mois. ☐ C. De 3 cm de 3 mois à 6 mois. ☐

B. De 1 cm de 6 mois à 12 mois. ☐ D. De 1 cm de 4 mois à 24 mois. ☐

92. Mme Kouadio viendra peser son enfant à la date suivante: la bonne réponse

A. Le 22 Février 2020. ☐ C. Le 23 Février 2020. ☐

B. Le 24 Février 2020. ☐ D. Le 25 Février 2020. ☐

93.Les éléments quantitatifs de la croissance de l'enfant sont : la bonne réponse

A. Le poids, la taille, le périmètre crânien, le périmètre thoracique, le périmètre brachial. ☐

B. Le Z score, le poids, la taille et le peintre crânien. ☐

C. La croissance des os, la taille, le périmètre thoracique. ☐

D. La fermeture de la fontanelle antérieure, la dentition. ☐

94. Un nouveau-né est : deux bonnes réponses

A. Un être humain vivant dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours. ☐

B. Un enfant qui a un âge compris entre 0 et 28 jours. ☐

C. Un être vivant dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours. ☐

D. Un être vivant dont l'âge est compris entre 0 et 1 mois. ☐

95. La perte de poids physiologique est la conséquence de :la mauvaise réponse

A. L'hérédité. ☐ C. L'élimination du méconium. ☐

B. La post-maturité. ☐ D. La prématurité. ☐

96. Les éléments suivants font partie du tableau d'APGAR : deux bonnes réponses

A- La fréquence cardiaque. ☐ C. Les pleurs. ☐

B- Le réflexe de succion. ☐ D. La respiration. ☐

97. L'évolution pondérale de l'enfant se fait de la manière suivante de la naissance à trois (3) mois : la bonne réponse

A. 0-3mois, il prend en moyenne 25 à 30 mg/jour. ☐ C. 0-3mois, il prend en moyenne 10 mg/jour. ☐

B. 0-3mois, il prend en moyenne 15 mg/jour. ☐ D. 0-3mois, il prend en moyenne 20 mg/jour. ☐

98. Pour apprécier la maturation des os, l'argent de santé utilise : la bonne réponse

A. Poids et taille. ☐ C. Poids et périmètre brachial. ☐

B. Eruption des dents et fontanelle. ☐ D. Poids et périmètre crânien. ☐

99. Une des activités de l'agent de santé dans un centre de santé périphérique en cas d'accouchement d'un prématuré dont le poids de naissance est en dessous de 2400 et présentant une détresse vitale est :la bonne réponse

A. Faire les soins habituels. ☐ C. Administrer 5mg de vitamine k1 en IM. ☐

B. Le réchauffer. ☐ D. Donner un rendez-vous à la mère pour vacciner le nouveau-né. ☐

100. À l'âge de 9 mois, l'enfant est capable de : la bonne réponse

A. Marcher sans aide. ☐ C. Dire papa et maman. ☐

B. Faire bravo et au revoir. ☐ D. Pointer du doigt. ☐

101. Le gain de poids journalier du nouveau-né nourri au sein est compris entre : la bonne réponse.

A. 15 et 20 gramme. ☐ B. 10 et 15 gramme. ☐ C. 20 et 25 gramme. ☐ D. 25 et 30 gramme. ☐

102. La pesée se fait : la bonne réponse

A. Une fois par semaine le 1er semestre. ☐

B. Deux fois par mois le 3ème mois. ☐

C. Trois fois par mois le 2ème mois. ☐

D. Une fois tous les trois mois à partir de 13 mois jusqu'à 24 mois. ☐

1***03. À la naissance, le périmètre crânien est de 35 à 36 cm : la bonne réponse***

A. De 0 à 3 mois, il augmente de 2 cm par mois. ☐

B. Il augmente de 0,5 cm par mois de 3 à 6 mois. ☐

C. De 6 à 12 mois, il augmente de 0,25 cm par mois. ☐

D. A l'âge adulte, il augmente d'un 1 cm par mois. ☐

104. La principale complication immédiate de la diarrhée aiguë du nourrisson est la

D. Dysenterie. ☐ C. Déshydratation. ☐
E. Dénutrition. ☐ D. Septicémie. ☐

105. Le grand prématuré à un âge gestationnel compris entre

A. [28-32] semaines d'aménorrhée. ☐ C. [28-30] semaines d'aménorrhée. ☐
B. [28-33] semaines d'aménorrhée. ☐ D. Autre. ☐

105. Le nourrisson est un enfant dont I 'âge est compris entre

A. 1et 12 mois. ☐ C. 0 et 23 mois. ☐ E. 1 et 24 mois. ☐
B. 0 et 25 mois. ☐ D. 1 et 23 mois. ☐

106. En 2016, la population ivoirienne était estimée à 23 740 424 HA. La proportion d'enfant de 0-14 ans était estimée à:

A. 36%. ☐ B. 38%. ☐ C.42%. ☐ D. 35%. ☐

107. Pour décider de la sortie d'hospitalisation du prématuré, je m'assure que la fréquence cardiaque est comprise entre :

A. 120 et 100 battements/minutes. ☐ C. 80 et 100 battements/minutes. ☐
B. 90 et 100 battements/minutes. ☐ D. 70 et 100 battements/minutes. ☐

108. La principale complication métabolique du nouveau-né prématuré est

A. Hypomnésie. ☐ B. Hypoglycémie. ☐ C. Hypocalcémie. ☐ D. Hyponatrémie. ☐

109. CL est âgé de 4 ans et mesure 100cm. Il n'a eu aucun problème de croissance. Sa taille de naissance était de

A. 51 cm. ☐ B. 50 cm. ☐ C. 49 cm. ☐ D. 48 Cm. ☐

110. LM est âgé de 12 mois et pèse 9 kilogramme. Son poids de naissance était de

A. 3250g. ☐ B. 3150. ☐ C. 300g. ☐ D.3100g. ☐

111. Le nouveau-né normal à

A. Un lobule de l'oreille ourlée. ☐ D. Un poids de 2400g. ☐
B. Une fontanelle bombée. ☐ E. Un nodule mammaire de 2mm. ☐
C. Une couleur rose foncée. ☐

112. En Côte d'ivoire, la principale cause de l'hospitalisation et décès du nouveau-né est

A. Infection néonatale. ☐ B. Anémie néonatale. ☐ C. ictère néonatale. ☐ D. Paludisme néonatal. ☐

113-L'adolescent est un enfant dont l'âge est compris entre

A. 13 et 17 ans. ☐ B. 13 et 19 ans. ☐ C. 13 et 18 ans. ☐ D. 13 et 20 ans. ☐

114. En Côte d'ivoire, les prophylaxies recommandées à la femme enceinte sont

A. Paludisme + anémie + tétanos. ☐ C. Syphilis + toxoplasmose + rubéole. ☐
B. VIH +infection génitale + méningite. ☐ D. Hépatite + coqueluche + diphtérie. ☐

115. Le tétanos néonatal est dans la majorité des cas provoquée par

A. L'injection de la vitamine K1. ☐ C. La circoncision. ☐
B. Les soins du cordon ombilical. ☐ D. L'excision clandestine. ☐

116. Le poids de naissance du nouveau-né normal est compris entre

A. 2500g et 3500g. ☐ B. 2500g et 3800g. ☐ C. 2500g et 3700g. ☐ D. 2500g et 4000g. ☐

117-Le nouveau-né de Michelle est malade, je l'accompagne en radiologie du thorax. Cet acte de soins figure dans mes rôles ;

A. Propre. ☐ B. Délégué. ☐ C. Collaboration. ☐ D. Conseils et préventions. ☐

118-Parmi les actes de soins au nouveau-né suivant, un seul fait partie du rôle délégué de l'agent de santé. Quel est cet acte ?

A. Placer le bébé dans la couveuse. ☐ C. Prendre la température du bébé. ☐
B. Accompagné en diététique. ☐ D. Administrer la vitamine k1 en IM. ☐

119. HL, sexe féminin dessine un carré, fait de la bicyclette sans roue latérale et connait les couleurs. HL a la performance psychomotrices d'un enfant de ;

A. 3 ans. ☐ B. 4 ans. ☐ C. 6 ans. ☐ D. 2 ans. ☐

120. PH est âgé de 7 ans. Il a une croissance normale. Le poids idéal théorique de PH est ;

A. 24 kg. ☐ B. 20 Kg . ☐ C. 22 kg. ☐ D. 26 kg. ☐

121. Les signes suivants témoignent d'une immaturité du nouveau-né sauf un. Quel est ce signe ?

A. Lanugo au dos. ☐ C. Cartilage du lobule de l'oreille. ☐
B. Nodule mammaire ≤4mm. ☐ D. Vernix caseosa sur le corps. ☐

EPREUVE D'ETUDE DU MILIEU

Partie 1: ***QCD*** cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1- l'étude du milieu n'est pas dévolue aux seuls agents de santé. **A**☐ **B**☐
2- La photographie n'a aucun intérêt en monographie. **A**☐ **B**☐
3- La présence des cantines fonctionnelles dans une école fait partie des informations sanitaires et épidémiologiques de la localité. **A**☐ **B**☐
4- L'âge fait partie des facteurs psychologiques favorisant la maladie. **A**☐ **B**☐
5- L'étude du milieu est l'étude de la connaissance d'une région, d'un milieu culturel donné dans toutes les dimensions physiques, sociales, économiques, culturelles et spirituelles. **A**☐ **B**☐
6- Pendant l'étude du milieu des différents facteurs pouvant agir sur la santé, l'attitude à développer par le personnel de santé est I 'observation et I 'information . **A**☐ **B**☐
7- Les différents facteurs pouvant agir sur la santé sont au nombre de quatre. **A**☐ **B**☐
8- Les facteurs biologiques sont regroupés en deux facteurs qui sont les facteurs physiologiques et les Facteurs psychologiques. **A**☐ **B**☐
9- Les facteurs biologiques sont tous les aspects de la santé physique et mentale dont l'origine est à l'extérieur de l'organisme. **A**☐ **B**☐
10- Le fonctionnement correct de tous les organes, le patrimoine génétique correct et complet et I'absence de troubles métaboliques sont les facteurs psychologiques favorisant la santé. **A**☐ **B**☐
11- L'absence de troubles psychiques, affection parentale durant l'enfance, satisfaction du besoin d'être aimé, du besoin d'estime de soi, du besoin d'être reconnu, le sevrage bien conduit et l'éducation adéquate de I 'enfant sont des facteurs physiologiques favorisant la santé. **A**☐ **B**☐
12- Les facteurs de l'environnement physique ou socio-économico-culturels sont l'ensemble des décisions de la population qui ont des répercussions positives sur la santé. **A**☐ **B**☐
13- L'existence d'un habitat salubre, l'existence d'eau courante, SMIG raisonnable sont des facteurs de I 'environnement physique favorisant la santé. **A**☐ **B**☐
14- Les facteurs qui favorisent la maladie ne peuvent pas être internes et externes. **A**☐ **B**☐
15- L'âge, le genre, I 'aspect physique et l'absence d'immunité naturelle ou acquise sont les facteurs physiologiques ou constitutionnels favorisant la maladie. **A**☐ **B**☐
16- Le chômage, les soucis, I 'ignorance et l'alcoolisme sont des facteurs psycho-économico socio-culturels favorisant la maladie. **A**☐ **B**☐
17- Les facteurs environnementaux ou de nuisance sont l'ensemble des facteurs qui proviennent du milieu intérieur et qui favorisent I 'attaque de l'organisme par des agents pathogènes ou physiques. **A**☐ **B**☐
18- L'eau polluée et non portable, ordures, promiscuité, mauvaise évacuation des excréta et des eaux usées sont les facteurs environnementaux ou de nuisance favorisant la maladie. **A**☐ **B**☐
19- Les microbes, les parasites, les traumatismes et les brulures sont les facteurs déterminant la maladie . **A**☐ **B**☐
20- Le document monographique permet d'avoir à coup d'œil sur le tableau de bord du centre de santé ou de la structure sanitaire et toutes les informations utiles et nécessaires concernant l'aire sanitaire ou le bassin desserte. **A**☐ **B**☐
21- Le document monographique permet d'être en parfaite harmonie et de vivre en symbiose avec la population pour laquelle l'agent de santé travaille. **A**☐ **B**☐
22- La cartographie du centre est l'activité qui consiste à dessiner la carte de l'air sanitaire. **A**☐ **B**☐
23- Les données relatives à l'identification du centre constituent la carte d'identité de la structure sanitaire. **A**☐ **B**☐
24- La date d'ouverture du centre de santé et la dénomination de la structure de santé constituent les données relatives à l'éducation. **A**☐ **B**☐
25- L'étude monographique constitue pour l'agent de santé un outil essentiel de sa performance et de son efficacité. **A**☐ **B**☐
26- Au-delà des soins classiques, le professionnel de santé exerçant dans un milieu social donné doit être un agent de développement . **A**☐ **B**☐
27- La connaissance des hommes et de son environnement dans laquelle ils vivent n'a aucun impact sur leur prise en charge sanitaire. **A**☐ **B**☐
28- L'étude du milieu est un outil d'efficacité et non d'efficience. **A**☐ **B**☐
29- La stratégie fixe consiste le déplacement de l'agent de santé dans les villages voisins pour des soins. **A**☐ **B**☐

30- Le bassin de desserte autorise un rayon de 20 kilomètre . . **A** ☐ **B** ☐
31- L'intervention de l'agent de santé dans un rayon de 5 à 15 kilomètre est qualifiée de stratégie avancée. **A** ☐ **B** ☐
32- L'intervention du district sanitaire en dessous de 15 kilomètre du CSR et CSU est qualifiée de la stratégie mobile. **A** ☐ **B** ☐
33- La maitrise de I 'hydrographie est inutile dans la monographie. **A** ☐ **B** ☐
34- La zone de silence est : les localités situées moins de 10 kilomètres dotées d'établissements sanitaire. **A** ☐ **B** ☐
35- L'absence de troubles métaboliques est un facteur psychologique du facteur biologique favorisant la santé. **A** ☐ **B** ☐
36- L'existence d'un habit insalubre est un facteur de l'environnement physique, socio-économique et culturel favorisant la santé. **A** ☐ **B** ☐
37- L'aspect physique est un facteur psychologique, économique et socio-culturel déterminant la maladie. **A** ☐ **B** ☐
38- En étude du milieu, L'observation et le dialogue consiste à garder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu. . **A** ☐ **B** ☐
39- Disposer des données fiables et récentes sur la population est un avantage d'une étude du milieu. **A** ☐ **B** ☐
40- L'étude du milieu permet au professionnel de santé de vivre en parfaite harmonie et en symbiose avec la population. **A** ☐ **B** ☐
41- La cartographie permet de délimiter I 'aire sanitaire ou le bassin de desserte. **A** ☐ **B** ☐
42- Le nombre de technicien supérieurs de santé est une information relative aux ressources humaines. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 QCM :</u> cochez la ou les bonnes réponses

43- Les facteurs environnementaux ou de nuisance :
A- évacuation hygiénique des excréta et les eaux usées. ☐
B- eau traitée et ou potable. ☐
C- abondance ou déséquilibre de la ration budgétaire. ☐
D- état défectueux des infrastructures routières ; etc. ☐

44- Facteurs de l'environnement physique favorisant la santé:
A- L'existence de promiscuité, de pollution. ☐ C. L'existence d'un habitat salubre. ☐
B- l'absence d'eau courante. ☐ D. un milieu insalubre. ☐

45- Les facteurs déterminants la maladie sont :
A- les bruits. ☐ B. Le tabagisme. ☐ C. Les brulures. ☐ D. Les cellules métaboliques. ☐

46- Les facteurs psychologiques favorisant la santé :
A- un sevrage bien conduit. ☐
B- Une absence de troubles physiques. ☐
C- une affection parentérale durant I 'enfance. ☐
D- l'insatisfaction du besoin d'être aimé du besoin d'estime de soi, du besoin d'être reconnu. ☐

47- Les facteurs physiologiques favorisant la santé
A- fonctionnement incorrect de tous les organes : foie, cœur, tube digestif, vaisseaux, cerveau. ☐
B- patrimoine génétique correct et incomplet. ☐
C- absence de troubles métaboliques : diabète. ☐
D- apport anormal des éléments physiologiques : air, oxygène, nourriture. ☐

48- L'étude du milieu de vie des communautés, permet à l'agent de santé d'être:
A- un acteur ignorant les besoins réels de la communauté et répondant à son aspiration. ☐
B- un acteur travaillant uniquement en milieu hospitalier. ☐
C- un acteur travaillant uniquement en milieu extrahospitalier. ☐
D- un acteur travaillant uniquement en milieu hospitalier qu'en milieu extrahospitalier. ☐

49- Indiquez le (ou les éléments) qui n'appartient (nent) pas aux facteurs environnementaux de nuisance :
A- la promiscuité. ☐ B. Le chômage. ☐ C. L'eau polluée. ☐ D. Les bruits. ☐

50- Les facteurs psychologiques favorisant la maladie :
A- l'existence d'immunité naturelle ou acquise. ☐ C. Le chômage. ☐
B- l'ignorance. ☐ D. La promiscuité. ☐

☐

51- Ce facteur n'est pas au nombre de ceux pouvant agir sur la santé

A- facteurs favorisant la santé. ☐ C. Facteur favorisant la maladie. ☐

B- facteurs déterminant la santé. ☐ D. Facteur déterminant la maladie. ☐

52- Les facteurs psychologiques favorisant la santé :

A- absence de trouble physiques. ☐ C. Défection parentale durant l'enfance. ☐

B- satisfaction du besoin de boire, manger et respirer. ☐ D. éducation adéquate de l'enfant. ☐

53- La monographie se définit comme étant une étude :

A- de la santé des populations d'une région donnée. ☐

B- Sur un point spécial de l'histoire, de la science d'un milieu culturel donné. ☐

C- de la reconnaissance des hommes vis-à-vis de 'environnement dans lequel ils vivent. ☐

D- de la connaissance d'une région dans toutes ses dimensions. ☐

54- Les facteurs relatifs au terrain ou à l'organisme humain

A- statut matrimonial. ☐

B- ensemble des savoirs (savoir, savoir être et savoir-faire). ☐

C- aspect physique : maigreur et embonpoint. ☐

D- absence d'immunité naturelle ou acquise. ☐

55- Les facteurs physiologiques favorisant la santé

A. Fonctionnement approximatif de tous les organes : foie, cœur, tube digestif, vaisseaux. ☐

B. patrimoine génétique correct et complet. ☐

C. une absence de troubles métaboliques : diabète. ☐

D. apport normal des éléments psychologiques. ☐

56- La monographie ou étude du milieu peut être définie comme:

A- l'étude des populations d'une région donnée. ☐

B- une étude sur un point spécial de l'histoire, de la science, sur un milieu culturel donné. ☐

C- la connaissance des hommes et des animaux de leur environnement. ☐

D- l'ensemble des infrastructures sanitaires d'une région donnée. ☐

57- La cartographie permet de:

A- délimiter l'aire sanitaire ou bassin de desserte. ☐

B- proposer des informations sur les voies de communication et les infrastructures. ☐

C- d'attribuer le nom de la localité où est implantée la structure sanitaire. ☐

D- délocaliser facilement les différents problèmes sanitaires de la localité. ☐

58- Les facteurs psychologiques favorisant la santé sont :

A- l'absence de promiscuité, de pollution. ☐

B- une éducation adéquate de l'enfant. ☐

C- l'existence de moyens de communication acceptables. ☐

D- la satisfaction du besoin de s'occuper et de se rendre utile. ☐

59- Pendant l'étude des différents facteurs le personnel de santé devrait être capable de :

A- pousser les habitants à demeurer eux-mêmes, sans changement à leur existence. ☐

B- pousser les habitants à ignorer les possibilités d'amélioration de leur vie. ☐

C- exploiter les informations sur la communauté et d'en tirer profits. ☐

D- réprimander les habitants sur les écarts de comportement. ☐

60- La stratégie mobile se définit sur :

A- 0 à 5 km. ☐ B- 10 à 15 km. ☐ C- 0 à 15 km. ☐ D- Plus de 15 km. ☐

61- L'aire sanitaire ou :

A- Bassin de desserte. ☐ B- Bassin de déserte. ☐ C- Bassine de desserte. ☐

62- Les informations relatives à l'éducation et à la formation professionnelle :

A- Le nombre d'écoles. ☐ C- Le nombre des enseignants. ☐

B- Le nombre de cantines scolaires. ☐ D- Le nombre de marché. ☐

63- Les facteurs du milieu pouvant agir sur la santé sont:

A- les facteurs du milieu favorisants la santé. ☐

B- les facteurs du milieu déterminants la santé. ☐

C- les facteurs du milieu favorisants la maladie. ☐

D- Les facteurs du milieu déterminants la maladie. ☐

EPREUVE DE SEMIOLOGIE MEDICALE

Partie 1: ***QCD*** cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Le Pyrosis survient généralement en postprandial. **A** ☐ **B** ☐
2. L'Hématémèse est l'extériorisation de sang rouge ou noir par la bouche lors d'un effort de vomissemen. **A** ☐ **B** ☐
3. Le signe du lacet est une dysphagie à type de serrement. **A** ☐ **B** ☐
4. La dysphagie est une sensation d'obstacle à la progression du bol alimentaire entre la bouche et le Rectum. **A** ☐ **B** ☐
5. Le syndrome dyspepsique est caractérisé par un ballonnement et des douleurs épigastriques post Prandiales . **A** ☐ **B** ☐
6. Une colique est une infection du côlon. **A** ☐ **B** ☐
7. L'Hématémèse traduit une hémorragie digestive basse. **A** ☐ **B** ☐
8. La dysphagie a une irradiation rétro sternale. **A** ☐ **B** ☐
9. L'œsophagite est une sensation non douloureuse de l'œsophage. **A** ☐ **B** ☐
10. Le reflux gastro-œsophagien est la remontée de nourriture dans l'œsophage. **A** ☐ **B** ☐
11. Les vomissements sont des rejets par la bouche du contenu du tube digestif. **A** ☐ **B** ☐
12. La Diarrhée est l'émission quotidienne fréquente de selles molles ou liquides et en quantité trop Abondante. **A** ☐ **B** ☐
13. Un effort de vomissements est caractérisé par des contractions douloureuses des muscles abdominaux. **A** ☐ **B** ☐
14. La dysurie est une anomalie de la miction qui traduit un obstacle vésical, prostatique ou urétral. **A** ☐ **B** ☐
15. Un ictère est dû à une augmentation du taux de bilirubine plasmatique. **A** ☐ **B** ☐
16. Le syndrome ulcéreux est caractérisé par la douleur duodénale. **A** ☐ **B** ☐
17. Une ascite est un épanchement liquidien intra-duodénal. **A** ☐ **B** ☐
18. La constipation est l'émission de selles de faible abondance et de consistance peu solide. **A** ☐ **B** ☐
19. Le Pyrosis est une douleur à type de brûlure épigastrique. **A** ☐ **B** ☐
20. Pyrosis est le signe clinique de l'œsophagite. **A** ☐ **B** ☐
21. Un ictère est une coloration bleuâtre de la peau et des muqueuses, liée à une augmentation du taux d'insuline sécrétée par le pancréas. **A** ☐ **B** ☐
22. Lipothymie est une sensation passagère de malaise qui n'aboutit pas à la perte de connaissance du patient . **A** ☐ **B** ☐
23. La syncope est une perte de connaissance partielle et brève avec chute de sa hauteur et récupération spontanée du patient. **A** ☐ **B** ☐
24. La Nycturie est l'augmentation du volume des urines pendant la nuit. **A** ☐ **B** ☐
25. L'appareil digestif haut est composé de plusieurs organes dont : La cavité buccale, L'œsophage, L'estomac. Le duodénum . **A** ☐ **B** ☐
26. La dysphagie est la sensation d'obstacle à la progression du bol alimentaire entre la bouche et l'estomac et siège au niveau thoracique et rétrosternal. **A** ☐ **B** ☐
27. La hernie hiatale est une protrusion permanente ou intermittente d'une partie de l'estomac dans le thorax à travers le hiatus œsophagien du diaphragme. **A** ☐ **B** ☐
28. La nosologie est la classification des maladies. **A** ☐ **B** ☐
29. Le signe pathognomonique d'une maladie est un signe dont sa seule présence suffit à affirmer la maladie. **A** ☐ **B** ☐
30. On parle d'oligurie lorsque le volume d'urine est inférieur 500 ml/24h. **A** ☐ **B** ☐
31. l'ankylose est la disparition complète des mouvements de l'articulation. **A** ☐ **B** ☐
32. l'amyotrophie est la diminution du volume du muscle. **A** ☐ **B** ☐
33. L'Hématémèse traduit une hémorragie digestive basse. **A** ☐ **B** ☐
34. la dysphagie a une irradiation rétro sternale. **A** ☐ **B** ☐
35. L'œsophagite est une sensation non douloureuse de l'œsophage. **A** ☐ **B** ☐
36. Le reflux gastro-œsophagien est la remontée de nourriture dans L'œsophage. **A** ☐ **B** ☐
37. Les vomissements sont des rejets par la bouche du contenu du tube digestif. **A** ☐ **B** ☐
38. Le Pyrosis survient généralement en postprandial. **A** ☐ **B** ☐

39. L'Hématémèse est l'extériorisation de sang rouge ou noir par la bouche lors d'un effort de vomissement. **A** ☐ **B** ☐
40. Le signe du lacet est une dysphagie à type de serrement. **A** ☐ **B** ☐
41. la pollakiurie est une anomalie de la continence qui est caractérisée par une fréquence anormalement élevée des mictions sans augmentation de la diurèse. **A** ☐ **B** ☐
42. La polyurie est une anomalie de la miction caractérisée par une diurèse au-dessus de 3 litres /24h. **A** ☐ **B** ☐
43. L'hématémèse est du sang rouge ou noir rejeté par la bouche et provenant des voies digestives hautes. **A** ☐ **B** ☐
44. L'hémoptysie est du sang rejeté par le nez et provenant des voies respiratoires. **A** ☐ **B** ☐
45. Le méléna est une expulsion du sang digéré par l'anus dont l'origine est le rectum. **A** ☐ **B** ☐
46. La syncope est une perte de connaissance complète, brève avec chute et récupération spontanée. **A** ☐ **B** ☐
47. La douleur testiculaire est de siège sous-pubien, profonde, très vive irradiant vers l 'aine et la fosse Iliaque **A** ☐ **B** ☐
48. La diurèse est la qualité des urines émise en 24 heures. **A** ☐ **B** ☐
49. La diarrhée est l'évacuation trop fréquente de selle trop liquide. **A** ☐ **B** ☐
50. la pollakiurie est une anomalie de la continence qui est caractérisée par une fréquence anormalement élevée des mictions sans augmentation de la diurèse. **A** ☐ **B** ☐
51. Les symptômes subjectifs sont les manifestations de la maladie révélés par l'examen clinique. **A** ☐ **B** ☐
52. L'interrogatoire est une étape facultative de la prise en charge du patient. **A** ☐ **B** ☐
53. Une fréquence respiratoire de 10 à 16 cycles par minute sans pause est une dyspnée. **A** ☐ **B** ☐
54. L'âge est une cause indirecte de la maladie. **A** ☐ **B** ☐
55. La pleurésie purulente est une cause de vomique. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 Q CM</u> : *cochez-la ou les bonnes réponses*

56. L'angiocholite est une inflammation :

A. des voies hépatiques ☐ C. des voies vésicales ☐
B. des voies biliaires ☐ D. des voies cystiques ☐

57. Deux des signes suivants sont à la fois des signes cardiovasculaires et des signes respiratoires :

A. Dysphagie ☐ C. hémoptysie ☐ E. expectoration ☐
B. Nycturie ☐ D. dyspnée ☐ F. vomique ☐

58. Un ensemble de malaises digestifs qui associent une impression de plénitude gastrique, ou de digestion prolongée, ou de pesanteur abdominale est l'expression de

A. un reflux gastro œsophagien ☐ C. un syndrome dyspepsique ☐
B. une colique hépatique ☐ D. une douleur précordiale ☐

59. L'hématurie est la présence :

A. d'hématies dans les urines ☐ C. de pus dans les urines ☐
B. de leucocytes dans les urines ☐ D. de sang dans les urines ☐

60. Laquelle des affirmations suivantes est juste ?

A. la péricardite aigue s'accompagne de fièvre contrairement à l 'infarctus du myocarde ☐
B. l'embolie pulmonaire s'accompagne de toux sans tachypnée ☐
C. L'expectoration est une manifestation normale qui témoigne d'une affection broncho pulmonaire ☐
D. la vomique est une expectoration purulente brutale et massive ☐

61. Lequel des signes suivants est une précordialgie cardiaque .

A. Cystalgie ☐ B. hépatalgie ☐ C. céphalalgie ☐ D. dysphagie ☐

62. L'un des signes ci-après est une anomalie de la miction

A. l'énurésie ☐ B. l'oligurie ☐ C. I 'incontinence ☐ D. I 'hématurie ☐

63. Lequel des signes suivants est une anomalie de la continence.

A. brûlure mictionnelle ☐ C. rétention vésicale ☐
B. pesanteur lombaire ☐ D. énurésie ☐

64. La colique néphrétique est une

A. douleur atroce vésicale et hépatique ☐ C. douleur de distension aigue de la voie d'excrétrice ☐
B. douleur intense et paroxystique sus pubienne ☐ D. douleur pénible de l'angle costo ☐

65. le mal de POTT est la localisation de la Tuberculose :

A. osseuse ☐ B. Pulmonaire ☐ C. Viscérale ☐ D. génito-urinaire ☐

66. l'angiocholite est une inflammation

A. des voies hépatiques ☐ B. des voies vésicales ☐ C. des voies biliaires ☐ D. des voies cystiques ☐

67. Les manifestations cliniques de l'hypertension portale associent 3 signes suivants :

A. une circulation veineuse collatérale abdominale ☐ C. une splénomégalie ☐

B. des varices œsophagiennes ☐ D. une hépatomégalie ☐

68. La protéinurie est la présence dans les urines de :

A. Sang ☐ B. Gaz ☐ C. Selles ☐ D. Albumine ☐

69. La fécalurie est la présence dans les urines de :

A. Sang ☐ B. Gaz ☐ C. Selles ☐ D. Albumine ☐

70. identifiez la bonne conduite devant un patient souffrant d'une dyspnée aigue :

A. je fais d'abord appel au médecin, ensuite je l'installe dans une bonne position respiratoire, enfin je prends ses constantes ☐

B. je prends d'abord ses constantes, ensuite je fais appel au Médecin enfin je l'installe dans une bonne position respiratoire ☐

C. je l'installe d'abord dans une bonne position respiratoire, ensuite je prends ses constantes enfin je fais appel au médecin ☐

D. je l'installe d'abord dans une bonne position respiratoire, ensuite je fais appel au médecin, enfin je prends ses constantes ☐

71. Les 4 temps obligatoires de la consultation sont

A. Inspection ☐ C. Palpation ☐ E. Percussion ☐

B. Diagnostic ☐ D. Prescription ☐ F. Auscultation appareil par appareil pour ne rien oublier ☐

72. Les 3 signes cliniques respiratoires fondamentaux* d'atteinte de l'appareil respiratoire qui doivent être connus *de l'infirmière sont :

A. La dyspnée ☐ C. La cyanose ☐ E. La toux ☐

B. L'hippocratisme digital ☐ D. Les Sueurs ☐

73. Parmi les propositions suivantes Cochez la valeur de la respiration

A. 25 Cycles/minute ☐ B. 24 Cycles/minute ☐ C. 20 Cycles/minute ☐ D. 16 Cycles/minute ☐

74- La prise de la température corporelle d'un patient donne $38^0$8C à la lecture directe au thermomètre. L' auxiliaire de soins veut consigner la température du malade sur la feuille de température. La valeur à noter sera :

A. 38°3 C ☐ B. 38°8 C ☐ C. 39°2C ☐ D. 39°3 C ☐

75. Devant une pathologie rhumatismale l'infirmer ou la sage-femme doivent.

A. en reconnaître les manifestations cliniques ☐

B. Lancer le bilan préliminaire de confirmation ☐

C. traiter les premiers signes liés à la douleur ☐

D. adresser systématiquement le client au spécialise ☐

76. La conduite infirmière devant une situation d'emphysème vise :

A. Les conseils hygiéno-diététiques ☐

B. Le traitement symptomatique ☐

C. Evaluation des besoins prioritaires non satisfaits ☐

D. La réhabilitation respiratoire ☐

E. traiter les premiers signes liés à la douleur ☐

F. La prise en charge des complications ☐

77. lequel des signes suivants est une anomalie de la continence :

A. brûlure mictionnelle ☐ C. rétention vésicale ☐

B. pesanteur lombaire ☐ D. énurésie ☐

78. il y a anurie si la diurèse est

A inférieure à 150 ml par 24 heures ☐ C. inférieure à 100 ml par 24 heures ☐

B. inférieure à 75 ml par 24 heures ☐ D. inférieure à 50 ml par 24 heures ☐

EPREUVE DE DIÉTÉTIQUE

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1- Colostrum est le lait maternel particulier que la femme produit et qui aide au démarrage de l'allaitement **A** ☐ **B** ☐

2- L'alimentation de remplacement éloigne très rapidement la mère de l'enfant en émoussant la communication, l'attachement et l'affection entre les deux êtres **A** ☐ **B** ☐

3- Les laits de vache semi liquides ont perdu 50% de leur teneur en eau **A** ☐ **B** ☐

4- L'hormone ocytocine libérée par le post hypophyse provoque la contraction des cellules alvéolaires qui propulsent le lait par les différents canaux conducteurs pour stagner dans le sinus lactifère **A** ☐ **B** ☐

5- Les seins, en plus d'être des organes sexuels secondaires, sont des organes de la lactation **A** ☐ **B** ☐

6- L'un des facteurs entravant le bon déroulement de 'allaitement serait la consommation d'une alimentation variée et équilibrée. **A** ☐ **B** ☐

7- Lait de transition, de couleur blanche, est plus fluide, riche en graisse et en sucre par rapport au colostrum **A** ☐ **B** ☐

8- L'alimentation de remplacement se définit comme le fait de nourrir l'enfant avec un lait autre que celui de sa mère. **A** ☐ **B** ☐

9- L'allaitement immédiat facilite I 'expulsion du placenta, par la succion de l'enfant; stimule les contractions utérines et réduit les risques d'hémorragie après l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐

10- Sous l'effet de la succion, le lait est éjecté dans la douche du bébé, par la compression du sinus lactifère **A** ☐ **B** ☐

11- Les canaux véhiculent le lait depuis son lieu de sécrétion jusqu'à son éjection. **A** ☐ **B** ☐

12- GL pèse 6 kg. Pour la préparation de son lait, il faut:150 ml d'eau bouillie tiédie + 5 meurettes de lait en poudre maternisé de 1er âge. **A** ☐ **B** ☐

13- Mme TK vient vous voir pour sillons creux autour du mamelon. Vous diagnostiquez les crevasses et conseillez de laisser les seins à l'air libre. **A** ☐ **B** ☐

14- L'allaitement exclusif est le fait de nourrir l'enfant uniquement avec le lait maternel jusqu'à 6 mois, sans apport de décoction, hormis l'eau et les médicaments prescrits. **A** ☐ **B** ☐

15- Le lait pré- terme : c'est le lait produit vers la voire 28ème semaine de gestation. **A** ☐ **B** ☐

16- Une mère vous dit que son bébé pleure après chaque tétée. Elle pense qu'elle n'a pas assez de lait. Vous concluez qu'il s'agit d'une hypogalactie. **A** ☐ **B** ☐

17-la structure du sein est constituée de lobes, les acini ou alvéoles et les différents canaux excréteurs **A** ☐ **B** ☐

18- Le lait maternel doit être donné à l'enfant autant de fois qu'il le réclame . **A** ☐ **B** ☐

19- Pour le bon déroulement de l'allaitement, la nourrice doit dormir paisiblement au moins 8 heures par jour, dans un environnement calme, en prenant soin de son corps avec des vêtements serrés. **A** ☐ **B** ☐

20- Dans la physiologie de la lactation, après l'expulsion du placenta, le taux d'œstrogène et de progestérone baisse considérablement entraînant la montée laiteuse sous le contrôle de l'hormone prolactine. **A** ☐ **B** ☐

21- La mise au sein doit se faire précocement dans les 15 à 30 mn qui suivent l'accouchement . **A** ☐ **B** ☐

22- La ration alimentaire de l'enfant se définit par la quantité d'aliment donnée à l'enfant répartie au cours de la journée . **A** ☐ **B** ☐

23- La bonne pratique de l'allaitement nécessite que l'enfant soit laissé au sein jusqu'à ce qu'il soit rassasié et réserver l'autre sein pour la tétée suivante; même s'il réclame les deux seins à chaque tétée. **A** ☐ **B** ☐

24- Le colostrum qui est de couleur jaune ou d'apparence claire et de consistance épaisse, constitue un excellent laxatif pour le bébé. **A** ☐ **B** ☐

25- Sur le plan anatomique, le sein comporte deux parties. **A** ☐ **B** ☐

26- Dans la physiologie de la lactation, I 'hormone chef de file de la production du lait est la prolactine. **A** ☐ **B** ☐

27- Pour l'alimentation de l'enfant infecté par le VIH, il est recommandé d'allaiter exclusivement pendant 6 mois après la naissance et poursuivre l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. **A** ☐ **B** ☐

28- Le ramollissement du sein après la tétée, est le signe d'une tétée efficace. **A** ☐ **B** ☐

29- Soulager la mère, entretenir la lactation et nourrir l'enfant sont des indications de l'extraction du lait. **A** ☐ **B** ☐

30- Pour la préparation du bol de lait d'un nourrisson de 10 mois avec du lait sec en poudre maternisé, nous avons besoin de : 240 ml d'eau bouillie tiédie +8 meurettes de lait en poudre maternisé de 2ème âge. **A** ☐ **B** ☐

31- L'enfant doit vider bien le premier sein avant de lui donner le second. **A** ☐ **B** ☐

32- Le lait maternel contient les anticorps qui protègent le nourrisson et favorise sa croissance et son développement harmonieux. **A** ☐ **B** ☐

33- Le retard dans la mise en route de l'allaitement est le facteur favorisant de l'engorgement mammaire. **A** ☐ **B** ☐

34- Le sigle AFADS signifie : Acceptable, Faisable, Accessible, Durable et Sûre. **A** ☐ **B** ☐

35- Pour réussir l'alimentation de remplacement les conditions AFADS doivent être réunies. **A** ☐ **B** ☐

36- J'observe le nourrisson dont le menton touche le sein de la mère et la bouche grandement ouverte, je conclus qu'il a une tétée efficace. **A** ☐ **B** ☐

37- Mme BM a les seins ombiliqués, pour faire ressortir le mamelon, je le tire doucement. **A** ☐ **B** ☐

38- Dans le contexte du VIH/SIDA, pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l 'alimentation de remplacement est exclusive dès la naissance jusqu'à 6 mois si les conditions AFADS sont réunies. **A** ☐ **B** ☐

39- Le revêtement cutané comprend l'aréole, le mamelon et les tubercules de Montgomery. **A** ☐ **B** ☐

40- La galactophorite est définie comme une infection des canaux lactifères apparaissant 3 à 4 jours après le début d'une lymphangite mal traitée. **A** ☐ **B** ☐

41- Mme WB consulte parce qu'elle a les seins plats. Je lui demande de déprimer l'aréole pour faire ressortir le mamelon. **A** ☐ **B** ☐

42- La bonne prise du sein par le nourrisson est caractérisée par la lèvre inférieure éversée au contact de l'aréole peu visible en haut et le menton touche le sein. **A** ☐ **B** ☐

43- La galactophorite est définie comme une infection des canaux lactifères apparaissant 3 à 4 jours après le début d'une lymphangite mal traitée. **A** ☐ **B** ☐

44- Pour l'alimentation de l'enfant infecté par le VIH, il est recommandé d'allaiter exclusivement pendant 6 mois après la naissance et poursuivre l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. **A** ☐ **B** ☐

45- Le lait maternel contient les antigènes qui protègent le nourrisson et favorise sa croissance et son développement harmonieux. **A** ☐ **B** ☐

46- Le colostrum qui est de couleur jaune ou d'apparence claire et de consistance épaisse, constitue un excellent laxatif pour le bébé. **A** ☐ **B** ☐

47- Après la tétée, la meilleure position que doit prendre l'enfant est la position de décubitus ventral. **A** ☐ **B** ☐

48- Après l'expulsion du placenta le taux d'estrogène et progestérone augmente considérablement entrainant la montée laiteuse sous le contrôle de l'hormone prolactine. **A** ☐ **B** ☐

49- Les canaux véhiculent le lait depuis son lieu de sécrétion jusqu'à son éjection. **A** ☐ **B** ☐

50. Lorsque la mère allaitante regarde avec attention et écoute le son émis par son enfant, cela déclenche chez elle la production de lait dans les seins. **A** ☐ **B** ☐

51- L'ocytocine est une hormone secrétée par la partie postérieure de l'hypophyse de la mère pour faire sortir le lait des seins. **A** ☐ **B** ☐

52. Pour la préparation du bol de lait d'un nourrisson de 6 mois 15 jours avec du lait sec en poudre maternisé, nous avons besoin de : 210 ml d'eau bouillie tiédie+7 meurettes de lait en poudre maternisé de 2ème âge. **A** ☐ **B** ☐

53- La prolactine est l 'hormone chef de file de la production du lait. **A** ☐ **B** ☐

54- La prolactine stimule l'éjection du lait au niveau des seins. **A** ☐ **B** ☐

55. La mise au sein précoce signifie que la mère met son enfant au sein durant les 24 premières heures de Vie. **A** ☐ **B** ☐

56- Le visage face au sein et le corps près de celui de la mère fait partie des critères d'une bonne position de 'enfant au sein. **A** ☐ **B** ☐

57- La structure du sein est constituée de lobes, les acini ou alvéoles et les différents canaux excréteurs. **A** ☐ **B** ☐

58- La mise au Sein précoce du nouveau-né favorise la perte de poids physiologique du nouveau-né . **A** ☐ **B** ☐

60- Une mère, ayant accouché d'un nouveau-né prématuré de 32 semaines d'aménorrhée, a un lait pré terme. **A** ☐ **B** ☐

61- L'allaitement immédiat facilite l'expulsion du placenta par la succion de l'enfant, stimule les

contractions utérines et réduit les risques d'hémorragie après l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐

62- Mme TK vient vous voir pour sillons creux autour du mamelon. Vous diagnostiquez les crevasses et conseillez de laisser les seins à l'air libre. **A** ☐ **B** ☐

63- Les différents canaux excréteurs de l'alvéole ou du mamelon sont : le canal alvéolaire et le canal intra et inter lobaire. **A** ☐ **B** ☐

64- La tétée est dite efficace lorsque l'enfant a le visage face au sein, la bouche grande ouverte et les joues bien rondes, remplies de lait . **A** ☐ **B** ☐

65- Le substitut du lait maternel doit être donné à l'enfant autant de fois qu'il le réclame. **A** ☐ **B** ☐

66-. Lait de transition, de couleur blanche, est plus fluide, riche en graisse et en sucre par rapport au colostrum. **A** ☐ **B** ☐

67 - La mère qui nourrit son bébé constamment au lait maternel n'a pas besoin de contraceptif pour éviter une grossesse indésirable. **A** ☐ **B** ☐

68- Le lait définitif ou mature est le produire vers les 6 jours d'après I 'accouchement. **A** ☐ **B** ☐

69- Les différents canaux excréteurs d'alvéole au mamelon sont le canal alvéolaire et le canal extra intra lobaire. **A** ☐ **B** ☐

70- La structure du sein est constituée de lobes, d'acini ou alvéoles et les différents canaux excréteurs. **A** ☐ **B** ☐

71- Le besoin en eau de l'enfant est de 80-100ml/kg. **A** ☐ **B** ☐

72- Lorsque la mère entend, voit ou pense à son bébé, la montée laiteuse peut se produire. **A** ☐ **B** ☐

73- L'aliment prépondérant c'est le fait de nourrit l'enfant en y ajoutant de l'eau et du jus. **A** ☐ **B** ☐

74- La contraction de l'utérus sous l'effet de I 'ocytocine entraine aussi l'hémostase physiologique après la délivrance. **A** ☐ **B** ☐

75- Le revêtement cutané comprend l'aréole, le mamelon et les tubercules de Montgomery. **A** ☐ **B** ☐

76- Le lait de vache liquide entier est un lait de 2ème âge. **A** ☐ **B** ☐

77- Les seins comportent 2 parties. **A** ☐ **B** ☐

78- L'allaitement exclusif c'est le fait de nourrit l'enfant au sein de sa mère. **A** ☐ **B** ☐

79- La position football américain est recommandée pour l'allaitement des jumeaux. **A** ☐ **B** ☐

80- Il est conseillé de faire un coupage pour le LVLE avant de donner à un nouveau-né 1 âge . **A** ☐ **B** ☐

81- Le colostrum est de couleur jaune d'apparence claire et de constance épaisse. **A** ☐ **B** ☐

82- L'allaitement exclusif est le fait de nourrir l'enfant uniquement avec le lait maternel sans ajout d'eau, de décoction, de jus de fruit, de lait, de tisane ou d'autres aliments à I 'exception des médicaments prescrits. **A** ☐ **B** ☐

83- Les canaux véhiculent le lait depuis son lieu de sécrétion jusqu'à son éjection. **A** ☐ **B** ☐

84- Le lait maternel est avantageux pour la mère et l'enfant. **A** ☐ **B** ☐

85- Le lait pré terme est secrété après la 2ème semaine d'aménorrhée. **A** ☐ **B** ☐

86- La succion du bébé provoque la compression du sinus lactifère et éjecte le lait dans la bouche. **A** ☐ **B** ☐

87- Le lait de vache liquide entier est conseillé au nouveau-né de 3 mois. **A** ☐ **B** ☐

88- Après l'expulsion du placenta le taux d'œstrogène et de progestérone baisse considérablement entrainant la montée laiteuse sous le contrôle de l'hormone prolactine. **A** ☐ **B** ☐

89. Le principe de la préparation du lait maternisé consiste à faire la constitution d'une mesurette pour 30ml d'eau. **A** ☐ **B** ☐

90- Le colostrum est riche en vitamine AEK, pauvre en protéines et en sels minéraux. **A** ☐ **B** ☐

91- Le muguet chez le nouveau-né constitue une difficulté de l'allaitement. **A** ☐ **B** ☐

92- La mastite est une complication de l'engorgement mammaire. **A** ☐ **B** ☐

93- Il y a quatre sortes de tire-lait. **A** ☐ **B** ☐

94- La nourrice doit éviter la position couchée avant trois mois. **A** ☐ **B** ☐

95. L'innervation du sein vient du plexus cervical superficiel et des nerfs intercostaux. **A** ☐ **B** ☐

96. Les tubercules de Montgomery sont des orifices qui s'ouvrent dans le mamelon. **A** ☐ **B** ☐

97- Pour les enfants de 24 à 59 mois vivant avec le VIH, il faut donner 3 à 4 repas équilibrés + 2 collations par jour. **A** ☐ **B** ☐

98- Un nourrisson de 7 à 8 mois Symptomatique sans perte de poids a 5 à 6 repas + un goûter par jour. **A** ☐ **B** ☐

99- On ne donne pas d'aliment lacté aux enfants de plus de 24 mois. **A** ☐ **B** ☐

100- Un nouveau-né infecté par le VIH peut être allaité exclusivement jusqu'à 6 mois. **A** ☐ **B** ☐

101- Le soutien-gorge serré peut favoriser la montée laiteuse. **A** ☐ **B** ☐

102- La diététique est une discipline qui étudie l'administration raisonnée et méthodique de l'aliment en

vue de la couverture efficiente des besoins nutritionnels dans toute leur diversité. **A** ☐ **B** ☐

103- La diététique c'est l'art d'une alimentation équilibrée. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

104- Le nourrisson YD double son poids de naissance : sa ration par est de:

A. 150ml ☐ B. 165ml ☐ C. 180ml ☐ D. I200ml ☐

105- JB est un nouveau-né qui double son poids de naissance ce jour. Pour son bol de lait, j'ai besoin de :

A. 80 ml ☐ B. 90 ml ☐ C. 100ml ☐ D. 110 ml ☐

106- Pour préparer le bol de lait un enfant qui triple son poids de naissance, nous avons besoin d'une ration de

A. 200ml ☐ B. 220ml ☐ C. 100ml ☐ D. 110 ml ☐

107- Le diagnostic d'une lymphangite se fait à partir des signes suivants :

A. Tension mammaire douloureuse dans les 05 à 06 premiers jours de l'allaitement ☐

B. Insuffisance de production de lait ☐

C. Douleur diffuse avec asthénie intense et hyperthermie à 40^0sur une rougeur mammaire en placard ☐

D. Sein tendu modérément douloureux avec présence de pus ☐

108- L'hormone chef de fil de la production de lait est :

A. L'ocytocine ☐ B. La prolactine ☐ C. L'estrogène ☐ D. La progestérone ☐

109- Lequel de ces critères est celui d'une bonne prise de sein ?

A. La tête et le corps de l'enfant sont droits ☐

B. Le visage de l'enfant est face au sein et le nez face au bout du sein ☐

C. La bouche de l'enfant est grande ouverte et couvre une grande partie de l'aréole ☐

D. Les joues sont bien rondes et remplies de lait. ☐

110- Parmi les signes suivants, deux correspondent à une tétée efficace, Lesquels ?

A. La bouche du nouveau-né est grandement ouverte ☐ D. Le nourrisson est serré à sa mère ☐

B. Le menton du nouveau-né touche le sein ☐ E. La lèvre inférieure est en éversion ☐

C. La succion est lente et régulière ☐ F. La succion est profonde et audible ☐

111- Mi est un nourrisson âgé de 5 mois nourri au lait maternisé. Pour la préparation de son bol de lait, j'ai besoin de:

A. 5cuillères mesures rases de lait ☐ C. 6 cuillères mesures rases de lait ☐

B. 7 cuillères mesures rases de lait ☐ D. 8 cuillères mesures rases de lait ☐

112- Des points suivants, un est le point clé d'une bonne position de l'enfant au sein :

A. Tout le corps de l'enfant est près de celui de la mère qui le soutient ☐

B. La lèvre inférieure est repliée vers le bas ☐

C. On entend et/ou on voit l'enfant déglutir ☐

D. L'enfant doit vider bien vider le premier sein avant de lui donner le second ☐

113- Pour Préparer le bol de lait d'un nouveau-né de 3 semaines avec du lait modernisé, nous avons besoin de:

A. 3 ,50 mesurettes rases de lait ☐ C. 4 mesurettes rases de lait ☐

B. 3,33 mesurettes rases de ☐ D. 5 mesurettes rases de lait ☐

114- Dans la pratique, la ration journalière d'un nouveau-né de 24 jours est de:

A. 90 ml x 6 repas ☐ B. 100mnl x 5 repas ☐ C. 110ml x 6 repas ☐ D. 120ml x 6 repas ☐

115- L'allaitement exclusif chez le nouveau -né sous-entend:

A. L'administration de médicaments prescrits ☐ D. L'apport d'eau minérale ou très propre ☐

B. Le lait commercialisé ☐ E. Le lait de sa mère ☐

C L'apport de tisanes ou de jus de fruit de saison ☐

116-Le lait mature est produit chez la mère allaitante à partir de

A. 1 semaine ☐ B. 2 semaines ☐ C. 3 semaines ☐ D. 4 semaines ☐

117- L'hormone chef de fil de la production de lait est :

A. L'ocytocine ☐ B. La prolactine ☐ C. L'œstrogène ☐ D. La progestérone ☐

118- Le diagnostic d'une lymphangite se fait à partir des signes suivants :

A. Tension mammaire douloureuse dans les 05 à 06 premiers jours de l'allaitement ☐

B. Insuffisance de production de lait ☐

C. Douleur diffuse avec asthénie intense et hyperthermie à 40^0sur une rougeur mammaire en placard ☐

D. Sein tendu modérément douloureux avec présence de pus ☐

119- Le nourrisson OB double son poids de naissance ce jour, alors qu'il vient de perdre sa mère. Vous devez préparer son bol de lait. Quelle sera sa ration par repas ?

A. 120 ml ☐ B. 150 ml ☐ C. 180 ml ☐ D. 200 ml ☐

120- ZS est nourri au sein. La bonne position de l'enfant au sein est faite lorsque :

A. Le dos de l'enfant repose sur le bras de la mère et la nuque dans le pli du coude ☐
B. Le bras de l'enfant est bien serré sous les aisselles de la mère et les fesses dans la paume ☐
C. La bouche de l'enfant effleure le mamelon de la mère ☐
D. Le ventre de l'enfant fait face et en contact avec celui de la mère ☐

121- Zl est un nourrisson âgé de 5 mois nourri au lait maternisé. Pour la préparation de son bol de lait, j'ai besoin de :

A. 5 cuillères mesures rases de lait ☐ C. 6 cuillères mesures rases de lait ☐
B. 7 cuillères mesures rases de lait ☐ D. 8 cuillères mesures rases de lait ☐

122- Des points suivants, un est le point clé d'une bonne position de l'enfant au sein :

A. Tout le corps de l'enfant est près de celui de la mère qui le soutient ☐
B. La lèvre inférieure est repliée vers le bas ☐
C. On entend et/ou on voit l'enfant déglutir ☐
D. L'enfant doit vider bien vider le premier sein avant de lui donner le second ☐

123- Parmi les signes suivants, deux correspondent à une tétée efficace. Lesquels ?

A. Le menton du nouveau-né touche le sein ☐ D. La lèvre inférieure est en éversion ☐
B. La succion est lente et régulière ☐ E. La succion est profonde et audible ☐
C. La bouche du nouveau-né est grandement ouverte ☐

124- Les facteurs suivants entravent une bonne montée laiteuse sauf un : lequel ?

A. La succion régulière du sein ☐ C. Le stress ☐
B. La compression des seins ☐ D. Le soutien-gorge trop serré ☐

125- Le lait de transition est produit chez la mère allaitante entre :

A. 1 et 3 semaines ☐ B. 3 et 6 semaines ☐ C. 6 et9 semaines ☐ D. 9 et 12 semaines ☐

126- Lorsque l'enfant est en train de téter efficacement, l'on constate que:

A. La déglutition du bébé se fait sans bruit ☐ C. La mère ressent quelques petites douleurs ☐
B. Le nourrisson fait parfois des pauses ☐ D. La succion est lente, rapide et profonde ☐

127- La ration d'un enfant de 3 mois 15 jours est de:

A. 100 ml ☐ B. 150 ml ☐ C. 165 ml ☐ D. 110 ml ☐

128- Les inconvénients de l'alimentation de remplacement :

A. Toutes réponses justes ☐
B. Les difficultés de préparations du lait de vache ☐
C. Difficultés de contact direct et affection mère-enfant ☐
D. Les difficultés d'adaptation du lait aux besoins nutritionnels ☐

129- Les indications de l'alimentation de remplacement :

A. Enfant abandonné ☐ C. Enfant de mère diabétique ☐
B. Enfant de mère décédé ☐ D. Enfant de mère VIH positif ☐

130- Les besoins du nouveau-né à terme est présent comme suite :

A. J0 de vie : 60-80ml/kg ☐ C. J0 de vie :80-100 ml/kg ☐
B. J15 140-160 ml/kg ☐ D. J0 de vie : 40 -60 ml/k ☐

131- Le besoin en eau du prématuré est présenté comme suite:

A. J15 :160-170 ml/kg ☐ C. J0 de vie : 40-60 ml/kg ☐
B. 60-80 ml/kg ☐ D. J15: 140-160 ml/kg ☐

132- Le besoin en eau de l'enfant

A. 80-100 ml/kg ☐ B. 160-170 ml/kg ☐ C. 140-60 ml/kg ☐

133- Pour préparer le bol de lait pour un nouveau-né de 24 h avec du lait sec en poudre maternisé il faut:

A. 30ml d'eau bouillie tiédie pour 1 mesurette de LSPM ☐
B. 45ml d'eau bouillie tiédie pour 1 mesurette de LSPM ☐
C. 60ml d'eau bouille tiédie pour 1 mesurette de LSPM et 1 carreau de sucre ☐

134*- Pour préparer le bol de lait pour un nouveau-né ne pesant 2,700 kg avec le lait sec en poudre maternisé il faut:*

A. 3 mesurettes rases de LSPM pour 70ml d'eau bouille tiédie ☐
B. 1 mesurette rase de LSPM pour 100ml d'eau bouille tiédie ☐
C. 2 mesurettes rase de LSPM pour 90ml d'eau bouillie tiédie ☐
D. 3 mesurettes rases de LSPM pour 90 ml d'eau bouillie ☐

135- Pour préparer le bol de lait pour un nourrisson de 2 mois avec du lait de vache liquide entier il faut :

A.90 ml de LVLE pour 30 ml d'eau et 1 carreau de sucre ☐
B.120 ml de LVLE pour 30 ml d'eau et 2 carreaux de sucre ☐
C. 80 ml de LVLE pour 40 ml d'eau et 1 carreau de sucre ☐

136- Les laits suivants sont des laits de 1er âge:

A. LVLE ☐ B. LCNS ☐ C. LVL1/2 ☐

137- Que donne- t-on à boire au nouveau en cas d'allaitement exclusif?

A. Lait de vache + eau ☐ C. Lait de sa mère + eau ☐
B. Eau de vache sans eau ☐ D. Lait de sa mère sans eau ☐

138- ***Le prématuré, l'hypotrophe, le macrosome ont en commun un même risque. Lequel ?***

A. Hypoglycémie ☐ C. Avitaminose K ☐
B. Elongation du plexus brachial ☐ D. Maladie des membres hyalines

139- Les facteurs entravant la bonne montée laiteuse:

A. Le stresse ☐ C. Soutien-gorge qui est trop serré ☐
B. Stimulation du mamelon ☐ D. Les sédatifs ☐

140- Quelle est la composition du bol d'un nourrisson de trois mois si le lait en poudre Nan est utilisé ?

A. 150 ml d'eau bouillie tiédie + 5 mesurettes de lait Nan I ☐
B. 150 ml d'eau bouillie tiédie + 5 mesurettes de lait de Nan II ☐
C. 120 ml d'eau bouillie tiédie + 5 mesurettes de lait de Nan I ☐ D. 120 ml d'eau bouillie tiédie + 5 mesurettes de lait de Nan II ☐

141- les laits infantiles en poudre se reconstituent à raison de 1 mesurette de lait pour quelle quantité

A. 10 ml d'eau ☐ B. 20ml d'eau ☐ C. 30 ml d'eau ☐ D. 40 ml d'eau ☐

142- La composition du lait maternel varie :

A. D'une tétée à l'autre ☐ C. Au cours de la même tétée ☐
B. En fonction de l'âge de la mère ☐ D. En fonction de l'âge de la grossesse ☐

143- VM a 3 mois, né à terme eutrophique et nourri avec substitut de lait maternel depuis la naissance. Il pèse 5 kg. Le besoin journalier est de 150 ml/kg/jour

A.155ml ☐ B. 145 ml ☐ C.135 ml ☐ D. 125 ml ☐

COACHING

EPREUVE DE MALADIES INFECTIEUSES

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les animaux ne peuvent pas héberger les germes et les transmettre à l'homme. **A** ☐ **B** ☐
2. Les secrétions liées à l'appareil génital sont des produits contaminants. **A** ☐ **B** ☐
3. Période d'Etat s'étend du jour de la pénétration du germe dans l'organisme jusqu'au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie. **A** ☐ **B** ☐
4. La poliomyélite est une maladie cosmopolite non invalidante. **A** ☐ **B** ☐
5. Dans la forme inapparente, la poliomyélite n'entraîne aucun trouble. **A** ☐ **B** ☐
6. Ces vaccins antipolio sont associés à d'autres vaccins. **A** ☐ **B** ☐
7. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse, non liée au péril fécal. **A** ☐ **B** ☐
8. Dans sa forme atypique la fièvre typhoïde présente un tableau de gastro-entérite fébrile. **A** ☐ **B** ☐
9. Le cholera est une maladie à déclaration non obligatoire. **A** ☐ **B** ☐
10. La réhydratation du plan B et plan C se fait par perfusion **A** ☐ **B** ☐
11. La prévention du tétanos est basée sur la vaccination efficace. **A** ☐ **B** ☐
12. L'agent pathogène du tétanos est le Bacille de Koch. **A** ☐ **B** ☐
13. L'homme sain ne peut être le réservoir de germe d'une maladie. **A** ☐ **B** ☐
14. L'antigène est une substance étrangère au corps humain. **A** ☐ **B** ☐
15. Les animaux peuvent héberger les germes et les transmettre à l'homme. **A** ☐ **B** ☐
16. La virulence d'un germe diminue avec le vieillissement de la souche et de l'exposition à la chaleur et à la lumière. **A** ☐ **B** ☐
17. Les angines sont des affections qui ont une incidence élevée pendant les saisons froides. **A** ☐ **B** ☐
18. Les angines sont moins constantes après 35 ans. **A** ☐ **B** ☐
19. La tachycardie n'est pas un signe général de l'angine. **A** ☐ **B** ☐
20. Le traitement de l'angine fait appel à l'anti-inflammatoire stéroïdien. **A** ☐ **B** ☐
21. La poliomyélite est une maladie immunitaire. **A** ☐ **B** ☐
22. Le réservoir des poliovirus est exclusivement humain . **A** ☐ **B** ☐
23. La contamination de la poliomyélite se fait par voie manu portée. **A** ☐ **B** ☐
24. La poliomyélite est une maladie du péril fécal. **A** ☐ **B** ☐
25. Les mauvaises conditions d'hygiène ne favorisent pas la poliomyélite. **A** ☐ **B** ☐
26. La poliomyélite ne touche pas les muscles respiratoires. **A** ☐ **B** ☐
27. La varicelle est une maladie bénigne sur un terrain immunocompétent. **A** ☐ **B** ☐
28. Le début de l'éruption de la varicelle apparait sur le visage. **A** ☐ **B** ☐
29. La varicelle et le zona sont causés par le même virus. **A** ☐ **B** ☐
30. Le zona est fréquent chez les immunodéprimés. **A** ☐ **B** ☐
31. La principale complication du zona est l 'algie poste zostérienne. **A** ☐ **B** ☐
32. Le zona peut avoir une manifestation oculaire. **A** ☐ **B** ☐
33. Les maladies infectieuses sont dues à des agents microscopiques vivants. **A** ☐ **B** ☐
34. La bouche est une porte d'entrée dans les maladies infectieuses. **A** ☐ **B** ☐
35. La transmission des maladies infectieuses est seulement directe. **A** ☐ **B** ☐
36 Dans la transmission des maladies infectieuses, il existe une seule porte d'entrée. **A** ☐ **B** ☐
37. La contamination de la poliomyélite est sanguine. **A** ☐ **B** ☐
38. Dans la fièvre typhoïde, le malade présente une diarrhée fétide, liquide avec aspect jus de papaye. **A** ☐ **B** ☐
39. A l'examen du malade dans la méningite, il existe un météorisme abdominal, une splénomégalie et une langue saburrale. **A** ☐ **B** ☐
40. Le gargouillement et la sensibilité de la fosse iliaque droite s'observe dans le cholera. **A** ☐ **B** ☐
41. La déshydratation et la malnutrition sont les complications générales de la rougeole. **A** ☐ **B** ☐
42. Le R. A. A est aussi appelé maladie de bouillard. **A** ☐ **B** ☐
43. la dissociation du pouls et de la température s'observe dans le tétanos. **A** ☐ **B** ☐

44. Le signe de koplick se caractérise par l'apparition de petites taches blanches, bleuâtres à l'intérieur de la joue de l'enfant. **A** ☐ **B** ☐
45. l'éruption dans la rougeole est toujours descendante. **A** ☐ **B** ☐
46. le signe de C-I-V-E-T s'observe dans la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐

47. le trismus est le signe pathognomonique de la rougeole . **A** ☐ **B** ☐
48. la constipation, l'anorexie sont les signes de la rougeole. **A** ☐ **B** ☐
49. Dans le R. A. A, le germe en cause est le staphylocoque. **A** ☐ **B** ☐
50. dans le choléra, le malade présente une diarrhée profuse. **A** ☐ **B** ☐
51. les paroxysmes font partie des signes du tétanos. **A** ☐ **B** ☐
52. dans la rougeole, il faut toujours laver l'enfant au savon. **A** ☐ **B** ☐
53. l'ova rite est une inflammation des testicules et se traduit par une douleur à la miction. **A** ☐ **B** ☐
54. la rougeole sévit sous un mode endémique en zone urbaine. **A** ☐ **B** ☐
55. dans la rougeole, les signes nerveux se caractérisent par les convulsions et la raideur de la nuque **A** ☐ **B** ☐
56. le vibrion cholérique est l'agent pathogène de la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐
57. la réhydratation au plan C fait appel aux S.R.O . **A** ☐ **B** ☐
58. le bacille de Nicolaier est I 'agent pathogène de la méningite purulente. **A** ☐ **B** ☐
59. dans le choléra, il ne faut jamais donner de l'eau à boire à l'enfant. **A** ☐ **B** ☐
60. dans le choléra, le malade présente aussi des vertiges et une épistaxis. **A** ☐ **B** ☐
61. la rougeole est une maladie endémique. **A** ☐ **B** ☐
62. dans la fièvre typhoïde, il n'existe pas de fièvre . **A** ☐ **B** ☐
63. il existe un pli-cutané dans la déshydratation au plan A. **A** ☐ **B** ☐
64. dans la maladie du bouillard, I 'atteinte articulaire est bilatérale. **A** ☐ **B** ☐
65. la péritonite est une complication digestive de la méningite. **A** ☐ **B** ☐
66. la constipation et la langue saburrale font partie des signes de la méningite purulente. **A** ☐ **B** ☐
67. I 'orchite ourlienne est une localisation oculaire de l'oreillon. **A** ☐ **B** ☐
68. dans la fièvre typhoïde, il existe deux modes de contamination. **A** ☐ **B** ☐
69. la réhydratation au plan C fait appel au S.R.O **A** ☐ **B** ☐
70. le signe de koplick s'observe dans le tétanos. **A** ☐ **B** ☐
71. la réhydratation par voie orale est indiquée dans la déshydratation au plan A ; **A** ☐ **B** ☐
72. la catarrhe oculo-respiratoire s'observe aussi dans la poliomyélite. **A** ☐ **B** ☐
73. dans le choléra, il existe deux stades de déshydratations. **A** ☐ **B** ☐
74. dans le choléra, il existe une fièvre. **A** ☐ **B** ☐
75. le diagnostic de la rougeole est essentiellement clinique. **A** ☐ **B** ☐
76. pour qu'il ait tétanos, il faut une condition. **A** ☐ **B** ☐
77. La dissociation du pouls et de la température s'observe dans la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐
78. la coproculture est l'examen de certitude de la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐
79. La complication la plus fréquemment rencontrée dans la fièvre typhoïde est l'abcès du foie. **A** ☐ **B** ☐
80. l'examen de Widal et Félix est I 'examen de certitude de la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐
81. Dans la fièvre typhoïde, il existe une fièvre en plateau. **A** ☐ **B** ☐
82. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse, non liée au péril fécal. **A** ☐ **B** ☐
83. Dans sa forme atypique la fièvre typhoïde présente un tableau de gastro-entérite fébrile. **A** ☐ **B** ☐
84. Le bacille de HANSEN est l'agent Pathogène de la Fièvre Typhoide. **A** ☐ **B** ☐
85. Le Bacille de HANSEN est aussi appelé Mycobactérium léprae. **A** ☐ **B** ☐
86. La cécité qui apparait après une méningite est une complication de cette maladie. **A** ☐ **B** ☐
87. Les céphalées en casque sont l'un des signes du trépied méningitique. **A** ☐ **B** ☐
88. Le trépied méningitique est caractérisé par deux signes majeurs. **A** ☐ **B** ☐
89. La constipation ne fait pas parti du trépied méningitique. **A** ☐ **B** ☐
90. Le signe de C-I-V-E-T s'observe dans les Méningites Purulentes. **A** ☐ **B** ☐
91. Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie secondaire à une infection oropharyngé. **A** ☐ **B** ☐
92. Dans le R.A.A, le germe en cause est le streptocoque. **A** ☐ **B** ☐
93. Les maladies de RAA touchent les enfants entre 7 et 14 ans. **A** ☐ **B** ☐
94. La manifestation majeure du RAA est la douleur cervicale. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 QCM</u> :cochez la ou les bonnes réponses

95. Parmi les localisations de la tuberculose suivantes, cochez les deux réponses justes

A. Tuberculose osseuse contagieuse ☐
B. Tuberculose pulmonaire ☐
C. La tuberculose génitale ☐
D. Tuberculose rénale ou mal de Pott ☐
E. Les méningites tuberculoses génitales ☐

96. Le réservoir de germe de la fièvre typhoïde est strictement humain:

A- I 'homme malade ☐ B- I 'homme porteur chronique ☐ C- A+B ☐

97. Les signes suivants caractérisent le trépied méningitique sauf un, lequel ?

A- Vomissements en jet ☐ C- Céphalées en casque ☐ E. Douleur articulaire ☐

B- Raideur méningée ☐ D- Constipation ☐

98. L'agent responsable de la fièvre typhoïde est :

A. un virus ☐ B. une bactérie ☐ C. un champignon ☐

99. Choisir les bonnes réponses ? Parmi les signes cliniques suivants de la méningite purulente, quels sont ceux que l'on désigne sous le vocable trépied méningitique:

A. Température à 40°C ☐ C. Vomissements ☐ E. Douleur articulaire ☐

B. Céphalées ☐ D. Constipation ☐

100. Parmi les examens biologiques suivants, un permet de faire le diagnostic positif de la fièvre typhoïde, Lequel ?

A. Hémogramme ☐ C. Sérodiagnostic de Widal et Félix ☐

B. Antibiogramme ☐ D. Hémoculture ☐

101. les constantes suivantes vous permettent de faire le diagnostic différentiel entre la fièvre typhoïde et le paludisme dans un centre de santé.

A. La tension artérielle ☐ B. La température ☐ C- La respiration ☐ D. Le pouls ☐

102. À la phase d'état le syndrome méningé se caractérise par : Cochez l'intrus.

A. Un syndrome digestif ☐ C. Un syndrome méningé ☐

B. Un syndrome infectieux ☐ D. Des troubles neurologiques ☐

103. Dans la fièvre typhoïde, la prophylaxie collective est basée sur :

A. Les mesures hygiéno-diététiques ☐

B- Le lavage des mains avant chaque repas ☐

C- la lutte contre le péril fécal ☐

104. Les signes du syndrome méninge sont caractérisés par trois signes. Lesquels ?

A. épistaxis ☐ D- les vomissements en jets ☐

B. la constipation ☐ E- la diarrhée ☐

C. céphalées intense en casque ☐

105. La phase catarrhale de la coqueluche est caractérisée par une toux remarquable par :

A. Son caractère émétisante ☐ C- son prolongement ☐ E- sa durée ☐

B. sa ténacité ☐ D- son aspect spasmodique ☐ F- sa prédominance nocturne ☐

106. Les éléments suivants font partie du but de traitement du tétanos sauf deux. Lesquels ?

A. prévenir toutes les complications ☐ D- réduire les contractions ☐

B. sonder le malade ☐ E- neutraliser la toxine circulante ☐

C. détruire le germe ☐ F- tester le T. D. R ☐

107. dans la coqueluche, la toux est à prédominance :

A. matinale ☐ B- postprandiale ☐ C. nocturne ☐ D- diurne ☐

108. Le syndrome infectieux comporte les signes suivants sauf deux. Lesquels ?

A. constipation ☐ C- oligule ☐ E- herpes péri-buccale ☐

B. langue saburrale ☐ D- POULS rapide ☐ F- insomnie ☐

109. Dans la coqueluche, les signes suivants font partie des complications mécaniques sauf trois. Lesquels ?

A. insomnie ☐ C- prolapsus rectal ☐ E- épistaxis ☐ G- sécheresse de la bouche ☐

B. hernie ☐ D- la constipation ☐ F- ulcération du frein de la langue ☐

110. Lesquels des signes suivants font partie des caractères de toux dans la coqueluche ?

A. moussante ☐ D- quinteuse ☐

B. expectoration ☐ E- sèche ☐

C. sanguinolente

111. Les signes suivants font partie des signes du syndrome méningite sauf deux. Lesquels

A. raideur de la nuque ☐ D- Brudzinsky ☐

B. anorexie ☐ E- épistaxis ☐

C- kernig positif ☐

112. La prophylaxie des parasitoses intestinales consiste à observer ces mesures d'hygiène sauf un, lequel

A. Lutter contre le péril fécal ☐

B. Construire des latrines ☐

C. Dormir sous une moustiquaire imprégnée ☐
D. Eviter de manger des crudités souillées par les déchets animaux ☐

113. La contamination orale se fait par les éléments suivants sauf un. Lequel ?
A. Les aliments souillés ☐ B- le pied nu sale ☐ C- les mouches ☐ D- les mains sales ☐

114. L'hôte intermédiaire du parasite héberge en générale :
A. la forme adulte ☐ C- l'œuf ☐
B. la forme larvaire ☐ D- la forme larvaire et l'œuf ☐

115. Dans les propositions suivantes une seule est fausse, laquelle? dans l 'oxyurose la prophylaxie consiste à
A. traiter tous les membres de la famille ☐ C- traiter tous ceux qui sont atteints ☐
B. se laver les mains avant chaque repas ☐ D- couper les ongles courts ☐

116. lequel des échantillons suivants a un temps de transport de 30 mn
A. selles mouillées ☐ C. selles liquides ☐
B. selles dure ☐ D. selles pâteuses ☐

117. parmi les propositions suivantes une est fausse, laquelle ? le parasite est un être vivant qui :
A. vit en association avec un autre être vivant ☐ C. se comporte comme un prédateur ☐
B. vit dans les cavités profondes de l'hôte ☐ D. transmet la maladie ☐

118. La Prophylaxie collective du choléra repose sur :
A. La Communication pour le Changement de comportement ☐
B. La construction, I 'utilisation et l'entretien de latrines ☐
C. L'isolement des malades en période d'épidémie ☐
D. L'assainissement du milieu ☐
E. A+B+C+D ☐

119. La Prophylaxie individuelle du choléra repose sur:
A. Le lavage des mains avant chaque repas crus ☐
B. la lutte contre le péril fécal ☐
C. Le lavage des légumes et des fruits consommés ☐
D. A+B+C ☐

120. Dans la déshydratation sévère la perte hydrique est :
A. < 5% du poids corporel. ☐
B. comprise entre 5% et 10% du poids corporel. ☐
C. à 10% du poids corporel. ☐

121. La diarrhée dans le cholera présente un aspect semblable à :
A. Eau de manioc ☐ B. Eau de banane ☐ C. Eau de riz ☐

122. La déshydratation c'est la conséquence de :
A- La diarrhée ☐ B- L'asthénie majeure ☐ C. L'anémie ☐ D- Des vomissements ☐

123. Les éléments suivants sont les réservoirs de germe du choléra sauf un. Lequel ?:
A- l'homme malade ☐ C- Le cadavre ☐ E -Les fruits de mer ☐
B- L'animal ☐ D-L 'homme sain ☐

124. Le cholera est une toxi-infection :
A- Pulmonaire ☐ B- musculaire ☐ C- intestinale ☐

125. Dans sa forme atypique la fièvre typhoïde le tuphos se
A- Prostration, ☐ C- Hébétude ☐ E- A+B+C+D ☐
B- Indifférence ☐ D- Délire ☐

126. Dans sa forme typique la fièvre typhoïde présente les symptômes suivants. Sauf un point lequel ?
A- Céphalées ☐ C- Insomnies ☐ E- Epistaxis ☐
B- myalgie ☐ D- Vertige ☐ F- Température ☐

127. L'On distingue deux modes de transmission dans la fièvre typhoïde :
A- La transmission directe ☐ C- La transmission par eau souillée ☐
B- La transmission par aliments souillés ☐ D -La transmission indirecte ☐

128. Le réservoir de germe de la fièvre typhoïde est strictement humain :
A- L'homme malade ☐ B- l'homme porteur chronique ☐ C. A+B ☐

129. Le vaccin vivant atténué oral de la poliomyélite de sabinse donne :
A- De 0-5 ans ☐ D- 2 gouttes espacées d'un mois pendant 3 mois ☐
B- Rappel à 1 an ☐ E- Rappel tous les 5 ans. ☐
C- A+B+C+D ☐

130. Le vaccin injectable en prévention de la poliomyélite se fait par voie :

A- Intramusculaire ☐ B- Sous-cutanée ☐ C. Intraveineuse ☐ D- A+B+C ☐

131. Lutte contre le péril fécal par se fait en observant les consignes suivantes:

A- Utilisation systématique des latrine ☐ D- Désinfecter les selles des malades ☐

B- Vaccin injectable en s/c. ☐ E. Protéger les aliments contre les mouches ☐

C- A+B+C+D ☐

132. La confirmation du diagnostic de la poliomyélite repose généralement sur la mise en évidence de poliovirus dans un prélèvement de :

A –Selles ☐ B- La gorge ☐ C -A+B+C+D ☐ D-Salive ☐ E- Sueur ☐

133. La poliomyélite est une maladie qui se manifeste sous plusieurs formes dont :

A- Respiratoire ☐ C- Attenue ☐ E -A+B +C+D ☐

B- Paralytique ☐ D- Inapparente ☐

134. La contamination directe de la poliomyélite par :

A -Manu portage ☐ C - Ingestion de l'eau souillée par ces selles. ☐

B-Ingestion aliments souillés par ces selles. ☐ D- Féco-orale. ☐

135. Le réservoir des poliovirus est exclusivement :

A -Homme malade ☐ B- L'animal malade ☐ C- L'environnement ☐ D -Le porteur sain ☐

136. La poliomyélite est une maladie infectieuse sévissant en mode :

A Endémique ☐ B. Epidémique ☐ C. Endemo-epidemique ☐

137. On distingue trois périodes dans l'évolution d'une maladie infectieuse classez les par ordre A B Cen les liant au nombre :

1-Invasion ☐ 2 -L'incubation ☐ 3 -Période d'Etat ☐

138. Différentes portes d'entrée sont possibles pour la pénétration du germe dans l 'organisme.

A- Voie respiratoire ☐ B-Voie génitale ☐ C-Voie buccale ☐ D -A+B+C ☐

139 Le mode de transmission indirect des maladies infectieuses peut être :

A- l'eau ☐ B -Animale à l'homme ☐ C- Interhumaine ☐ D- Aliments ☐

140. Le mode de transmission des maladies infectieuses peut être :

A- Directe ☐ C- Interhumaine ☐ E- A+B +C+ D ☐

B- Indirecte ☐ D- Animale à l'homme ☐

141. Le pouvoir pathogène des germes des agents infectieux dépend de plusieurs facteurs qui sont

A- La virulence ☐ C -La sécrétion d'enzyme ☐ E- A+B+C+D ☐

B- La toxicité ☐ D -Le pouvoir antigénique ☐

142. La virulence est la propriété qu'ont les germes à :

A- Se multiplier ☐ B -Résister à la phagocytose ☐ C -A+B ☐

143. Les éléments suivants sont responsables des maladies infectieuses sauf un. Lequel ?

A- Les Virus ☐ C- Les Bactéries ☐

B- Les Adn ☐ D- Les parasites ☐ E -Les champignons ☐

144. L'agent responsable de la fièvre typhoïde est :

A. un virus ☐ B. une bactérie ☐ C. un champignon ☐

145. Les maladies infectieuses sont dues à des agents microscopiques :

A -vivants. ☐ B-Atténués ☐

146. L'on distingue deux modes de transmission dans la fièvre typhoïde :

A- La transmission directe ☐ C- La transmission par aliments souillés ☐

B- La transmission par eau souillée ☐ D- La transmission indirecte ☐

147. L'infection se définie comme étant :

A- l'ensemble des manifestations cliniques résultant de la pénétration des micro -organismes pathogènes vivant dans l'organisme humain. ☐

B- l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques résultant de la pénétration des micro-organismes pathogènes vivant dans l'organisme humain . ☐

C- l'ensemble des manifestations biologiques résultant de la pénétration des micro-organismes pathogènes vivant dans l'organisme humain ☐

148. La NFS, dans la biologie de la fièvre typhoïde à la phase d'état met en exergue

A- Une hyperleucocytose ☐ B- Une thrombopénie ☐ C- Une leucopénie ☐

149. Dans la fièvre typhoïde les anticorps anti H sont présents dès :

A- Le 14°jour ☐ B- Le 8e jour ☐ C- Le 10° jour ☐

150. Cochez l'intrus. Les facteurs favorisants le développement de la fièvre typhoïde sont

A. La pauvreté ☐ B. Le lévirat ☐ C. La drépanocytose hase de régression ☐

151. Parmi les produits contaminants, cochez ceux qui sont responsable de la fièvre typhoïde :

A. Les urines ☐ B. Le sang ☐ C. La salive ☐ E. Les expectorations ☐ D- Les selles ☐

152. Une personne présente des céphalées ; une insomnie, des vertiges avec Epistaxis, une température intense et constante. A quelle affection pensez-vous ?

A. Paludisme ☐ B. Fièvre typhoïde ☐ C. Dengue ☐

153. Dans sa forme typique la fièvre typhoïde présente Les symptômes suivants. Sauf un point lequel?

A- Céphalées ☐ C-Température ☐

B- Insomnies ☐ D- Vertige ☐

154. Les signes suivants font partir des séquelles de la méningite purulente sauf un. Lequel ?

A- Anurie ☐ B- Surdité ☐ C- Cécité ☐ D- Epilepsie ☐

155. Le trépied méningé est caractérisé par :

A. Une fièvre en plateau ☐ D. Les vomissements qui se font par jets ☐

B. Des céphalées en casques ☐ E. La constipation (inconstante) ☐

C. La raideur de la nuque ☐

156. Une courbe de température est dite « en plateau » est observée dans les maladies

A. La grippe ☐ B. La méningite ☐ C. La typhoïde ☐ D. La tuberculose ☐

COACHING

EPREUVE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les qualités potables d'une eau sont à la fois physiques, chimiques et bactériologiques. **A** ☐ **B** ☐
2. La chloration consiste à purifier l'eau à l'aide de l'eau de javel. **A** ☐ **B** ☐
3. L'ébullition consiste à bouillir l'eau et à la laisser reposer pour son utilisation. **A** ☐ **B** ☐
4. Les puits ordinaires sont des puits creusés manuellement. **A** ☐ **B** ☐
5. Les puits artésiens sont des puits obtenus des suites d'un forage. **A** ☐ **B** ☐
6. La turbidité de l'eau peut être améliorée en utilisant du charbon. **A** ☐ **B** ☐
7. Les puits forés sont des puits qui se creusent au lieu même de la source. **A** ☐ **B** ☐
8. La saveur et l'odeur de l'eau peuvent être corrigées par la décantation, et la sédimentation. . **A** ☐ **B** ☐
10. Les puits foncés sont des puits avec un tube perforé que l'on enfonce sous la terre . **A** ☐ **B** ☐
11. Les puits constituent le moyen le plus courant de captage des eaux souterraines. . **A** ☐ **B** ☐
12. Le stockage communautaire se fait pour stocker les ordures ménagères afin d'être ramassées et jetées dans des décharges. **A** ☐ **B** ☐
13. La correction des défauts chimiques de l'eau consiste à équilibrer la composition chimique de l'eau pour la rendre potable. **A** ☐ **B** ☐
14. La turbidité peut être corrigée par la décantation, la filtration, la sédimentation. **A** ☐ **B** ☐
15. La saveur et l'odeur peuvent être améliorées en utilisant du charbon actif ou le charbon de bois. **A** ☐ **B** ☐
16. La température de conservation est représentée par la température ambiante. . **A** ☐ **B** ☐
17. Il n'est pas utile que les eaux résiduelles industrielles soient épurées et traitées avant leur évacuation au niveau de la mer. **A** ☐ **B** ☐
18. Dans le traitement des ordures ménagères, I 'incinération est un procédé qui consiste à recycler les ordures ménagères d'un dépotoir. **A** ☐ **B** ☐
19. Le compostage consiste à transformer les déchets synthétiques en composte utilisable comme engrais pour les cultures maraichères. **A** ☐ **B** ☐
20. Les trois phases qui interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères sont : le stockage ; le ramassage et le financement. **A** ☐ **B** ☐
21. Le stockage familial se fait à domicile avec un récipient démuni de couvercle, dans un sachet en plastique ou dans un carton. **A** ☐ **B** ☐
22. La correction des défauts bactériologiques de l'eau consiste à débarrasser l'eau des micro-organismes pathogènes qu'elle peut contenir. **A** ☐ **B** ☐
23. L'approvisionnement en eau potable et en courante est l'un des critères relatif à la protection contre la contagion d'un habitat salubre. **A** ☐ **B** ☐
24. L'absence d'humidité est I 'un des critères relatifs aux besoins physiologiques d'un habitat salubre. **A** ☐ **B** ☐
25. La préservation de l'intimité est l'un des critères relatifs aux besoins de protection de l'habitat salubre. **A** ☐ **B** ☐
26. La protection suffisante contre les bruits est I 'un des critères relatifs aux besoins physiologiques d'un habitat salubre. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

27. Une décharge commune doit respecter les normes de sécurités suivantes :

A- Etre située au moins à 10 mètres de tout habitat. ☐
B- Doit être situé en hauteur. ☐
C- Etre situé au moins à 100 mètres de tout cours d'eau. ☐
D- Etre entouré d'une palissade en matériaux locaux. ☐
E- Etre situé sur un terrain argileux. ☐
F- Etre accessible aux récupérateurs de déchets. ☐

28. Les moyens de lutte contre le péril fécal sont :

A- Porter des chaussures fermées . ☐
B- Assurer la potabilité de Il'eau. ☐
C- Se rincer les mains après les selles . ☐
D. Ne manger que des aliments chauds et repas fumant . ☐
E. Se laver proprement avant de manger . ☐
F. Se laver les mains après chaque repas . ☐

29. Les moyens de lutte contre le péril fécal sont :

A- Protéger les aliments contre les moustiques. ☐
B- Cuire les aliments ou désinfecter ceux qui sont à consommer crus. ☐
C- Traiter les malades atteints de gastro-entérites. ☐
D- Construire des latrines de qualités. ☐
E- Ne pas utiliserd'engrais dans l'agriculture. ☐
F- Pratiquement régulièrement des activités physiques. ☐

30. Dans la liste suivante, indiquez les règles à observer pour l'emplacement d'une latrine :

A- La latrine doit être située en amont de toute source d'eau . ☐
B- Elle doit être située au plus à 15 mètres de toute source d'eau. ☐
C- Elle doit être située au moins à 6 mètres de tout habitat. ☐
D- La fosse doit avoir au moins une profondeur de 10 mètres. ☐
E- L'emplacement des installations doit être sec, bien drainé. ☐
F- L'emplacement des installations doit être en dessous du niveau de crue. ☐

31. Comme avantage du système d'évacuation des excréta avec entrainement des matières la fosse septique permet d'éviter :

A- La pollution du sol superficiel. ☐
B- La pollution industrielle. ☐
C- La contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. ☐
D- L'accès des excréta aux mouches et aux rongeurs lorsque la fosse est soigneusement couverte. ☐
E- La propagation des déchets ménagers. ☐
F- L'évacuation des eaux usées. ☐

32. identifiez dans la liste proposée les différents types de pollution de l'eau :

A- Les pollutions domestiques. ☐ D. Les pollutions atmosphériques. ☐
B- Les pollutions industrielles . ☐ E. Les pollutions cryoniques. ☐
C- Les pollutions agropoles . ☐ F. Les pollutions profuses ou individuelles. ☐

33. Indiquez dans la liste proposée, les maladies parasitaires liées à l'eau :

A- La dysenterie bacillaire. ☐ C. La poliomyélite . ☐ E. Les helminthiases. ☐
B- Les schistosomiases. ☐ D. Les hépatites virales . ☐ F. La fièvre typhoïde . ☐

34. Indiquez dans la liste proposée, les qualités physiques d'une eau potable

A- Limpide . ☐ C. Chlorée. ☐ E. Incolore. ☐
B- Indolore. ☐ D. Recréée. ☐ F. Dotée d'une saveur désagréable. ☐

35. Dans le système d'évacuation des excréta avec entrainement des matières, indiquez les inconvénients de la fosse septique :

A- Sa mise en œuvre nécessite une installation d'eau courante. ☐
B- Son fonctionnement nécessite l'évacuation et le traitement d'importants volumes d'eau contaminée. ☐
C- Son utilisation est compliquée et demande beaucoup d'apprentissage. ☐
D- Elle se remplit vite et contraint à des vidanges rapprochées. ☐
E. L'odeur des excréta envahit fréquemment les habitations environnantes. ☐
F- Sa structure ne dure pas et impose des reconstructions régulières. ☐

36. La lutte contre des larves des moustiques consiste à :

A- Vider tous les récipients qui contiennent de l'eau potable à domicile. ☐
B- Drainer et combler les flaques d'eau et eaux stagnantes. ☐
C- Séparer les fosses septiques et les caniveaux d'élimination des eaux usées. ☐
D- Eliminer ou réduire les gites de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions. ☐
E- Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide . ☐
F- Poser des grilles aux portes et aux fenêtres. ☐

37. La lutte contre les moustiques adultes recommande de:

A- Dormir sous un ventilateur . ☐
B- Dormir sous un MILDA. ☐
C- Utiliser des crèmes anti-moustiques. ☐
D. Porter des vêtements longs et sombres à la tombée de la nuit. ☐
E. Déposer des feuillages aux portes et fenêtres. ☐
F. Pulvériser l'intérieur des maisons de déodorisant. ☐

38. La lutte contre les rongeurs repose essentiellement sur deux méthodes :

A- Les méthodes de lutte authentique . ☐
B- Les méthodes de lutte attractive . ☐
C- Les méthodes de lutte invasive . ☐
D. Les méthodes de lutte défensive. ☐
E. Les méthodes de lutte offensive. ☐
F. Les méthodes de lutte persuasive. ☐

39. Les effets du bruit sur la santé

A- Lésion du pavillon de l'oreille. ☐
B- Les décibels . ☐
C- Les modifications du caractère. ☐
D. Les irradiations . ☐
E. Accroissement de l'attention et du rendement. ☐
F. Hypoacousies qui peuvent aboutir à une surdité. ☐

40. Relativement à un habitat salubre, identifiez sur la liste suivante les deux critères relatifs aux besoins de sécurité

A. Le logement doit être construit avec des matériaux biodégradables. ☐
B. Tenir compte des mesures de protection contre les incendies et les accidents domestiques. ☐
C. Les portes et fenêtres doivent être solides pour la protection contre les agressions. ☐
D. Disposer d'armes létales pour dissuader tout agresseur. ☐

41. Relativement à un habitat salubre, Identifiez sur la liste suivante les deux critères relatifs aux besoins physiologiques

A- Une température estivale pour assurer le confort. ☐
B- Une absence de promiscuité. ☐
C- Une absence d'humidité. ☐
D- Une aération et une ventilation suffisante. ☐

42. Relative ment à un habitat salubre, Identifiez sur la liste suivante les deux critères relatifs à la protection contre la contagion

A- L'approvisionnement en eau potable et en eau courante . ☐
B- L'évacuation des déchets solides et liquides (eaux usées) . ☐
C- La lutte contre les insomnies et les cauchemars ☐
D- Porter en permanence des cache-nez. ☐

43. Relativement à un habitat salubre, Identifiez sur la liste suivante les deux critères relatifs aux besoins psychologiques

A- Avoir une maison ensoleillée . ☐
B- L'existence de support audiovisuel. ☐
C. La préservation de l'intimité . ☐
D. La possibilité d'assurer l'hygiène du logement. ☐

44- Relative ment à un habitat salubre, Identifiez sur la liste suivante les deux objectifs de l'hygiène du milieu

A- Prévenir la mortalité prématurée. ☐
B- Traiter les maladies et les traumatismes. ☐
C. Promouvoir le bien être. ☐
D. Assurer le confort. ☐

COACHING

EPREUVE D'INFECTION A VIH ET IST

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. La double protection consiste à utiliser des préservatifs pendant les rapports sexuels .**A** ☐ **B** ☐
2. Le sororat, c'est lorsqu'un homme prend la femme de son frère défunt en deuxième noce. **A** ☐ **B** ☐
3. La gonococcie est Le syndrome d'écoulement urétral le plus fréquent chez les hommes. **A** ☐ **B** ☐
4. Un des avantages de la prise en charge clinique des IST est le soulagement rapide du patient. **A** ☐ **B** ☐
5. Dans l'approche étiologique le diagnostic n'est pas précis. **A** ☐ **B** ☐
6. La côte d'ivoire a adopté l'approche syndromique de la prise en charge des IST parce qu'elle est efficace et peut être appliquée partout. **A** ☐ **B** ☐
7. Les IST et les ITG sont des infections sexuellement transmissibles. **A** ☐ **B** ☐
8. Il existe deux stratégies prioritaires pour le contrôle des IST. **A** ☐ **B** ☐
9. Le traitement des IST vise seulement à diminuer la durée de la contagiosité. **A** ☐ **B** ☐
10. Un des avantages de la prise en charge clinique des IST est le soulagements- rapide du patient. **A** ☐ **B** ☐
11. Dans l'approche étiologique le diagnostic est précis. **A** ☐ **B** ☐
12. L'anatomie de la femme n'est pas un déterminant de la propagation du VIH. **A** ☐ **B** ☐
13. L'analphabétisme est un déterminant de la propagation du VIH. **A** ☐ **B** ☐
14. Les piqûres de moustiques sont un déterminant de transmission du VIH. **A** ☐ **B** ☐
15. La côte d'ivoire a adopté l'approche syndromique parce qu'elle permet de prendre les patients en charge dans toutes les structures sanitaires. **A** ☐ **B** ☐
16. Dans I 'infection à VIH le stade avancé de la maladie représente un facteur de risque. **A** ☐ **B** ☐
17. Le syndrome d'écoulement urétral est la principale IST chez les hommes. **A** ☐ **B** ☐
18. Dans l'évolution de I 'infection à VIH la période de latence est symptomatique. **A** ☐ **B** ☐
19. Le lévirat, c'est lorsque le frère prend la femme de son frère défunt en j- deuxième noce. **A** ☐ **B** ☐
20. Utilisation de mêmes toilettes, douches, est un déterminant de transmission du VIH. **A** ☐ **B** ☐
21. La double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/NIH. **A** ☐ **B** ☐
22. La salutation est un déterminant de transmission du VIH. **A** ☐ **B** ☐
23. La double protection renforce les relations au sein du couple. **A** ☐ **B** ☐
24. Le VIH entraine une destruction brutale des lymphocytes T4. **A** ☐ **B** ☐
25. Les anticorps anti-VIH sont inefficaces sur le virus. **A** ☐ **B** ☐
26. Le VIH est de la famille des rota virus. **A** ☐ **B** ☐
27. Le liquide amniotique est un Liquide biologique à risque élevé de transmission. **A** ☐ **B** ☐
28. Le VIH résiste à Alcool à 70° pendant 15 minutes. **A** ☐ **B** ☐
29. L'infection au VIH 1 se transmet moins facilement. **A** ☐ **B** ☐
30. L'infection au VHI 2 entraine une progression rapide vers le stade SIDA. **A** ☐ **B** ☐
31. En milieu de soins, des mesures d'hygiène doivent être prises pour prévenir les AES. **A** ☐ **B** ☐
32. Toute transfusion sanguine doit se faire avec du sang testé. **A** ☐ **B** ☐
33. Dans la période de latence la sérologie VIH positive. **A** ☐ **B** ☐
34. Dans le VIH, le mode de transmission le plus courant est la voie sexuelle. **A** ☐ **B** ☐
25. SIDA est le sigle du syndrome d'immunodéficience acquise. **A** ☐ **B** ☐
36. Tout écoulement vaginal est toujours pathologique. **A** ☐ **B** ☐
37. Le traitement précoce et efficace des cas d'IST vise à Limiter le nombre de nouveaux cas. **A** ☐ **B** ☐
38. la prévention secondaire est la prise en charge précoce des cas d'IST. **A** ☐ **B** ☐
39. Dans les IST La prévention primaire comporte le changement de comportement. **A** ☐ **B** ☐
40. Dans les IST La prévention vise uniquement à la réduction des contacts sexuels à risque. **A** ☐ **B** ☐
41. Les ITG sont des infections sexuellement transmissibles. **A** ☐ **B** ☐
42. Il existe deux stratégies prioritaires pour le contrôle des IST. **A** ☐ **B** ☐
43. Le traitement des IST ne vise pas seulement à diminuer la durée de la contagiosité. **A** ☐ **B** ☐
44. Le mot SIDA n'est pas un sigle. **A** ☐ **B** ☐
45. Les rétrovirus se caractérisent au plan physicochimique par leurs sensibilités aux solutions de DAKHIN pendant au moins 5 minutes. **A** ☐ **B** ☐
46. La salive est un liquide biologique à risque élevé de la transmission du virus du SIDA. **A** ☐ **B** ☐
47. La fellation est facteur à risque de la transmission par voie sexuelle du VIH. **A** ☐ **B** ☐

48. La charge virale élevée est un facteur de risque de la transmission mère- enfant du VIH. **A** ☐ **B** ☐
49. Les Baisers simples sont des déterminants de non transmission du VIH. **A** ☐ **B** ☐
50. Les macrophages ont une affinité pour le virus du sida. **A** ☐ **B** ☐
51. L'infection à VIH évolue en quatre stades. **A** ☐ **B** ☐
52. L'année 2017 correspond à la prise de la note circulaire testé et traité tous dans la prise en charge du VIH en CI. **A** ☐ **B** ☐
53. Le virus du SIDA est un Lentivirus. **A** ☐ **B** ☐
54. L'amaigrissement est un symptôme toujours présent chez tous les patients en phase de sida maladie. **A** ☐ **B** ☐
55. Le VIH se transmet uniquement au cours de rapport sexuel non protégés. **A** ☐ **B** ☐
56. Un sujet séropositif est sidéen. **A** ☐ **B** ☐
57. Certains génotypes et phénotypes viraux constituent des facteurs de risque prouvés de la transmission (mère-enfant) du VIH. **A** ☐ **B** ☐
58. Les résultats immédiats constituent un avantage des tests rapides. **A** ☐ **B** ☐
59. La primo-infection à VIH se traduit par l'apparition de maladies opportunistes. **A** ☐ **B** ☐
60. Le pourcentage de transmission du VIH par la voie sanguine est respectivement moins élevé que celui du VHC et du VHB. **A** ☐ **B** ☐
61. Un traitement ARV peut être entrepris dans le but de prévenir la transmission sexuelle du VIH. **A** ☐ **B** ☐
62. Les Cellules du système nerveux sont les cellules microgliales du cerveau. **A** ☐ **B** ☐
63. Le traitement de l'écoulement vaginal doit associer certaines mesures d'hygiène au traitement médicamenteux. **A** ☐ **B** ☐
64. L'accouchement est la voie par excellence de la transmission mère enfant (TME) du VIH. **A** ☐ **B** ☐
65. La transmission par voie sexuelle du VIH est la moins fréquente à l'échelle planétaire. **A** ☐ **B** ☐
66. La prévention et le traitement précoce et efficace des cas d'IST constituent les deux stratégies prioritaires pour le contrôle de ces maladies non contagieuses. **A** ☐ **B** ☐
67. Un traitement ARV efficace permet de prévenir la transmission du VIH d'une personne vivant avec le VIH à son partenaire sexuel. **A** ☐ **B** ☐
68. L'expression Infections du Tractus Génital désigne, toutes les infections transmises par voie sexuelle aux organes génitaux. Et celles qui ne le sont toujours pas. **A** ☐ **B** ☐
69. La transmission du VIH par la voie verticale est majorée lors de l'allaitement que lors de l'accouchement **A** ☐ **B** ☐
70. Le traitement de l'écoulement vaginal doit associer certaines mesures d'hygiène au traitement médicamenteux. **A** ☐ **B** ☐
71. Les Cellules du système immunitaire visées par le VIH sont les lymphocytes CD4 ou T4 et les macrophages. **A** ☐ **B** ☐
72. Dans la contamination par le VIH, il existe toujours un risque résiduel lors d'une transfusion. **A** ☐ **B** ☐
73. Les organes lymphoïdes sont un réservoir important du VIH. **A** ☐ **B** ☐
74. La prévention et le traitement précoce et efficace des cas d'IST constituent les deux stratégies prioritaires pour le contrôle de ces maladies non contagieuses. **A** ☐ **B** ☐
75. Les Cellules du système lymphatique sont les cellules folliculaires dendritiques des ganglions. **A** ☐ **B** ☐
76. Le risque de transmission du VIH est majoré par pénétration anale et les IST que la transfusion. **A** ☐ **B** ☐
77. les pourcentages suivants sont attribués à la transmission sanguine VIH =30%, VHC= 3%, VHB =0,3%. **A** ☐ **B** ☐
78. Il est recommandé d'instaurer un traitement ARV chez toute personne vivant avec le VIH, quel que soit son nombre de lymphocytes CD4. **A** ☐ **B** ☐
79. Les germes responsables de la transmission des infections sexuellement transmissibles sont d'origine bactérienne, parasitaire, mycosique et virale. **A** ☐ **B** ☐
80. Les cellules cibles du VIH sont des cellules qui portent à leur surface un récepteur spécifique (molécule CD4) sur lequel viendra se fixer le virus. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2</u>: ***QCM*** cochez-la ou les bonnes réponses

81. Les éléments de surveillance biologique sont

A- Charge virale plasmatique + Génotype si échec ☐ C. Taux de lymphocytes CD 4 ☐

B- Contrôle des urines (ECBU) ☐ D. Contrôle Hémogramme ☐

82. Les manifestations du début de l'infection à VIH sont:

A- Primo-infection symptomatique ☐ D. Patients asymptomatiques ☐
B- Adénopathies cervicales et axillaires ☐ E. Aucune réponse n'est juste ☐
C. Signes mineurs (zona, mycose, ...) ☐

83. Les IST sont uniquement : (2 réponses justes)

A. Des infections sexuellement transmissibles ☐
B. Des maladies sexuellement transmissibles ☐
C. Des infections du tractus génital ☐

84. Combien de stratégies de prise en charge des IST existent-ils ?

A. Toutes les réponses sont justes ☐ D- deux ☐
B. Quatre ☐ E- un ☐
C. Trois ☐

85. La prévention primaire comporte : (2 réponses justes)

A. Le changement de comportement ☐ C. La prise en charge des partenaires ☐
B. L'amélioration de la disponibilité des préservatifs ☐ D. Aucune réponse n'est juste ☐

86. combien d'approche de prise en charge des IST existent-ils ? (3 bonnes réponses)

A. Approche syndromique ☐ C- Approche étiologique ☐
B. Approche biologique ☐ D- Approche clinique ☐

87. Les étapes du Counseling sont ? (1 bonne réponse)

A. Accueillir le client ☐
B. Expliquer les modes de transmission des IST ☐
C. Décrire les complications en l'absence de traitement ☐
D. Expliquer le traitement et encourager le client ☐

88. La double protection est uniquement : (une bonne réponse)

A. L'utilisation régulière de contraceptifs ☐ C. La non utilisation de préservatif ☐
B. La diversité des partenaires ☐ D. La prévention simultanée des IST et des grossesses ☐

89. Parmi les méthodes suivantes, lesquelles assurent la double protection ? 2 réponses justes

A. Etre circoncit ☐ C. Fidélité réciproque dans un couple monogame plus un contraceptif ☐
B. L'abstinence totale ☐ D. La ligature des trompes ☐

90. Parmi ces éléments, lesquels sont les limites de la double protection?

A La difficulté d'adhésion de tous les membres ☐ C. La non disponibilité des moyens à tout moment ☐
B. L'apprentissage de l'utilisation des méthodes ☐ D. Toutes les réponses sont justes ☐

91. le premier cas du diagnostic du VIH SIDA est fait en 1981

A. USA ☐ B- japon ☐ C. Allemagne ☐ D- France ☐

92. le premier cas du diagnostic du SIDA en Côte d'Ivoire s'est fait en :

A. 1987 ☐ B- 1985 ☐ C. 1984 ☐ D- 1986 ☐

93. le lancement du plan d'élimination de la transmission mère-enfant en Côte d'Ivoire a débuter en:

A. 2012 ☐ B- 2015 ☐ C. 2014 ☐ D- 2016 ☐

94. La note circulaire de l'approche « tester et traiter tous » a débuté en :

A. 2016 ☐ B- 2017 ☐ C. 2014 ☐ D- 2009 ☐

95. Le virus du VIH est sensible à :

A. Eau à 15° pendant 10 minutes ☐ C. Alcool à 70° pendant 15 minutes ☐
B. Soluté de dakin pendant 15 minutes ☐

96. Les liquides biologiques suivants constituent des risques élevés de la transmission du virus :

A. Le liquide amniotique ☐ D. Eau de javel à 12° diluée à 1/10 pendant 05 minutes ☐
B. La salive ☐ E. Le lait maternel ☐
C. Le sperme ☐

97. Les facteurs suivants peuvent favoriser la transmission mère-enfant du VIH :

A. Charge virale élevée ☐ C. Certains génotypes et phénotypes viraux ☐
B. CD4 élevés ☐ D. Primo-infection pendant la grossesse ou l'allaitement ☐

98. Les éléments suivants sont des déterminants de la non-transmission du VIH :

A. L'allaitement maternel ☐ C. Les baisers ☐
B. Les secrétions vaginales ☐ D. Les piqures de mouches ou de moustiques ☐

99. Les éléments suivants sont des déterminants de la propagation du VIH :

A. La pauvreté ☐ C. Le lévirat ☐
B. L'inconscience ☐ D. Le mythe de l'uniforme des corps habillés ☐

100. La prévalence du VIH en Côte d'ivoire chez la femme et chez l'homme est de :

A. Homme 1% - Femme 2% ☐ D. Dégradation de la famille ☐
B. Homme 1,5% - Femme 3,3% ☐ E. Homme 4,3% - Femme 3,1% ☐
C. Homme 3% - Femme3, 7 ☐

101. Les éléments suivants constituent des impacts socioéconomiques du VIH :

A. Réduction significative de l'espérance de vie ☐
B. Augmentation des besoins en soin de santé et réduction de la production agricole ☐
C. Près de la moitié des sujets infectés par le VIH sont avant 25 ans ☐
D. Toutes les réponses sont justes ☐

102. Les éléments suivants constituent des voies de transmission du VIH :

A. Sexuelle ☐ B. Voie digestive ☐ C. Les AES ☐ D. L'allaitement ☐

103. Un seul élément appartient aux facteurs de risque de la transmission par voie sexuelle du VIH. Lequel ?

A. Stade avancé de la maladie ☐ D. Le non utilisation de préservatif ☐
B. Toxicomanie avec échange de sérum ☐ E. Transfusion avec le sang non-testé ☐
C. AES ☐

104. Le VIH se transmet :

A. Par voie sexuelle ☐ C. Par voie verticale ☐
B. Par voie sanguine ☐ D. Toutes les réponses sont justes ☐

105. Le virus du Sida se transmet par :

A. Son ARN mature propre à sa reproduction ☐ C. Les globules étant ses seules cibles ☐
B. Une enzyme appelée transcriptase inverse ☐ D. Son action immunisante après infection éteinte ☐

106. Le VIH n'appartient pas à la famille des :

A. Oncovirus ☐ B. Lentivirus ☐ C. Spumavirus ☐ D. Coronavirus ☐

107. La déficience immunitaire correspond à :

A. L'incapacité de l'organisme à absorber les médicaments ☐
B. L'incapacité du système immunitaire à défendre l'organisme contre les agressions ☐
C. Les difficultés pour l'organisme de métaboliser les nutriments ☐
D. La réaction de l'organisme contre les infections ☐

108. Approche étiologique est basée sur les données de :

A. l'interrogatoire ☐ C. l'examen physique ☐
B. tests de laboratoires ☐ D. A+B+C ☐

109. Approche syndromique est basée sur

A. Tests de laboratoires ☐ C. I 'identification de groupes de signes et de symptômes ☐
B. I 'interrogatoire ☐ D. A+B+C ☐

110. Entourez deux limites de l'approche clinique

A. Erreur de diagnostic et de traitement ☐ C. Tests peu accessibles ☐
B. ignore les infections mixtes ☐ D. Traitement différé ☐

111. Entourez deux avantages de l'approche étiologique

A. Précision diagnostique ☐ C. Traitement spécifique ☐
B. Soulagement rapide ☐ D. Applicable partout ☐

112. Entourez deux avantages de l'approche syndromique

A. Précision diagnostique ☐ C. Traitement spécifique ☐
B. Applicable partout ☐ D. Coût réduit à long terme ☐

113. Entourez deux avantages de la double protection

A. Abstinence totale ☐
B. Préservatif seul ☐
C. Améliore la santé de I 'individu, du couple et de la famille. ☐
D. Diminue les dépenses liées aux maladies et aux grossesses non désirées. ☐

114.Entourez les liquides biologiques à risque élevé de transmission du virus

A. Sang ☐ B. Sperme ☐ C. Sécrétions vaginales ☐ D. A+B+C ☐

115. Entourez deux Facteurs de risques de la transmission par voie sexuelle

A. Stade avancé de la maladie ☐ C. Premier rapport sexuel chez la jeune fille ☐
B. Excision, circoncision ☐ D. Transfusion avec du sang non testé ☐

116. Entourez les déterminants de non transmission du VIH

A. Piqûres d'insectes: mouches, moustiques ☐ C. Natation dans la même piscine ☐
B. Utilisation des mêmes moyens de transport ☐ D. A+B+C ☐

117. Selon la classification de l'OMS 1990 le VIH évolue en:

A. Deux stades ☐ B. Trois stades ☐ C. Quatre stades ☐

118. Le VIH est l'acronyme de :

A. Virus de l'immunodéfience Humaine ☐
B. Virus de l'Immunodéffaillance Humaine ☐
C. Virus de l'Immunodéficience Humaine ☐

119. L'infection à VIH évolue en :

A. Trois stades ☐ B. Quatre stades ☐ C. cinq stades ☐

120. Modes de transmission du VIH par contact sexuel non protégé s'élève à un taux de :

A. 60 % ☐ B. 70% ☐ C. 90% ☐

121. Entourez trois facteurs de risque de la transmission VIH par voie sanguine

A. Transfusion avec du sang non testé ☐ C. Rapports non protégés pendant les menstrues ☐
B. Toxicomanie avec échange de seringues ☐ D. Microtraumatismes lors des rapports ☐

122. Dans du sang en dessiccation le VIH résiste pendant :

A. Une semaine ☐ B. Deux semaines ☐ C. trois semaines ☐

123. Dans l'infection à VIH la transmission mère -enfant se fait à un taux de :

A. 90% ☐ B. 7% ☐ C. 3% ☐

124. Les voies de transmission du VIH sont : cocher la ou les bonnes réponses

A. La voie sexuelle ☐ D. Contact direct avec le sang ou les liquides corporels ☐
B. Grossesses ☐ E. Allaitement maternel ☐
C. Accouchement ☐

125. On peut savoir si on est séropositif au VIH après un rapport non ou mal protégé : cocher la ou les bonnes réponses

A. Dès le lendemain ☐ C. Dans les 72 heures qui suivent le rapport ☐
B. Dans la semaine qui suit ☐ D. Après un délai de séroconversion de plusieurs semaines ☐

126. Lequel de ces facteurs n'est pas à risque de la transmission par voie sexuelle du VIH :

A. La fellation ☐ C. Les microtraumatismes lors des rapports sexuels ☐
B. La prostitution ☐ D. Le stade avancé de la maladie ☐

127. Quel est l'intrus parmi ses facteurs de risque de la transmission mère- enfant du VIH.

A. Charge virale élevée ☐ C. Accouchement par césarienne ☐
B. Primo-infection pendant la grossesse ☐ D. Chorioamniotite ☐

128. Les éléments suivants sont des déterminants de non transmission du VIH : cocher la ou les bonnes réponses

A. Baisers simples ☐ D. Subordination ☐
B. Utilisation du même couvert ☐ E. Analphabétisme ☐
C. Pauvreté ☐

129. Les Rétrovirus ont une affinité pour les défenses immunitaires suivantes : cocher la ou les bonnes réponses

A. Les lymphocytes T4 ☐ C. Les macrophages ☐
B. Les basophiles ☐ D. Les éosinophiles ☐

130. Suite à l'infection par le VIH la séroconversion par les tests rapides se fait à partir de : cocher la bonne réponse

A. 3mois ☐ B. 9 mois ☐ C. 6mois ☐ D- 12mois ☐

131 Parmi les symptômes suivants un est toujours présent chez tous les patients en phase sida maladie lequel :

A. Fièvre ☐ B-amaigrissement ☐ C. Diarrhée ☐ D- tuberculose ☐

132 Des examens suivants un seul permet de faire le diagnostic indirect du VIH lequel:

A. Culture du virus ☐ C. Recherche de l'antigène P24 ☐
B. Dosage de la réverse transcriptase ☐ D. Mise en évidence des anticorps anti-GP41 ☐

133. Les phrases suivantes constituent des avantages des tests rapides sauf un lequel :

A. Peuvent être pratiqué par un personnel non qualifié ☐
B. Les résultats peuvent être obtenus sur place peuvent avoir un coût élevé ☐
C. Peuvent être pratiqué sans équipement spécialisé ☐

134. Le SIDA est : cocher la bonne réponse

A. Un sigle qui signifie Symptôme d'limmuno Déficit Avéré ☐
B. Un acronyme qui signifie Syndrome d'Immuno Déficience Acquise ☐
C. Une maladie contagieuse, d'origine bactérienne. ☐
D. Une maladie contagieuse, d'origine virale. ☐

COACHING

EPREUVE DE SONU

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Le poids du placenta a un poids qui représente les 1/6 du poids du fœtus. **A** ☐ **B** ☐
2. Au cours de l'examen du placenta la découverte des dépôts inter villeux et des calcifications de couleur blanchâtre avec une sensation granuleuse à la palpation, nous indique que le placenta est vieillissant. **A** ☐ **B** ☐
3. La cotation d'APGAR se fait à la 1ère, à la 5ème et à la 10ème minute de naissance du nouveau-né. **A** ☐ **B** ☐
4. La 2ème cotation d'APGAR effectuée à la 5ème minute de naissance du nouveau-né est très déterminante dans la mesure où elle nous oriente en cas de réanimation. **A** ☐ **B** ☐
5. La CPN recentré est basée sur cinq (5) principes. **A** ☐ **B** ☐
6. Les activités de counseling et soutien permettent à la femme de prendre une part aux soins. **A** ☐ **B** ☐
7. Les soins centrés sur la femme mettent l'accent sur la priorité donnée à la santé/ suivie de la mère et du nouveau-né ; . **A** ☐ **B** ☐
8. La préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles sont des composantes importantes de la consultation prénatale recentrée. **A** ☐ **B** ☐
9. Après la sortie du fœtus s'il tarde à crier, à l'aide de l'alcool ou d'une eau de Cologne badigeonner le bébé et le frictionner vigoureusement. **A** ☐ **B** ☐
10. Pour sectionner le cordon du bébé il faut faire deux ligatures à environ 2 cm de l'abdomen de l'enfant. **A** ☐ **B** ☐
11. Après la délivrance il faut obligatoirement surveiller rigoureusement l'accouchée pendant deux heures. **A** ☐ **B** ☐
12. Devant une hémorragie dans le post-partum immédiat on peut penser à une rétention placentaire. **A** ☐ **B** ☐
13. En cas d'hémorragie du post-partum, si l 'hémorragie est minime il faut juste administrer de l'ocytocine. **A** ☐ **B** ☐
14. Le dosage de l'albumine et du sucre dans les urines est effectué à toutes les CPN et obligatoire au cours de la consultation prénatale. **A** ☐ **B** ☐
15. Trois échographies sont obligatoires au cours de la grossesse pour une surveillance plus rigoureuse du fœtus. **A** ☐ **B** ☐
16. Il est conseillé d'effectuer trois échographies au cours de la grossesse. **A** ☐ **B** ☐
17. La 3ème échographie permet en plus de la morphologie de faire le pronostic de l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐
18. Pendant la surveillance de la parturiente si la rupture de la poche des eaux Survient avant l'expulsion du fœtus, il faut veiller à assurer une hygiène rigoureuse car le fœtus n'est plus protégé contre l'infection. **A** ☐ **B** ☐
19. Le retard de croissance ou la mort fœtale peuvent se vérifier à travers les mouvements fœtaux actifs, la hauteur utérine les conjonctives de la gestante. **A** ☐ **B** ☐
20. La 2ème CPN doit s'effectuer au plus tard au 6ème mois de la grossesse. **A** ☐ **B** ☐
21. La consultation prénatale effectuée entre le 7ème et le 8ème mois apprécie l'évolution de la grossesse en recherchant des signes de prématurité. **A** ☐ **B** ☐
22. La dernière consultation prénatale est recommandée au 9ème mois de grossesse deux à trois semaines avant le terme probable de l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐
23. Le taux d'hémoglobine et hématocrite sont des examens du bilan prénatal non obligatoires mais conseillés au cours de la grossesse. **A** ☐ **B** ☐
24. Les Sérologies de la toxoplasmose, de la rubéole et de la syphilis sont des examens obligatoires du bilan prénatal. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

25. Parmi les éléments suivants deux font partir des principes de la consultation prénatale

A. Soins individualisés . ☐
B. Suivi et Evaluation . ☐
C. Counseling et soutien . ☐
D. Prévention des complications et des maladies. ☐
E. Soins centrés sur la femme et le nouveau-né. ☐
F. Soins assurés par un prestataire qualifié. ☐

26. L'insertion du cordon ombilical est dite velamenteuse si :

A. Le cordon est inséré sur le bord du placenta. ☐ C. Le cordon est excentré. ☐

B. Le cordon est inséré sur les membranes. ☐ D. Le cordon est inséré en marge du placenta. ☐

27. Les séquences suivantes décrivent le mécanisme de l'expulsion du fœtus : veuillez les classer dans l'ordre Chronologique

SEQUENCES	ORDRE CHROLNOLOGIQUE
a- Extension complète	A. (1-c), (2-e), (3-a), (4-b), (5-d)
b- Restitution	B. (1-d), (2-b), (3-e), (4-a), (5-c)
C- Engagement-flexion-descente	C. (1-e), (2-d), (3-c), (4-d), (5-a)
d- Expulsion de l'épaule antérieure	D. (1-a), (2-c), (3-d), (4-e), (5-b)
e- Rotation complète, début de 1'extension	E. (1-b), (2-a), (3-b), (4-c), (5-e)

Choisissez la lettre correspondant à l'ordre chronologique correct

28. Après des soins complémentaires doivent être administrés à la mère et à l'enfant ; il s'agit de :

A. Donner à la mère le fer/folate jusqu' au 45ème jour . ☐

B. Donner à la mère 2 doses de vitamine A (200.000 U) a intervalle de 48 heures . ☐

C. Donner à la mère 2 doses de vitamine A (100.000 UI) a intervalle de 24 heures. ☐

D. Donner à la mère le fer/folate jusqu' au 42ème jour. ☐

E. Donner à la mère 2 doses de vitamine A (200.000 U) a intervalle de 24 heures. ☐

F. Donner à la mère le fer/folate jusqu' au 40ème jour. ☐

29. Après l'accouchement, l'accouchée doit bénéficier d'une attention particulière en salle de naissance selon la règle « des trois 6 > ; ce qui signifie qu'on doit revoir la cliente : *Indiquez la bonne réponse*

A. 6ème heure, 6ème jour, 6ème semaine . ☐ C. 6ème minutes, 6ème heures, 6ème jours. ☐

B. 6ème jour, 6ème semaine, 6ème mois. ☐ D. 6ème heure, 6ème semaine, 6ème mois. ☐

30. Devant une Hypertension artériel, des œdèmes des membres inférieurs, reflexes tendineux, protéinurie chez une femme enceinte il faut craindre: *Une seule réponse est juste*

A. Une anémie sévère. ☐ C. Une gestose. ☐

B. Une éclampsie. ☐ D. Un hématome retro-placentaire. ☐

31. Les infections sexuellement transmissibles peuvent se manifester à travers :

Choisir deux bonnes réponse

A. Des pertes physiologiques. ☐ D. Un examen au toucher vaginal. ☐

B. Des leucorrhées. ☐ E. Un examen pelvien. ☐

C. Des condylomes. ☐

32. L 'examen du placenta juste après la délivrance permet : *Deux propositions sont justes*

A. Expliquer un certain nombre de maladie héréditaires. ☐

B. S'assurer de l'intégralité du périnée. ☐

C. S'assurer de I 'intégralité du placenta et des membranes. ☐

D. Confirmer l'âge gestationnel. ☐ E. Confirmer un diagnostic de Placenta Prævia. ☐

33. La Périodicité de la surveillance d'une accouchée en salle d'accouchement se décrit comme suit :

Deux de ces propositions sont justes ; indiquez-les

A. Toutes les 15 mn pendant les 2 premières heures. ☐

B. Toutes les 30 mn après la 3ème heure. ☐

C. Toutes les 15 mn pendant la première heure. ☐

D. Toutes les heures pendant les 3 dernières heures. ☐

E. Toutes les 15 mn pendant les 3 premières heures. ☐

F. Toutes les heures pendant les 2 dernières heures. ☐ G. Toutes les 30 mn pendant la 3èmne heure. ☐

34. La seconde consultation prénatale permet de : *Deux réponses sont exactes*

A. Suivre l'évolution de la hauteur utérine. ☐

B. Sensibiliser à l'environnement de l'accouchement. ☐

C. Faire la prophylaxie antianémique. ☐

D. Rechercher les risques d'accouchement de prématurité. ☐

E. Faire la première dose de SAT si nécessaire. ☐ F. Suivre l'évolution de la grossesse. ☐

35. Le bilan au cours de la grossesse est composé des examens obligatoires qui suivent :

Choisir les deux réponses justes

A. Sérologie de la toxoplasmose (si positif surveiller tous les mois). ☐

B. Sérologie de la rubéole (au 1er Trimestre) . ☐

C. Sérologie de la rubéole (au 2ème Trimestre) . ☐

D. Sérologie de l'hépatite B. ☐

E. Sérologie VIH. ☐ F. Sérologie de la toxoplasmose (si négatif surveiller tous les mois) . ☐

36. Au moment de l'expulsion de la tête il faut exécuter les gestes suivants :

Indiquer les deux bonnes réponses

A. Prendre avec douceur simultanément la tête et les épaules. ☐

B. Prendre avec douceur la tête puis les épaules. ☐

C. Prendre avec douceur les épaules de l'enfant. ☐

D. Empêcher la parturiente de pousser. ☐

E. Demander à la parturiente de pousser. ☐ F. Demander à la parturiente de prendre une bonne inspiration. ☐

37. L'accouchement se passe en trois temps qui sont : *Choisir les trois bonnes réponses*

A. Le début des contractions de l'utérus. ☐ E. L'effacement et dilatation du col. ☐

B. La descente du fœtus vers le bassin. ☐ F. Le début du travail. ☐

C. L'expulsion du fœtus. ☐ G. L'expulsion du placenta. ☐

D. La sortie des annexes, délivrance. ☐

38. Pendant la période de la délivrance pour prévenir une l'hémorragie de la délivrance il faut :

Une seule réponse est exacte

A. Vider la vessie, avant l'expulsion. ☐

B. Faire ne injection de 5 unités de Syntocinon à la vue des épaules. ☐

C. Faire une toilette vulvaire après l'expulsion. ☐

D. Rassurer la patiente et la guider pour les efforts pendant ce moment. ☐

39. Parmi les éléments de surveillance après l'accouchement ci-dessous, deux sont correctes indiquez les :

A. L'évolution utérine ☐ C. L'écoulement vaginal ☐

B. Constantes ☐ D. Les douleurs pelviennes ☐ E. Les lochies ☐

40. Parmi les propositions suivantes une seule est une complication mineure après un accouchement, laquelle?

A. L'infection urinaire ☐ B. L'inflammation ☐ C. L'hématome ☐

COACHING

EPREUVE DE NUTRITION

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les habitudes de vie (alcool. tabac), le stress n'ont pas d'influence sur le besoin alimentaire. **A** ☐ **B** ☐
2. Un homme avec IMC 30 est en surpoids. **A** ☐ **B** ☐
3. Un homme avec IMC 25 < IMC<30 est en surpoids. **A** ☐ **B** ☐
4. Concernant la classification de I 'état nutritionnel. **A** ☐ **B** ☐
5. Les vitamines protègent contre les agents pathogènes et Régulation des processus corporels. **A** ☐ **B** ☐
6. Produits laitiers sont Riche en protéines, glucides, lipides, Vitamines (B2 +++), minéraux (calcium, phosphore) . **A** ☐ **B** ☐
7. La balance de Salter Permet de faire la pesée jusqu'à 25 kg. **A** ☐ **B** ☐
8. La taille se mesure à l'aide d'une toise. **A** ☐ **B** ☐
9. On mesure arrêté chez l'enfant de moins de 24 mois. **A** ☐ **B** ☐
10. La nutrition est l'ensemble des aliments transformés dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. **A** ☐ **B** ☐
11. Les aliments sont des substances naturelles complexes qui contiennent au moins deux nutriments. **A** ☐ **B** ☐
12. L'alimentation est 'action volontaire d'introduire les aliments dans I 'organisme par la bouche. **A** ☐ **B** ☐
13. La calorie est I 'unité de mesure de la valeur énergétique et de la quantité d'énergie contenue dans l'aliment. **A** ☐ **B** ☐
14. Les nutriments sont des substances chimiques provenant de la transformation de l'aliment dans l'organisme. **A** ☐ **B** ☐
15. La malnutrition se présente sous trois formes qui sont: normales, aigue sévère et aigue modérée. **A** ☐ **B** ☐
16. L'hygiène pauvre, le manque d'accès aux soins de santé sont des causes des maladies à la malnutrition. **A** ☐ **B** ☐
17. ATPE signifie application thérapeutique près à l'emploi. **A** ☐ **B** ☐
18. Les macronutriments sont des substances qui sont nécessaires en grande quantité au bon fonctionnement de I 'organisme. **A** ☐ **B** ☐
19. Les micronutriments sont des substances qui sont nécessaires en petites qualité au bon fonctionnement de l'organisme. **A** ☐ **B** ☐
20. Le traitement de la malnutrition aiguë modérée se fait en ambulatoire. **A** ☐ **B** ☐
21. Pour détecter une malnutrition on évalue la taille et le poids de l'enfant de 0 à 5 mois. **A** ☐ **B** ☐
22. Le métabolisme reste l'ensemble des transformations qui s'accomplissent dans l'organisme vivant. **A** ☐ **B** ☐
23. Le goitre est une maladie due à une carence en proteino-énergétique. **A** ☐ **B** ☐
24. L'avitaminose A est l'une des maladies par carence alimentaire. **A** ☐ **B** ☐
25. L'anémie est I 'une des maladies par carence alimentaire. **A** ☐ **B** ☐
26. La sédentarité est le quatrième facteur de risque de la mortalité à l'échelle mondiale. **A** ☐ **B** ☐
27. La pyramide alimentaire comporte trois versants et sept niveaux. **A** ☐ **B** ☐
28. La malnutrition désigne un état pathologique causé par la déficience ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments en quantité ou en qualité. **A** ☐ **B** ☐
29. Les maladies par excès alimentaire sont obésité, kwashiorkor, le diabète. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

30. IMC, évaluer le risque que représente le poids corporel pour la santé parmi les propositions suivantes
Cochez la ou les bonnes réponses

A. IMC inférieur à 16, traduit la malnutrition sévère. ☐
B. IMC entre 18,5 et 25 est dite Normale. ☐
C. IMC Entre 30 et 35 est dite Obésité. ☐
D. IMC Entre 30 et 35 est dite Normale. ☐
E. IMC Entre 25 et 30 est Obésité morbide. ☐

31. Les aliments énergiques de base sont

A. Céréales. ☐ B. Racines et tubercules. ☐ C. Huile et matière grasse. ☐

32. Un homme de 78 kg avec 1,80 m a pour IMC

A. 25 normal. ☐ B. 24, 07 normal. ☐ C. 32 Obèse. ☐

33. Concernant le Périmètre brachial ou MUAC cochez la ou les bonnes réponses

A. Permet de Mesurer l'épaisseur du tissu musculaire et graisseux sous cutané au niveau du biceps. ☐
B. Indiquée chez I 'enfant de moins de 6 mois. ☐
C. Outil de mesure : bandelette de Shakir. ☐
D. Indiquée chez l'enfant à partir de 6 mois. ☐

34. L'évaluation de l'état nutritionnel permet de déterminer si une personne ou un groupe de la population est bien nourri (sous-alimenté, suralimenté, carence en micronutriment(s) Parmi les propositions suivantes trois bonnes réponses

A. Aide à dépister à un stade précoce les éventuels problèmes de santé et de nutrition. ☐
B. Aide à identifier les comportements à risque ou les facteurs qui pourraient contribuer aux problèmes de santé et au mauvais état nutritionnel. ☐
C. Donne une information sur l'état nutritionnel actuel et le changement de poids. ☐
D. Aide à dépister à un stade avancé les éventuels problèmes de santé et de nutrition. ☐
E. Aide à identifier les comportements à risque ou les facteurs qui pourraient éviter aux problèmes de santé et au mauvais état nutritionnel. ☐

35. Buts de l'identification d'un problème nutritionnel est Cochez la ou les bonnes réponses

A. Définir les besoins, établir un plan d'intervention. ☐
B. Evaluer I 'impact d'un programme/recommandations nutritionnelles. ☐
C. Orienter ou formuler des politiques. ☐
D. Sensibiliser la population/ l'individu et améliorer sa contribution en vue d'un impact durable. ☐
E. Toutes les réponses sont justes. ☐

36. les Noix et graines sont riches en Lipides polyinsaturés, fibres alimentaires, protéines Vitamines (B+++ sauf B12), minéraux et de composés photochimiques parmi les propositions suivantes deux sont graines, lesquelles?

A. Amande . ☐ B- tournesol . ☐ C. Sésame. ☐ D- Arachide. ☐

37. les Noix et graines sont riches en Lipides polyinsaturés, fibres alimentaires, protéines Vitamines (B+++ sauf B12), minéraux et de composés photochimiques parmi les propositions suivantes trois sont des noix, lesquelles?

A. Amande . ☐ B- tournesol . ☐ D. pistache. ☐ C- Arachide. ☐ E- sésame. ☐

38. Les Légumes Sont Riches en protéines, glucides (fibres alimentaires +++) Vitamines (B9, B1) minéraux et composés photochimiques Parmi les propositions trois sont des légumes, lesquelles ?

A. Blé. ☐ B. Haricot sec. ☐ C- Avoine. ☐ D- Pois secs. ☐ E- Soja. ☐ F- Maïs. ☐

39. Les Produits céréaliers contribuent largement à l'apport énergétique du régime alimentaire. riches en glucides, en vitamines du groupe B (sauf B12), en minéraux et composés photochimiques parmi les propositions suivantes trois sont des produits céréaliers, lesquels ?

A. Blé. ☐ B. Haricot sec. ☐ C. Millet. ☐ D- Pois secs. ☐ E- Sorgho. ☐

40. Concernant les groupes d'aliments les légumes et fruits sont riches en glucides, vitamines, minéraux et composé photochimiques Cochez la ou les bonnes réponses ci-dessous

A. Les légumes sont représentés par les Tomate, aubergine, gombo Igname, manioc, pomme de terre Carotte, navet, bette rave... Ail, oignon... . ☐
B. Les fruits sont les Tomate, aubergine, gombo, igname, manioc, pomme de terre Carotte, navet, betterave... .☐
C. Fruits sont les Ananas, papaye, goyave, mangue... Fraise, framboise, bleuet... Poire, pomme, raisin... citron,orange, pamplemousse ☐

41. L'eau Représente 60% de la masse corporelle

. Apport: 2-3 L/jr

. Rôle: Maintien de l'équilibre hydrique, Régulation de la température corporelle, Elimination des déchets.Transport de substances.

Après ces informations sur l'eau, Cochez la ou les bonnes réponses ci-dessous

A. Un homme de 70 kg, l'eau représente 42% de sa masse corporelle. ☐
B. Un homme de 56 kg l'eau représente 33.6 % de sa masse corporelle. ☐
C. Un homme de 54 kg l'eau représente 20% de sa masse corporelle ☐

42. Concernant les minéraux nous avons les Macroéléments et les Oligo-éléments

Dans la liste ci-dessous laquelle représente des Macroéléments ?

A. calcium, magnésium, phosphore, chlore, potassium, sodium. ☐

B. Fer, Zinc, manganèse, fluor, cuivre, sélénium, iode, chrome, molybdène. ☐

43. Concernant les minéraux nous avons les Macroéléments et les Oligo-éléments

Dans la liste ci-dessous laquelle représente des oligo-éléments ?

A. Fer, zinc, manganèse, fluor, cuivre, sélénium. ☐

B. calcium, magnésium, phosphore, chlore, potassium, sodium. ☐

44. Concernant les groupes de vitamines Cochez les bonnes réponses

A. Les vitamines Hydrosolubles sont les Vitamines groupe B et C. ☐

B. Les vitamines Liposolubles sont les Vitamines groupe B et C. ☐

C. Les vitamines Liposolubles sont A, D, E, K. ☐

D. Les vitamines Liposolubles sont B et C. ☐

45. Concernant les protéines Co chez la ou les bonnes réponses

A. Origine végétale et animale. ☐

B. Origine végétale uniquement. ☐

C. Apport: 10-35% de l'énergie consommée ou 0,8 g/Kg. ☐

D. Rôle: Production des composantes fonctionnelles (enzymes), Développement, croissance et maintien des cellules Régulation des processus corporels et Energie... ☐

E. 1 gramme représente 4 Kcal. ☐

F. 1gramme représente 9 Kcal . ☐

46. Concernant les lipides Cochez la bonne ou les bonnes réponses

A. Apport: 20-35% de l'énergie consommée. ☐

B. Rôle: Energie, Développement, croissance et maintien des cellules. ☐

C. 1 gramme représente 9 Kcal. ☐

D. 1 gramme représente 4 Kcal. ☐

47. Concernant les Glucides Cochez la ou les bonnes réponses

A. Origine végétale essentiellement . ☐

B. Apport: 45-65% de l'énergie consommée. ☐

C. Apport: 20-35% de l'énergie consommée. ☐

D. Origine animale essentiellement. ☐

E. Rôle: fournir de l'énergie. ☐

48. Concernant les classes de nutriments, Six principales classes de nutriments existent Cochez la ou les bonnes réponses

A. Les Glucides, les protides et les lipides sont des micronutriments. ☐

B. Les Glucides, les protides et les sont des macronutriments. ☐

C. Les macronutriments sont des sources d'énergies. ☐

49. Quelle est la définition exacte de la Malnutrition

A. État pathologique causé par une sous-alimentation, suralimentation, un excès en micronutriments ou une malabsorption de nutriments. ☐

B. État pathologique causé par une sous-alimentation, suralimentation, une carence en micronutriments ou une malabsorption de nutriments. ☐

C. État physiologique causé par une sous-alimentation, suralimentation, une carence en micronutriments ou une malabsorption de nutriments. ☐

50. Chez les enfants de 6 à 59 mois

. Périmètre brachial

. Particulièrement utile pour identifier les enfants ayant un risque élevé de mortalité, Cochez les bonnes réponses

A. Un enfant avec un périmètre brachial inférieur à 115 à une malnutrition aiguë sévère. ☐

B. Un enfant avec un périmètre brachial supérieur à 125 mm est normal. ☐

C. Un enfant avec un périmètre brachial inférieur à 125 est normal. ☐

51. Quels sont les Facteurs qui influencent les besoins nutritionnels dans cette liste

A. Le sexe, l'âge. ☐

B. la grossesse et l'allaitement, le stress. ☐

C. toutes les réponses sont fausses. ☐

D- le NAP, I 'état de santé. ☐

E- Toutes réponses sont justes. ☐

52. Le Besoin nutritionnel est

A. La quantité de nutriments nécessaire à l'organisme pour combler les besoins cellulaires. ☐

B. La quantité d'aliments nécessaire à I 'organisme pour combler les besoins cellulaires. ☐

C. La quantité de nutriments nécessaire à I 'organisme pour combler les excès cellulaires. ☐
D. La quantité de nutriments nécessaire à I 'organisme pour combler les défauts cellulaires. ☐

53. Un Nutriment est :

A. Substance biologique obtenue des aliments et utilisée dans l'organisme pour fournir de l'énergie, des Composants structuraux et des composés soutenant la croissance, I 'entretien et la réparation des tissus de l'organisme. ☐
B. Substance chimique obtenue des aliments et utilisée dans 'organisme pour fournir de l'énergie, des composants structuraux et des composés soutenant la croissance, l'entretien et la réparation des tissus de l'organisme. ☐

54. Un aliment est :

A. Substance solide ou liquide qui sert de nourriture à l'organisme. ☐
B. Substance et liquide qui sert de nourriture à l'organisme. ☐

55. Les trois groupes d'aliments sont sauf deux. Lesquels ?

A. Energétique. ☐ B. Equilibré . ☐ C- construction. ☐ D- protection . ☐ E- protéines. ☐

56. Les clés pour une hygiène alimentaire plus sure sont sauf un. Lequel ?

A. Prenez I 'habitude de la propreté . ☐
B. Conserver les aliments chauds au frigo . ☐
C. Mangez les aliments bien chauds. ☐
D. Séparez les aliments crus des aliments cuits. ☐
E. Utilisez de l'eau et des aliments frais. ☐

57. Les conséquences de la malnutrition à long terme sont sauf un. Lequel ?

A. Incapacité. ☐
B. Taille adulte. ☐
C- maladie métabolique. ☐
D- performance reproductive. ☐

COACHING

EPREUVE D'ÉPIDÉMIOLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1- Un cas est un ensemble de critères utilisés (critères cliniques et/ou de laboratoire) pour déterminer si une personne est atteinte d'une maladie particulière. **A** ☐ **B** ☐
2- L'épidémiologie est une discipline scientifique qui s'intéresse à un individu au sein de sa communauté. **A** ☐ **B** ☐
3- L'axe analytique répond à la question « pourquo1 >». **A** ☐ **B** ☐
4 L'axe analytique évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population. **A** ☐ **B** ☐
5- le paludisme est une maladie endémique. **A** ☐ **B** ☐
6- L'épidémie est une apparition soudaine, attendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. **A** ☐ **B** ☐
7- Le seuil d'action est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'endémie. **A** ☐ **B** ☐
8- Le coronavirus est une maladie pandémique. **A** ☐ **B** ☐
9- La thérapie dans I 'approche clinique consiste la guérison du malade. **A** ☐ **B** ☐
10-L'approche épidémiologique consiste à rechercher la cause d'apparition de la maladie et de sa propagation dans la population. **A** ☐ **B** ☐
11- Un cas épidémiologique est un ensemble de critères qui permettent de préciser les malades qui doivent être notifié pour la surveillance. **A** ☐ **B** ☐
12- Une maladie épidémique peut se muter en une maladie pandémique. **A** ☐ **B** ☐
13- Le taux induit une notion d'espace et la probabilité pour un individu de s'exposer à une situation donnée. **A** ☐ **B** ☐
14- La contribution à l'amélioration de la santé des populations est un intérêt de l'étude épidémiologique. **A** ☐ **B** ☐
15- L'approche clinique s'intéresse au malade tandis que I 'approche épidémiologique à la maladie. **A** ☐ **B** ☐
16- L'approche épidémiologique a pour sujet d'intérêt, la maladie. **A** ☐ **B** ☐
17- Une pandémie est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois, voir la planète dans un temps limite. **A** ☐ **B** ☐
18- Dans I 'approche clinique, le diagnostic permet l'identification d' un phénomène de groupe important. . **A** ☐ **B** ☐
19- L'axe descriptif dans l'étude épidémiologique répond à ses questions : quand (temps), où (lieu), quoi (population, cible) et combien (nombre) . **A** ☐ **B** ☐
20- L'endémie est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. **A** ☐ **B** ☐
21- L'épidémiologie est une discipline scientifique qui étudie la distribution et les déterminants des états de santé et des maladies dans la population humaine ainsi que des influences qui déterminent cette distribution. (OMS, 2010) . **A** ☐ **B** ☐
22- Mesurer l'état de santé d'une population est un but de l'épidémiologie. **A** ☐ **B** ☐
23- Les indicateurs de santé à tendance positive mesure la santé. **A** ☐ **B** ☐
24- Les indicateurs de santé à tendance négative mesurent uniquement les décès. **A** ☐ **B** ☐
25- Il existe quatre domaines d'application en épidémiologie. **A** ☐ **B** ☐
26- Les axes en épidémiologie sont au nombre de deux. **A** ☐ **B** ☐
27- L'épidémiologie descriptive permet de répondre aux quatre questions : quand ? où ? chez qui ? comment ? **A** ☐ **B** ☐
28- L'épidémiologie analytique fait le dénombrement du nombre de cas de maladies dans une zone donnée, au cours d'une période d'observation considérée. **A** ☐ **B** ☐
29- Le sujet d' intérêt dans l'approche épidémiologique des problèmes de santé est le malade. **A** ☐ **B** ☐
30- La finalité thérapeutique dans l'approche clinique des problèmes de santé est le contrôle, l'éradication, la maitrise et l'élimination. **A** ☐ **B** ☐
31- La vérification de la guérison dans l'approche épidémiologique est la disparition des signes cliniques donnée, au cours d'une période d'observation considérée. **A** ☐ **B** ☐

32- Les phénomènes de masses en épidémiologie sont l'épidémie, la pandémie et l'épidémie donnée, au cours d'une période d'observation considérée. **A** ☐ **B** ☐
33- L'épidémie est un phénomène de masse illimité dans le temps et limité dans l'espace donnée, au cours d'une période d'observation considérée. **A** ☐ **B** ☐
34- La pandémie est phénomène de masse limité dans le temps et illimité dans I 'espace donnée, au cours d'une période d'observation considérée. **A** ☐ **B** ☐
35- L'endémie est un phénomène de masse limité dans le temps et dans l'espace. **A** ☐ **B** ☐
36- La proportion est un rapport dans lequel le numérateur et le dénominateur désignent la même entité. **A** ☐ **B** ☐
37- L'indice est un rapport dans lequel le numérateur n'est pas inclut dans le dénominateur et que l'un et l'autre se référant à des événements distincts. **A** ☐ **B** ☐
38- Dans le contrôle de la maladie l'agent pathogène n'est pas entièrement éliminé de l'environnement mais le risque de se recontaminer n'est plus possible. **A** ☐ **B** ☐
39- Dans l'éradication d'une maladie, la maladie et le germe en cause sont supprimés, le risque de recommandation n'est plus possible. **A** ☐ **B** ☐
40- L'épidémiologie analytique répond aux questions : combien ? **A** ☐ **B** ☐
41- L'épidémiologie analytique répond aux questions : pourquoi ? **A** ☐ **B** ☐
42- L'élimination d'une maladie consiste à supprimer la maladie (plus de cas) mais l'agent pathogène n'est pas entièrement éliminé de l'environnement. **A** ☐ **B** ☐
43- Les indicateurs de santé sont repartis en deux grands groupes. **A** ☐ **B** ☐
44- La recherche des causes d'apparition de la maladie et de sa propagation dans la, population s'inscrit dans l'approche clinique de la démarche épidémiologique. **A** ☐ **B** ☐
45- Comprendre les états de santé et de la maladie est l'un des buts de l'épidémiologie. **A** ☐ **B** ☐
46- Le rapport est une soustraction qui met en rapport deux quantités. **A** ☐ **B** ☐
47- Le sujet d'intérêt dans l'approche épidémiologique des problèmes de santé est la maladie et les individus ayant contracté cette maladie. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

48- Les domaines d'application d 'une étude épidémiologique sont :
A. L'épidémiologie des maladies transmissibles ☐
B. L'épidémiologie des maladies non transmissibles ☐
C. L'épidémiologie de maladies contagieuses ☐
D. L'épidémiologie des maladies métaboliques ☐

49- La maladie à EBOLA virus en Guinée et au Liberia était :
A. Une épidémie ☐ B. Une endémie ☐ C. Une pandémie ☐

50- Parmi ses concepts statistiques utilisés en épidémiologie, quels sont ceux dont le numérateur est exclu du dénominateur.
A. La proportion ☐ B. L'indice ☐ C. Le ratio ☐ D. Le taux ☐

51- Choisissez les réponses justes
A. Epidémie (temps : limité), (espace : limité) ☐ C. Endémie (temps : limité), (espace : illimité) ☐
B. Pandémie (espace : illimité), (temps : limité) ☐ D. Endémie (espace : limité), (temps : illimité) ☐

52- Les buts d'une étude épidémiologique sont:
A. Comprendre les états de maladie, ☐ D. Mesurer les risques individuels et collectifs, ☐
B. Mesurer l'état de santé d'une population, ☐
C. Identifier les agents pathogènes, les modes de transmissions et les facteurs de risques ☐

53- Dans l'approche épidémiologique des problèmes de santé, l'une des thérapies mise suivante n'est pas juste:
A. Contrôle ☐ B. Eradication ☐ C. Elimination ☐ D. Guérison du malade ☐

54- Une pandémie est un phénomène :
A- Limité dans le temps ☐ C. Limité dans l'espace ☐
B- Illimité dans I 'espace ☐ D. Illimité dans le temps ☐

55- Une épidémie est un phénomène:
A- Limité dans le temps ☐ C. Limité dans l'espace ☐
B- Illimité dans I 'espace ☐ D. Illimité dans le temps ☐

EPREUVE DE PARASITOLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les échantillons sont uniquement conservés avant leur analyse. **A** ☐ **B** ☐
2. L'examen direct se fait dans la phase pré-analytique. **A** ☐ **B** ☐
3. Les helminthes sont recherchés uniquement dans les selles. **A** ☐ **B** ☐
4. La phase érythrocytaire au cours du cycle du plasmodium se déroule dans les cellules hépatiques. **A** ☐ **B** ☐
5. Les signes cliniques du paludisme apparaissent pendant le cycle érythrocytaire du plasmodium. **A** ☐ **B** ☐
6. La fièvre tierce maligne est due à Plasmodium falciparum. **A** ☐ **B** ☐
7. L'ankylostomose se contracte chez les enfants par les mains sales. **A** ☐ **B** ☐
8. La femelle parthénogénétique est responsable de l'anguillulose. **A** ☐ **B** ☐
9. Les signes cliniques du paludisme apparaissent pendant le cycle pré-érythrocytaire du plasmodium. **A** ☐ **B** ☐
10. La femelle parthénogénétique vit chez le malade atteint de strongyloidose. **A** ☐ **B** ☐
11. Le cycle sexué du plasmodium est encore appelé cycle schizogonique. **A** ☐ **B** ☐
12. La spoliation sanguine de l'ankyslostoma duodénale est de 0,2mi/j/ver. **A** ☐ **B** ☐
13. Strongyloidesstercoralos est un vers de la muqueuse duodénale. **A** ☐ **B** ☐
14. L'œuf de l'oxyure est infestant à la ponte. **A** ☐ **B** ☐
15. L'ankylostomose se contracte chez les enfants par les mains sales. **A** ☐ **B** ☐
16. La femelle parthénogénétique de l'anguillule vit exclusivement chez le malade. **A** ☐ **B** ☐
17. Le plasmodium ovale est un agent pathogène du paludisme. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

18. La prophylaxie des parasitoses intestinales consiste à observer ces mesures d'hygiènes, sauf une, laquelle ?

A- lutte contre le péril fécal ☐
B- construire des latrines ☐
C- éviter de manger les sauces bien cuites avec de la viande ☐
D- laver les mains avant chaque repas ☐

19. Lequel des échantillons suivants a un temps de transport ne dépassant pas 30 mn ?

A- selles moulées ☐ C- selles liquides ☐
B- selles dures ☐ D- selles pâteuses ☐

20. Ces produits biologiques sont prélevés au laboratoire d'analyses médicales sauf un, lequel ?

A- le sang ☐ C- liquide pleural ☐
B- le LCR ☐ D- l'eau de javel ☐

21. Les protozoaires sanguinoles sont recherchés dans les échantillons suivants :

A. hématie ☐ C. Urines ☐
B. sérum ☐ D. eau ☐

22. À quelle classe appartient-il le plasmodium ?

A- Ciliés ☐ B- Rhizopodes ☐ C- flagellés ☐ D- Sporozoaires ☐

23. Les protozoaires sanguinoles sont recherchés dans les échantillons suivants.

A- hématie ☐ B. sérum ☐ C. Urines ☐ D- eau de javel ☐

24. A quelle étape du cycle apparaissent-ils les signes cliniques du paludisme ?

A- cycle hépatique ☐ C- cycle érythrocytaire ☐
B- cycles exo-érythrocytaire ☐ D- cycle sporogonique ☐

25. Parmi les propositions suivantes concernant le cycle du plasmodium chez I 'homme, une est fausse laquelle ?

A- apparaissent les gamètes males et les gamètes femelles ☐
B- comprend une phase hépatique et une phase érythrocytaire ☐
C- aboutit à l'apparition des gamétocytes ☐
D- apparaissent les signes cliniques ☐

26. Toutes ces caractéristiques se rapportent à la forme parthénogénétique de l'anguillule sauf une, laquelle.

A- elle occasionne une auto-infestation ☐ C- elle est la forme qui contamine ☐
B- elle vit chez le malade ☐ D- elle pond ses œufs dans la muqueuse duodénale ☐

27. Dans les propositions suivantes une seule est fausse, laquelle ? Dans l 'oxyurose la prophylaxie consiste à :

A- traiter tous les membres de la famille ☐ C- traiter seulement ceux qui sont atteints ☐
B- se laver les mains avant chaque repas ☐ D- couper les ongles courts ☐

28. Indiquer le protozoaire hématophage

A- trichomonas vaginalis ☐ B- trichomonas intestinalis ☐ C- entamoeba ☐

29. Le paludisme peut être contracté par :

A- transfusion sanguine ☐ C- contact homme à homme ☐
B- transmission sexuelle ☐ D- ingestion de crudités souillées ☐

30. Dans la liste suivante, indique-le (les) parasites qui entrainent une auto-infestation

A- Ascaris ☐ C- ankylostoma duodénale ☐
B- L'Oxyure ☐ D- strongyloidesstercoralis ☐

31. Parmi les propositions suivantes concernant le cycle de plasmodium chez les anophèles, laquelle est fausse ?

A- C'est le cycle sexué du plasmodium ☐ C- le moustique digère les gamétocytes ☐
B- les protozoaires sont stockés dans sa salives ☐ D- l'anophèle est infesté à vie ☐

32. La lutte contre le péril fécal est obligatoire pour éviter ces parasites, sauf un, lequel ?

A- Ascaris ☐ B- Anguillule ☐ C- ankylostome ☐ D- Plasmodium ☐

33. Ces parasites sont des protozoaires, sauf un, lequel?

A- Amibe ☐ C- Enterobiusvermicularis ☐
B- Plasmodium ☐ D- le Trichomonas vadinalis ☐

COACHING

EPREUVE DE IECC / CCC

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Dans le processus de communication, si l'objectif n'est pas fixé au départ, il sera difficile de mesurer les résultats à la fin. **A** ☐ **B** ☐
2. Pour arriver à CCSC nous avons connu 5 éditions dans les concepts de la communication. **A** ☐ **B** ☐
3. La méthode est la technique que je vais utiliser pour le message. **A** ☐ **B** ☐
4. Le comportement c'est l'ensemble des manières de faire ou de pratiques propres à un individu ou à un groupe d'individus. **A** ☐ **B** ☐
5. La communication pour le changement de comportement est un processus interactif et participatif. **A** ☐ **B** ☐
6. La CCC permet d'échanger des informations, des idées, des connaissances, des opinions et de décisions. **A** ☐ **B** ☐
7. La perception, c'est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d´informations externes pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure. **A** ☐ **B** ☐
8. Les croyances correspondent à un élément de connaissances descriptives qu'un individu entretient à l'égard d'un objet. **A** ☐ **B** ☐

• La communication interpersonnelle repose sur six éléments principaux. **A** ☐ **B** ☐

9. Le but du plaidoyer est d'influencer le changement de politique. **A** ☐ **B** ☐
10. La communication de groupe fait intervenir au moins deux personnes dans le processus de communication. **A** ☐ **B** ☐
11. Les attitudes résument les évolutions positives ou négatives, les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir. **A** ☐ **B** ☐
12. La rétroaction, c'est la réaction du récepteur du message vers l'émetteur ou le retour de l'information à l'émetteur. **A** ☐ **B** ☐
13. Les responsables de la mobilisation sociale sont les agents de santé, les OBC et la société. **A** ☐ **B** ☐
14. Obstacles liés au récepteur sont méfiance, préjugés, inapproprié et distraction. **A** ☐ **B** ☐
15. La culture est l'ensemble des normes, rites valeurs, convictions et habitudes d'une société. **A** ☐ **B** ☐
16. Toute société met en place un système de stratification sociale des différentes classes sociales **A** ☐ **B** ☐
17. La modification du comportement humain suit généralement un processus progressif. **A** ☐ **B** ☐
18. La segmentation consiste à découper un public cible donné en groupes homogènes afin de leur adresser des messages spécifiques et adaptés. **A** ☐ **B** ☐
19. L'un des obstacles liés à l'émetteur dans la communication est le non-respect des autres. **A** ☐ **B** ☐
20. La communication par rapport au langage utilisé est seulement une communication verbale. **A** ☐ **B** ☐
21. Les facteurs environnementaux susceptibles à influencer sur le CCSC sont la culture et le milieu social. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

22. Les étapes d'un processus de changement de comportement sont sauf un lequel ?

A. Connaissance ☐ C- Perception et prise de conscience ☐
B. Action ☐ D- Les attitudes ☐

23. Les facteurs internes susceptibles à influencer sur le CCSC sont :

A. Les connaissances ☐ C- la perception ☐
B. La culture ☐ D- les croyances ☐

24. Dans la liste qui suit, retenez deux éléments constitutifs de la communication

A. Signal ☐ B- receveur ☐ C- Emetteur ☐ D. message ☐

25. Identifiez deux éléments du paralangage sur la liste suivante

A. Les mimiques du visage ☐ C. la façon de parler ☐
B. L'élocution ☐ D. la tenue vestimentaire ☐

26. Indiquez dans la liste deux obstacles liés à l'émetteur dans le processus de communication

A. Le refus du message ☐ C. le non-respect des autres ☐
B. La maitrise du sujet ☐ D. mauvaise attitude ☐

27. Indiquez dans la liste deux obstacles liés à l'émetteur dans le processus de communication

A. Reconnaissance du public ☐ C- non disponibilité ☐
B. Mauvaise diction ☐ D. trop de patience ☐

28. Les obstacles liés au message sont sauf deux. Lesquels ?

A. Confus et imprécis ☐ C. reformulé ☐
B. Appliqué ☐ D. trop long ou trop court etc. ☐

29. Avant toute animation, l'animateur doit se poser les questions pour identifier son public cible :

A. Quel est son problème ? ☐ C- qui suis-je ? ☐
B. A qui vais-je parler ? ☐ D- quel nouveau comportement vais-je lui imposer ? ☐

30. Les obstacles liés au récepteur sont :

A. Mauvaise perception du message ☐ C. défiance ☐
B. Non disponibilité ☐ D. existence de feed-back ☐

31. Ces éléments sont des constitutifs de la communication sauf un. Lequel ?

A. Récepteur ☐ B. le codage ☐ C. Plaidoyer ☐ D- le canal ☐

32. Les obstacles liés au canal sont sauf deux lesquels ?

A. indirect ☐ B. Timidité ☐ C- message compliqué ☐ D- inadapté ☐

33. EPS signifie :

A. Education physique de la santé ☐ C. éducation pour la santé ☐
B. Education pour la société ☐ D. éducation de personnel de santé ☐

34. Les différents types de communications sont sauf un. Lequel ?

A. Interpersonnelle ☐ B. Sociale ☐ C. de masse ☐ D. de groupe ☐

35. Les éléments suivants sont des éléments principaux de la communication

A. La perception ☐ B- le codage ☐ C. Le message ☐ D. encodage ☐

COACHING

EPREUVE D'UROLOGIE

Consignes

→Pour les questions QCD réponds par A si l'affirmation est vraie ou par B si elle est fausse
→Pour les questions QCM choisis la ou les bonnes réponses aux questions

LE REIN

1- Le rein est un organe double. **A** ☐ **B** ☐
2- Le rein est un organe retro-péritonéale. **A** ☐ **B** ☐
3- Le rein est situé dans les fosses lombaires. **A** ☐ **B** ☐
4- Le rein est un organe indispensable à la vie. **A** ☐ **B** ☐
5- Le rein produit essentiellement les urines. **A** ☐ **B** ☐
6- Le rein contrôle l'équilibre du milieu extérieur. **A** ☐ **B** ☐
7- Le rein produit des hormones. **A** ☐ **B** ☐
8- L'érythropoïétine est produite par les reins. **A** ☐ **B** ☐
9- Le rein droit est situé entre la 11e côte et la crête iliaque. **A** ☐ **B** ☐
10- Le rein est vascularisé par le pédicule rénal. **A** ☐ **B** ☐
12- Le rein a une couleur brune. **A** ☐ **B** ☐
11- La veine rénale gauche est plus courte que la veine rénale droite. **A** ☐ **B** ☐
13- Le rein mesure 12cm de longueur et 3cm de largeur. **A** ☐ **B** ☐
14- Le rein présente deux faces. **A** ☐ **B** ☐
15- Le cortex rénal comprend deux parties. **A** ☐ **B** ☐
16- L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. **A** ☐ **B** ☐
17- Le rein pèse 130-140g. **A** ☐ **B** ☐
18- Un traumatisme du rein peut s'exprimer par une hématurie. **A** ☐ **B** ☐
19- Le rein possède une fonction triple. **A** ☐ **B** ☐
20- Une chute sur la 11e côte entraine une fracture du rein gauche. **A** ☐ **B** ☐

21- La situation du rein est :
A. L'espace retro péritonéal ☐
B. Fosses lombaires ☐
C. En arrière et sous le péritoine ☐
D. La fosse lombaire dans I 'espace retro-péritonéal ☐
E. La partie supérieure de la fosse lombaire dans l'espace retro-péritonéal ☐

22- Le rein droit est situé entre :
A. En haut: partie basse de la 11e côte ☐
B. En faut : partie haute de la 11e côte ☐
C. En bas : partie supérieure de la vertèbre L3 ☐
D. En bas : partie supérieure de la vertèbre L3, à 4cm de la crête iliaque ☐

23- Le rein a une couleur :
A. Rouge ☐ B. Brune ☐ C. Jaune noire ☐ D. Brun-rouge ☐

24- Le rein mesure :
A. 12cm de hauteur ☐ B. 16cm de hauteur ☐ C. 10cm de hauteur ☐ D. Autre ☐

25- Le poids du rein est :
A. 140g ☐ B. 120 g ☐ C. 155 g ☐ D. Autre ☐

26- L'épaisseur du rein est :
A. 3 cm ☐ B. 6 cm ☐ C. 2 ☐ D. Autre ☐

27- La largeur du rein est:
A. 5 cm ☐ B. 6 cm ☐ C. 7 cm ☐ D. Autre ☐

28- Le pellicule rénal est composé de :
A. Artère et veine ☐
B. Artère rénale, veine rénale et nerfs ☐
C. Artère, veine et nerfs ☐
D. Autre ☐

29- Le pole supérieur du rein est en rapport avec :

A. Diaphragme ☐ B. Base thoracique ☐ C. Cœur ☐ D. Duodénum ☐

30- Le rein décrit :

A. 2 faces, 2 pôles, 2 bords, un hile ☐ C. 2 faces, 2 pôles, 2 bords ☐

B. Un hile 2 faces, 2 pôles,3 bords ☐ D. Autre ☐

L'URETERE

1- L'uretère est un conduit musculo-membraneux qui fait suite au pelvis rénal. **A** ☐ **B** ☐

2- L'uretère présente plusieurs zones de rétrécissement. **A** ☐ **B** ☐

3- Les points urétraux se projettent sur l'abdomen. **A** ☐ **B** ☐

4- La portion lombaire mesure 10 cm. **A** ☐ **B** ☐

5- Le diamètre de L'uretère est de 5 cm. **A** ☐ **B** ☐

6- L'uretère présente trois tuniques. **A** ☐ **B** ☐

7- L'uretère est situé essentiellement dans le rétro péritoine. **A** ☐ **B** ☐

8- La portion iliaque de L'uretère mesure 5 cm. **A** ☐ **B** ☐

9- La portion pelvienne mesure 10-15 cm. **A** ☐ **B** ☐

10- L'uretère est de couleur blanc nacré. **A** ☐ **B** ☐

11- L'uretère présente :

A. 4 zones de rétrécissement ☐ C. 3 zones de rétrécissement ☐

B. 3 zones de rétrécissement physiologique ☐ D. Autre ☐

12- La portion lombaire de L'uretère mesure:

A. 10 cm ☐ B. 5 cm ☐ C. 15 cm ☐ D. Autre ☐

13- La portion iliaque mesure :

A- 10 cm ☐ B. 5 cm ☐ C. 15 cm ☐ D. Autre ☐

14- La portion pelvienne de L'uretère mesure :

A. 10-15 cm ☐ B. 10-20 cm ☐ C. 20 cm ☐ D. Autre ☐

LA VESSIE

1- La vessie est l 'organe intermédiaire de l'appareil urinaire. **A** ☐ **B** ☐

2- La vessie est un organe du haut appareil urinaire. **A** ☐ **B** ☐

3- La vessie est un organe du bas appareil urinaire. **A** ☐ **B** ☐

4- Une pathologie de la vessie aura un retentissement sur le haut et le bas appareil urinaire. **A** ☐ **B** ☐

5- La vessie est le seul organe sous péritonéal de l'organisme. **A** ☐ **B** ☐

6- La vessie présente des r apports avec le rectum. **A** ☐ **B** ☐

7- La continence urinaire est assurée par le sphincter. **A** ☐ **B** ☐

8- La vessie est en rapport avec l'utérus en sa partie postérieur. **A** ☐ **B** ☐

9- Le trigone vésical est le siège préférentiel des tumeurs de la vessie. **A** ☐ **B** ☐

10- La vessie vide mesure 6 cm. **A** ☐ **B** ☐

11- La vessie vide mesure :

A. 5 cm ☐ B. 6 cm ☐ C. 7 cm ☐ D. Autre ☐

12- La vessie est periforme et comprend :

A. Un corps globuleux à l'état de réplétion ☐ C. Un apex postérieur ☐

B. Un col ☐ D. Un fundus ☐

13- La longueur de la vessie est :

A. 5 cm ☐ B. 6 cm ☐ C. 8 cm ☐ D. Autre ☐

14- La vessie pleine mesure :

A. 10 cm ☐ B. 12 cm ☐ C. 24 cm ☐ D. Autre ☐

15- Chez l'adulte, la capacité anatomique de la vessie est :

A- 2 à 6L ☐ B. 2 à 3 L ☐ C. 3 à 6L ☐ D. Autre ☐

COACHING

16- Chez l'adulte, la capacité physiologique est :
A. 150 ml (B1) et 300 ml (B2) ☐ C. 100 ml (B1) et 250 ml (B2) ☐
B. 200 ml (B1) et 350 ml (B2) ☐ D. Autre ☐

17- Chez l'enfant, la capacité vésicale (B2) est :
A. 50 ml à 1 an ☐ B. 60 ml à 1 an ☐ C. 70 ml à 1 an ☐ D. 50-70 ml à 1 an ☐

18- Chez I 'enfant de 2 ans, la capacité vésicale (B2) est :
A. 50 ml ☐ B. 100ml ☐ C. 50 à 100 ml ☐ D. Autre ☐

19- Chez l'enfant de 4 ans, la capacité vésicale est :
A. 100 ml ☐ B. 150 ml ☐ C. 200 ml ☐ D. Autre ☐

20- Chez I 'enfant de 6 ans, la capacité vésicale est :
A. 100 ml ☐ B. 150 ml ☐ C. 200 ml ☐ D. Autre ☐

L'URETRE

1- L'urètre est un conduit musculo-membraneux qui présente deux fonctions chez l'homme. **A** ☐ **B** ☐
2- L'urètre a une seule fonction chez la femme. **A** ☐ **B** ☐
3- Chez l'être humaln, Iurètre a une fonctlon double. **A** ☐ **B** ☐
4- L'urètre féminin est plus court que L'urètre masculin. **A** ☐ **B** ☐
5- L'urètre mesure en général 16 m. **A** ☐ **B** ☐
6- L'urètre féminin fait 3 à 6 cm. **A** ☐ **B** ☐
7- La brièveté de L'urètre féminin rend compte des fuites d'urines. **A** ☐ **B** ☐
9- L'urètre masculin présente trois fonctions. **A** ☐ **B** ☐
8- L'urètre masculin présente deux parties en général. **A** ☐ **B** ☐
10- L'urètre prostatique est la première portion de L'urètre. **A** ☐ **B** ☐
11- L'urètre antérieur est plus long que L'urètre postérieur chez l'homme. **A** ☐ **B** ☐
12- La majeure partie des infections de l'urètre siège dans la portion bulbaire. **A** ☐ **B** ☐
13- La compliance de l'urètre prostatique est de 20 mm. **A** ☐ **B** ☐
15- La compliance de l'orifice externe de l'urètre externe est de 7 mm. **A** ☐ **B** ☐
14- La compliance de l'urètre spongieux est de 12 à 14 m. **A** ☐ **B** ☐
16- l'urètre prostatique est de 3 cm. **A** ☐ **B** ☐
17- l'urètre membraneux est de 2 cm. **A** ☐ **B** ☐
18- I 'urètre prostatique fait 12 cm. **A** ☐ **B** ☐
19- l'urètre présente un orifice virtuel. **A** ☐ **B** ☐
20- I 'urètre est un organe vital pour l'homme. **A** ☐ **B** ☐

21- I 'urètre masculin présente :
A. 2 portions ☐ B. 3 parties ☐ C. 4 portions ☐ D. Autre ☐

22- I 'urètre féminin mesure :
A. 4 cm ☐ B. 3-5 Cm ☐ C. 3 cm ☐ D. Autre ☐

23- I 'urètre masculin mesure :
A. 15-20 cm ☐ B. 15-17 cm ☐ C. 17-20 cm ☐ D. Autre ☐

24- I 'urètre prostatique mesure :
A- 3 cm ☐ B. 6 cm ☐ C. 5 cm ☐ D. Autre ☐

25- I 'urètre membraneux mesure :
A. 5 cm ☐ B. 3 cm ☐ C. 2 cm ☐ D. Autre ☐

26- L'urètre prostatique mesure :
A. 15 cm ☐ B. 12 cm ☐ C. 7 cm ☐ D. Autre ☐

27- La compliance urétrale maximale de l'urètre prostatique est :
A. 10 mm ☐ B. 20 mm ☐ C. 30 mm ☐ D. Autre ☐

28- La compliance urétrale maximale de l'urètre membraneux est :
A. 5 mm ☐ B. 10 mm ☐ C. 20 mm ☐ D. Autre ☐

29- La compliance maximale de l'urètre spongieux est :
A. 10-14 mm ☐ B. 12-16 mm ☐ C. 12-14 mm ☐ D. Autre ☐

30- Chez la femme L'urètre est en rapport avec :

A. Le vagin en arrière ☐ B. L'aponévrose de Denonvilliers ☐ C. Le fascia de Albou en arrière ☐ D. Autre ☐

LE TESTICULE ET L'EPIDIDYME

1- Le testicule est un organe double. **A** ☐ **B** ☐
2- Le testicule est une glande amphricrine. **A** ☐ **B** ☐
3- Le testicule est le seul organe produisant la testostérone. **A** ☐ **B** ☐
4- La pulpe du testicule est le siège de la production de testostérone. **A** ☐ **B** ☐
5- La pulpe du testicule est le siège de la production des spermatozoïdes. **A** ☐ **B** ☐
6- Le testicule mesure 4 cm de la longueur. **A** ☐ **B** ☐
7- Le testicule mesure 2,5 cm d'épaisseur. **A** ☐ **B** ☐
8- Le testicule mesure 3 cm de diamètre. **A** ☐ **B** ☐
9- Le testicule pèse 14 à 20g. **A** ☐ **B** ☐
10- L'épididyme coiffe le testicule. **A** ☐ **B** ☐
11- L'épididyme présente plusieurs parties. **A** ☐ **B** ☐
12- L'épididyme présente deux parties anatomiques. **A** ☐ **B** ☐
13- L'épididyme est le siège de la maturation du spermatozoïde. **A** ☐ **B** ☐
14- La queue de l 'épididyme fait suite au canal déférent. **A** ☐ **B** ☐
15- L'épididyme est indispensable au pouvoir fécondant du spermatozoïde. **A** ☐ **B** ☐
16- La température du testicule est de 33^0 C. **A** ☐ **B** ☐
17- La température du testicule est de 33^0 C à 34^0C. **A** ☐ **B** ☐
18- La torsion du testicule est une urgence. **A** ☐ **B** ☐
19- L'orchidectomie est l'ablation chirurgicale du testicule. **A** ☐ **B** ☐
20- La cryptorchidie est l'arrêt de la descente d'un ou des deux testicules. **A** ☐ **B** ☐
21- L'ectopie se traduit par une situation hors du trajet migratoire du testiculaire. **A** ☐ **B** ☐

LA PROSTATE

1- La prostate est une glande paire. **A** ☐ **B** ☐
2- La prostate est un organe sous vésical. **A** ☐ **B** ☐
3- La prostate une forme de point inversé. **A** ☐ **B** ☐
4- La prostate est accessible au toucher rectal. **A** ☐ **B** ☐
5- La prostate est indispensable à la procréation chez l'homme. **A** ☐ **B** ☐
6- La prostate sécrète l 'antigène spécifique de la prostate. **A** ☐ **B** ☐
7- La topographie sous vésicale de la rend compte des troubles mictionnels en cas de pathologie.
A ☐ **B** ☐
8- La prostate est en rapport avec le pubis en avant. **A** ☐ **B** ☐
9- Le bec de la prostate est en rapport avec le sphincter de l'urètre. **A** ☐ **B** ☐
10- La prostate est le siège de la première portion de l 'urètre. **A** ☐ **B** ☐

11- La prostate pèse :

A. 15-20 g ☐ B. 15-25 g ☐ C. 25 g ☐ D. Autre ☐

12- La prostate secrète une hormone :

A. PSA ☐ B. Testostérone ☐ C. Œstrogène ☐ D. Autre ☐

13- La prostate est subdivisée en :

A. 4 zones anatomiques ☐ B. 5 zones anatomiques ☐ C. 3 zones anatomiques ☐ D. Autre ☐

14- La prostate est en rapport en haut avec :

A. Pubis ☐ B. Vessie ☐ C. Sphincter ☐ D. Autre ☐

15- La prostate est en rapport en avant avec :

A. Pubis ☐ B. Vessie ☐ C. Rectum ☐ D. Autre ☐

16- La prostate est en rapport en arrière avec:

A. Pubis ☐ B. Vessie ☐ C. Rectum ☐ D. Autre ☐

17- La prostate est en rapport en bas avec:

A. Sphincter lisse ☐ B. Sphincter strié ☐ C. L'urètre ☐ D. Autre ☐

18- Le PSA secrété par la prostate a pour valeur :

A. ≤ 4ng/ml ☐ B. ≤ 10ng/ml ☐ C. ≥ 10ng/ml ☐ D. Autre ☐

19- La prostate joue plusieurs rôle sauf:

A. Production d'hormone ☐ C. Autre ☐

B. Fertilité E. Sécrétion d'urine ☐ D. Obstruction de l'urètre prostatique pendant l'éjaculation ☐

LE PENIS

1- Le pénis présente plusieurs corps érectiles. **A** ☐ **B** ☐
2- Le corps spongieux est le siège de l'urètre. **A** ☐ **B** ☐
3- Le pénis est l'organe de copulation de l'homme. **A** ☐ **B** ☐
4- Le pénis a une seule fonction : la copulation. **A** ☐ **B** ☐
5- Le pénis dispose de plusieurs fonctions. **A** ☐ **B** ☐
6- Le pénis a deux fonctions. **A** ☐ **B** ☐
7- La fracture de verge intéresse les trois corps érectiles. **A** ☐ **B** ☐
8- La fracture de verge intéresse les corps caverneux. **A** ☐ **B** ☐
9- La tumescence correspond à l'engorgement de sang dans le corps caverneux. **A** ☐ **B** ☐
10- Le pénis présente deux parties anatomiques. **A** ☐ **B** ☐
11- La racine du pénis est cachée dans le périnée et est fixe. **A** ☐ **B** ☐
12- Le corps du pénis est plus visible que la racine du pénis. **A** ☐ **B** ☐
13- À l'état de flaccidité, le pénis mesure 12 cm. **A** ☐ **B** ☐
14- À l'état de flaccidité, le pénis peut mesurer 11à 12 cm. **A** ☐ **B** ☐
15- À l'état d'érection, le pénis mesure 16 à 18 cm de longueur. **A** ☐ **B** ☐
16- La circonférence du pénis à l'état d'érection est de 12 cm. **A** ☐ **B** ☐
17- Le diamètre du pénis en érection est 4 cm. **A** ☐ **B** ☐
18- Le diamètre du pénis en érection n'est pas proportionnel à celle de l'état de flaccidité ni à la taille.
A ☐ **B** ☐
19- À l'état de flaccidité, le pénis peut mesurer est vascularisé par les artères pro fondes et superficielles.
A ☐ **B** ☐
20- L'état d'érection correspond à une pression intra caverneuse à 110mmb. **A** ☐ **B** ☐
21- Le faux pas du coït est la principale cause de fractures de verge. **A** ☐ **B** ☐

LE SCROTUM

1. Le scrotum soutient les testicules. **A** ☐ **B** ☐
2. Le scrotum participe à la régulation thermique de l'environnement des testicules. **A** ☐ **B** ☐
3. Le scrotum constitue l'enveloppe cutanée des testicules. **A** ☐ **B** ☐
4. La peau scrotale est fixe et extensible. **A** ☐ **B** ☐
5. Le scrotum est vascularisé par les artères scrotales. **A** ☐ **B** ☐
6. Le scrotum est le prolongement du périnée. **A** ☐ **B** ☐
7. L'innervation du scrotum est assurée par les nerfs scrotaux postérieurs. **A** ☐ **B** ☐
8. Les veines scrotales se drainent dans les veines pudendales. **A** ☐ **B** ☐
9. Les artères scrotales postérieures proviennent des artères pudentales internes. **A** ☐ **B** ☐
10. Le scrotum est appendu au périnée uro-génital. **A** ☐ **B** ☐

PHYSIOLOGIE RENALE

1- Le rein comporte deux zones. **A** ☐ **B** ☐
2- La corticale rénale fait 1 cm d'épaisseur. **A** ☐ **B** ☐
3- Les colonnes de Bertin sont situées dans la zone corticale du rein. **A** ☐ **B** ☐
4- La médullaire est formé par les pyramides de Malpighi. **A** ☐ **B** ☐
5- Les papilles se jettent dans les calices. **A** ☐ **B** ☐
6- L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. **A** ☐ **B** ☐

7- Le néphron se divise en plusieurs segments. **A** ☐ **B** ☐
8- Le rein se divise en 4 segments. **A** ☐ **B** ☐
9- Un rein comporte environ un million de néphrons. **A** ☐ **B** ☐
10- Le rein a une fonction exocrine. **A** ☐ **B** ☐
11- Le rein a une double fonction. **A** ☐ **B** ☐
12- Le rein a une fonction endocrine. **A** ☐ **B** ☐
13- La fonction d'homéostasie est assurée par la fonction exocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
14- L'excrétion des déchets métaboliques est assurée par la fonction exocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
15- L'élimination des déchets des médicaments est assurée par la fonction exocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
16- La régulation de la pression artérielle est assurée par la fonction endocrine du, rein. **A** ☐ **B** ☐
17- Le contrôle de l'érythropoïèse est assuré par la fonction endocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
18- le contrôle du métabolisme calcique est assure par la fonction endocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
19- Les protéines normales dans les urines sont ≤ 0,15 g /24h. **A** ☐ **B** ☐
20- Le débit urinaire est 1,5l /24h. **A** ☐ **B** ☐
21- Le filtre glomérulaire est composé de 3 structures. **A** ☐ **B** ☐

22- Le filtre glomérulaire est composé de :
A- L'endothélium ☐ D. Membrane basale glomérulaire ☐
B- Epithélium ☐ E. Muqueuse ☐
C- Autre ☐
23- La pression efficace de filtration est :
A. 25 mm Hg ☐ B. 30 mm Hg ☐ C. 70 mm Hg ☐ D. Autre ☐
24- La pression hydrostatique dans les capillaires est :
A. 25 mm Hg ☐ B. 30 mm Hg ☐ C. 70 mm Hg ☐ D. Autre ☐
25- La pression oncotique des protéines est :
A. 70 mm Hg ☐ B. 15 mm Hg ☐ C. 30 mm Hg ☐ D. Autre ☐
26- La pression hydrostatique dans la capsule de Bowman est :
A. 70 mm Hg ☐ B. 15 mm Hg ☐ C. 30 mm Hg ☐ D. Autre ☐
27- La clairance de la créatinine chez un sujet normal est :
A. 100 ml/mm ☐ B. 120ml/mm ☐ C. 140ml/mm ☐ D. Autre ☐
28- La valeur normale de la créatinine plasmatique chez l 'homme est :
A- 80-110 umol/l ☐ B. 9-13 ng/l ☐ C. 60-90 umol/l ☐ D. Autre ☐
29- La valeur normale de la créatinine plasmatique chez la femme est :
A. 7-10 mg/l ☐ B. 80-110 umol/l ☐ C. 80-110 umol/l ☐ D.60-90 umol/l ☐
30- Les transferts tubulaires sont :
A- Réabsorption ☐ B. Diffusion ☐ C. Excrétion ☐ D. Sécrétion ☐ E. Autre ☐
31- Ces structures sont totalement réabsorbées sauf un :
A- Na^+ ☐ B. Glucose ☐ C. Acides aminés ☐ D. Bicarbonate ☐
32- L'excrétion et la sécrétion sont:
A- Active ☐ B. Passive ☐
33- La diffusion est :
A- Active ☐ B. Passive ☐
34- Le système rénine-angiotensine-aldostérone comporte les substances suivants sauf :
A- La rénine ☐ B. Aldostérone ☐ C. Œstrogène ☐ D. Angiotensine ☐
35- Le site principal de la sécrétion de la rénine est :
A- Appareil justa glomérulaire ☐ B. Les tissus ☐ C. Rein ☐ D. Autre ☐
36- La rénine est synthétisée par :
A- La cellule épithélioide ☐ C. Cellule de la macula densa ☐
B- Cellule surrénalienne ☐ D. Autre ☐
37- L'angiotensine est :
A- Vasoconstricteur ☐ B. Vasodilatateur ☐ C. Autre ☐
38- L'aldostérone contrôle la réabsorption de :
A- Na^+ ☐ B. Cacl ☐ C. K+ ☐ D. Autre ☐
39- Le calcitriol :

A- augmente l'absorption du Na^+ ☐ C. augmente l'absorption de phosphate ☐
B- baisse I 'absorption du Na^+ ☐ D. autre ☐

40- Le calcitriol :

A- réduit la sécrétion de la parathormone ☐ C. régule la sécrétion de la parathormone ☐
B- augmente la sécrétion de la parathormone ☐ D. autre ☐

41- Le principal site de production de l'érythropoïétine est :

A- Foie ☐ B. Rate ☐ C. rein ☐ D. Autre ☐

PHYSIOLOGIE DE LA MICTION

1- Le volume de distension maximal de la vessie est de 500 à 600 ml. **A** ☐ **B** ☐
2- Le pressant d'uriner lorsque la capacité vésicale atteint 600 ml. **A** ☐ **B** ☐
3- le besoin douloureux d'uriner survient lorsque la capacité vésicale atteint 600 ml. **A** ☐ **B** ☐
4- La vessie est vide après toute miction. **A** ☐ **B** ☐
5- Le résidu post mictionnel normal est inférieur à 50 ml. **A** ☐ **B** ☐
6- La fréquence normale de miction est de 4 à 6/24h. **A** ☐ **B** ☐
7- La diurèse normale est de 1,5 à 21 /ml. **A** ☐ **B** ☐
8- La dysurie est un gène à la miction. **A** ☐ **B** ☐
9- La polyurie est une augmentation du volume des urines > 4l/ 24h. **A** ☐ **B** ☐
10- La pollakiurie est une émission fréquente d'urine supérieure à 3 levés nocturnes. **A** ☐ **B** ☐
11- L'énurésie est une perte involontaire d'urines. **A** ☐ **B** ☐
12- La nycturie est un besoin d'uriner la nuit sans modification de la qualité la vie du patient. **A** ☐ **B** ☐
13- La rétention d'urines s'exprime par un globe vésical. **A** ☐ **B** ☐
14- L'augmentation du tonus sympathique entraine une stimulation du detrusor. **A** ☐ **B** ☐
15- L'augmentation du tonus sympathique entraine le relâchement du sphincter strié. **A** ☐ **B** ☐
16- L'augmentation du tonus sympathique entraine le relâchement des muscles périnéaux. **A** ☐ **B** ☐

PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

1- La pulpe du testicule est indispensable à la reproduction chez l'homme. **A** ☐ **B** ☐
2- Les spermatozoïdes sont produits par les tubes séminifères du testicule. **A** ☐ **B** ☐
3- Le canal déférent permet le cheminement des spermatozoïdes du testicule à la prostate. **A** ☐ **B** ☐
4- L'épididyme est le siège d'acquisition du pouvoir fécondant des spermatozoïdes. **A** ☐ **B** ☐
5- Le rapport sexuel est le seul moyen de reproduction chez I 'homme. **A** ☐ **B** ☐
6- Il existe environ trois millions de spermatozoïdes par éjaculat. **A** ☐ **B** ☐
7- Le canal éjaculateur est formé par le canal déférent et les vésicules séminales. **A** ☐ **B** ☐
8- Les vésicules séminales produisent 70% de l'éjaculat. **A** ☐ **B** ☐
9- La prostate produit 30% de l'éjaculat chez l'homme. **A** ☐ **B** ☐
10- L'éjaculat comporte essentiellement 2% de spermatozoïde. **A** ☐ **B** ☐
11- Le liquide spermatique a un rôle de coagulation. **A** ☐ **B** ☐
12- L'initiation de la reproduction humaine rend compte de la fécondation. **A** ☐ **B** ☐
13- La fécondation est la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. **A** ☐ **B** ☐
14- La reproduction peut être un phénomène naturel. **A** ☐ **B** ☐
15- La reproduction prend effet à partir de la nidation de l'œuf. **A** ☐ **B** ☐
16- La grossesse ectopique est une grossesse extra-utérine. **A** ☐ **B** ☐
17- Le nombre d'ovule chez la femme est indéterminé à la naissance. **A** ☐ **B** ☐
18- L'ovaire fœtal comporte à la naissance environ un million d'ovules. **A** ☐ **B** ☐
19- Durant la vie génitale seul quatre cent ovules connaitront l'ovulation. **A** ☐ **B** ☐
20- Le zygote est l'œuf formé par le spermatozoïde et l'ovule. **A** ☐ **B** ☐
21- La durée de vie d'un spermatozoïde est de 72 heures. **A** ☐ **B** ☐

EPREUVE DE GYNECOLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. La délivrance est la 3ème phase du travail de l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐
2. La délivrance artificielle se réalise en cas de placenta partiellement décollé. **A** ☐ **B** ☐
3. L'AMIU est la plus efficace que la méthode médicamenteuse dans la prise en charge des avortements après 12 semaines. **A** ☐ **B** ☐
4. L'hémorragie lors de la délivrance ou après la complication maternelle, la plus grave lors d'un accouchement. **A** ☐ **B** ☐
5. La révision utérine est l'exploration manuelle de la cavité utérine, après l'expulsion du placenta. **A** ☐ **B** ☐
6. L'échographie du premier trimestre qui permet de confirmer la grossesse doit être réalisée aux 22 semaines d'aménorrhée. **A** ☐ **B** ☐
7. La présentation est la partie du fœtus qui présente en premier dans I 'aire du détroit supérieur du bassin obstétrical. **A** ☐ **B** ☐
8. L'engagement est lorsque le plus grand diamètre de la présentation a franchi l'aire du détroit supérieur. **A** ☐ **B** ☐
9. Dans la présentation du sommet la présentation est le bregma ou la petite fontanelle. **A** ☐ **B** ☐
10. La délivrance normale doit se faire au maximum dans les 30 minutes après l'expulsion du fœtus. **A** ☐ **B** ☐
11. L'avortement spontané est le plus souvent douloureux et incomplet. **A** ☐ **B** ☐
12. Les complications immédiates sont des complications tardives d'un avortement provoqué. **A** ☐ **B** ☐
13. Le counseling sur une méthode de planification familiale est systématique dans les soins après avortement. **A** ☐ **B** ☐
14. Au cours de la grossesse, le col de la patiente est rosé. **A** ☐ **B** ☐
15. Le principe de la CPN recentrée repose sur les soins individualisés axés sur chaque femme. **A** ☐ **B** ☐
16. Les suites de couches normales durent en moyenne 1 mois. **A** ☐ **B** ☐
17. L'infirmier est qualifié pour procurer des CPN recentrées. **A** ☐ **B** ☐
18. Les saignements observés dans les suites de couches sont appelés des métrorragies. **A** ☐ **B** ☐
19. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont une politique mise en place pour réduire uniquement la mortalité maternelle. **A** ☐ **B** ☐
20. La manœuvre de Budin permet de faire le diagnostic de l'engagement fœtal au cours du travail. **A** ☐ **B** ☐
21. L'augmentation de poids au cours de la grossesse mono-fœtal normale ne dépasse pas 12 kg environ. **A** ☐ **B** ☐
22. L'excavation pelvienne sépare le petit bassin qui est en bas du grand bassin qui se trouve en haut. **A** ☐ **B** ☐
23. La phase de l'expulsion du fœtus est la deuxième au cours de l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐
24. L'excavation est le canal où le fœtus effectue sa descente et sa poussée. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

25. La GATPA compte 3 phases

A. L'injection de 10 ui en IM d'un utéro tonique ☐ C. La TCC ☐
B. La vidange vésicale ☐ D. Le massage utérin ☐

26. Deux situation ci- dessous sont des contre- indications à l'accouchement de siège sont :

A. SFA ☐ B. Bassin normal ☐ C. Primigeste ☐ D. Prématuré ☐

27. Eléments de surveillance maternelle du post partum immédiat sont : (2 réponses justes).

A. Le globe utérin ☐
B. La consistance des mollets ☐
C. La recherche d'œdème aux membres inférieurs ☐

28. Lors du diagnostic de la grossesse au début on observe (cocher la réponse fausse) :

A. Une augmentation du volume des seins ☐
B. Un col utérin violacé ☐ C. Une glaire cervicale abondante et filante ☐

29. Identifiez deux signes digestifs retrouvés en début de grossesse :

A. Diarrhée ☐ B. Modification du goût ☐ C. Constipation ☐ D. Faux besoins ☐

30. Parmi les assertions suivantes, deux sont des complications immédiates de l'avortement provoqué. Lesquels ?

A. Septicémie ☐ C. Hémorragie ☐ E. Béance du col ☐

B. Douleurs pelviennes chroniques ☐ D. Perforation utérine ☐

31. Identifiez les deux objectifs de la CPN réalisée entre 4 et 6 mois :

A. Donner la 2ème dose de TPI ☐

B. Suivre l'évolution de la grossesse ☐

C. Rechercher des facteurs de risques de prématurité ☐

D. Etablir le pronostic de l'accouchement ☐

32. Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des phases de la délivrance normale.

A. Phase d'expulsion ☐ C. Phase de migration ☐

B. Phase de rémission ☐ D. Phase de décollement ☐

33. Identifiez les examens biologiques obligatoires du bilan prénatal :

A. L'hémogramme ☐ C. La sérologie VIH ☐

B. Les groupes sanguins rhésus ☐ D. La glycémie veineuse ☐ E. La sérologie syphilitique ☐

34. Les caractéristiques des contractions sont les suivantes sauf une :

A. Involontaire ☐ B. Permanentes ☐ C. Douloureuses ☐ D. Totales ☐

35. Quelles sont les différentes parties de l'accouchement :

A. Phase de travail ☐ C. Phase de délivrance ☐ E. Phase d'expulsion ☐

B. Phase de palpation ☐ D . Phase de toucher vaginale ☐

36. Cocher les deux bonnes réponses, après tout accouchement, l 'accouché doit être hospitalisé selon la loi ivoirienne pendant:

A. 72 H ☐ C. 3 Jours ☐ E. Au moins 72 h ☐

B. Au plus 72 h ☐ D. Au moins 3 jours ☐

37. La nidation a lieu :

A. Dans la trompe ☐ B. Dans l'ovaire ☐ C. Dans l'utérus ☐ D. Dans l'endomètre ☐

38. La nidation dure combien de jours :

A. 15 Jours ☐ B. 7 jours ☐ C. Au moins 7 jours ☐ D. Au plus 7 jours ☐

39. Le vagin sert :

A. À soutenir les organes pelviens ☐ C. Avoirs des rapports sexuels ☐

B. Sécréter des règles ☐ D. Produire L'œstrogène ☐

40. Les éléments suivants font parties de l'appareil génital de la femme :

A. Corps caverneux ☐ B. Trompe utérine ☐ C. Epididyme ☐ D. Vagin ☐

41. Dans la présentation du front, le repère est :

A. Occiput ☐ B. Petite fontanelle ☐ C. Racine du nez ☐ D. Grande fontanelle ☐

42. Dans la présentation sommet, le repère est :

A. Racine du nez ☐ B. Petite fontanelle ☐ C. Occiput ☐ D. Grande fontanelle ☐

43. Dans la présentation du siège, le repère est:

A. Occiput ☐ B. Face ☐ C. Grande fontanelle ☐ D. Sacrum ☐

EPREUVE D'IMMUNOLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. L'immunologie est la science de l'immunité. **A** ☐ **B** ☐
2. L'immunité est la science de l'immunologie. **A** ☐ **B** ☐
3. L'immunologie est l'immunité de la science. **A** ☐ **B** ☐
4. Le système immunitaire est composé : d'un ensemble de tissus, de cellules et d'organes. **A** ☐ **B** ☐
5. Les états de tolérance se définissent comme l'acceptation sans réaction de ce qui est étranger. **A** ☐ **B** ☐
6. Un état de tolérance est un déficit immunitaire. **A** ☐ **B** ☐
7. Une réponse cellulaire est sous la dépendance de lymphocytes T qui vont se différencier en LT cytotoxiques et en LT producteurs de lymphokines. **A** ☐ **B** ☐
8. Le TPHA est une réaction d'Hémagglutination. **A** ☐ **B** ☐
9. Le TPHA se positive vers le 11éme jour du chancre. **A** ☐ **B** ☐
10. Le TPHA reste positif pendant plusieurs années, même chez un malade correctement traité. **A** ☐ **B** ☐
11. La CRP augmente d'avantage en cas d'infection bactérienne que virale. **A** ☐ **B** ☐
12. La technique utilisée pour le groupage sanguin comporte deux épreuves. **A** ☐ **B** ☐
13. Il existe huit groupes sanguins dans le système AB0 - Rhésus (D) . **A** ☐ **B** ☐
14. Le diagnostic de l'hépatite C repose sur la détection du génome viral par PCR. **A** ☐ **B** ☐
15. La disparition de l'antigène Hbe et l'apparition des anticorps an HBe indiquent la fin de la réplication virale. **A** ☐ **B** ☐
16. Le sang utilisé pour faire un groupage sanguin Rhésus et le test de Coombs direct est prélevé sur tube EDTA. **A** ☐ **B** ☐
17. Un taux d'Ac< 1/20 en IHA indique une immunité rubéolique naturelle ou vaccinale. **A** ☐ **B** ☐
18. Un taux d'Ac inférieur à 1/20indique l'absence d'immunité rubéolique. **A** ☐ **B** ☐
19. La détermination du groupe sanguin se pratique uniquement chez les donneurs de sang. **A** ☐ **B** ☐
20. Le VIH a un tropisme pour les lymphocytes T4(CD4) . **A** ☐ **B** ☐
21. Les lymphocytes T (CD4) ont un tropisme pour le VIH. **A** ☐ **B** ☐
22. L'antigène P24 est une protéine de la capside que libère la réplication virale. **A** ☐ **B** ☐
23. L'antigène P24 disparait après la primo-invasion pour ne réapparaître qu'au stade du sida. **A** ☐ **B** ☐
24. À la période d'état, le titre des agglutinines H est largement supérieur au titre des agglutinines O **A** ☐ **B** ☐
25. Les agglutinines O disparaissent plus rapidement au bout de 05 semaines. **A** ☐ **B** ☐
26. Les agglutinines O persistent plus longtemps que les agglutinines H. **A** ☐ **B** ☐
27. Le sérodiagnostic de Widal et Félix est l'analyse qui permet de mettre en évidence les agglutinines des salmonelles. **A** ☐ **B** ☐
28. La HCG est composée de la chaine alpha commune à LH, FSH et TSH, et la chaîne béta, spécifique. **A** ☐ **B** ☐
29. En cas de grossesse, les hCG sont entre 40U1/| et 50 UI/| dès le 1Oème jour après fécondation. **A** ☐ **B** ☐
30. Les salmonelles comportent un antigène somatique O et un antigène flagellaire H. **A** ☐ **B** ☐
31. Le mot « immunité » vient du mot grec Immunitas qui veut dire exempt de charge. **A** ☐ **B** ☐
32. Tout être humain est conçu de telle sorte qu'il refuse et rejette tout ce qui est inné. **A** ☐ **B** ☐
33. Le concept de l'immunité repose sur un trio de 3 piliers. **A** ☐ **B** ☐
34. Le support de l'immunité est le système immunitaire. **A** ☐ **B** ☐
35. Un état de tolérance est un déficit immunitaire. **A** ☐ **B** ☐
36. Une réponse immunitaire conduit à l'épuration antigénique, soit directement ou indirectement. **A** ☐ **B** ☐
37. L'antigène possède deux propriétés essentielles : l'immunogenicité et la spécificité sérologique. **A** ☐ **B** ☐
38. Les voies immunogènes sont celles qui sont peu utilisées lors des vaccinations. **A** ☐ **B** ☐
39. Les adjuvants augmentent le pouvoir immunogène. **A** ☐ **B** ☐
40. Le sérum du nouveau-né renferme un taux d'lgG au moins égal à celui de sa mère. **A** ☐ **B** ☐
41. Les lgM sont les Ac de la réponse humorale primaire. **A** ☐ **B** ☐

42. L'antigène D appartient au système rhésus. **A** ☐ **B** ☐
43. Sur les globules rouges des sujets dits Rhésus négatifs l'antigène D n'est pas présent. **A** ☐ **B** ☐
44, Le test de Coombs direct met en évidence des anticorps incomplets. **A** ☐ **B** ☐
45. La détermination du groupe sanguin se pratique seulement chez les donneurs de sang. **A** ☐ **B** ☐
46. Un plasma ne possédant d'anticorps Anti-A et possédant des antigènes A sur ces hématies est un sang de groupe A. **A** ☐ **B** ☐
47. On trouve des antigènes A et B sur les hématies d'une personne de groupe O. **A** ☐ **B** ☐
48. Le groupe sanguin de l'enfant ne dépend pas du groupe des parents. **A** ☐ **B** ☐
49. Les lgM sont témoins d'une affection constante. **A** ☐ **B** ☐
50. Les anticorps sont impliqués dans toutes les méthodes du diagnostic immunologique basés sur la reaction Ag-Ac. **A** ☐ **B** ☐
51. Les lgD assurent la transduction du signal d'activation des lymphocytes B. **A** ☐ **B** ☐
52. La formation du complexe imm Ag-Ac est une des fonctions des Anticorps. **A** ☐ **B** ☐
53. Les anticorps sont des immunoglobulines. **A** ☐ **B** ☐
54. Les anticorps sont synthétisés les lymphocytes Tet les plasmocytes. **A** ☐ **B** ☐
55. Les anticorps sont des glycoprotéines. **A** ☐ **B** ☐
56. Les lgA interviennent également dans la défense anti-infectieuse mais au niveau des muscles. **A** ☐ **B** ☐
57. Les lgE interviennent dans la défense antiparasitaire. **A** ☐ **B** ☐
58. Les lgG sont témoins d'une affection ancienne. **A** ☐ **B** ☐
59. Seuls les lgG maternels résistent à la barrière placentaire. **A** ☐ **B** ☐
60. Une personne du groupe A possède sur ses globules rouges des antigenes A. **A** ☐ **B** ☐
61. Dans le plasma d'une personne du groupe sanguin B, il y a des anticorps anti-A. **A** ☐ **B** ☐
62. Un sang prélevé sur tube EDTA peut servir à faire un groupe ABO Rhésus et un test de coombs direct. **A** ☐ **B** ☐
63. Le test de coombs direct se fait en un seul temps. **A** ☐ **B** ☐
64. Les ac anti VIH une fois présent dans le sérum persistent la vie durant. **A** ☐ **B** ☐
65. La réaction qualitative de Widal et Félix est une réaction de dépistage. **A** ☐ **B** ☐
66. Les lgM sont témoins d'une affection Evolutive. **A** ☐ **B** ☐
67. On trouve des anticorps anti A et anti B dans le plasma d'une personne de groupe sanguin O. **A** ☐ **B** ☐
68. Le test de coombs direct se fait en deux temps. **A** ☐ **B** ☐
69. Seuls les lgG maternels traversent la barrière placentaire. **A** ☐ **B** ☐
70. Le test de coombs indirect est négatif lorsqu'il y a présence d'anticorps dans le sérum du malade. **A** ☐ **B** ☐
71. Le test de coombs indirect est positif lorsqu'il y a présence d'anticorps dans le sérum du malade. **A** ☐ **B** ☐
72. Dans le plasma d'une personne de groupe B, il y a des anticorps anti-A. **A** ☐ **B** ☐
73. Une personne du groupe A possède sur ses globules rouges des antigènes A. **A** ☐ **B** ☐
74. Les agglutinines H des salmonelles apparaissent vers le 8e jour. **A** ☐ **B** ☐
75. Les agglutinines O des salmonelles apparaissent vers le 12e jour. **A** ☐ **B** ☐
76. Les agglutinines O des salmonelles apparaissent vers le 8e jour. **A** ☐ **B** ☐
77. Le test de coombs indirect se fait en deux temps. **A** ☐ **B** ☐
78. Tous les examens sérologiques sont prélevés sur tube EDTA. **A** ☐ **B** ☐
79. Tous les examens sérologiques sont prélevés sur tube sec. **A** ☐ **B** ☐
80. Tous les examens sérologiques sont prélevés sur tube Héparine. **A** ☐ **B** ☐
81. L'immunologie est la science de l'immunisation. **A** ☐ **B** ☐
82. L'immunologie est la science de l'immunigenicité. **A** ☐ **B** ☐
83. L'immunologie est la science de I 'immunité. **A** ☐ **B** ☐
84. La rubéole est une maladie non contagieuse causée par un virus. **A** ☐ **B** ☐
85. La rubéole est une maladie contagieuse causée par une bactérie. **A** ☐ **B** ☐
86. Le support de l'immunité est le système immunitaire. **A** ☐ **B** ☐
87. Le support de l'immunité est le lymphocyte T. **A** ☐ **B** ☐
88. Quand la CRP vaut 10 fois la valeur normale, il s'agit d'une infection bactérienne. **A** ☐ **B** ☐
89. L'hormone chorionique Gonadotrope apparait 48h après l'implantation ovocytaire. **A** ☐ **B** ☐
90. La technique de Widal et Félix se fait en deux temps. **A** ☐ **B** ☐
91. Les salmonelles sont des bacilles GRAM+. **A** ☐ **B** ☐

92. Les salmonelles sont des coccis GRAM-. **A** ☐ **B** ☐
93. Les anticorps sont des globulines. **A** ☐ **B** ☐
94. L'utilisation d'adjuvant diminue le pouvoir immunogène. **A** ☐ **B** ☐
95. La voie sous-cutanée est moins immunogène. **A** ☐ **B** ☐
96. La voie intradermique est immunogène. **A** ☐ **B** ☐
97. La voie veineuse est plus immunogène que la voie sous-cutanée. **A** ☐ **B** ☐
98. Les facteurs qui conditionnent l'immunogenicité sont ceux liés à lantigène et ceux liés à l'hôte.
A ☐ **B** ☐
99. La réponse immunitaire secondaire est appelée anamnestique. **A** ☐ **B** ☐
100. L'acceptation sans réaction de ce qui est étranger est un état de tolérance. **A** ☐ **B** ☐
101. La réponse immunitaire est strictement spécifique. **A** ☐ **B** ☐
102. Le but de la réponse immunitaire est d'assurer la protection. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

103. Les Sérums tests utilisés dans la technique de Beth Vincent sont :

A- Anti-A, Anti-B, Anti-D ☐ C- Anti-A, Anti-B, Anti-AB ☐
B- Anti-A, Anti-c, Anti-B ☐ D- Anti-B, Anti-AB, Anti-D ☐

104. Tout être vivant est conçu de telle sorte

A- qu'il reconnaisse et rejette ce qui lui appartient. ☐
B- qu'il méconnaisse et tolère ce qui lui appartient. ☐
C- qu'il reconnaisse et tolère ce qui lui appartient. ☐
D- qu'il reconnaisse et tolère ce qui ne lui appartient pas ☐

105. Le concept de l'immunité repose sur

A- un trio de piliers. ☐ C- Trois trios de piliers ☐
B- un trio de 3 piliers. ☐ D- Trois piliers en triplet ☐

106. TPHA signifie :

A- TreponemaPallidiumHemagglutinationAssay. ☐
B- Trepounema Pallidum HemagglutinotionAissay ☐
C- Trepounema Pallidum HemagglutinotionAisay ☐
D- Treponema Pallidum HemagglutinationAssay ☐
E- Trepnema Pallidum hemagglutinationAsisay ☐

107. La rubéole est une maladie virale éruptive bénigne, transmise

A-par voie digestive ☐ B- Par voie respiratoire ☐ C- Par voie sexuelle ☐ D- Par voie cutanée ☐

108. Un individu de groupe A possède

A- des anticorps AntiB dans son sérum et des antigènes B à la surface de ses hématies ☐
B- des anticorps Anti A dans son sérum et des antigènes B à la surface de ses hématies ☐
C- des anticorps Anti B dans son sérum et des antigènes A à la surface de ses hématies ☐
D- des anticorps Anti B dans son sérum et des antigènes AB à la surface de ses hématies ☐

109. Un individu de groupe B possède

A. Des anticorps Anti A et Anti B dans son plasma. ☐
B. Des anticorps Anti A dans son plasma ☐
C. Ni anticorps anti A, ni anticorps anti B dans son plasma ☐
D. Des anticorps Anti B dans son plasma ☐

110. Un individu de groupe AB positif possède

A. ni anticorps anti A, ni anticorps B dans son plasma et des antigènes A, B et D à la surface de ses Hématies. ☐
B. Les anticorps Anti A et Anti B dans son plasma et des antigènes D à la surface de ses hématies. ☐
C. Les anticorps anti A dans son plasma et des antigènes B et D à la surface des hématies. ☐
D. Les anticorps Anti B dans son plasma et des antigènes A et D à la surface de ses hématies. ☐

111. L'antigène P24 apparaît dans le sérum

A- treize jours en moyenne après l'infection. ☐ C. Seize jours en moyenne après l'infection. ☐
B- Vingt jours en moyenne après l'infection. ☐ D. Trois mois en moyenne après l' infection. ☐

112. La valeur seuil de l 'antigène P24 est de l'ordre de :

A- 10 pg/ml. ☐ B- 20 pg/ml. ☐ C- 30 pg/ml. ☐ D- 15 pg/ml. ☐

SOCRATING

113. Les anticorps anti VIH apparaissent vers

A- le 21ème jour. ☐ B- le 23ème jour. ☐ C- le 25ème jour. ☐ D- le 24ème jour. ☐

114. L'hépatite aiguë C passe à la chronicité dans

A- les1/3 des cas. ☐ B- Les 3/4 des cas. ☐ C- Les2/3 des cas. ☐ D- Les 1/4 des cas. ☐

115. Les agglutinines H apparaissent vers

A- le 14ème jour de la maladie. ☐ C- le 12ème jour de la maladie. ☐

B- le 13 ème jour de la maladie. ☐ D- le 11ème jour de la maladie. ☐

116. La valeur usuelle du Taux hCG chez I 'homme comme chez la femme est :

A- <5 U/l. ☐ B- >5 UI/l. ☐ C- =5UI/l. ☐ D- ≤5 UI/l. ☐

117. Les lgG sont des anticorps « chauds » qui se fixent à

A- 36°C . ☐ B- 37°C. ☐ C- 38°C. ☐ D- 40°C. ☐

118. L'agent pathogène de la rubéole est

A. Un parasite . ☐ B- Un champignon. ☐ C- Un virus. ☐ D- Une bactérie. ☐

119. SIDA signifie :

A- Syndrome d'lmmunodéficient acquis. ☐ C- Syndrome d'immunodéficience acquise. ☐

B- Symptômes d'immunodéfisation acquis. ☐ D- Symptômes d'immunodéiscience acquise. ☐

120. VIH signifie

A- Virus de l'immunodéficience humain. ☐ C- Virus de l'immunodéfiscience humaine. ☐

B- Virus de l'immunodéficience humaine. ☐ D- Virus de l'immunodéfiscience humain. ☐

121. Les antigènes A et B appartiennent

A-au système Rhésus. ☐ B- au système ABO . ☐ C- au système Lewis. ☐ D- au système Kel. ☐

122. Le système Rhésus possède

A- 3antigènes. ☐ B- 4 antigènes. ☐ C- 5 antigènes . ☐ D- 6 antigènes. ☐

123. Un individu de groupe A possède dans son sérum :

A- Des anticorps Anti B. ☐ C- Des anticorps Anti A. ☐

B- Des anticorps Anti A et Anti B. ☐ D- Aucun Anticorps. ☐

124. Le test coombs direct a pour objet de mettre en évidence

A. Des anticorps érythrocytaires dans le sérum du malade. ☐

B. Des anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du malade. ☐

C. Des antigènes présents à la surface des érythrocytes. ☐

D. Des antigènes présents à la surface des hématies. ☐

125. Les manifestations de Treponema pallidum apparaissent environ

A. Trois mois après contage. ☐ C. Trois mois et demi après contact. ☐

B. Trois semaines après contact. ☐ D. Trois semaines avant contage . ☐

126. Le TPHA se positive

A. Au 12è jour. ☐ B. Au 8è jour. ☐ C. Au 11 è jour. ☐ D- Au 10 è jour. ☐

127. Le VDRL se positive

A. Au 12è jour. ☐ B. Au 10è jour. ☐ C. Au 8 è jour. ☐ D- Au 11 è jour. ☐

128. La CRP signe une infection bactérienne quand

A. Le taux est 12 fois la normale . ☐ C. Le taux est 10 fois la normale. ☐

B. Le taux est 3 fois la normale. ☐ D. Le taux est 6 fois la normale. ☐

129. Une immunité rubeolique naturelle ou vaccinale a un taux d'anticorps

A. =1/20 en IHA. ☐ B- <1/20 en IHA. ☐ C- >1/20 en IHA. ☐ D- ≤1/20 en IHA. ☐

130. La valeur usuelle du taux HCG chez I 'homme comme chez la femme est

A. >5U1/l. ☐ B- ≤5UI/l. ☐ C- ≥5U1/l. ☐ D- <5U1/l. ☐

131. Une personne est séronégative concernant la toxoplasmose si

A. lgG<8UI/ml . ☐ B- IgG<8UI/l . ☐ C- IgG≤8UI/l . ☐ D- IgG>8Ul/ml. ☐

132. La valeur seuil de l'antigène P24 est de l'ordre de :

A. 20 pg/l. ☐ B- 20 mg/l . ☐ C- 20 UI/l. ☐ D- 20 pg/ml. ☐

133. TPHA négatif, VDRL positif signifie

A. Absence de syphilis. ☐ B- Faux positif. ☐ C- Syphilis guérie. ☐ D- Syphilis tertiaire. ☐

134. TPHA négatif, VDRL négatif signifie

A. Absence de syphilis. ☐ C- Syphilis très récente(phraséologique) . ☐

B. Syphilis présent . ☐ D- Syphilis rechute. ☐

135. La syphilis est une maladie

A. Non contagieuse . ☐ C- Non transmissible. ☐

B. Contagieuse et sexuellement transmissible. ☐ D- Muette. ☐

136. Un haptène est une substance

A. Non immunogène, mais possédant la spécificité immunologique. ☐

B. Non immunogène et ne possédant pas la spécificité immunologique. ☐

C. Immunogène et ne possédant pas de spécificité immunologique. ☐

D. De très grande taille. ☐

137. L'immunogénicité est liée à la

A. Surface de l'antigène. ☐ C- Taille de l'antigène. ☐

B. Quantité de l'antigène. ☐ D- Modification de l'antigène. ☐

138. L'immunogénicité est la

A. Capacité d'un antigène de causer une destruction. ☐

B. Capacité d'un antigène d'induire une réponse immunitaire. ☐

C. Capacité d'un anticorps de protéger. ☐

D. Capacité de I 'organisme de produire des toxines. ☐

139. La fonction du système immunitaire est de

A. Défendre I 'organisme. ☐ C- Libérer l'organisme des corps étrangers. ☐

B. Attaquer les microbes. ☐ D- Secréter des cytokines. ☐

140. L'immunologie repose sur

A. 4 piliers. ☐ B- 10 piliers. ☐ C- 3 piliers. ☐ D- 6 piliers. ☐

141. L'immunologie est la science de

A. L'immunisation. ☐ B- L'immunogénicité. ☐ C- L'immunitaire. ☐ D- L'immunité. ☐

142. Le support de l'immunité est

A. Le système immunitaire. ☐ C. Le lymphocyte T . ☐

B. L'ensemble des tissus et organes . ☐ D. L'ensemble des éléments cellulaires et humoraux. ☐

143. La réponse immunitaire se présente sous deux aspects ou formes

A. Humorale et cellulaire . ☐ C- Cellulaire et les lymphocytes. ☐

B. Humorale et les anticorps. ☐ D- Anticorps et antigènes. ☐

144. Est appelé immunogène

A- Tout antigène ayant une immunogénicité. ☐ C- Toute substance produisant un anticorps. ☐

B- Tout corps étranger secrétant des cytokines. ☐ D- Toute substance ayant une tolérogénicité . ☐

145. Un tolérogène est

a- Une substance capable d'induire une tolérance spécifique. ☐

b- Une substance capable de libérer une réponse immunitaire. ☐

c- Une substance liée à la taille de la molécule. ☐

d- Une substance de petite taille. ☐

146. La bactérie responsable de la syphilis est

A. Le trponemasyphilidum. ☐ C- Le treponemasyphilidium. ☐

B. Le treponema pallidum. ☐ D- Le treponemapallidium. ☐

147. Les deux tests les plus utilisés pour le sérodiagnostic de la syphilis sont

A. TPHA. ☐ B. FTAVDRL. ☐ C- ELISA. ☐ D- IMAQ. ☐

EPREUVE DE THEORIE ET CONCEPT

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les soins infirmiers préventifs consistent à atténuer les symptômes pénibles d'une maladie. **A** ☐ **B** ☐
2. Une profession se distingue d'un métier en ce qu'elle repose sur les connaissances théoriques qui lui sont propres et sur une base scientifique. **A** ☐ **B** ☐
3. Les Besoins Fondamentaux de ABRAHAM MASLOW sont hiérarchisés. **A** ☐ **B** ☐
4. Le septième besoin de Virginia Henderson est le besoin de s'habiller et se déshabiller. **A** ☐ **B** ☐
5. Apprendre est un besoin fondamental d'Abraham Maslow. **A** ☐ **B** ☐
6. Le dossier de soins infirmiers est uniformisé pour tous les établissements sanitaires. **A** ☐ **B** ☐
7. Le « besoin » exprime à la fois ce que nous sommes et ce qu'il nous faut être. **A** ☐ **B** ☐
8. Les expériences antérieures sont des facteurs d'influence d'une définition personnelle de la santé. **A** ☐ **B** ☐
9. Le dossier de soins infirmiers contribue au processus d'apprentissage. **A** ☐ **B** ☐
10. Les soins infirmiers sont un ensemble d'activités destinées à répondre aux besoins de santé des personnes malades uniquement. **A** ☐ **B** ☐
11. La fonction de diagnostic est une fonction principale de l'infirmier. **A** ☐ **B** ☐
12. Selon Virginia Henderson les soins infirmiers consistent à mettre la personne dans des meilleures conditions afin que la nature agisse sur elle. **A** ☐ **B** ☐
13. La relation d'aide consiste à se soumettre totalement à un patient lors de son hospitalisation. **A** ☐ **B** ☐
14. Le besoin de respirer est le 1er besoin fondamental de tout individu malade ou en bonne santé selon Virginia Anderson. **A** ☐ **B** ☐
15. La fonction de diagnostic est une fonction principale de l'infirmier. **A** ☐ **B** ☐
16. Dans le centre de santé, l'IDE/SF délèguent leur rôle aux auxiliaires. **A** ☐ **B** ☐
17. Le dossier de soins infirmiers augmente la charge de travail de 'IDE/SF. **A** ☐ **B** ☐
18. Un besoin fondamental n'est pas une nécessité vitale. **A** ☐ **B** ☐
19. L'écoute active consiste aussi à être neutre et bienveillant. **A** ☐ **B** ☐
20. L'autonomie du malade est perturbée pendant l'hospitalisation. **A** ☐ **B** ☐
21. L'infirmier a trois fonctions principales. **A** ☐ **B** ☐
22. La sage-femme a aussi une mission spirituelle auprès de la parturiente. **A** ☐ **B** ☐
23. Selon l'OMS (1978) la santé est un état d'une personne sans maladie et sans infirmité. **A** ☐ **B** ☐
24. Les composantes essentielles d'un modèle conceptuel sont : les postulats, les valeurs et les éléments. **A** ☐ **B** ☐
25. Le besoin de se récréer est un des besoins de Virginia Henderson. **A** ☐ **B** ☐
26. Le besoin de procréer est un besoin fondamental de Virginia Henderson. **A** ☐ **B** ☐
27. Le dossier de soins infirmiers est un document collectif pour tous les malades. **A** ☐ **B** ☐
28. Dans la pratique des soins infirmiers et obstétricaux, la personne est bénéficiaire des soins infirmiers. **A** ☐ **B** ☐
29. la pratique des soins infirmiers et obstétricaux exige que les soins se fassent dans une complication émotionnelle. **A** ☐ **B** ☐
30. NOUMSI (1988) définit le modèle conceptuel comme une représentation mentale structurée de I'image d'une profession. **A** ☐ **B** ☐
31. L'infirmier joue un rôle de suppléance de connaissance, de force ou de volonté auprès du client. **A** ☐ **B** ☐
32. Selon Abraham Maslow, avoir des rapports sexuels fait partie des besoins sociaux. **A** ☐ **B** ☐
33. Dans un modèle conceptuel, les valeurs représentent l'aspect affectif. **A** ☐ **B** ☐
34. La mort paisible est l 'une des conséquences attendues dans le modèle conceptuel de Virginia Henderson. **A** ☐ **B** ☐
35. Dans le modèle conceptuel de Virginia Henderson, le centre de l'intervention infirmière est le malade. **A** ☐ **B** ☐
36. Pour Virginia Henderson, le but des soins, c'est de mettre l'être humain dans les meilleures conditions afin que la nature agisse sur lui. **A** ☐ **B** ☐
37. Le dossier de soins infirmiers est un document collectif pour tous les malades pris en charge par l'infirmier. **A** ☐ **B** ☐
38. Le dossier de soins infirmiers préserve le secret professionnel. **A** ☐ **B** ☐

39. Tous les besoins fondamentaux selon Evelyn Adam sont des nécessités vitales. **A** ☐ **B** ☐
40. Un besoin fondamental est un manque pour l'homme. **A** ☐ **B** ☐
41. Les soins infirmiers palliatifs visent à accroitre les symptômes d'une maladie sans qu'ils puissent agir sur la cause. **A** ☐ **B** ☐
42. Les dimensions suivantes se retrouvent également dans les soins palliatifs préventif, relationnel et technique. **A** ☐ **B** ☐
43. Les soins infirmiers palliatifs visent à atténuer les symptômes d'une maladie sans qu'ils puissent agir sur la cause. **A** ☐ **B** ☐
44. Pour Florence Nightingale, le but des soins, c'est de mettre l'être humain dans les meilleures conditions afin que la nature agisse sur lui. **A** ☐ **B** ☐
45. Pour Virginia Henderson, les soins infirmiers visent à conserver ou à rétablir l'indépendance du client de sorte qu'il puisse satisfaire lui-même ses besoins fondamentaux. **A** ☐ **B** ☐
46. Les soins infirmiers sont un ensemble d'activités spécifiques, autonomes et/ou déléguées visant le maintien de la santé des personnes saines ou malades, des familles et des collectivités. **A** ☐ **B** ☐
47. La reprise évolutive d'une même maladie est appelée récidive alors que la rechute est la réapparition d'une maladie antérieurement guérie. **A** ☐ **B** ☐
48. L'infirmier et la sage-femme travaillent sur les consignes des médecins à l'hôpital. **A** ☐ **B** ☐
49. Appliquer les prescriptions médicales fait partie du rôle propre de l'infirmier. **A** ☐ **B** ☐
50. Procéder à la toilette du malade est un soin de nature relationnelle. **A** ☐ **B** ☐
51. Le modèle conceptuel en soins infirmier désigne une façon simplifiée de voir la réalité professionnelle. **A** ☐ **B** ☐
52. L'application du modèle conceptuel dans la pratique infirmière quotidienne nécessite l'utilisation d'une méthode de travail appelée démarche de soins. **A** ☐ **B** ☐
53. Le modèle conceptuel est un modèle sur lequel un agent de santé se base pour prodiguer des soins de qualité. **A** ☐ **B** ☐
54. Les besoins sont universels pour tous les êtres humains mais spécifiques pour chacun. **A** ☐ **B** ☐
55. L'infirmier est une personne qui travaille dans une structure sanitaire. **A** ☐ **B** ☐
56. On évalue la qualité des soins à travers la relation d'aide avec le malade. **A** ☐ **B** ☐
57. Le mot profession signifie une vocation apprise. **A** ☐ **B** ☐
58. Le dossier de soins infirmiers est un dossier nominatif, individuel et remis à jour pour chaque patient. **A** ☐ **B** ☐
59. La philosophie de V. H permet de satisfaire les besoins du malade. **A** ☐ **B** ☐
60. Virginia H soutient que pour que l'homme soit en santé il faut que tous ses 14 besoins soient satisfaits. **A** ☐ **B** ☐
61. L'empathie qui est une attitude du professionnel de la santé au cours de la relation d'aide amène l'agent de santé à écouter le malade. **A** ☐ **B** ☐
62. V. H dans sa philosophie de soins annonce que le but essentiel des soins infirmiers est d'aider seulement l 'individu malade à recouvrer la santé. **A** ☐ **B** ☐
63. La philosophie de la science infirmière démontre que la théorie et le concept ont des similitudes. **A** ☐ **B** ☐
64. Dans la pratique des soins infirmiers, le modèle conceptuel donne une idée précise du rôle qu'un agent de santé joue auprès de la population. **A** ☐ **B** ☐
65. Dans la pratique des soins infirmiers, le modèle de soins et la théorie de soins sont les mêmes. **A** ☐ **B** ☐
66. Selon Dunn, le continuum santé-maladie est un processus de santé stable quel que soit l'environnement dans lequel vit l'individu. **A** ☐ **B** ☐

67. L'homme en science infirmière n'est pas un homme en perpétuel devenir et en interaction avec son environnement car cherche une situation qu'il n'atteindra jamais jusqu'à sa mort. **A** ☐ **B** ☐
68. A travers l 'idée des différents auteurs et l'OMS, la notion des santés est centrée uniquement sur l'absence de maladie ou infirmité. **A** ☐ **B** ☐
69. La philosophie de soin de Dorethea OREM identifie 4 types d'auto-soins. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 QCM</u> : cochez-la ou les bonnes réponses

70. Les théories de soins reposent sur quatre concepts fondamentaux sauf un. Lequel ?

A. La santé ☐ B. L'homme ☐ C- la réception du malade ☐ D- l'environnement ☐

71. Selon Virginia Henderson, les sources de difficultés reliées à la satisfaction des quatorze besoins fondamentaux sont :

A. le manque de force physique ☐ C- Le manque de connaissance ☐
B. le manque de volonté ☐ D- Toutes les réponses (A, B et C) sont justes ☐

72. Les soins infirmiers peuvent être classés parmi trois catégories distinctes gui sont : (Cochez les bonnes réponses)

A. Soins curatifs ☐ D- soins réductionnels ☐
B. Soins préventifs ☐ E- soins promotionnels ☐
C. Soins palliatifs ☐

73. La santé est une notion qui varie selon plusieurs facteurs lesquels ?

A. Le secteur (biologique, social et psychologique) ☐ D- Le moment ☐
B. La perspective (façon dont I 'individu se perçoit) ☐ E- L'environnement ☐
C. Toutes les réponses sont justes ☐

74. Chaque catégorie de soin intègre, trois composantes du soin de nature suivantes sauf deux (choisir les bonne réponses) les soins sont à la fois :

A. Nature technique ☐ C- traumatique ☐ E- Nature éducative ☐
B. nature fonctionnelle ☐ D- Nature relationnelle ☐

75. Parmi les fonctions suivantes relevez les principales fonctions de l'infirmier(e)

A. fonction administratives ☐ D- fonction d'enseignement et d'éducation ☐
B. Fonction de diagnostic ☐ E- fonction de traitement et de réadaptation ☐
C. Fonction de recherche ☐ F- toutes les réponses sont justes ☐

76. Les raisons suivantes motivent I 'étude des concepts en soins infirmiers (choisir la bonne réponse)

A. Permettre I 'analyse de la pratique soignante ☐ D- concrétiser le concept dans la réalité ☐
B. Adapter les soins à la personne ☐ E- toutes les réponses sont justes ☐
C. S'appuyer sur un langage commun professionnel ☐

77. L'utilité de I 'enseignement des concepts en soins infirmiers sont les suivants (choisir les ou la propositions justes)

A. Le concept sert à comprendre le monde qui nous entoure ☐
B. Le concept sert à adapter ceux-ci en rapport avec le sujet ☐
C. Le concept sert à identifier des situations ☐
D. le concept sert à construire des connaissances utiles concernant ses propriétés et leurs Comportements ☐
E. Toutes les propositions dont justes ☐

78. Un des pionniers en soins infirmiers affirme que les comportements adaptés seront des réponses qui assurent I 'intégrité de la personne en matière de : (choisir les bonnes réponses)

A. Suivie ☐ C- croissance ☐ E- Reproduction ☐
B. maturation ☐ D- Toutes les réponses sont justes ☐

79. Parmi les facteurs d'influences d'une définition personnelle de la santé, un seul est faux. Lequel ?

A. Les soins infirmiers ☐ C. les influences sociales et culturelles ☐
B. Le développement personnel ☐ D. les attentes personnelles ☐

80. Les éléments ci-dessous font partis du modèle conceptuel de V. H sauf un. Lequel ?

A. Le rôle de l'infirmier ☐ C- les conséquences de activité professionnelle ☐
B. Le postulat ☐ D- la cible de l'activité professionnelle ☐

81. Les éléments ci-dessous font partis des trois principaux concepts de base de V. H sauf un. Lequel ?

A. La relation soignant soigné ☐ C. les besoins fondamentaux ☐
B. L'indépendance ☐ D. l'empathie ☐

82. Parmi les éléments ci-dessous deux font partie des phases de relation d'aide V. H. lesquels ?

A. La prise de contact ☐ C- la relation thérapeutique ☐ E- Relation fonctionnel ☐
B. Relation de civilité ☐ D- Période d'évaluation ☐

83. Un seul des éléments ci-dessous constitue les apports de la théorie de V. H. lequel ?

A. Un modèle pour l'individualisation de soin ☐
B. Une vision claire et nette de soins infirmiers ☐
C. Une définition du rôle du suppléant ☐
D. Une démarche pour aider le patient à reconquérir son indépendance ☐

84. Les quatre besoins fondamentaux ci-dessous sont issus de V. H sauf un. Lequel ?

A. dormir et se reposer ☐ B- inspirer ☐ C- éliminer ☐ D- apprendre ☐

85. Selon le modèle conceptuel de V. H, le rôle essentiel d'IDE/SF consiste à rendre le patient indépendant par les gestes ci-dessous

A. soigner seulement l'individu malade ☐
B. suppléer aux déficiences de l'individu malade ☐
C. prendre le malade dans sa globalité en prenant en charge sur tous les plans ☐
D. individualiser les soins ☐

86. Les concepts fondamentaux ci-dessous font partie des théories de soins sauf deux. Lesquels ?

A. l'homme ☐ C- l'environnement ☐ E- la santé mentale ☐
B. les soins infirmiers ☐ D- l'indépendance ☐

87. Le rôle de l'infirmier selon V. H, consiste à accomplir les activités ci-dessous sauf un. Lequel ?

A. aider l'individu malade ou sain au maintien ou à recouvrer la santé ☐
B. individualiser les soins ☐
C. aider seulement la personne malade à satisfaire ses besoins ☐
D. aider l'individu malade à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible ☐

88. parmi les différentes conceptions ci-dessous des auteurs des soins sur la santé, une est celle de Dorethea Orem. Laquelle ?

A. les lois de la santé sont pratiquement inconnues ☐
B. la santé consiste à garder une autonomie maximum face aux changements ☐
C. la santé est une réponse adaptative cohérente à trois stimuli locaux, contextuel et résiduel ☐
D. la santé est un état où l'être humain satisfait tous ses besoins seuls et sans effort pour devenir indépendant ☐

COACHING

EPREUVE DE RECHERCHE

Partie 1 QCD: cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. La recherche appliquée ne se préoccupe pas des implications de ses produits. **A** ☐ **B** ☐
2. L'un des buts de la recherche est d'améliorer les techniques qui existent. **A** ☐ **B** ☐
3. La recherche non expérimentale permet de déterminer les causes des phénomènes. **A** ☐ **B** ☐
4. Les deux modes d'investigation utilisés en recherche scientifique sont l'approche quantitative et l'approche qualitative. **A** ☐ **B** ☐
5. La recherche infirmière permet de faire passer de la conception de profession à celle de métier. **A** ☐ **B** ☐
6. Les domaines d'investigation en sciences infirmières sont la personne et la santé. **A** ☐ **B** ☐
7. La recherche scientifique se déroule en deux principales phases. **A** ☐ **B** ☐
8. La recherche scientifique a quatre grandes fonctions. **A** ☐ **B** ☐
9. Le soin infirmier est un sujet de préoccupation de la recherche en soins infirmiers. **A** ☐ **B** ☐
10. La phase conceptuelle de la recherche est aussi appelée phase théorique. **A** ☐ **B** ☐
11. Toute recherche comporte trois principales phases dont la dernière est la phase tactique. **A** ☐ **B** ☐
12. L'une des fonctions de la recherche est de formuler des généralisations. **A** ☐ **B** ☐
13. L'approche qualitative est une étape du processus de la recherche scientifique. **A** ☐ **B** ☐
14. Le problème formulé est un énoncé de six principaux éléments dont le type d'étude. **A** ☐ **B** ☐
15. Les librairies sont des lieux de documentations utilisés pour faire la revue de littérature. **A** ☐ **B** ☐
16. Le but de la recherche est un énoncé déclaratif dans lequel on présume qu'il existe une relation entre une ou des variables indépendantes. **A** ☐ **B** ☐
17. La définition opérationnelle des termes permet de marquer l'équivoque au niveau des concepts clés par le chercheur. **A** ☐ **B** ☐
18. Dans une hypothèse, c'est la variable dépendante qui explique cette dite indépendante. **A** ☐ **B** ☐
19. La phase empirique est la dernière phase du processus de la recherche scientifique. **A** ☐ **B** ☐
20. La recherche fondamentale est une fonction de la recherche scientifique. **A** ☐ **B** ☐
21. Les graffiti sont des documents photographiques. **A** ☐ **B** ☐
22. La recherche expérimentale est un mode d'investigation en recherche scientifique. **A** ☐ **B** ☐
23. En matière de recherche scientifique, on distingue deux modes d'investigation. **A** ☐ **B** ☐
24. L'une des orientations de la recherche scientifique est la recherche appliquée. **A** ☐ **B** ☐
25. La description est I 'un des niveaux de la recherche scientifique. **A** ☐ **B** ☐
26. La rationalisation des connaissances infirmières est l'une des finalités de la recherche en soins infirmiers. **A** ☐ **B** ☐
27. La littérature grise comprend exclusivement l'ensemble des documents produits dans les universités et écoles de formations. **A** ☐ **B** ☐
28. La littérature scientifique est constituée par l'ensemble des documents produits par les grandes institutions internationales. **A** ☐ **B** ☐
29. Les sciences expérimentales traitent l'homme, son histoire, son comportement, la langue, le social, le psychologique, le politique. **A** ☐ **B** ☐
30. Le domaine de la recherche une spécialité de la discipline scientifique qui a retenu l'attention. **A** ☐ **B** ☐
31. La finalité de la recherche en soins infirmiers est de développer des connaissances sur les soins i infirmiers et non leur application pratique. **A** ☐ **B** ☐
32. Les sciences exactes comprennent les mathématiques et les « sciences mathématisées » comme la physique théorique. **A** ☐ **B** ☐
33. Les sciences humaines comprennent les sciences de la nature et de la matière, la biologie, et la médecine. **A** ☐ **B** ☐
34. La première phase de la recherche est appelée phase conceptuelle ou tactique ou stratégique. **A** ☐ **B** ☐

35. Les variables dichotomiques ou binaires sont des variables pouvant prendre plus de valeurs possibles. **A** ☐ **B** ☐
36. Le construit est un concept spécialement inventé ou adopté par le chercheur dans un but

scientifique précis**. A** ☐ **B** ☐

37. La variable dépendante est la variable qui subit l'effet attendu de la variable indépendante**. A** ☐ **B** ☐
38. La recherche en sciences infirmières est née 2e moitié du XXe siècle avec Florence Nightingale, durant la guerre de cessation aux USA**. A** ☐ **B** ☐
39. Un thème de recherche est une branche qui consiste à délimiter un aspect du vaste champ d'intérêt à l'étude**. A** ☐ **B** ☐
40. 1970 marque 'émergence de théories et de modelés conceptuels en sciences infirmières pour guider la pratique des soins**. A** ☐ **B** ☐
41. Observer, c'est considérer avec attention afin d'avoir une idée abstraite qui représente les manifestations de certains comportements ou caractéristiques**. A** ☐ **B** ☐
42. La recherche infirmière est l'étude systématique de phénomènes présents dans les domaines des scientifiques**. A** ☐ **B** ☐
43. La variable indépendante est la variable manipulée par le chercheur dans le but d'étudier ses effets sur la variable dépendante**. A** ☐ **B** ☐
44. La troisième phase de la recherche est appelée phase opérationnelle ou empirique**. A** ☐ **B** ☐
45. La science est l'ensemble des connaissances encore appelées dogmes, assertion par la nature arbitraire**. A** ☐ **B** ☐
46. Les variables qualitatives sont des variables dont les valeurs sont des quantités exprimées en chiffres**. A** ☐ **B** ☐
47. Une question de recherche est un énoncé explicite relatif à un domaine que l'on désire explorer en vue d'obtenir de nouvelles informations**. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

48. Sélectionnez les phases qui constituent des buts de la recherche scientifique :

A. Développer des théories ☐
B. Constituer une base scientifique qui conduit à la crédibilité des professions de santé ☐
C. Imaginer des faits nouveaux concernant des phénomènes ☐
D. Formuler des généralisations ☐
E. Améliorer des techniques qui n'existent pas encore ☐

49. Cochez les réponses qui constituent des fonctions de la recherche scientifique :

A. identifier des sujets d'étude ☐ C. faire des enquêtes ☐
B. Décrire des faits ☐ D. Deviner des faits ☐ E. Expliquer des phénomènes ☐

50. Cochez les éléments qui sont des composantes de 'énoncé :

A. Le sujet d'étude ☐ C- la rationalité ☐
B. la précision ☐ D- La justification du choix du sujet ☐ E- Le fait réel ☐

51. Parmi les documents suivants, cochez ceux qui sont manuscrits :

A. Les carnets de correspondances ☐ C. les rapports d'activités ☐
B. Les carnets intimes ☐ D. les rapports d'enquête ☐ E- Les articles de journaux ☐

52. Cochez dans cette liste, les documents tapuscrits

A. Le procès-verbal ☐ C. les registres d'activités ☐
B. Les internes ☐ D- les archives ☐ E- Les autobiographies ☐

53. identifiez en cochant, les documents qui se présentent sous forme orale

A. Les procès-verbaux ☐ C. le compte rendu ☐
B. L'histoire racontée ☐ D. Le chant ☐ E. le journal intime ☐

54. Cochez parmi ces phases, celles qui caractérisent le processus de la recherche scientifique :

A. La phase théorique ☐ D. le choix et la formulation du sujet de recherche ☐
B. La revue documentaire ☐ E. l'énoncé du problème de recherche ☐
C. La phase tactique ☐

55. Cochez parmi ces documents, ceux qui sont imprimés sont :

A. Les documents de familles ☐ C. les registres de paroisse ☐ E. Les livres ☐
B. les registres administratifs ☐ D. les articles de revues ☐

56. Parmi ces groupes de mots, cochez ceux qui indiquent les grandes orientations de la recherche scientifique

A. L'approche qualitative ☐ C. la recherche appliquée ☐ E. La recherche fondamentale ☐
B. La démarche rigoureuse ☐ D. l'approche quantitative ☐

57. Les fonctions de la recherche scientifique sont :

A. Décrire des faits ☐ C. deviner de faits ☐
B. Comprendre des phénomènes ☐ D. contrôler des conduites ☐

58. Les grandes orientations de la recherche scientifique sont :

A. La recherche mixte ☐ C. la recherche fondamentale ☐
B. La recherche appliquée ☐ D. l'approche quantitative ☐

59. Parmi ces éléments suivants, identifiez, les méthodes de recherche :

A. Le recherche qualitative ☐ C. la recherche quantitative ☐
B. La recherche non expérimentale ☐ D. la recherche expérimentale ☐ E- La recherche mixte ☐

60. Les modes d'investigation sont :

A. L'approche fondamentale ☐ B- L'approche qualitative ☐ C- L'approche appliquée ☐

61. Dans une hypothèse de recherche :

A. La variable dépendante est souvent expliquée par la variable indépendante ☐
B. La variable dépendante n'est jamais expliquée par la variable indépendante ☐
C. La variable dépendante est toujours expliquée par la variable indépendante ☐

62. Les domaines de recherche en soins infirmiers et obstétricaux sont :

A. La personne ☐ B. la santé ☐ C- le cadre de vie de l'homme ☐ D. le soin médical ☐

63. Les différents types de documents utilisés pendant la revue de littérature sont entre autres :

A. les documents imprimés ☐
B- les documents rédigés manuellement ☐
C- les documents tuquscrits ☐

64. les principaux lieux de documentation sont :

A. les personnes ressources ☐ C- les outils numériques ☐
B. les bibliothécaires ☐ D. les sites internet ☐

65. Les composantes de l'énoncé sont entre autres :

A. la description de la situation ☐ B- l'imitation personnelle ☐ C- les stratégies possibles ☐

66. Cochez les documents imprimés pouvant être utilisés pour mener une revue de littérature :

A. les livres ☐ B. les mémoires ☐ C. les thèses ☐ D. les articles de journaux ☐

67. Cochez les lieux de documentation à utiliser pour assurer la revue documentaire

A. les bibliothécaires ☐ B. les sites internet ☐ C. les articles de journaux ☐ D. les mémoires ☐

68. Cochez les documents issus de la littérature grise

A. les mémoires ☐ B. les procès-verbaux ☐ C. les journaux ☐ D. les thèses ☐

69. Les éléments constitutifs de la formulation du sujet sont :

A. le thème ou le phénomène à l'étude ☐
B. le continent et le pays de chercheur ☐
C. la population cible qui doit faire l'objet d'étude ☐
D. le lieu où a court le phénomène qui a fait l'objet du constat ☐

70. La question de recherche a deux composantes :

A. la question pivot ☐ B. la citation ☐ C. le problème ☐ D. le domaine ☐

71. Le problème est :

A. une situation qui nécessite une solution, une amélioration ou une modification ☐
B. une situation qui ne peut trouver de solution ☐
C. une situation catastrophique ☐
D. un écart entre la situation actuelle et la situation telle qu'elle devrait être ☐

72. Le sujet ou titre d'un travail de recherche est :

A. le centre de préoccupation d'une personne ☐ C. le champ d'intérêt ☐
B. la question ☐ D. ce sur quoi s'exerce la relation ou l'activité ☐

73. Ces définitions font référence à la recherche scientifique

A. un processus, une démarche systématique qui permet d'obtenir des réponses à des questions Précises qui méritent une investigation ☐
B. une démarche ou un processus permettant de faire admettre l'opinion ou la pensée du chercheur ☐
C. un ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques ☐

74. Deux de ces éléments font partie de la phase empirique :

A. la collecte des données ☐ C. les variables ☐

B. la population et l'échantillon ☐ D. la communication des résultats ☐

75. Deux de ces éléments sont des étapes de la phase conceptuelle

A. le choix et la formulation d'un problème de recherche ☐ C. le devis de recherche ☐

B. le but, les questions de recherche ou les hypothèses ☐ D. interprétation des résultats ☐

76. Deux de ces éléments font partie de la phase tactique :

A. le devis de recherche ☐ C. l'élaboration d'un cadre de recherche ☐

B. la recension des écrits pertinents ☐ D. les méthodes de collète et analyse des données ☐

COACHING

EPREUVE SYSTÉME NATIONAL DE SANTE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix non exorbitant. **A** ☐ **B** ☐
2. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix exorbitant. **A** ☐ **B** ☐
3. La prestation des services et le système d'information sur la santé sont deux des trois composantes d'un système de santé. **A** ☐ **B** ☐
4. Un système de santé doit être physiquement et financièrement accessible à tous. **A** ☐ **B** ☐
5. Un système de santé est acceptable lorsque les méthodes utilisées sont compatibles avec le niveau intellectuel de la communauté. **A** ☐ **B** ☐
6. La globalité, l'efficacité et l'acceptabilité font partie des caractéristiques d'un bon système de santé. **A** ☐ **B** ☐
7. Un système de santé réactif ne peut se modifier qu'une seule fois pour s'adapter à l'évolution des besoins. **A** ☐ **B** ☐
8. La liberté comme caractéristique du système de santé consiste pour le malade à pouvoir s'adresser à la structure et à l'agent de santé de son choix. **A** ☐ **B** ☐
9. Un système de santé doit être physiquement et financièrement accessible à tous. **A** ☐ **B** ☐
10. L'une des insuffisances du système de santé ivoirien est son manque d'équité. **A** ☐ **B** ☐
11. La prévention primaire consiste à éviter l'apparition de la maladie par un dépistage précoce. **A** ☐ **B** ☐
12. L'objectif principal du système de santé de la Côte d'ivoire de la période de 1960 à 1980 (postcolonial) était la consolidation des acquis en termes d'infrastructures sanitaires, de personnel de santé et de financement du système de santé. **A** ☐ **B** ☐
13. L'objectif principal du système de santé de la Côte d'ivoire de la période précoloniale était la consolidation des acquis. **A** ☐ **B** ☐
14. La stratégie avancée est le seul moyen de rendre le système de santé physiquement accessible aux populations vivant loin d'une structure de santé. **A** ☐ **B** ☐
15. La construction de structures de santé à moins de 5 kilomètres des lieux d'habitation des populations est le seul moyen de rendre le système de santé physiquement accessible aux populations. **A** ☐ **B** ☐
16. L'une des insuffisances du système de santé ivoirien est son manque d'équité. **A** ☐ **B** ☐
17. Un système de santé qui a la capacité d'apprécier une situation qui prévaut et de mesurer le niveau d'atteinte de ses objectifs est dit planifiable. **A** ☐ **B** ☐
18. Un système de santé qui a la capacité de mesurer les résultats obtenus et d'identifier les difficultés rencontrées est dit évaluable . **A** ☐ **B** ☐
19. Un système de santé dans lequel le malade a la liberté de prescrire le médicament de son choix admet la liberté. **A** ☐ **B** ☐
20. Un système de santé est dit global lorsqu'il est accessible à tous dans les mêmes proportions sans discrimination. **A** ☐ **B** ☐
21. Un système de santé dont les animateurs prodiguent des soins curatifs et des soins préventifs est dit global. **A** ☐ **B** ☐
22. Un système de santé qui enregistre une forte consommation des ressources matérielles est toujours efficace. **A** ☐ **B** ☐
23. Un système de santé qui atteint ses objectifs avec les moyens disponibles est efficient. **A** ☐ **B** ☐
24. Un pays qui parvient à mettre à la disposition de chaque localité habitée, une structure de soins de santé est doté d'un système de santé accessibl. **A** ☐ **B** ☐
25. Le système de santé de la Côte d'ivoire offre trois types de soins qui sont les soins précaires, les soins secondaires et les soins tertiaires. **A** ☐ **B** ☐
26. Un système dans lequel des activités de prévention, de soins curatifs et de sensibilisation sont menées peut-être considéré comme global. **A** ☐ **B** ☐
27. Un système de santé qui fonctionne sans tenir compte des caractéristiques socioculturelles des populations manque de liberté. **A** ☐ **B** ☐
28. Les fonctions d'un système de santé sont au nombre de trois (3) . **A** ☐ **B** ☐
29. Les piliers d'un système de santé sont au nombre de cinq (5) . **A** ☐ **B** ☐
30. L'inaccessibilité aux soins de santé est une caractéristique d'un système de santé. **A** ☐ **B** ☐

31. L'acceptabilité est l'une des caractéristiques d'un système de santé. **A** ☐ **B** ☐
32. Le Système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec trois versants et deux niveaux. **A** ☐ **B** ☐
33. Le système de santé ivoirien est sous forme pyramidale avec deux versants et trois niveaux. **A** ☐ **B** ☐
34. Les ressources humaines pour la santé regroupent entre autres les travailleurs non médicaux qui assurent la gestion et le soutien dans les services de santé. **A** ☐ **B** ☐
35. Les Objectifs d'un système de santé consistent à restaurer la santé, promouvoir la maladie et assurer la prévention de la santé. **A** ☐ **B** ☐
36. La globalité d'un système de santé se mesure par sa capacité à offrir des soins préventifs et des soins curatifs à la population. **A** ☐ **B** ☐
37. Un système de santé peut être efficient sans être efficace. **A** ☐ **B** ☐
38. Les soins sont dits accessibles lorsqu'ils sont mis à la disposition de toutes les populations quel que soit leur localisation géographique. **A** ☐ **B** ☐
39. Un système qui permet à l'agent de santé de s'adresser à la structure de son choix et au malade de son choix admet la liberté. **A** ☐ **B** ☐
40. L'histoire du système de santé a connu successivement la période d'après l'indépendance, la période d'avant I 'indépendance. **A** ☐ **B** ☐
41. L'objectif principal du système post colonial était de maintenir en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique. **A** ☐ **B** ☐
42. Le système de santé pré-indépendance n'était pas global accordait une priorité à la main d'œuvre valide au détriment des autres couches sociales. **A** ☐ **B** ☐
43. Pendant la période coloniale le personnel était en nombre réduit et formées sur le tas et à l'école de médecine Jules CARDE en France. **A** ☐ **B** ☐
44. Le système de santé colonial était caractérisé par une infrastructure maximale de base avec 23 lits en 1902. **A** ☐ **B** ☐
45. De 1960 à 1980, l'objectif principal du système post-colonial était la consolidation des acquis en matière d'infrastructures, de personnel et de financement. **A** ☐ **B** ☐
46. Le système de santé est un moyen dont dispose la collectivité pour répondre aux besoins de santé. **A** ☐ **B** ☐
47. Les soins sont dits essentiels lorsqu'ils portent sur les besoins prioritaires des individus, des familles et des communautés. **A** ☐ **B** ☐
48. Les soins sont dits accessibles lorsqu'ils sont administrés aux populations à un moindre coût. **A** ☐ **B** ☐
49. Les soins sont dits accessibles lorsqu'ils sont mis à la disposition de toutes les populations quel que soit leur statut social. **A** ☐ **B** ☐
50. Les soins sont acceptables lorsque leur administration tient compte des caractéristiques socioculturelles des communautés. **A** ☐ **B** ☐
51. Un pays qui parvient à offrir gratuitement les soins de santé à l'ensemble de sa population est doté d'un système de santé accessible. **A** ☐ **B** ☐
52. La construction de structures de santé dans un rayon de moins de 5 kilomètres de chaque localité habitée est le seul moyen de rendre le système de santé physiquement accessible à toutes les populations. **A** ☐ **B** ☐
53. Le fait d'offrir gratuitement les soins de santé est le seul moyen de rendre le système de santé financièrement accessible. **A** ☐ **B** ☐
54. Un système de santé efficient est toujours efficace. **A** ☐ **B** ☐
55. Un système de santé efficace est toujours efficient. **A** ☐ **B** ☐
56. Tout système de santé peut être évalué. **A** ☐ **B** ☐
57. Tout système de santé qui parvient à déterminer les ressources disponibles et à choisir les solutions aptes à résoudre les problèmes de santé des populations est dit évaluable. **A** ☐ **B** ☐
58. Un système de santé qui s'adapte constamment à l'évolution des besoins de la population est dit efficient. **A** ☐ **B** ☐
59. Un système de santé qui permet au malade de faire de l'automédication admet la liberté. **A** ☐ **B** ☐
60. On dit qu'un système de santé admet la liberté, lorsqu'il permet aux agents de santé de consulter la structure ou le malade de leur choix et donne au malade la liberté de prescrire le médicament de leur choix. **A** ☐ **B** ☐
61. Les ressources humaines pour la santé sont constituées par le personnel médical, infirmier, sage-femme, l'aide-soignant travaillant dans les services de santé. **A** ☐ **B** ☐
62. les techniciens de surfaces, les vigiles et les chauffeurs embauchés dans les structures de santé sont aussi considérés comme des ressources humaines pour la santé. **A** ☐ **B** ☐

63. Le système de santé pré-indépendance n'était pas équitable car il réservait certaines. **A** ☐ **B** ☐
64. structures urbaines destinées aux Européens et Syriens puis d'autres, rurales, légères et préventives destinées aux autochtones. . **A** ☐ **B** ☐
65. Les activités du système de santé colonial aux populations étaient constituées par l'organisation de l'hygiène collective et la prophylaxie des grandes épidémies. . **A** ☐ **B** ☐
66. Le système de santé colonial était financé par les autorités ivoiriennes qui géraient l'administration **A** ☐ **B** ☐
67. De 1960 à 1980, les structures d'accueil et de soins étaient localisées dans les centres ruraux. **A** ☐ **B** ☐
68. L'institut de cardiologie d'Abidjan est localisé à Cocody. **A** ☐ **B** ☐
69. Le Service d'Aide Médicale d'Urgence d'Abidjan est localisé à Yopougon. **A** ☐ **B** ☐
70. L'institut Raoul Follereau à Alépé. **A** ☐ **B** ☐
71. L'INHP d'Abidjan est localisé à Adjamé, près du Camp Militaire Galiéni. **A** ☐ **B** ☐
72. L'INSP est localisé à Treichville, à proximité du CHU de cette commune. **A** ☐ **B** ☐
73. Le centre de transfusion sanguine d'Abidjan est situé à Cocody. **A** ☐ **B** ☐
74. De 1960 à 1980, le financement du système de santé ivoirien était du ressort de l'Etat ivoirien, du secteur privé et des partenaires au développement. **A** ☐ **B** ☐
75. La Direction de la Coordination du Programme Elargi de Vaccination se trouve dans l'enceinte de l'institut National d'Hygiène Publique. **A** ☐ **B** ☐
76. La Direction de la Coordination du Programme National de Lutte contre la Tuberculose se trouve à la gare de Bassam. **A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 QCM</u> : cochez-la ou les bonnes réponses

77. Les objectifs ci-dessous énumérés sont les objectifs d'un système de santé, sauf un. identifiez ce dernier.

A. Restaurer la santé.☐
B. Assurer la prévention des maladies.☐ C. Assurer la promotion de la maladie.☐

78. La période 1960 à 1980, la prestation des services était organisée selon deux (02) volets. Lesquels ?

A. Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins.☐
B. Un volet orienté sur la promotion de la santé.☐
C. Un volet préventif basé sur une assistance médicale visant la lutte contre les grandes endémies.☐

79. Parmi les activités suivantes indiquez celles qui sont du domaine de la prévention :

A. la vaccination.☐
B. le dépistage volontaire du VIH /SIDA.☐
C. les spots publicitaires télévisés relatifs aux problèmes de santé.☐
D. la consultation prénatale.☐ E. la sensibilisation en vue de l'utilisation des moustiquaires imprégnées.☐

80. Parmi les éléments suivants identifiez ceux font partie du système de santé:

A. les structures de santé.☐ D. le personnel soignant.☐ F- la politique de santé.☐
B .les ressources financières.☐ E. les populations.☐ G- l'accessibilité aux soins.☐
C. les maladies infectieuses.☐

81. Identifiez parmi ces phases, celle (s) qui constitue(ent) un ou des objectifs d'un système de santé :

A. Restaurer la santé.☐ B- Assurer la prévention de la santé.☐ C- Assurer la promotion de la maladie.☐

82. Parmi les éléments suivants, sélectionnez ceux qui influencent l'offre de soin:

A. l 'implication du secteur privé en matière de santé.☐
B. l'importance de l'activité des tradithérapeutes.☐ C. la pyramide sanitaire.☐

83. Parmi les milieux suivants, indiquez ceux qui étaient concernés par les activités d'hygiène collective menée pendant la période coloniale

A. les domiciles privés.☐ C- le milieu scolaire.☐ E- les marchés.☐
B. les prisons.☐ D- les lieux de culte.☐ F- les cinémas.☐

84. Parmi les actions de prophylaxie suivantes, indiquez celles pratiquées en période coloniale :

A. le dépistage des cas de maladies.☐ C- les consultations prénatales.☐ E- l'isolement des cas dépistés.☐
B. les stratégies avancées.☐ D- les journées nationales de vaccination.☐

85. De 1960 à 1980, selon quels volets était organisée la prestation des services de soins en Côte d'ivoire ?

A. un volet orienté sur les soins curatifs .☐
B. un volet orienté sur les soins promotionnels.☐
C. un volet orienté vers les soins préventifs.☐

EPREUVE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité indépendante du système national de santé**. A** ☐ **B** ☐
2. Les soins de santé primaires sont des stratégies issues de la conférence internationale de BAMAKO pour réduire les inégalités dans la situation sociale des peuples**. A** ☐ **B** ☐
3. Le CHR et même le CHU peut être considéré dans certaines circonstances comme un ESPC**. A** ☐ **B** ☐
4. L'une des raisons pour lesquelles les centres de santé ne répondent pas toujours à l'attente des populations réside dans le fait que les populations elles-mêmes ne soient pas toujours associées aux activités du centre**. A** ☐ **B** ☐
5. Dans le traitement des ordures ménagères, I 'incinération est un procédé qui consiste à brûler les ordures ménagères stockées à l'aide d'un incinérateur**. A** ☐ **B** ☐
6. L'objectif de la santé pour tous avant l'an 2000 a été défini par l'assemblée mondiale de la Santé en 1977**. A** ☐ **B** ☐
7. La participation active des populations aux activités du centre de santé est une recommandation de I 'initiative de Bamako**. A** ☐ **B** ☐
8. La conférence du 6 au 12 septembres 1978 au cours de laquelle la politique des SSP a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS**. A** ☐ **B** ☐
9. En 1985, les chefs d'état africains membres de l'OMS se sont retrouvés dans la capitale Zambienne pour dégager trois niveaux d'application des SSP**. A** ☐ **B** ☐
10. Le district sanitaire est situé au niveau secondaire de la pyramide sanitaire ivoirienne**. A** ☐ **B** ☐
11. L'hôpital général est I 'une des structures prestataires du niveau périphérique de la pyramide sanitaire ivoirienne**. A** ☐ **B** ☐
12. Les différents niveaux d'application des SSP sont le niveau stratégique et le niveau de mise en œuvre des activités**. A** ☐ **B** ☐
13. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé niveau primaire**. A** ☐ **B** ☐
14. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé périphérique**. A** ☐ **B** ☐
15. Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau secondaire**. A** ☐ **B** ☐
16. Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau intermédiaire**. A** ☐ **B** ☐
17. La gestion du niveau primaire est assurée par le Directeur départemental de la santé**. A** ☐ **B** ☐
18. La gestion du niveau secondaire est assurée par le Directeur départemental de la santé**. A** ☐ **B** ☐
19. Le niveau central des SSP s'occupe seulement de la conception des politiques de santé**. A** ☐ **B** ☐
20. La politique des SSP définie à l'initiative de Bamako a mis un accent particulier : sur la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile**. A** ☐ **B** ☐
21. Le lancement officiel de la mise en œuvre des SSP en Côte d'ivoire a eu lieu en 1993**. A** ☐ **B** ☐
22. Le début effectif de la mise en œuvre des activités des SSP en Côte d'ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé**. A** ☐ **B** ☐
23. Les SSP sont des soins essentiels car ils répondent aux besoins fondamentaux des populations**. A** ☐ **B** ☐
24. Les SSP sont adaptés car leur mise en œuvre tient contre des caractéristiques socioculturelles et des besoins de santé des populations**. A** ☐ **B** ☐
25. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité indépendante du système national de santé**. A** ☐ **B** ☐
26. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité dépendante du système national de santé**. A** ☐ **B** ☐
27. Le but particulier des SSP en Côte d'ivoire est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant**. A** ☐ **B** ☐
28. la mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'ivoire est axée en partie sur la participation Communautaire**. A** ☐ **B** ☐
29. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend huit composantes essentielles**. A** ☐ **B** ☐
30. En côte d'ivoire la politique des SSP comprend deux composantes curatives**. A** ☐ **B** ☐
31. En côte d'ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives**. A** ☐ **B** ☐
32. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois Composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐
33. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et deux composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐

34. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐
35. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend deux versants**. A** ☐ **B** ☐
36. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central**. A** ☐ **B** ☐
37. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central**. A** ☐ **B** ☐
38. La pyramide sanitaire ivoirienne comporte des structures de gestion qui sont le district sanitaire, le District régional et le Ministère de la santé et de l'Hygiène publique**. A** ☐ **B** ☐
39. La pyramide sanitaire ivoirienne comporte un versant de prestation de services composé entre autres des ESPC, du CHR et des instituts spécialisés**. A** ☐ **B** ☐
40. L'OMS compte à ce jour 143 pays**. A** ☐ **B** ☐
41. En 1985, les chefs d'état africains membres de l'OMS se sont retrouvés dans la capitale Zambienne (Lusaka) pour dégager trois niveaux d'application des SSP**. A** ☐ **B** ☐
42. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend trois versants**. A** ☐ **B** ☐
43. La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante curative des soins de santé primaire**. A** ☐ **B** ☐
44. La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993**. A** ☐ **B** ☐
45. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend deux composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐
46. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles est une composante essentielle des SSP**. A** ☐ **B** ☐
47. La vaccination contre les maladies infectieuses est une composante essentielle des SSP**. A** ☐ **B** ☐
48. La composante des SSP qui traite de l'approvisionnement en eau est formulée comme suite : « I 'approvisionnement suffisant en eau potable et des mesures d'assainissement de base » **. A** ☐ **B** ☐

<u>Partie 2 QCM</u> :*cochez la ou les bonnes réponses*

49. En Côte d'ivoire la politique des SSP comprend :

A. 02 composantes préventives et 03 composantes curatives . ☐
B. 02 composantes préventives et 03 composantes promotionnelles. ☐
C. 03 composantes préventives et 02 composantes promotionnelles. ☐
D. 03 composantes préventives et 03 composantes promotionnelles. ☐

50. Parmi les composantes essentielles des soins de santé primaire ci-dessous, cochez celles qui sont justes.

A. Vaccination contre les maladies courantes. ☐ C. Fourniture en médicaments essentiels. ☐
B. Promotion de bonnes conditions d'hygiène alimentaire.☐ D. Prévention et lutte contre les endémies locales. ☐

51. La pyramide sanitaire de la Côte d'ivoire comporte :

A. 06 niveaux.☐ B. 04 niveaux.☐ D. 05 niveaux.☐ C. 03 niveaux.☐

52. Parmi les établissements sanitaires suivants cochez ceux qui se trouvent au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire.

A. CSR.☐ B- CHR.☐ C- CSU.☐ D- Direction Régionale.☐ E- District sanitaire.☐

Dans le système national de santé, les soins de santé primaire se situent

B. Au niveau primaire du système de santé .☐ C. Au niveau intermédiaire du système de santé.☐
A. Au niveau tertiaire du système de santé.☐ D. À tous les niveaux du système de santé.☐

53. Cochez parmi ces éléments, un des motifs qui ont incité lOMS à concevoir la politique des SSP :

A. L'incapacité des systèmes de santé des pays de répondre efficacement aux besoins de santé des populations.☐
B. La cherté du coût des actes de santé qui ne permet pas aux démunis de se soigner correctement.☐
C. L'adéquation de la répartition des ressources allouées à la santé entre les pays.☐

54. Dans quelle ville les trois niveaux d'application de la politique des SSP ont t-ils été définis ?

A- Lusaka.☐ B. Bamako.☐ C. Brazzaville.☐

55. En quelle année la politique des SSP a-t-elle été officiellement lancée en Côte d'ivoire ?:

A. 1990.☐ B. 1993.☐ C. 1991.☐ D. 1988.☐

56. Quand est-ce que la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie ?

A- en septembre 1977.☐ B- en septembre 1978.☐ C- en mars 1987.☐

57. Parmi les éléments suivants, lequel constitue une composante essentielle des soins de santé primaires est :

A. l'approvisionnement suffisant en eau saine ou potable.☐

B. la vaccination contre les maladies infectieuses.☐
C. prévention et lutte contre les endémies locales.☐

58. Dans quelle ville, la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie ?

A. Rome.☐ B. Alma Ata.☐ C. Genève.☐ D. Ata alma.☐

59. ***Cochez les phrases qui constituent des composantes de 5SP :***

A. Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de maladie auxquels la population est confrontée.☐
B. Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale.☐
C. Promotion et la lutte contre les endémies locales.☐
D. Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.☐
E. Vaccination contre les principales maladies endémiques.☐

60. Dans quelle pays, la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie pour la première fois?

A. Italie.☐ B. URSS.☐ C. Suisse.☐ D. Mali.☐ E. Zambie.☐

Le contenu de l 'initiative de Bamako préconise entre autres :

A. un accès prioritaire des femmes et des enfants aux soins de santé.☐
B. une autonomie de gestion au niveau local à travers les comités de gestion.☐
C. une interdiction des médicaments génériques dans les structures de santé.☐
D. une définition des niveaux d'application des soins de santé primaires.☐

61. Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A. les SSP sont des soins essentiels.☐ C- les SSP sont des soins adoptés.☐
B. les SSP sont des soins accessibles.☐ D- les SSP sont des soins intègres.☐

62. Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A. Les SSP sont des soins accessibles car ils ne coûtent pas cher.☐
B. Les SSP sont accessibles car ils favorisent l'automédication.☐
C. Les SSP sont des soins accessibles car ils sont disponibles dans les centres de santé.☐

63. Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP:

A. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.☐
B. Promotion et la lutte contre les endémies locales.☐
C. Approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base.☐
D. Prévention et lutte contre les épidémies locales.☐
E. Vaccination contre les maladies infectieuses.☐

64. Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP :

A. Approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base.☐
B. Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.☐
C. Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.☐

65. La gestion du niveau primaire est assurée par

A. Le Directeur départemental de la santé.☐
B. Le Directeur régional de la santé.☐
C. Le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture Maladie Universelle.☐

66. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé:

A- niveau primaire.☐ B- niveau secondaire.☐ C- niveau intermédiaire.☐ D- niveau central.☐

67. Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A. les SSP sont des soins essentiels.☐ C- les SSP sont des soins intègres.☐
B. les SSP sont des soins adoptés.☐ D- les SSP sont des soins acceptables.☐

68. Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP:

A. Promotion de bonnes conditions alimenta ires et nutritionnelles.☐
B. Promotion et lutte contre les endémies locales.☐
C. Approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base.☐
D. Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.☐
E. Vaccination contre les principales maladies infectieuses.☐
F. Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction.☐

69. L'analyse de la situation sanitaire mondiale par l'OMS de 1977 a identifié comme problème :

A. la capacité des systèmes de santé des pays de répondre efficacement aux besoins de santé des populations.☐

B. la cherté du coût des actes de santé ne permettant pas aux démunis de se soigner correctement et efficacement.☐

C. L' inadéquation et la répartition inéquitables des ressources humaines allouées à la santé.☐

D. le désintérêt de plus de plus croissant du personnel de santé dans I 'exécution de leurs activités parce que non associé aux prises de décision concernant leur profil de carrière.☐

70. L'objectif de santé pour tous au-delà des horizons 2000 a été fixé par:

A. le ministère ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture Maladie Universelle.☐

B. le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.☐

C. l'Organisation Mondiale de la Santé.☐

D. le bureau Afrique de l'OMS.☐

71. l'objectif santé pour tous à l'an 2000 ou au-delà des horizons 2000 a été fixé en

A.1978.☐ B. 1976.☐ C. 1977.☐ D. 1985.☐

72. Les Soins de Santé Primaires ont été identifiés par la communauté sanitaire mondiale à :

A. Lusaka.☐ B. Alma Ata.☐ C. Genève.☐ D. Brazzaville.☐

73. Les SP ont été identifiés comme stratégie pour atteindre l'objectif social santé pour tous à l'an 2000:

A. le 12 septembre 1998.☐ C. le 12 septembre 1977.☐

B. le 12 septembre 1978.☐ D. le 12 septembre 1987.☐

74. Les trois niveaux d'applications de la stratégie des SSP ont été identifiés à :

A. Lusaka.☐ B. Bamako.☐ C. Brazzaville.☐ D. Ouagadougou.☐

75. Les trois niveaux d'applications de la stratégie des SSP ont été identifiés en :

A. 1978.☐ B. 1987.☐ C. 1991.☐ D. 1985.☐

76. L'initiative de Bamako a été lancée en :

A. 1987.☐ B. 1985.☐ C. 1978.☐ D. 1977.☐

77. La mise en œuvre effective des activités des SSP en Côte d'ivoire a eu lieu en

A. 1991.☐ B- 1993.☐ C- 1992.☐ D. 1989.☐

78. Le nombre des composantes essentielles des SSP est de :

A. 12 composantes.☐ B- 06 composantes.☐ C- 08composantes.☐ D- 10 composantes.☐

79. Parmi les composantes essentielles des SSP suivantes, une seule est fausse, laquelle ?

A. La vaccination contre les maladies infectieuses.☐

B. La vaccination contre les maladies infectieuses.☐

C. Le traitement des maladies et lésions courantes.☐

D. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.☐

80. La pyramide sanitaire de la Côte d'ivoire comprend :

A. un versant gestionnaire et un versant prestataire.☐

B. un versant gestionnaire et un versant intermédiaire.☐

C .un versant périphérique et un versant gestionnaire.☐

D. un versant gestionnaire et un versant tertiaire.☐

81. L'ESPC signifie :

A. Etablissement Sanitaires Par Communes.☐

B. Entreprise Sanitaire de Premier Choix.☐

C. Etablissement Sanitaires de Premier Contact.☐

D. Etablissement Sans Paramètres Corrects.☐

82. Le CHR signifie :

A. Centre Hospitalier Rural.☐ C. Conseil Hospitalier Régional.☐

B. Centre Hospitalier Rare.☐ D. Centre Hospitalier Régional.☐

83. Le CHU signifie :

A. Centre Hospitalier Universel.☐ C. Centre Hospitalier Unifié.☐

B. Centre Hospitalier Universitaire.☐ D. Centre Hospitalier des Universitaires.☐

84. Les soins de santé primaires sont la stratégie identifiée à Alma-Ata

A. en septembre 1977.☐ C. en octobre 1985.☐ E. en septembre 1978.☐

B. en mars 1987.☐ D. en septembre 1991.☐

85. Parmi les phrases suivantes identifier celle qui constitue une composante essentielle des soins de santé primaires:

A. L'approvisionnement suffisant en eau saine ou potable.☐ D. Prévention et lutte contre les endémies locales.☐

B. La prévention et la lutte contre les endémies locales.☐ E. Traitement des infections et lésions fréquentes.☐

C. Fourniture en médicaments.☐

EPREUVE DE PATHOLOGIE RESPIRATOIRE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1- L'examen du diagnostic de certitude de l'asthme est la spirométrie**. A** ☐ **B** ☐
2- Le traitement de la crise d'asthme suffit dans la prise en charge du sujet asthmatique**. A** ☐ **B** ☐
3- Le traitement de la bronchite aiguë repose sur les moyens symptomatiques**. A** ☐ **B** ☐
4- L' œdème aigue du poumon cardiaque est caractérisé par une augmentation de la pression hydrostatique**. A** ☐ **B** ☐
5- La substance de la dépendance tabagique est la caféine**. A** ☐ **B** ☐
6- La pneumopathie aigue bactérienne est une affection pleurale**. A** ☐ **B** ☐
7- Dans un centre de santé de niveau primaire. la ponction pleurale peut être réalisée par l'infirmier**. A** ☐ **B** ☐
8- L'épanchement gazeux pleural est encore appelé pneumothorax**. A** ☐ **B** ☐
9- La phase du début de la bronchite aigue est caractérisée par une toux sèche**. A** ☐ **B** ☐
10- Devant une hémoptysie, I 'hospitalisation du patient n'est pas nécessaire**. A** ☐ **B** ☐
11- La polypnée désigne une augmentation de la fréquence cardiaque**. A** ☐ **B** ☐
12- Au cours de la bronchite aigue, la radiographie thoracique est toujours anormale**. A** ☐ **B** ☐
13- La principale complication de la bronchite aigue est la surinfection bactérienne**. A** ☐ **B** ☐
14- La préinscription d'antitussifs est systématique devant une toux grasse**. A** ☐ **B** ☐
15- La toux est dite chronique lorsqu'elle évolue depuis plus de 03 mois**. A** ☐ **B** ☐
16- Le tabac est le premier facteur de risque du cancer bronchique primitif**. A** ☐ **B** ☐
17- La phase intensive du traitement antituberculeux dure 04 mois**. A** ☐ **B** ☐
18- Au cours de l'examen pleuro-pulmonaire, l'interrogatoire objectif les signes physiques sont présentés par le patient**. A** ☐ **B** ☐
19- L'œdème aigue du poumon n'est pas une urgence**. A** ☐ **B** ☐
20- L'asthme est une maladie aigue des bronches caractérisée par des épisodes récurrents de dyspnée sifflante**. A** ☐ **B** ☐
21- La pneumopathie bactérienne est une infection du parenchyme pulmonaire par un virus**. A** ☐ **B** ☐
22- Le staphylocoque est le germe le plus fréquemment rencontré chez I 'adulte atteint d'une pneumopathie aigue bactérienne**. A** ☐ **B** ☐
23- La bronchite aigue est une inflammation chronique des bronches et /ou des bronchioles d'origine infectieuse le plus souvent virale**. A** ☐ **B** ☐
24- La radiographie thoracique est indispensable pour le diagnostic de la bronchite aigue**. A** ☐ **B** ☐
25- L'antibiothérapie est toujours indiquée dans le traitement de la bronchite aigue**. A** ☐ **B** ☐
26- La principale complication de la bronchite aigue est la surinfection bactérienne**. A** ☐ **B** ☐
27- L'asthme est caractérisé cliniquement par la dyspnée inspiratoire sifflante**. A** ☐ **B** ☐
28- La crise d'asthme aigue grave peut se prendre en charge dans un centre de santé périphérique**. A** ☐ **B** ☐
29- La voie d'administration idéal du bronchodilateur au cours de la crise d'asthme est la inhale**. A** ☐ **B** ☐
30- L'atteinte pleurale est la forme la plus fréquente de la tuberculose**. A** ☐ **B** ☐
31- Dans la tuberculose pulmonaire, la toux est productive et évolue depuis au moins trois semaines**. A** ☐ **B** ☐
32- La tuberculose multi résistante désigne un cas ou le bacille tuberculeux est résistant à la rifampicine ou à l'isoniazide**. A** ☐ **B** ☐
33- La pleurésie purulente est une urgence thérapeutique**. A** ☐ **B** ☐
34- Le pneumocoque est le germe le plus fréquent responsable de pleurésie purulente chez l'adulte**. A** ☐ **B** ☐
35- La ponction pleurale peut être réalisée par un agent de santé**. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM :cochez la ou les bonnes réponses

36- Le médicament à utiliser en urgence devant une embolie pulmonaire est :

A. Les diurétiques.☐ C- les anticoagulants.☐ E- Les bronchodilatateurs.☐
B. Les antibiotiques.☐ D- aucune réponse n'est juste.☐

37. Parmi ces propositions concernant la tuberculose pulmonaire, 2 sont justes : lesquelles ?

A. Maladie contagieuse.☐ C- durée de traitement : 06 mois.☐ E- Affection saisonnière.☐
B. Maladie incurable.☐ D- le diagnostic est clinique.☐

38. Parmi ces propositions, une ne fait pas partie des causes respiratoires de l'hémoptysie : laquelle ?

A. Cancer broncho-pulmonaire.☐ C- abcès du poumon.☐ E- Pleurésie de grande abondance.☐
B. Pneumopathie bactérienne grave.☐ D- tuberculose pulmonaire.☐

39. Au cours du traitement d'un nouveau cas de tuberculose pulmonaire bacillifère, le contrôle bactériologique des crachats se fait (choisir la bonne réponse)

A. Au 1e, 4eme et 6eme mois de traitement.☐ D- Au 2eme, 5eme et 6eme mois de traitement.☐
B. Au 2eme, 5eme et 6eme mois de traitement.☐ E. Au 5eme et 6eme mois de traitement.☐
C. Au 3eme, 5eme et 8eme mois de traitement.☐

40. Concernant la prise en charge de l'embolie pulmonaire, 02 réponses ne sont pas justes : lesquelles ?

A. La prise en charge peut se faire dans un centre de santé de niveau primaire.☐
B. C'est une urgence thérapeutique.☐
C. Mise en condition du patient avant son évacuation.☐
D. Attendre les résultats des examens de certitude avant de débuter le traitement.☐
E. Le risque est augmenté chez la femme enceinte.☐

41. Pendant la crise d'asthme, l'examen physique retrouve : (choisir les 02 bonnes réponses)

A. Bradypnée respiratoire.☐ D- Etat général altéré.☐
B. Râles sibilants à l'auscultation pulmonaire.☐ E- Syndrome de condensation pulmonaire.☐
C. Fièvre élevée.☐

42. Au cours de l'embolie pulmonaire un de ces signes n'est pas retrouvé : lequel ?

A. Douleur thoracique.☐ B- toux.☐ C- Dyspnée.☐ D- hémoptysie.☐ E- Vomique.☐

43. Ces propositions concernant les signes de gravité de la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf 2 : lesquelles ?

A. Fréquence respiratoire à 16 cycles/mn.☐ D- Trouble de la conscience.☐
B. Fréquence cardiaque>125 battements/mn.☐ E- Température <35° ou >40°.☐
C. Douleur thoracique.☐

44. Le germe le plus fréquemment retrouvé au cours de la pneumopathie aigue bactérienne chez l 'adulte est : (choisir la bonne réponse)

A. Le staphylocoque.☐ C- le Pseudomonas.☐ E- Le pneumocoque.☐
B. L'Haemophilus.☐ D- le bacille de Koch.☐

45. Ces propositions concernant les signes de la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf 2: lesquelles

A. Début progressif.☐ D- douleur thoracique à type de point de côté.☐
B. Forte fièvre.☐ E- frisson.☐
C. Syndrome d'atélectasie.☐

46. Ces propositions concernant le traitement de la pneumopathie bactérienne sans signe de gravité sont justes sauf une: laquelle

A. Traitement ambulatoire.☐ D- durée du traitement : 8 à 10 jours.☐
B. Traitement par la voie orale.☐ E- bi antibiothérapie.☐
C. Amoxicilline.☐

47. Les facteurs de risque acquis de l'embolie pulmonaire sont : (choisir les 2 bonnes réponses)

A. L'immunodépression.☐ C- déficit en protéines C et S.☐ E- I 'obésité.☐
B. La grossesse.☐ D- Déséquilibre de l'hémostase.☐

48. Ces propositions concernant les signes respiratoires de gravité de la crise d'asthme sont justes sauf 2 : lesquelles ?

A. Difficulté à parler.☐ C- silence auscultatoire.☐ E- Toux.☐
B. douleur thoracique.☐ D- Polypnée avec FR>30 cycles/mn.☐

49. Le traitement de la crise d'asthme repose essentiellement sur 2 de ces médicaments : lesquels ?

A. Beta 2 agoniste de longue durée d'action par voie inhalée.☐
B. Corticoïde inhalé.☐
C. Beta 2 agoniste de courte durée d'action par voie injectable.☐
D. Beta 2 agoniste de courte durée d'action par voie inhalée.☐
E. Corticoïde injectables ou oraux.☐

50. Parmi ces propositions concernant la phase humide de la bronchite aigue, 2 sont justes : lesquelles ?

A. La toux est productive.☐ C. La vomique.☐ E- La dyspnée.☐
B. L'examen physique est pauvre.☐ D. La température est très élevée (39^0-40^0) .☐

51- Ces propositions concernant les signes de gravité d'un épanchement pleural sont justes Sauf 2 : lesquels ?

A. La présence de signes de lutte respiratoire.☐ C- La toux .☐ E- Les extrémités froides.☐
B. La tachycardie.☐ D- La douleur thoracique.☐

52-Parmi ces signes, un ne fait pas partie des signes d'imprégnation tuberculose : lequel ?

A. L'amaigrissement.☐ C- L 'anorexie.☐ E- La fièvre qui survient le soir.☐
B. La toux chronique.☐ D- Les sueurs nocturnes.☐

53-Le syndrome d'épanchement liquidien pleural est constitué par (entourez la bonne réponse)

A. Augmentation des vibrations vocales + tympanisme + diminution du murmure vésiculaire.☐
B. Abolition des vibrations vocales + matité + abolition du murmure vésiculaire.☐
C. Abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants.☐
D. Augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaires + râles crépitants.☐
E. Aucune réponse n'est juste.☐

54-Ces incidents peuvent être retrouvés au cours de la ponction pleurale sauf un :lequel ?

A. Le pneumothorax.☐ C- un malaise.☐ E. L'œdème aigu du poumon.☐
B. L'hémoptysie.☐ D- I 'hémorragie intra-pleurale.☐

55-Un de ces médicaments ne fait pas partie des antituberculeux : lequel ?

A. Ethambutol.☐ C- Pirazinamide.☐ E- Rifampicine.☐
B. Erythromycine.☐ D- Isoniaside.☐

56-C'est propositions concernant la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf une :

A. début brutal.☐ C- Fébricule.☐
B. Frisson.☐ D- Une toux sèche qui devient plus tard productive.☐

57-les signes de gravite d'une pneumopathie bactérienne sont :

A. Fréquence respiratoire > 30cycles/mn.☐ C- Trouble de conscience.☐
B. Fréquence cardiaque > 125 battements/mn.☐ D- Température <35° ou >40°.☐

58-Trois propositions sont justes concernant le traitement de la pneumopathie bactérienne sans signe de gravite: Lesquelles ?

A. Amoxicilline.☐ C- Hospitalisation.☐ E- Durée de traitement : 8 à 10 jours.☐
B. Amoxicilline + macrolides.☐ D- Voie orale.☐

59-Toutes ces propositions concernant la phase catarrhale de la bronchite aigue sont justes sauf 2: Lesquels ?

A. La toux est productive.☐ C. L'état général est altère.☐
B. La température est très élevée (39° à 40°).☐ D. L'examen physique est pauvre.☐

60-Ces propositions concernant le traitement de la bronchite aigue sont justes sauf 2 : lesquels ?

A. Décongestionnants naseaux.☐ D- Apport de vitamine C et autres oligo-élément.☐
B. Conseil pour une alimentation équilibrée.☐ E- Broncho-dilatateur.☐
C. Antibiothérapie systématique.☐

61-Toutes les propositions concernant les signes respiratoires de gravite de la crise d'asthme sont justes sauf 2 : lesquels ?

A. Difficulté à tousser.☐ C- Un silence auscultatoire.☐ E- La tachycardie.☐
B. Une douleur thoracique.☐ D- Une polypnée avec FR > 30 cycles/mn.☐

62-Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme?

A. Beta-2 agoniste de court durée d'action inhale + corticoïdes inhales.☐
B. Beta-2 agoniste de courtes durées d'action injectable + corticoïdes inhales.☐
C. Beta-2 agoniste de court durée d'action inhale + corticoïdes injectables.☐
D. Beta-2 agoniste de court durée d'action inhale + corticoïdes inhales.☐
E. Aucune de ces propositions n'est juste.☐

63-Toutes ces propositions concernant les signes de gravite d'un épanchement pleural sont justes Sauf 2 - Lesquelles ?

A. La présence de lutte respiratoire.☐ C- La toux.☐ E- La tachycardie.☐
B. La douleur thoracique.☐ D- Les extrémités froides.☐

EPREUVE DEMARCHE DE SOINS SCIENTIFIQUE

CONSIGNE : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Un mutisme traduit la non satisfaction du besoin de communiquer avec ses semblables.**A** ☐ **B** ☐
2. Douleur aiguë reliée à un processus infectieux. Le besoin non satisfait est le besoin de se mouvoir et se maintenir en bonne posture.**A** ☐ **B** ☐
3. Elle est anxieuse parce qu'elle craint de perdre de nouveau son enfant. C'est une donnée d'indépendance.
4. L'œdème généralisé est un problème de dépendance.**A** ☐ **B** ☐
5. L'observation fait appel aux connaissances.**A** ☐ **B** ☐
6. Le problème de dépendance est un énoncé qui décrit la source de difficulté.**A** ☐ **B** ☐
7. Respecter les horaires du traitement est un diagnostic infirmier en relation avec le besoin d'éviter les dangers.**A** ☐ **B** ☐
8. Alimentation inadéquate reliée à un manque de connaissance du régime alimentaire prescrit. La cause du problème est le manque de connaissance.**A** ☐ **B** ☐
9. Le manque de force est un problème de dépendance.**A** ☐ **B** ☐
10. Alimentation inadéquate reliée à un manque de connaissance du régime alimentaire prescrit. Est un diagnostic infirmier relié au traitement.**A** ☐ **B** ☐
11. Incapacité de se reposer reliée à la douleur. Le besoin non satisfait est le besoin de dormir et se reposer. **A** ☐ **B** ☐
12. Exprime le désir de sortir de I 'hôpital pour s'occuper de ses enfants. C'est une donnée de dépendance.**A** ☐ **B** ☐
13. Pâleur des conjonctives et des téguments est une donnée de dépendance.**A** ☐ **B** ☐
14. Difficulté de se mouvoir reliée à une intolérance à l'effort. Est un diagnostic infirmier relié à la personne. **A** ☐ **B** ☐
15. Altération de la muqueuse buccale reliée à la déshydratation. Le besoin non satisfait est le besoin d'être propre soigné et protéger ses téguments et phanères.**A** ☐ **B** ☐
16. Les interventions dans l'exécution des soins sont les actions que l'IDE/SF doit poser lui- même ou déléguer aux autres. **A** ☐ **B** ☐
17. Les données de dépendance sont les informations sur lesquelles le soignant doit agir.
18. L'évaluation infirmière consiste à observer la réponse du patient aux soins reçus et la comparer à I 'objectif visé par les soins. **A** ☐ **B** ☐
19. Altération de la peau est un diagnostic infirmier. **A** ☐ **B** ☐
20. Le plan de soins n'est pas un instrument de formation et de perfectionnement du personnel soignant. **A** ☐ **B** ☐
21. Le plan de soins est un document écrit par le médecin. **A** ☐ **B** ☐
22. Un diagnostic médical peut engendrer plusieurs diagnostics infirmiers. **A** ☐ **B** ☐
23. L'indice d'observation d'un objectif de soin indique ce que doit faire le client. **A** ☐ **B** ☐
24. La fixation des objectifs de soins est une composante de la planification des interventions. **A** ☐ **B** ☐
25. Le plan de soins est uniforme pour tous les services. **A** ☐ **B** ☐
26. Le plan de soins n'est pas un moyen de communication entre le personnel soignant et parent. **A** ☐ **B** ☐
27. L'évaluation des soins consiste à porter un jugement de valeur sur les soins par le patient. **A** ☐ **B** ☐
28. Mme Siluié doit être capable de boire 1,5 litre d'eau en 24 heures est un objectif de soin. **A** ☐ **B** ☐
29. On élabore un plan de soins avant la fixation des objectifs de soins et la détermination des interventions infirmières. **A** ☐ **B** ☐
30. Pour la collecte des données, l'observation fait appel aux organes de sens. **A** ☐ **B** ☐
31. L'observation fait appel aux connaissances. **A** ☐ **B** ☐
32. La planification des interventions a deux composantes. **A** ☐ **B** ☐
33. Le recueil des données est la première étape dans la démarche scientifique des soins selon le modèle conceptuel de Virginia Anderson. **A** ☐ **B** ☐
34. Un changement de comportement observé chez le patient est un critère d'atteinte de l'objectif de soins. **A** ☐ **B** ☐
35. La collecte des données se base sur les jugements de valeur du soignant. **A** ☐ **B** ☐
36. Elle exprime le désir de sortir de l'hôpital pour s'occuper de ses enfants. C'est une donnée de dépendance. **A** ☐ **B** ☐
37. Le plan de soins ne permet pas d'évaluer la qualité des soins. **A** ☐ **B** ☐
38. Le problème de dépendance est un énoncé qui décrit la source de difficulté. **A** ☐ **B** ☐
39. L'interprétation consiste à examiner les faits observés et à poser un jugement de valeur. **A** ☐ **B** ☐

40. Douleur aigue reliée à une infection. le besoin non satisfait est le besoin de se mouvoir**. A** ☐ **B** ☐
41. Le mieux-être du malade est le but de la démarche de soins**. A** ☐ **B** ☐
42. La démarche de soins est une démarche scientifique**. A** ☐ **B** ☐
43. Les étapes de la démarche de soins sont au nombre de cinq**. A** ☐ **B** ☐
44. La data collection est la 3eme étape de la démarche de soins**. A** ☐ **B** ☐
45. La collecte des données se base sur les opinions et les phénomènes observables**. A** ☐ **B** ☐
46. Les connaissances et les expériences du soignant et le vécu du client sont des sources pour la data collection**.** **A** ☐ **B** ☐
47. Les interventions infirmières portent sur les données d'indépendance**. A** ☐ **B** ☐
48. Les problèmes actuels du client sont des données d'indépendance**. A** ☐ **B** ☐
49. La donnée suivante est une donnée de dépendance : monsieur YAO prend sa douche deux fois par jour**.** **A** ☐ **B** ☐
50. La comparaison des données de dépendance et d'indépendance permet de ressortir les besoins non satisfaits**. A** ☐ **B** ☐
51. Le diagnostic infirmier est formulé à partir des besoins satisfaits**. A** ☐ **B** ☐
52. Le diagnostic de l'infirmier est composé de problème d'indépendance reliée à la source de difficulté**. A** ☐ **B** ☐
53. Le diagnostic infirmier décrit le processus de la maladie**. A** ☐ **B** ☐
54. La planification des interventions s'appuie sur la cause du problème**. A** ☐ **B** ☐
55. L'objectif de soins décrit le comportement observable que le soignant attend du client**. A** ☐ **B** ☐
56. Le plan de soins permet l 'individualisation des soins**. A** ☐ **B** ☐
57. L'observation du client est un élément de la collecte des données**. A** ☐ **B** ☐
58. Les problèmes potentiels sont des données de dépendance**. A** ☐ **B** ☐
59. La 1ère du diagnostic infirmier décrit la source de difficulté**. A** ☐ **B** ☐
60. Le diagnostic infirmier suivant est relié au besoin de se réaliser: altération de la peau reliée à l'immobilité prolongée**. A** ☐ **B** ☐

COACHING

EPREUVE D'HEMATOLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. L'hématopoïèse, c'est la production des cellules sanguines par la moelle osseuse. **A** ☐ **B** ☐
2. Les globules blancs servent dans le système immunitaire à détruire les agents infectieux. **A** ☐ **B** ☐
3. la fonction essentielle des globules rouges est le transport de l'oxygène et du dioxygène. **A** ☐ **B** ☐
4. L'hémoglobine transporte l'oxygène au niveau des tissus. Son déficit est souvent lié à une carence en fer. **A** ☐ **B** ☐
5. Les globules rouges du sang possèdent un noyau et une membrane nucléaire. **A** ☐ **B** ☐
6. Pendant une transfusion sanguine, le patient est autorisé à manger et à boire. **A** ☐ **B** ☐
7. La compatibilité au lit du malade est obligatoire avant tout acte de transfusion sanguine. **A** ☐ **B** ☐
8. Une transfusion sanguine doit être iso -groupe et iso-rhésus ou compatible afin d'éviter tout accident transfusionnel. **A** ☐ **B** ☐
9. Un sujet qui a une thrombopénie sévère est exposé à un risque de saignement spontané. **A** ☐ **B** ☐
10. La drépanocytose est une maladie contagieuse à transmission autosomique récessive. **A** ☐ **B** ☐
11. La forme SS de la drépanocytose se manifeste par un tableau d'anémie auto-immune. **A** ☐ **B** ☐
12. L'aniso-poïkylocytose est une anomalie de forme des hématies. **A** ☐ **B** ☐
13. La drépanocytose est une maladie héréditaire à transmission autosomique. **A** ☐ **B** ☐
14. Le mécanisme en cause des anémies hypochromes microcytaires, est un trouble de production médullaire des globules rouges par déficit en vitamines. **A** ☐ **B** ☐
15. Un flou visuel est une des indications de l'hémogramme. **A** ☐ **B** ☐
16. Le temps de Quick explore la coagulation exogène. **A** ☐ **B** ☐
17. La méthode de DUKE mesure le temps d'arrêt du saignement au niveau d'une incision faite au lobule de l'oreille à l'aide d'un vaccinostyle. **A** ☐ **B** ☐
18. Un nombre de plaquettes inférieur à 50.000/mm3 de sang est le signe d'un risque hémorragique élevé. **A** ☐ **B** ☐
19. Les principaux antigènes capables d'induire la production d'anticorps par la mère dans le cadre de la maladie hémolytique du nouveau-né, sont ceux du système Rhésus. **A** ☐ **B** ☐
20. Les douleurs thoraciques sont des signes neurosensoriels des anémies chroniques. **A** ☐ **B** ☐
21. Le monocyte intervient dans l'immunité spécifique et non spécifique. **A** ☐ **B** ☐
22. La phase inter-critique de la drépanocytose SS commence généralement tôt dans I 'enfance à partir de l'âge de quatre mois à cause de l'effet protecteur de l'Hémoglobine F. **A** ☐ **B** ☐
23. La thrombocytémie essentielle est une diminution du nombre de plaquettes. **A** ☐ **B** ☐
24. En cas de thrombopénie il y a un risque de saignement et ce risque est d'autant plus faible que la thrombopénie est profonde. **A** ☐ **B** ☐
25. La lithiase biliaire est une des complications ischémiques de l'évolution de la forme SS de la drépanocytose. **A** ☐ **B** ☐
26. Le plasma frais congelé est obtenu après centrifugation du sang total suivi de la séparation des hématies. **A** ☐ **B** ☐
27. L'évolution de la forme SC de la drépanocytose est surtout marquée par des complications ischémiques. **A** ☐ **B** ☐
28. Une augmentation du nombre de plaquettes au - delà de la valeur normale peut être soit réactionnelle, soit primitive. **A** ☐ **B** ☐
29. Un prurit prolongé inexpliqué, est une des contre - indications de l'hémogramme. **A** ☐ **B** ☐
30. Le test de Coombs indirect est systématique chez la femme enceinte de phénotype Rhésus négatif au moins à quatre reprises. **A** ☐ **B** ☐
31. Le traitement d'une anémie se fait en fonction de la sa cause. **A** ☐ **B** ☐
32. La technique de Beth Vincent a pour but de déterminer l'anticorps présent à la surface des hématies. **A** ☐ **B** ☐
33. Dans la réalisation du groupage le clinicien dispose sur la plaque de groupage trois puits différents. **A** ☐ **B** ☐
34. Le plasma a pour fonction d'assurer le transport des nutriments vers les tissus des déchets du métabolisme vers les organes épurateurs. **A** ☐ **B** ☐
35. On distingue 5 formes cliniques de drépanocytose qui sont par ordre croissant de gravité. **A** ☐ **B** ☐
36. L'hémoglobine adulte est constituée de 2 chaines protéiques α et ß identiques 2 à 2. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

37. Cocher la bonne réponse La prévention de la Maladie Hémolytique du Nouveau-Né est basée sur l'injection d'un sérum anti-D à la femme de rhésus négatif ayant donné naissance à un bébé de rhésus positif dans

A. Les 72 heures avant l'accouchement.☐ C- Les 72 jours suivant l'accouchement.☐
B. Les 72 heures suivant l'accouchement.☐ D- Les 72 semaines suivant l'accouchement.☐

38. Les signes fonctionnels de cardiovasculaires de l'anémie sont sauf un. Lequel ?

A. Palpitations.☐ B- céphalée.☐ C- dyspnée d'efforts.☐ E- éblouissement.☐

39. L'hémostase primaire est explorée par :

A. Le temps de concentration.☐ C- le temps de saignement.☐
B. Le temps de quick.☐ D- le temps de Howel.☐

40. Un homme de groupe B négatif marié à une femme de groupe O positif, peuvent avoir un enfant de groupe :

A. AB positif.☐ B- AB négatif.☐ C- B positif.☐ D- O negative.☐

41. Le groupe sanguine se définit par:

A. L'existence d'antigène à la surface des thrombocytes.☐
B. L'existence d'antigènes appelés d'agglutinogènes à la surface des granulocytes.☐
C. La présence d'antigènes à la surface des érythrocytes.☐
D. La présence d'anticorps naturels dans le plasma.☐

42. Une anémie chronique peut être liée à

A. Une spoliation sanguine minime répétée ou permanente.☐ C. Une durée de vie excessive des hématies.☐
B. Une hémolyse périphérique.☐ D. Une insuffisance médullaire quantitative.☐

43. Dans une anémie chronique, l' organisme réagit à l'hypoxie par :

A. Une augmentation du débit cardiaque.☐ C- une adaptation à l'environnement.☐
B. Une augmentation de la pression artérielle.☐ D- une hyper-sécrétion de l'érythropoïèse.☐

44. L'hémostase sert à :

A. Eviter les blessures.☐ C- Rendre perméable les vaisseaux en cas d'obstruction.☐
B. Prévenir toutes fibrinolyses.☐ D- Prévenir toute coagulation intravasculaire.☐

45. Parmi les paramètres biologiques suivants, quels sont ceux qui permettent la caractérisation d'une anémie

A. L'hématocrite.☐ C- le volume globulaire moyen.☐
B. Le taux d'hémoglobine.☐ D- la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine.☐

46. Une carence en fer engendre habituellement :

A. Une anémie microcytaire normochrome.☐ C- un excès de sidéroblaste médullaire.☐
B. Une anémie microcytaire hypochrome.☐ D- une anémie normochroctaire.☐

47. Les syndromes communs aux anémies sévères sont :

A. Le surpoids.☐ B. L'asthénie.☐ C- la pâleur cutanée et muqueuse.☐ D- l'hypertension.☐

48. Les hématies sont :

A. Riche en cuivre.☐ B- riche en albumine.☐ C- riche en fer.☐ D- riche en glucose.☐

49. Dans le système de groupe sanguin A. B. 0, les sujets de groupe sanguin :

A. « AB» ont des antigènes A et B.☐
B. «O » n'ont pas d'antigènes présents sur leurs érythrocytes.☐
C. «A » ont d'anticorps anti-B dans leur sérum.☐
D. « O » ont des anticorps anti-B et anti-A dans leur sérum.☐

50. L'anémie se caractérise chez l'enfant de 18 mois par la chute de l'hémoglobine en dessous de :

A. 14g/.☐ B- 16g/dl.☐ C- 12g/dl.☐ D- 18g/dl.☐

51. Concernant I 'hémostase primaire sa phase plaquettaire comprend respectivement :

A. L'adhésion, l'activation et I 'agrégation plaquettaire.☐
B. L'activation, l'adhésion et I 'agrégation plaquettaire.☐
C. L'agglutination, I 'agrégation plaquettaire et la production de complément.☐
D. L'induction, I 'agrégation du temps de saignement, l'activation des facteurs de coagulations.☐

52. L'anémie se caractérise chez la femme enceinte par la chute de l'hémoglobine en dessous de:

A. 13g/dl.☐ B- 14g/dl.☐ C- 12g/dl.☐ D- 18g/dl.☐

53. L'anémie est dite microcytaire lorsque le volume globulaire moyen est

A. Compris entre 25000 et 75000 fl.☐ B. Inférieur à 80 fl.☐ C- supérieur à 75 fl.☐ D- inférieur à 14 fl.☐

54. Quelle étape est l'aboutissement de l'hémostase primaire :

A. La thrombinoformation.☐ C- la formation du clou plaquettaire.☐
B. L'hémolyse.☐ D- la plasminoformation.☐

55. Quels éléments du sang n'interviennent pas lors de l'hémostase :

A. Le facteur VIII.☐ B- les sels minéraux.☐ C- les thrombocytes.☐ D- les gombocytes .☐

56. Une hyperleucocytose peut être due à:

A. Un drépanocyte.☐ C- une hypertension.☐

B. une parasitose intestinale.☐ D- une pneumopathie bactérienne.☐

57. un temps de saignement est dit normal s'il est :

A. supérieur à 4 minutes.☐ C- comprise entre 4 et 6 minutes.☐

B. inférieur ou égale à 4 minutes.☐ D- égale à 3 minutes.☐

58. Choisir les bonnes réponses. Dans les conditions physiologiques normales, on retrouve dans le sang circulant d'un adulte

A. les érythrocytes.☐ B. les histiocytes.☐ C- les leucocytes.☐ D. les plasmocytes.☐ E. les leucocytes.☐

59. Choisir la bonne réponse. Pour poser le diagnostic d'une anémie ou surveiller l 'évolution d'une anémie, on s'appuie sur le paramètre biologique suivant :

A. le nombre de globules rouges.☐ C. le taux d'hémoglobine.☐

B. la numération globulaire.☐ D. le myélogramme.☐

60. Choisir les bonnes réponses. Un groupe sanguin est défini de façon générale par :

A. un antigène.☐ B. un globule rouge.☐ C- un facteur rhésus.☐ D. un anticorps.☐

61. Choisir les bonnes réponses. Parmi les paramètres biologiques suivants, quels sont ceux qui permettent de classer une anémie :

A. l'hématocrite.☐

B. Le taux d'hémoglobine.☐

C. la Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine.☐

D. le Volume Globulaire Moyen.☐

E. la Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine.☐

62. Cocher la bonne réponse. La cellule sanguine responsable de l'immunité cellulaire est :

A. le monocyte.☐ B. le leucocyte.☐ C. le lymphocyte T.☐ D. le lymphocyte B.☐

63. Cocher les bonnes réponses. La drépanocytose est caractérisée de façon générale par :

A. l'hémoglobine S.☐ B. la thrombopénie.☐ C. la leucopénie.☐ D. l'anémie.☐

64. Cocher la bonne réponse. Quelles sont les cellules sanguines qui jouent un rôle important dans l'hémostase primaire ?

A. les érythrocytes.☐ B. les mégacaryocytes.☐ C. les leucocytes.☐ D. les polynucléaires.☐

65. Cocher la bonne réponse. La cellule sanguine responsable de l'immunité humorale est :

A. le lymphocyte B.☐ B. le leucocyte.☐ C. le lymphocyte T.☐ D. le polynucléaire neutrophile.☐

66. Cocher les bonnes réponses. Pour un nombre de plaquettes inférieur à 50 000/mm3 de sang, on a:

A. une thrombopénie sévère.☐ C. une thrombopénie modérée.☐

B. un risque hémorragique faible.☐ D. un risque hémorragique élevé.☐

67. Cocher les bonnes réponses. Quelles sont les indications de la transfusion sanguine ?

A. thrombopénie.☐ B. polyglobulie.☐ C. déficit en facteur de la coagulation.☐ D. anémie.☐

68. Cocher la bonne réponse. La transfusion qui consiste à prélever du sang chez un patient afin de le lui transfuser ultérieurement est appelée :

A. transfusion homologue.☐ B. transfusion compatible.☐ C. transfusion iso-groupe D. transfusion autologue.☐

69. Cocher les bonnes réponses. L'exploration de l 'hémostase dans un bilan préopératoire comprend les examens suivants :

A. l'hématurie .☐ C. le Temps de Céphaline Activé (TCA) .☐

B. le fibrinogène.☐ D. le Taux de Prothrombine (TP) .☐

70. Cocher les bonnes réponses. La drépanocytose est caractérisée par des complications :

A. anémiques.☐ B. volumiques.☐ C. ischémiques.☐ D. infectieuses.☐

71. Cocher les bonnes réponses. La transfusion sanguine est un acte qui permet de sauver des vies humaines mais il comporte des risques:

A. infectieux .☐ B. héréditaires .☐ C. anatomiques.☐ D. immunologiques.☐

72. Cocher les bonnes réponses. Le trait drépanocytaire est la forme

A. de transmission de la drépanocytose.☐ C. AS de la drépanocytose.☐

B. de guérison de la drépanocytose.☐ D. anémique de la drépanocytose.☐

73. Cocher la bonne réponse. La valeur normale du Taux de Prothrombine (TP) varie de

A. 25 à 50 %.☐ B. 50 à 70%.☐ C. 70 à 100 %.☐ D. 100 à 150 %.☐

74. Cocher la bonne réponse. La valeur normale du Temps de Céphaline Activé (TCA) varie de

A. 30 à 40 S.☐ B. 40 à 50 S.☐ C. 50 à 60 S.☐ D. 60 à 70 S.☐

75. Cocher la bonne réponse. La drépanocytose est :

A. Une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive.☐
B. Une maladie héréditaire liée au sexe.☐
C. Une hémoglobinopathie.☐
D. Une anomalie du chromosome sexuel.☐

76. Cocher la bonne réponse. Le globule rouge est :

A. Une cellule intervenant dans l'immunité non spécifique.☐
B. Une cellule intervenant dans l'immunité spécifique.☐
C. Une cellule intervenant dans la phagocytose.☐
D. Spécialisé dans le transport des gaz.☐

77. Cocher les bonnes réponses. Deux des examens suivants sont réalisés chez un nouveau-né présentant une anémie et/ou un ictère pour le diagnostic biologique de la maladie hémolytique du nouveau-né :

A. Test de Coombs indirect.☐ C. Dosage répété de la bilirubine.☐
B. Test de Coombs direct.☐ D. Electrophorèse de l'hémoglobine.☐

78. Cocher les deux fausses réponses. La maladie hémolytique du nouveau-né est la conséquence de l'allo-immunisation fœto-maternelle qui se produit à différentes conditions:

A. Conditions liées à l'antigène.☐ C. L'âge de la grossesse.☐
B. Accident vasculaire cérébral.☐ D. Conditions liées à l'anticorps.☐

79. Cocher les deux fausses réponses. La maladie hémolytique du nouveau-né est la conséquence de l'allo-immunisation fœto-maternelle qui se produit à différentes conditions. Deux de ces propositions ne se rapportent pas aux conditions liées à la mère:

A. Les anticorps doivent traverser le placenta.☐
B. Immunisation par une transfusion incompatible, antérieure à la grossesse.☐
C. La mère doit être du Rhésus positif.☐
D. Immunisation par voie transplacentaire.☐

80. Cocher les deux bonnes réponses. Deux des complications suivantes sont observées dans la forme $S de la drépanocytose :

A. Complication hémolytique.☐ C. Complication hémorragique.☐
B. Complication ischémique.☐ D. Complication infectieuse.☐

81. Cocher la bonne réponse. La prévention thérapeutique des alloimmunisations est réalisée efficacement par injection de :

A. 100 µg d'antigène D à la mère.☐ C. 100 µg d'anticorps anti-D à la mère.☐
B. 100 µgd'lgG à la mère.☐ D. 100 µgd'lgM à la mère.☐

82. Cocher la bonne réponse. Le lymphocyte B intervient dans :

A. L'immunité non spécifique.☐ C. L'immunité spécifique à médiation cellulaire.☐
B. L'immunité spécifique à médiation humorale.☐ D. Les réactions inflammatoires.☐

82. Cocher les trois fausses réponses. Certaines de ces cellules ne font pas partie du groupe des mononucléaires:

A. Les lymphocytes.☐ C. Le polynucléaire neutrophile.☐
B. Le polynucléaire éosinophile.☐ D. Le polynucléaire basophile.☐

EPREUVE DE TECHNIQUE DE SOINS INFIRMIERS

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1- L'injection intramusculaire consiste à introduire une substance médicamenteuse dans le tissu musculaire**.** **A** ☐ **B** ☐
2- Une intramusculaire consiste à injecter un médicament directement dans un gros muscle au moyen d'une aiguille intramusculaire qui correspond à un diamètre précis**. A** ☐ **B** ☐
3- Dans l'injection Im, le muscle étant richement irrigué, le médicament diffuse rapidement dans la circulation sanguine**. A** ☐ **B** ☐
4- La perfusion est un procédé permettant 'injection lente et continue de liquide dans la circulation sanguine **A** ☐ **B** ☐
5- Au cours d'une injection, il ne faut pas toucher les parties qui entrent en contact avec le produit à injecter ou avec le patient**. A** ☐ **B** ☐
6- Dans une injection intramusculaire, I 'aiguille et la zone d'impact du muscle forme un angle de 90°**. A** ☐ **B** ☐
7- Dans une injections sous cutanées (SC) l'aiguille et la peau forment un angle de 45°**. A** ☐ **B** ☐
8- L'injection intramusculaire se pratique uniquement dans des muscles sains**. A** ☐ **B** ☐
9- Un patient sous anticoagulant ou avec des troubles de l'hémostase est une indication pour la réalisation de l'injection intramusculaire**. A** ☐ **B** ☐
10- Une injection SC est l'injection d'un médicament dans la couche de graisse juste au-dessous de la peau**. A** ☐ **B** ☐
11- L'injection SC se présente comme une Alternative possible à la voie IM en cas de contre-indication**. A** ☐ **B** ☐
12- Les seringues pré-remplies pour injection sous cutanée doivent être purgées avant l'injection**. A** ☐ **B** ☐
13- Les Solvants non aqueux sont les mieux indiqués pour les injections Intraveineuses(IV) **. A** ☐ **B** ☐
14- Les seringues à injections sont graduées en millilitres (ml) et en unité internationale(UI) **. A** ☐ **B** ☐
15-On distingue pour les injections IM, principalement cinq muscles qui présentent des avantages et des inconvénients divers**. A** ☐ **B** ☐
16- Les seringues à injections sont graduées soit en millilitres (ml) soit en unité internationale(UI) **. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

17- Les seringues pré-remplies pour injection sous cutanée présentent les avantages suivants
A- la bulle permet de dégager l'intégralité du produit.☐
B- favorise sa dispersion dans le tissu.☐
C- Ces avantages ne sont pas vrais.☐

18- Au cours des injections parentérales, les parties du dispositif à injection à toucher sont les suivantes:
A- l'aiguille.☐ D- le biseau de l'aiguille.☐ F- l'embase de l'aiguille.☐
B- l'embout de la seringue.☐ E- le joint du piston.☐ G- la tige du piston.☐
C- Toutes les réponses sont fausses.☐

19- Les seringues à insuline sont graduées en :
A- Unités Internationales.☐ B- Millilitres.☐ C- Pas d'unités fixes.☐

20- Pour une injection parentérale, on utilise préférentiellement une aiguille à biseau
A- Court pour les IM.☐ B- Long pour IV.☐ C- Peu importe.☐ D- Aucune réponse n'est juste.☐

21- Pour une injection IM, la quantité à injecter pour une absorption optimale est de
A- 0,5 à 3 ml.☐ B- 5 ml en une seule fois.☐ C- 10ml.☐

22-Ouelle est votre conduite lorsque la quantité à injecter dans les injections IM dépasse 5 ml
A- diviser la dose en deux.☐ C- injecter à 2 endroits différents.☐
B- Reporter la moitié le lendemain.☐ D- Diviser la dose et injecter à 2 endroits différents.☐

23- Les critères qui déterminent un muscle sain sont :
A- Souplesse à la relaxation et fermeté à la tension.☐
B- La palpation n'est pas douloureuse pour le patient.☐
C- Aucune masse dure n'est palpable à l'état de relaxation.☐
D- Muscle avec vergeture.☐

24- Les propositions suivantes sont les indications de la prise de tension artérielle, relever 3 propositions correctes parmi celles proposées.
A- identifier les signes d'aggravation subite du patient.☐
B- Apprécier les effets secondaires d'un traitement hypo et hypertenseur.☐

C- Surveiller le patient.☐
D- Comparer les résultats en fonction des positions debout/couché.☐
E- Prévoir l'hospitalisation pour une éventuelle poussée hypertensive.☐

25- Les sites suivants sont ceux de prise du pouls, cocher les réponses justes

A- Radiale.☐ B- Brachiale.☐ C- Ventral.☐ D- Temporale.☐ E- Carotide.☐

26- Le pouls radial se prend à un endroit parmi ceux cités ci-dessous, lequel ?

A. La base du pouce.☐ B- Pli du coude.☐ C- En avant et au-dessus de l'oreille.☐ D- Cou.☐

27- Les différentes zones de réalisations des injections intramusculaires sont les suivantes sauf deux lesquelles ?

A- Le muscle deltoïde.☐ C- Muscle abdominal.☐ E- Le vaste externe de la cuisse.☐
B- Muscle grand fessier.☐ D- Muscle du mollet.☐

28- La réalisation d'une perfusion exige les éléments nécessaires suivants :

A- Un récepteur : différentes voies d'abord.☐
B- Un vecteur : matériel de perfusion.☐
C- Un liquide de perfusion : ce sont des solutions liquidiennes stériles.☐
D- Ces éléments sont insuffisants.☐
E- Ces éléments sont les trois impératifs.☐

29- Les exigences pour le choix des aiguilles pour réaliser une injection parentérale sont :

A- Aiguille à biseau long pour IM.☐ C- Aiguille à biseau Court pour les IV.☐
B- Peu importe.☐ D- Toutes les réponses sont justes.☐

30- Parmi les activités suivantes, quelle (s) est/sont celle (s) que I' infirmier ne peut pas faire chez un malade soumis au traitement anticoagulant ?

A- Surveiller les temps de saignement et de coagulation.☐
B- Contrôler tous les trois jours le taux de prothrombine.☐
C- Faire des injections intramusculaires au malade.☐
D- Toutes les activités citées.☐

31- La pression veineuse est un acte qui consiste à:

A- Mesurer les pressions intra-cavitaires.☐
B- Mesurer les débris dans la grande circulation.☐
C- Mesurer le courant sanguin au niveau des voies veineux.☐

32- La tension artérielle est :

A- La sensation du soulagement perçu par le doigt qui déprime une artère superficielle sur plan osseux.☐
B- La sensation perçue par le malade lors de l'arrivée d'une substance au niveau de la langue.☐
C- La pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins.☐

33- L'Hémoptysie est caractérisée par la présence dans les vomissements de :

A- Sang digéré avec des débris alimentaires.☐
B- Sang rouge aéré, sans caillot, sans débris alimentaire.☐
C- Sang non aéré avec débris alimentaire et caillots.☐

34- L'Hémoptysie est une hémorragie extériorisée d'origine :

A- Respiratoire.☐ B-Digestive.☐ C-Dentaire.☐

COACHING

EPREUVE DE SOINS AUX ENFANTS

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. La toilette est une technique qui consiste à exécuter l'ensemble des soins de propriété du corps. **A**☐ **B**☐
2. Il existe trois types de toilettes. **A**☐ **B**☐
3. Pour exécuter la toilette du nouveau-né en toute sécurité, quatre précautions sont à prendre. **A**☐ **B**☐
4. Le matériel courant pour la toilette du nouveau-né : une cupule, une poubelle ou un haricot. **A**☐ **B**☐
5. Pendant la toilette du nouveau-né il n'est pas nécessaire d'insister sur les plis. **A**☐ **B**☐
6. La toilette est indiquée chez nouveau-né dont le cordon ombilical n'a pas chuté et dont la plaie Ombilicale n'est pas encore cicatrisée. **A**☐ **B**☐
7. Pendant la toilette il faut ouvrir les portes et les fenêtres. **A**☐ **B**☐
8. Après le soin il n'est pas nécessaire de faire la transmission. **A**☐ **B**☐
9. Les soins des orifices se font après l'habillement. **A**☐ **B**☐
10. La toilette du nouveau-né se fait : du cou au thorax en passant par l'abdomen, les pieds, les jambes et les cuisses. **A**☐ **B**☐
11. Le bain de propriété est un risque pour l'enfant entre 12 et 18 mois. **A**☐ **B**☐
12. Il existe 4 types de bain. **A**☐ **B**☐
13. Le bain thérapeutique se fait en cas de fièvre. **A**☐ **B**☐
14. Le bain, c'est I 'immersion du corps de l'enfant dans l'eau afin de maintenir la peau en parfait état de propriété et prévenir l'apparition de lésions cutanées. **A**☐ **B**☐
15. Dans le matériel spécifique pour l'exécution du bain chez l'enfant, on a besoin de : deux serviette propres, une poubelle, des vêtements et des couches propres et une cupule. **A**☐ **B**☐
16. Le bain est un moment privilégié avec l'enfant pour jouer, dialoguer et rire ensemble. **A**☐ **B**☐

•Le but des soins des orifices c'est d'éliminer une partie des secrétions en vue de rétablir le fonctionnement normal des orifices. **A**☐ **B**☐

17. Pendant la photothérapie, il faut surveiller la T° de l'enfant toutes les deux heures. **A**☐ **B**☐
18. Pendant la photothérapie, faire des soins préventifs des yeux au sérum physiologique suivi d'instillation de collyre antiseptique. **A**☐ **B**☐
19. La photothérapie peut provoquer à court terme chez I 'enfant un ballonnement abdominal. **A**☐ **B**☐
20. L'incubateur a quatre principales fonctions. **A**☐ **B**☐
21. L'entrée du matériel propre dans l'incubateur se fait par les hublots situés du côté des pieds. **A**☐ **B**☐
22. La pose de bouillote est recommandée chez le nouveau-né hypotrophe ou de petit poids. **A**☐ **B**☐
23. La pesée est une technique qui permet de mesurer la croissance pondérale de l'enfant. **A**☐ **B**☐
24. La taille est la hauteur de l'enfant du sommet du crâne au talon et dépend surtout de son alimentation. **A**☐ **B**☐
25. Le PC permet d'apprécier le volume du cerveau jusqu'à 3 ans. **A**☐ **B**☐
26. La surveillance de la croissance de l'enfant est un élément unique en pédiatrie préventive. **A**☐ **B**☐
27. La pose de la vessie de glace est recommandée lorsque l'enfant fait une fièvre ≥ 39° c. **A**☐ **B**☐
28. Ne jamais laisser une vessie de glace en place pendant plus de 30 minutes. **A**☐ **B**☐
29. Le bain tiède ou thérapeutique est recommandé à tous les enfants qui font une fièvre de 38° c. **A**☐ **B**☐
30. la pose de la bouillotte consiste à réchauffer le nouveau-né en l'absence d'incubateur ou lampe chauffante. **A**☐ **B**☐
31. La photothérapie est le traitement secondaire de I 'ictère de bilirubine libre. **A**☐ **B**☐
32. Les indications des soins des orifices dans vos documents nous en avons énuméré 05. **A**☐ **B**☐
33. Dans le cas où l'œil est chassieux, le nettoyage se fait du coin extérieur vers le coin intérieur. **A**☐ **B**☐
34. La malnutrition sévère, les maladies infectieuses, les sécrétions abondantes sont des indications des soins des orifices. **A**☐ **B**☐
35. Il existe deux types de soins ombilicaux. **A**☐ **B**☐
36. Le pansement du cordon frais a lieu les 04 premiers jours de vie du nouveau-né. **A**☐ **B**☐
37. les soins ombilicaux se déroulent en trois phases. **A**☐ **B**☐
38. Le pansement du cordon sec se déroule à partir du 5e jour de vie du nouveau-né jusqu'à la chute du moignon du cordon. **A**☐ **B**☐
39. Dans le pansement du cordon frais, le nettoyage se fait au niveau de l'extrémité du moignon de l'intérieur vers l'extérieur. **A**☐ **B**☐

40. Le pansement du cordon sec, le procédé consiste à nettoyer le moignon du cordon ombilical sec de l'extérieur vers la base**. A** ☐ **B** ☐
41. Le cordon chute entre le 8e et le 15e jour de naissance**. A** ☐ **B** ☐
42. Les indications de croissance permettent de suivre le développement somatique de l'enfant de la naissance à l'adolescence**. A** ☐ **B** ☐
43. Pour un meilleur soin à la Chlorhexidine, il faut appliquer la Chlorhexidine immédiatement après avoir coupé le cordon**. A** ☐ **B** ☐
44. À 12 mois, I 'enfant pèse entre 9 et 12 kg**. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

45. La pesée se fait :

A- Une fois par semaine le 1 semestre. ☐ C- Deux fois par mois le 3 mois. ☐
B- Trois fois par mois le 2 mois. ☐ D- Une fois tous les trois mois à partir du 13 mois jusqu'à 24 mois. ☐

46. Avant l'alimentation à la tulipe, lorsque la sonde est déjà en place, vous :

A- Vérifier et mesurer le résidu gastrique 5cc. ☐ C- Faites un lavage gastrique d'abord. ☐
B- Diminuez la ration de 2 à. ☐ D- Sautez un repas et vous informer le pédiatre. ☐

47. Pour une alimentation à la tulipe continue, il faut :(cochez la réponse incorrecte)

A- Remplir de moitié la seringue. ☐
B- Remplir la seringue selon la ration par repas de I 'enfant. ☐
C- Placer la seringue dans le pousse-seringue qui est déjà relié à la sonde. ☐
D- Régler le chronomètre et le débit. ☐

48. L'enfant est déjà alimenté, son résidu gastrique est supérieur au tiers de sa ration (cochez la réponse incorrecte)

A- L'enfant digère bien. ☐ C- L'enfant digère lentement. ☐
B- Faire un lavage gastrique. ☐ D- La ration est importante alors diminuer la ration de 2 à 5 cc. ☐

49. L'évolution pondérale de l'enfant se fait de la manière suivante, de la naissance à trois mois :(cochez la réponse correcte)

A- 0-3 mois, il prend en moyenne 25 à 30 mg/jr. ☐ C- 0-3 mois, il prend en moyenne 10 mg/jr. ☐
B- 0-3 mois, il prend en moyenne 15 mg/jr. ☐ D- 0-3 mois, il prend en moyenne 20 mg/jr. ☐

50. Le carnet mère enfant comprend quatre parties à savoir :(cochez la réponse incorrecte)

A- 1ère partie: identité et conditions de vie des parents. ☐
B- 2e partie: suivi de la grossesse. ☐
C- 3e partie : suivi de la vaccination de l'enfant et de la mère. ☐
D- 4 e partie : suivi de l'enfant (sain ou malade) . ☐

51. Le carnet de santé mère enfant est un : (cochez la réponse correcte)

A- Instrument de liaison entre le gynécologue et la SF uniquement. ☐
B- Un dossier médical pour la mère pendant la grossesse et I 'enfant dès la naissance. ☐
C- Un instrument de liaison entre la mère et l'enfant. ☐
D- Un instrument de liaison entre le père, la mère et le professionnel de santé. ☐

52. À la naissance l'enfant perd(cochez la réponse correcte)

A- Le 5e de son poids initial et le récupère vers le 7 e et le 10 e jour. ☐
B- Le 1/3 de son poids initial et le récupère vers le 10 e et le 15 e jour. ☐
C- Le 10 e de son poids initial et le récupère vers 10 e et le 15 e jour. ☐
D- Le 1/4 de son poids initial et le récupère vers le 7 e et le 15 e jour. ☐

53. La perte de poids physiologique est la conséquence de : (cochez la réponse correcte)

A- L'hérédité. ☐ B- L'élimination du méconium. ☐ C- La déperdition d'eau de la peau. ☐

54. Le rythme de la pesée se fait : *Choisissez les deux bonnes réponses*

A- 0-3 mois, une fois par semaine. ☐
B- De 4 mois jusqu'à 12 mois : une pesée chaque deux semaines. ☐
C- De 13 mois jusqu'à 24 mois : une pesée tous les trois mois. ☐
D- De 25 mois à 36 mois : deux pesées par semestre. ☐

55. Le carnet de santé mère enfant est : *Choisissez les deux bonnes réponses*

A- Un document médico-légal. ☐
B- Dossier médical pour la mère pendant la grossesse et à l'enfant dès la naissance. ☐
C- Instrument de liaison entre la mère et l'enfant. ☐

D- Instrument de liaison entre le père, la mère et le professionnel santé. ☐

56. Le pansement ombilical du cordon sec se fait : *Choisissez les deux bonnes réponses*

A- À partir du 4e jour de vie. ☐ C- De la base vers le haut. ☐

B- De l 'intérieur vers l'extérieur. ☐ D- De l'extrémité vers la base. ☐

57. Les précautions à prendre avant la photothérapie sont : *Choisissez les trois bonnes réponses*

A- S'assurer de la propreté de toute la couveuse. ☐ C- Régler la lumière. ☐

B- Assurer la protection oculaire. ☐ D- Laisser l'enfant tout nu. ☐

58. Les indications de gavage chez l'enfant sont : *Choisissez les deux bonnes*

A- La détresse respiratoire. ☐ C- Les grands brulés. ☐

B- La fente labio-palatine. ☐ D- Le nouveau-né de mère diabétique. ☐

59. Les éléments à surveiller après le gavage sont : *Choisissez les deux bonnes réponses*

A- Les réactions du nouveau-né. ☐ B- Le pli cutané. ☐ C- L'abdomen. ☐ D- La T° corporelle. ☐

60. Les indications des soins des orifices sont : *Choisissez la bonne réponse*

A- Les grands prématurés. ☐ C- L'absence de reflexes de succion et de déglutition. ☐

B- Le retard de croissance intra-utérin. ☐ D- L'érythème fessier.☐

61. Pendant la toilette du nouveau-né, les précautions à prendre sont : *Choisissez les trois bonnes réponses*

A- Eviter les courants d'air.☐ C- Assurer la sécurité du nouveau-né.☐

B- Eloigner la mère de l'enfant.☐ D- Respecter les règles d'hygiènes et d'asepsie.☐

62. Il existe plusieurs types de bain : *Choisissez la bonne réponse*

A- Le bain de croissance.☐ C- Le bain éducatif.☐

B- Le bain du développement psychomoteur.☐ D- Le bain de propreté.☐

63. Le pansement du cordon frais se fait *: Choisissez la bonne réponse*

A- Les trois premiers jours de vie.☐ C- Les deux premiers jours de vie.☐

B- Jusqu'au 7e jour de vie.☐ D- Jusqu'au 10 e jour de vie.☐

64. La solution Chlorhexidine s'applique sur le cordon frais de la manière suivante : *Choisissez la bonne réponse*

A- À la base du cordon.☐ C. À la pointe du cordon, sur le moignon et la base du cordon.☐

B- Sur le moignon.☐ D- À la pointe du cordon.☐

65. Les éléments quantitatifs de la croissance de l'enfant sont : *Choisissez la bonne réponse*

A- Le poids, la taille, le PC, le périmètre thoracique, le périmètre brachial.☐

B- Le Z score, le poids, la taille, et le PC.☐

C- La croissance des os, la taille, et le périmètre thoracique.☐

D- La fermeture de la fontanelle antérieure, la dentition.☐

66. L'évolution pondérale de l'enfant se fait de la manière suivante, de la naissance à trois mois :*Choisissez la bonne réponse*

A- 0-3 mois, il prend en moyenne 25 à 30 mg/jr.☐ C- 0-3 mois, il prend en moyenne 10 mg/jr.☐

B- 0-3 mois, il prend en moyenne 15 mg/jr.☐ D- 0-3 mois, il prend en moyenne 20 mg/jr.☐

COACHING

EPREUVE DE BIOCHIMIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Les solutés de perfusion ont un rôle de déshydratation. **A** ☐ **B** ☐
2. Le cholestérol VLDL est le bon cholestérol. **A** ☐ **B** ☐
3. L'hyperkaliémie désigne l'excès de sodium dans le plasma sanguin. **A** ☐ **B** ☐
4. Une carence en Fer peut entraîner une anémie martiale. **A** ☐ **B** ☐
5. L'anémie se définit par la diminution du taux d'hémoglobine. **A** ☐ **B** ☐
6. L'HGPO signifie Hyperglucose provoquée par voie Orale. **A** ☐ **B** ☐
7. La polyphagie désigne l 'augmentation exagérée du nombre de mictions. **A** ☐ **B** ☐
8. Une carence en cuivre entraîne le goitre. **A** ☐ **B** ☐
9. La volémie est le volume total de liquide intra cellulaire, voisin de 6L. **A** ☐ **B** ☐
10. Le sérum s'obtient à partir d'un prélèvement sanguin sur tube sans additif. **A** ☐ **B** ☐
11. Les cristalloïdes contiennent des particules de grande taille. **A** ☐ **B** ☐
12. Un soluté hypertonique a une concentration inférieure à celle du plasma. **A** ☐ **B** ☐
13. Un sujet est dit diabétique lorsque sa glycémie à jeun est ≥ 1,10 g/L. **A** ☐ **B** ☐
14. Les Glucides font partie des macroéléments de l'organisme. **A** ☐ **B** ☐
15. Le cholestérol HDL est le mauvais cholestérol. **A** ☐ **B** ☐
16. L'ionogramme plasmatique est un examen qui permet d'explorer l'équilibre acido-basique de l'organisme. **A** ☐ **B** ☐
17. L'HGPO n'est pas une épreuve d'exploration fonctionnelle. **A** ☐ **B** ☐
18. Les anions sont des ions de charge négative. **A** ☐ **B** ☐
19. Une hyperkaliémie plasmatique correspond à un taux élevé de sodium sanguin. **A** ☐ **B** ☐
20. Une formation d'un litre de sueur correspond à une perte de 2,3% du poids corporel. **A** ☐ **B** ☐
21. L'unité fonctionnelle du vivant est la cellule. **A** ☐ **B** ☐
22. Le mode de formation des biomolécules s'appelle catabolisrne. **A** ☐ **B** ☐
23. Chez la femme l'adiposité est comprise entre 15-30 %. **A** ☐ **B** ☐
24. Le saccharose est un disaccharide formé de glucose et de fructose. **A** ☐ **B** ☐
25. Une carence en iode entraine le goitre. **A** ☐ **B** ☐
26. Le fructose a un pouvoir sucrant supérieur au glucose. **A** ☐ **B** ☐
27. Un soluté glucosé de 25O cc à 10% contient 12,5g de glucose. **A** ☐ **B** ☐
28. L'ionogramme plasmatique est un examen qui permet d'explorer l'équilibre acido-basique de l'organisme. **A** ☐ **B** ☐
29. Le lactose est composé de glucose et de galactose. **A** ☐ **B** ☐
30. La potomanie se caractérise par un besoin irrépressible de boire constamment. **A** ☐ **B** ☐
31. Un soluté isotonique est un soluté dont l'osmolalité est inférieure à celle du plasma. **A** ☐ **B** ☐
32. Être porteur d'un trait drépanocytaire et un avantage contre le paludisme. **A** ☐ **B** ☐
33. Le sérum s'obtient à partir d'un prélèvement sanguin sur tube avec anticoagulant. **A** ☐ **B** ☐
34. Le cholestérol HDL est le bon cholestérol. **A** ☐ **B** ☐
35. Le dosage d'acide urique permet le suivi d'une femme enceinte hypertendue. **A** ☐ **B** ☐
36. Un soluté donc l'osmolalité est égale 400mOsm/l est un soluté isotonique. **A** ☐ **B** ☐
37. Le sérum est le plasma débarrassé de son fibrinogène. **A** ☐ **B** ☐
38. Le préalable à toute investigation biologique est la confrontation entre le clinicien et le malade. **A** ☐ **B** ☐
39. L'IMC est inadapté aux personnes géantes ou naines. **A** ☐ **B** ☐
40. Un soluté de perfusion glucosé de 250 cc à 30% contient 75g de glucose. **A** ☐ **B** ☐
41. Les colloïdes contiennent de grosses molécules qui restent dans les vaisseaux et attirent l'eau des liquides interstitiels. **A** ☐ **B** ☐
42. Au laboratoire tous les examens sont urgents. **A** ☐ **B** ☐
43. L'hypernatrémie désigne l'excès de sodium dans le plasma sanguin. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM : cochez-la ou les bonnes réponses

44. La triade diabétique est constituée par :

A. Polydipsie.☐ B. Polyurie.☐ C. Macrosomie.☐ D. Polyphagie.☐ E. Obésité.☐

45. Les valeurs d'une glycémie normale sont :

A. <1g/l.☐ B- [0.60g/l- 1.10 g/l] .☐ C- >1.26 g/l.☐

46. Les valeurs normales de l'urée sanguine sont comprises entre:

A. [0,60g/l - 1,10g/l.☐ B- [0, 15g/l -0,45g/1] .☐ C- [20- 60 mg/1] .☐

47. Chez un individu sain de 98 Kg l'eau occupe :

A. 14Kg.☐ B. 58, 80 Kg.☐ C- 42Kg.☐ D. 98 K.☐ g

48. L'électrophorèse des protéines permet d'obtenir un profil à :

A. 5 pics.☐ B- 6 pics.☐ C- 8 pics.☐

49. Les paramètres de l 'ionogramme réduit sont :

A. Na^+.☐ B. $Ca2^+$.☐ C. $Mg2^+$.☐ D- K^+.☐ E- $HCO3^-$.☐ F. Cl^-.☐

50. L'acide urique est un paramètre demandé en :

A. Rhumatologie. ☐ B- Diabétologie. ☐ C- Néphrologie. ☐

51. Parmi les pathologies suivantes, indiquez celles où un dosage de l'acide urique est demandé :

A. céphalée. ☐ B-douleur articulaire. ☐ C- diabète. ☐

52. L'ionogramme urinaire habituel implique le dosage de:

A. Na^+. ☐ B. Mg^{++} . ☐ C. K^+ . ☐ D. $SO42^-$. ☐

53. dosage de l'urée doit être complété par le dosage de:

A. Le cholestérol. ☐ C. La créatine phosphate. ☐

B. L'acide urique. ☐ D. La créatinine. ☐

54. Mon patient de 1,80 m pesant 97 kg, a un indice de masse corporelle (IMC) de:

A. 16 kg.m-2 et est maigre. ☐ C. 29,93 kg.m-2 et est en surpoids. ☐

B. 35 kg.m-2 et est obèse. ☐ D. 25 kg.m-2 et a une corpulence normale. ☐

COACHING

EPREUVE DE BACTERIOLOGIE VIROLOGIE

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. Le spectre d'action d'un ATB est I 'ensemble des espèces bactériennes sur lequel l'ATB est actif. **A** ☐ **B** ☐
2. Pour lutter contre les infections nosocomiales, il suffit de travailler avec du matériel propre. **A** ☐ **B** ☐
3. Une bactérie est un être vivant unicellulaire, microscopique du règne des protistes supérieurs. **A** ☐ **B** ☐
4. Les bactéries saprophytes se rencontrent dans l'air, le sol et l'eau. **A** ☐ **B** ☐
5. Le SWF est un examen de laboratoire réalisé pour diagnostiquer la dysenterie bacillaire. **A** ☐ **B** ☐
6. La coloration GRAM+ signifie présence de bactéries colorées en rose ou en rouge. **A** ☐ **B** ☐
7. Les entérobactéries sont des bactéries rondes(cocci) du tube digestif. **A** ☐ **B** ☐
8. Les arbovirus (arthropod-borne virus) sont des virus qui se transmettent parfois à l'homme par un vecteur arthropode. **A** ☐ **B** ☐
9. Les vers intestinaux sont des bactéries. **A** ☐ **B** ☐
10. Les bactéries se voient à l'œil nu. **A** ☐ **B** ☐
11. Pour savoir si une bactérie est virulente, on peut I 'inoculer à une souris. **A** ☐ **B** ☐
12. Le spectre d'action des phenicolés regroupe toutes les espèces bactériennes Gram positif et Gram négatif. **A** ☐ **B** ☐
13. Les bactéries se multiplient par division binaire. **A** ☐ **B** ☐
14. Après 4 divisions, une colonie bactérienne passe de 20 à 302 bactéries. **A** ☐ **B** ☐
15. Le site d'action des bêta-lactamines est la membrane cytoplasmique des bactéries. **A** ☐ **B** ☐
16. Les bactéries commensales peuvent se retrouver dans nos mains ou nos blouses. **A** ☐ **B** ☐
17. La sporulation permet à la bactérie de résister aux agressions. **A** ☐ **B** ☐
18. Les pathogènes opportunistes sont des saprophytes ou des commensales. **A** ☐ **B** ☐
19. Les bactéries toujours pathogènes pour un hôte donné sont des bactéries pathogènes occasionnelles. **A** ☐ **B** ☐
20. Une colonie de 15 bactéries qui se reproduit toutes les 30 minutes, se divise 3 fois pendant 4 heures. **A** ☐ **B** ☐
21. L'hépatite B est causée par le streptocoque du groupe B. **A** ☐ **B** ☐
22. La Fièvre jaune est une arbovirose qui sévit en Asie et en Océanie mais, épargne l'Afrique de l'Ouest forestière. **A** ☐ **B** ☐
23. Une colonie de 15 bactéries qui se reproduit toutes les 30 minutes, forme une colonie de 120 bactéries après 4 h. **A** ☐ **B** ☐
24. La Coproculture est la Recherche de bactéries enteropathogènes dans les selles. **A** ☐ **B** ☐
25. L'hémoculture est la Recherche de Kystes, Œufs et Parasites(KOP) dans les selles. **A** ☐ **B** ☐
26. L'ECBU est la culture bactériologique des secrétions urétrales. **A** ☐ **B** ☐
27. La qualité d'un prélèvement dépend de la qualité du résultat du laboratoire. **A** ☐ **B** ☐
28. La défense constitutive de l'organisme utilise des cellules tumorales. **A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM :cochez la ou les bonnes réponses

29. Cochez les éléments de structure d'une bactérie

A. La capside.☐ C- La membrane cytoplasmique.☐
B- La paroi.☐ D- Le génome.☐ E- Le peplos.☐

30. Le mode de multiplication des virus est la

A- La scissiparité.☐ B- La réplication.☐ C- La décapsidation.☐

31. Le moyen de lutte le plus efficace contre les arboviroses est.

A- La vaccination.☐ B- La lutte antivectorielle.☐ C- La chimiothérapie.☐

32. Le temps de pose de la poche urinaire chez I 'enfant est fixé à

A- 25 minutes.☐ B- 30 minutes.☐ C- 45 minutes.☐

33. le prélèvement pour une hémoculture se fait :

A- Au pic de la température.☐ C- Avant la prise de la tension artérielle.☐
B- Au moment de la visite de l'équipe médicale.☐ D- Quand les bactéries sont présentes dans le sang.☐

34. Le germe responsable de la méningite purulente est

A- Neisseria intracellularisi.☐ B- Neisseria meningitidis.☐ C- Neisseria gonorrhoeae.☐

35. la mycobactérie responsable de la tuberculose pulmonaire est:

A- Mycobacterium lepreae.☐ C- Mycobacterium tuberculosis.☐
B- Mycobacteriumulcerans.☐ D- Bacille de Koch.☐

36. Le produit biologique pour la recherche de BK est

A- Sang.☐ C- Crachats matinaux obtenus lors d'un effort de toux.☐

B- Salives matinales.☐ D- Tubage gastrique du matin.☐

37. Les vecteurs des arbovirus peuvent être des

A- Parasites intestinaux.☐ B- Mycobactéries.☐ C- Moustiques.☐ D- Puces.☐

38. Relever les conditions d'un bon prélèvement en bactériologie

A- Conditions de stérilités respectées.☐

B- Etiquetage du prélèvement selon le bulletin d'analyse.☐

C- Dépôt rapide du prélèvement au laboratoire.☐

D- Utilisation de matériel propre et non stérile en cas d'urgence.☐

39. La Fièvre jaune est une arbovirose qui est transmise par

A- L'Anophelesgambiae femelle infectée.☐ C- Les moustiques Aedesalbopictus.☐

B- La mouche tsé-tsé ou glossine.☐ D- aucun.☐

40. Le Prélèvement vaginal en vue de faire un diagnostic positif de Neisseriagonorroheae.

A- Se fait après avoir fait rincer la bouche de la patiente avec de l'eau bouillie.☐

B- Se fait Par recueil de secrétions vaginales avec un écouvillon propre.☐

C- Se fait dans endocol, l'exo col et jamais dans le vagin car celui-ci a un pH acide.☐

41. un antibiotique bactéricide à large spectre d'action, ayant pour cible la paroi bactérienne est de la Famille des :

A- Macrolides et apparentés.☐ B- Beta lactamines.☐ C. tetracyclines.☐ D- Aminosides.☐

42. L'entérobactérie responsable de la dysenterie bacillaire est

A- Ascaris lumbricoides.☐ B- Shigelladysenteriae.☐ C- Entamoebahistolytica.☐

43. Le bacille Gram non entérobactérie cité dans les maladies nosocomiales est :

A- Staphylococcus aureus.☐ C- Pseudomonas aeruginosa

B- Pseudomonas mallei.☐ D- Escherichia coli.☐

44. L'entérobactérie responsable de la fièvre typhoïde est

A- Salmonella typhi.☐ B- Proteus mirabilis.☐ C- Vibriocholerae.☐

45. Pour la coproculture, prélever :

A- Les selles.☐ C- Le sang au pic de la température.☐

B- Les urines de 4 heures.☐ D- Les crachats obtenus avec efforts.☐

46. Pour l'hémoculture, prélever :

A- Les selles.☐ C- Le sang au pic de la température.☐

B- Les urines de 4 heures.☐ D- Les crachats obtenus avec efforts.☐

47. pour l 'examen cytobactériologique des urines, prélever :

A. Les selles .☐ C- Le sang au pic de la température.☐

B. Les urines de 4 heures.☐ D- Les crachats obtenus avec efforts.☐

48. L'antibiogramme est un examen bactériologique qui permet de

A- identifier la bactérie responsable de l'infection.☐

B- Connaitre l'antibiotique qu'il faut pour traiter I 'infection.☐

C- Connaitre le Gram de la bactérie.☐

49. La raison du rejet des premiers jets d'urines dans le prélèvement de 'ECBU est

A- Eviter les souillures.☐

B- Recueillir le volume nécessaire du produit biologique.☐

C- Ce rejet est nécessaire pour l'isolement de certains germes.☐

50. Choisir l'association d'antibiotique pour un effet synergique

A- (Amoxicilline =betalactamine et Gentamicine= Aminoside) .☐

B- (Amoxicilline =betalactamine et cefuroxime= betalactamine) .☐

C- (Amoxicilline =betalactamine et Pristamycine = Macrolide) .☐

51. L'effet antagoniste est le fait de l'association de :

A- Deux antibiotiques bactéricides.☐

B- Deux antibiotiques bactériostatiques.☐

C- Un antibiotique bactéricide et un antibiotique bactériostatique.☐

52. Le virus de la dengue est transmis à l'homme par

A- L'Anophèles gambiae femelle infectée.☐

B- La mouche tsé-tsé ou glossine.☐ C- Des moustiques du genre Aedes

C- Des moustiques du genre Aedes.☐

EPREUVE DE PEV

Partie 1 QCD : cochez A si la proposition est vraie ou B si elle est fausse

1. La perte de l'appétit est l'une des contre-indications de l'administration du Rotarix.**A**☐ **B**☐
2. La perte de l'appétit est l'un des effets indésirables du Rotarix. **A**☐ **B**☐
3. Les enfants qui présentent des syndromes d'immunodéficience congénitale doivent recevoir le VPO plutôt que le VPI. **A**☐ **B**☐
4. Tous les enfants de 0 à 11 mois peuvent recevoir aussi bien le VPO que le VPI. B. **A**☐ **B**☐
5. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée ou présumée et /ou des signes et des symptômes de SIDA doit recevoir les vaccins RR et VAA à 6 mois, puis à nouveau à 9 mois. **A**☐ **B**☐
6. Le sérum est une substance qui a le désavantage d'avoir un effet moins durable que le Vaccin. **A**☐ **B**☐
7. Le sérum est une substance qui a l'avantage d'avoir un effet moins durable que le Vaccin. **A**☐ **B**☐
8. Le BCG est un vaccin bactérien inactivé. **A**☐ **B**☐
9. Le BCG est un vaccin vivant viral. **A**☐ **B**☐
10. Les vaccins sont des substances biologiques qui doivent conservés entre +2° et +8° C. **A**☐ **B**☐
11. Le vaccin de l'hépatite B pédiatrique s'administre en sous cutané à 6 semaines aux enfants de 0 à 11mois. **A**☐ **B**☐
12. Le vaccin Penta s'administre en intra musculaire à 6 semaines aux enfants de 0 à 11mois. **A**☐ **B**☐
13. Le vaccin polio inactivé s'administre en sous cutané à 14 semaines aux enfant de 0 à 11mois. **A**☐ **B**☐
14. Le vaccin antimeningococcique s'administre en intradermique à 9 mois aux enfants de 0 à 11mois. **A**☐ **B**☐
15. Le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole s'administre en sous cutané à 9 mois aux enfants de 0 à 11moi. **A**☐ **B**☐
16. Le vaccin antiamaril s'administre en intra musculaire à 9 mois aux enfants de 0 à 11mois. **A**☐ **B**☐
17. Le vaccin combiné contre le tétanos et la diphtérie s'administre en intra musculaire aux femmes enceintes. **A**☐ **B**☐
18. Le vaccin contre le Papilloma Virus Humain est un vaccin qui se présente sous forme de poudre. **A**☐ **B**☐
19. Le vaccin contre le Papilloma Virus Humain est un vaccin qui se présente sous forme liquide. **A**☐ **B**☐
20. Le nombre de doses nécessaires du vaccin Rotarix à administrer à un enfant de 0 à 11 mois pour assurer sa protection est de deux (2) doses. **A**☐ **B**☐
21. Le nombre de doses nécessaires du vaccin combiné Penta à administrer à un enfant de 0 à 11 mois pour assurer sa protection est de trois (3) doses. **A**☐ **B**☐
22. Un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné reçoit trois doses d'hépatite B dans son organisme. **A**☐ **B**☐
23. Les populations cibles visées par le PEV ivoirien sont constituées des enfants de 0 à 11 mois, des femmes en âge de reproduction et des jeunes de 9 ans. **A**☐ **B**☐
24. Les populations cibles visées par le PEV ivoirien sont constituées des enfants de 0 à 11 mois, des femmes enceintes et des jeunes de moins de 9 ans. **A**☐ **B**☐
25. Une maladie grave nécessitant une hospitalisation est une contre-indication vaccinale. **A**☐ **B**☐
26. Le PEV ivoirien a été mis en place en 1978. **A**☐ **B**☐
27. Le PEV ivoirien a été mis en place en 1974. **A**☐ **B**☐
28. Le vaccin est une substance qui a le désavantage d'avoir un effet moins durable que le sérum. **A**☐ **B**☐
29. Tout vaccin est administré pour assurer une protection spécifique. **A**☐ **B**☐
30. Le vaccin utilise les défenses de l'organisme pour assurer sa protection contre les maladies. **A**☐ **B**☐
31. La dose de BCG à administrer à une cible du PEV est de 0,05cc. **A**☐ **B**☐
32. La voie d'injection du BCG est la face externe du haut du bras ou épaule gauche. **A**☐ **B**☐
33. La première dose de Penta s'administre à l'âge d'un mois et demi. **A**☐ **B**☐
34. Le Penta s'administre chez l'enfant à mi-hauteur de la face externe de la cuisse. **A**☐ **B**☐
35. Le point d'injection du Penta est l'intramusculaire. **A**☐ **B**☐
36. Le VPO est un vaccin vivant qui s'administre en trois doses chez I 'enfant entre 0 et 11 mois. **A**☐ **B**☐
37. Le VPO et le VPI protègent contre la même maladie. **A**☐ **B**☐
38. On peut administrer le VPI à tous les enfants âgés entre 0 et 11 mois sans exception. **A**☐ **B**☐
39. On peut administrer le VPO à tous les enfants âgés entre 0 et 11 mois sans exception. **A**☐ **B**☐
40. Le VPI est un vaccin inactivé qui s'administre par voie orale. **A**☐ **B**☐
41. Le VPI est un vaccin inactivé qui s'administre en sous-cutanée. **A**☐ **B**☐
42. Le VPI ne doit pas être utilisé en cas de congélation de son flacon. **A**☐ **B**☐
43. Le VPI est un vaccin qui s'administre en quatre doses, chez l'enfant entre 0 et 11 mois. **A**☐ **B**☐

44. La population cible du PEV ivoirien est composée des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes. **A** ☐ **B** ☐
45. La Population cible du PEV ivoirien est composée des enfants de 0 à 11 mois et des femmes en âge de reproduction. **A** ☐ **B** ☐
46. Le VAA est un vaccin vivant qui nécessite un rappel tous les dix ans. **A** ☐ **B** ☐
47. Le Rotarix est un vaccin vivant non atténué qui s'administre par voie orale à raison de 2ml par dose. **A** ☐ **B** ☐
48. Le Td s'administre chez la femme enceinte dans le seul but de prévenir le tétanos Chez Celle-ci. **A** ☐ **B** ☐
49. Le Td est une anatoxine qui peut être congelée sans inconvénient. **A** ☐ **B** ☐
50. Il est possible d'oublier l'administration d'un antigène contenu dans une association combinée de vaccins. **A** ☐ **B** ☐
51. En matière de vaccination, I 'intervalle minimum n'existe pas. **A** ☐ **B** ☐
52. Pour un enfant ayant abandonné la vaccination pendant une longue période, il est recommandé de reprendre son calendrier dans sa totalité. **A** ☐ **B** ☐
53. Une injection est dite sécurisée lorsqu'elle s'administre dans le strict respect des règles d'asepsie. **A** ☐ **B** ☐
54. MAPI signifie Manifestation Post Immunisation. **A** ☐ **B** ☐
55. Les MAPI sont toujours liés à une erreur de conservation des vaccins. **A** ☐ **B** ☐
56. On parle de rupture de la chaîne du froid si et seulement si la température du réfrigérateur est supérieure à 8° c. **A** ☐ **B** ☐
57. On parle de rupture de la chaîne du froid si et seulement si la température du réfrigérateur est inférieure à 2°c. **A** ☐ **B** ☐
58. Il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid lorsque la température du réfrigérateur est comprise entre -2°c et +8°c. **A** ☐ **B** ☐
59. Il n'y a pas de rupture de la chaine du froid lorsque la température est inférieure à 8°c. **A** ☐ **B** ☐
60. En cas d'altération des vaccins par la chaleur ou la congélation, il faut les jeter immédiatement et faire une nouvelle commande au district sanitaire. **A** ☐ **B** ☐
61. Le test d'agitation des anatoxines concerne tous les vaccins du PEV, chaque fois qu'il y a suspicion de congélation. **A** ☐ **B** ☐
62. Le relevé de la température du réfrigérateur des vaccins se fait de façon quotidienne. **A** ☐ **B** ☐
63. Il est recommandé de conserver les vaccins du programme élargi de vaccination entre -2°c et 8°c. **A** ☐ **B** ☐
64. À l'exception du BCG et du VPO, la dose à administrer pour les autres vaccins du PEV est de 0,5 ml. **A** ☐ **B** ☐
65. Les différents vaccins associés de façon combinée ont toujours le même point d'injection. **A** ☐ **B** ☐
66. Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines. **A** ☐ **B** ☐
67. Chez un enfant de 10 mois mal vacciné, le vaccin prioritaire à lui administrer le jour du rattrapage est toujours le RR. **A** ☐ **B** ☐
68. Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination. **A** ☐ **B** ☐
69. Le coussinet et les chambres froides produisent du froid. **A** ☐ **B** ☐
70. Le congélateur et le réfrigérateur sont des matériels de conservation de froid. **A** ☐ **B** ☐
71. les glacières et les accumulateurs de froid sont les matériels de production de froid. **A** ☐ **B** ☐
72. Le vaccin contre l'hépatite de type B pédiatrique se fait à 6 semaines chez les enfants de 0 à 11 mois. **A** ☐ **B** ☐
73. le vaccin contre le papilloma virus humain s'administre à 9 ans chez les jeunes filles. **A** ☐ **B** ☐
74. Le Penta est une association simultanée d'antigènes. **A** ☐ **B** ☐
75. Une MAPI est une manifestation indésirable qui survient avant une vaccination et qui n'est pas nécessairement liée à l'utilisation du vaccin. **A** ☐ **B** ☐
76. La population cible vaccinale est la proportion de la population totale qui bénéficie de l'activité vaccinale. **A** ☐ **B** ☐
77. En Côte d'ivoire les populations cibles du PEV des campagnes de VPO, de RR et Td sont respectivement les enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et les enfants de 9 mois à 14 ans. **A** ☐ **B** ☐
78. Un taux d'utilisation de vaccins élevé est synonyme d'une bonne gestion des stocks de vaccins. **A** ☐ **B** ☐
79. Le besoin théorique des vaccins et le stock de sécurité sont contenus dans le besoin réel. **A** ☐ **B** ☐
80. Pour limiter le gaspillage de doses de vaccins il faut respecter les règles 2PS. **A** ☐ **B** ☐
81. La pastille de contrôle de vaccin est un cercle sensible à la chaleur placé à I 'intérieur d'un carré qui change de couleur sous l'influence combinée de la chaleur et du froid. **A** ☐ **B** ☐
82. La politique du flacon entamé consiste à réutiliser un flacon de vaccin ouvert et duquel l'on a prélevé une ou plusieurs doses de vaccins pour la prochaine séance de vaccination jusqu'à 4 semaines minimum. **A** ☐ **B** ☐

83. Moins la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de vaccins de chaque antigène est élevé, moins le taux de couverture vaccinal global est élevé**. A** ☐ **B** ☐
84. Plus la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de vaccins de chaque antigène est élevé, moins le taux de couverture vaccinal global est élevé**. A** ☐ **B** ☐
85. Moins la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de vaccins de chaque antigène est élevé, plus le taux de couverture vaccinal global est élevé**. A** ☐ **B** ☐
86. Le Rotarix est un vaccin qui comprend 2 doses de rappel**. A** ☐ **B** ☐
87. La première dose de Td ne s'administre à la femme enceinte qu'à partir de l'âge**. A** ☐ **B** ☐
88. Dans le PEV ivoirien, la 3e dose de Td administrée à la femme enceinte est considérée comme un rappel**. A** ☐ **B** ☐
89. En cas d'oubli d'un vaccin devant être pris en compte dans une association combinée, il faut le faire un mois après**. A** ☐ **B** ☐
90. Les MAPI sont toujours liés à une erreur de préparation des vaccins**. A** ☐ **B** ☐
91. Les MAPI sont toujours liés à une erreur d'administration des vaccins**. A** ☐ **B** ☐
92. Les MAPl sont toujours liés à des propriétés inhérentes aux vaccins**. A** ☐ **B** ☐
93. Une MAPI peut être provoquée par l'anxiété relative à la douleur au point d'injection du vaccin**. A** ☐ **B** ☐
94. En cas de suspicion d'une exposition des vaccins à la chaleur, la présence de glace dans le réfrigérateur ne suffit pas pour attester de la viabilité des vaccins**. A** ☐ **B** ☐
95. En cas d'une panne du réfrigérateur, il faut systématiquement ramener les vaccins au coordonnateur du PEV au district sanitaire**. A** ☐ **B** ☐
96. Le test d'agitation des anatoxines concerne tous les vaccins du PEV, chaque fois qu'il y a suspicion de congélation**. A** ☐ **B** ☐
97. Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines**. A** ☐ **B** ☐
98. La chaine de froid doit être toujours conservée car les vaccins sont thermosensibles, leur altération est réversible et les effets de leur altération d'additionnent**. A** ☐ **B** ☐
99. Le dégivrage du réfrigérateur doit être envisagé lorsque la couche de glace atteint 0,5 mm**. A** ☐ **B** ☐
100. On dit que la chaîne du froid est rompue lorsque la température du réfrigérateur dépasse 8^0c**. A** ☐ **B** ☐
101. À l'exception du BCG et du VPO, la dose à administrer pour les autres vaccins du PEV est de 0,5 ml**. A** ☐ **B** ☐
102. Pour obtenir constamment du froid dans le réfrigérateur il est recommandé entres autres mesures de I 'installer à une distance de 15 à 30 m du mur**. A** ☐ **B** ☐
103. Le VPO est un vaccin inactivé qui s'administre par voie orale**. A** ☐ **B** ☐
104. La population cible du Vaccin antiamaril est composée des enfants de 0 à 11 mois**. A** ☐ **B** ☐
105. Un enfant de 8 mois ayant reçu toutes ses doses de vaccins à l'exception du RR et du VAA est correctement vacciné**. A** ☐ **B** ☐
106. En matière de vaccination, I 'intervalle minimum existe**. A** ☐ **B** ☐
107. Les accumulateurs produisent du froid**. A** ☐ **B** ☐
108. La population cible vaccinale en Côte d'ivoire est constituée par les enfants de 0 à 11 mois et les femmes en âge de reproduction**. A** ☐ **B** ☐
109. Un enfant âgé de 2 semaines ayant été déjà vacciné avec le VP0, le BCG et la dose d'hépatite B dès la naissance est correctement vacciné**. A** ☐ **B** ☐
110. Les associations simultanées de vaccins peuvent se faire pendant des jours différents à condition de ne pas aller au-delà d'une semaine**. A** ☐ **B** ☐
111. Pendant une séance de rattrapage de vaccination, il est recommandé d'éviter d'administrer plus de deux vaccins le même jour**. A** ☐ **B** ☐
112. Le dégivrage du réfrigérateur des vaccins est recommandé dès gue la couche de givre atteint 5 cm**. A** ☐ **B** ☐
113. Les vaccins du PEV doivent être conservés entre -2°c et 8° C**. A** ☐ **B** ☐
114. La température du réfrigérateur de vaccins doit se faire de façon quotidienne**. A** ☐ **B** ☐
115. La pastille de contrôle est un indicateur de froid**. A** ☐ **B** ☐
116. La PCV permet d'apprécier la péremption des vaccins**. A** ☐ **B** ☐
117. Les enfants de 0 à 9 mois font partie de la population cible du PEV İvoirien**. A** ☐ **B** ☐
118. L'hygiène alimentaire est une composante de l'hygiène individuelle**. A** ☐ **B** ☐
119. Le porte-vaccins est un matériel de monitorage de la chaine du froid utilisé au centre de santé**. A** ☐ **B** ☐
120. La méningite, la diphtérie et la fièvre typhoïde sont des maladies cibles du PEV Ivoirien**. A** ☐ **B** ☐

121. Le nombre de dose du vaccin combiné tétanos diphtérie nécessaire pour assurer la protection de la femme enceinte est de deux doses**. A** ☐ **B** ☐
122. Tous les vaccins du PEV doivent être conservés entre 3°C et 8°C**. A** ☐ **B** ☐
123. Les associations vaccinales simultanées doivent être faites le même jour**. A** ☐ **B** ☐
124. Un nouveau-né est protégé à la naissance contre le tétanos néonatal lorsque la mère a reçu une dose Td au moins une semaine avant la naissance du bébé**. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 QCM :cochez la ou les bonnes réponses

125. La chaîne de froid doit être toujours conservée car :
A. les vaccins sont thermosensibles.☐
B. l'altération des vaccins est réversible.☐
C. les effets de l'altération de vaccins s'additionnent.☐

126. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux dont la voie d'administration est orale :
A. VAA.☐ B. VPI.☐ C. VPO.☐ D. BCG.☐ E. Penta.☐ F. PCV13.☐ G. Rotarix.☐

127. Que signifie le sigle DTCHepB-Hib :
A. Dysenterie-Tétanos-Coqueluche-HépatiteB-Heamophilusinfluenzae de type B.☐
B. Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B- Haemophilusinfiuenzae de type B.☐
C. Drepanositose -Tétanos-Coqueluche- Hépatite B -Haemnophiiusinfluenzae de type B.☐

128. « Disposer plusieurs seringues chargées de différents clients dans un même plateau » est une pratique à risque pour :
A- Le client.☐ B- Les agents de santé.☐ C- La communauté.☐

129. Parmi ces antigènes suivants, lequel est vivant atténué ?
A. Td.☐ B. VPO.☐ C. VPI.☐

130. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :
1. Penta1 2.DN-Hep B 3. VPO 2 4.RR 5.PCV13-3
A. (1,2,3,4,5) .☐ B. (1,3,2,4,5) .☐ C. (2,1,3,5,4) .☐ D. (2,1,4,3,5) .☐

131. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :
1. BCG 2. Penta 2 3. VAA 4.VPI 5.Rota 1
A. (1,2,5,4,3) .☐ B. (1,5,2,4,3) .☐ C. (1,2, 5,3,4) .☐ D. (1,5,3,2,4) .☐

132. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :
1. VPO0 2.Men A 3.PCV13-1 4. Rota 2 5. Penta 3
A. (1,3,4,5,2) .☐ B. (1,3,5,4,2) .☐ C. (1,2,3,4,5) .☐

133. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :
1. VPO1 2.RR 3.VPI 4.PCV13-2
A. (1,4,3,2) .☐ B. (1,3,4,2) .☐ C.(1,4,2,3) .☐ D. (1,3,2,4) .☐

134. Lequel des groupes de tranches d'âge suivantes est conforme à la progression du calendrier de vaccination du PEV ivoirien chez un enfant de 0 à 11 mois ?
A. Naissance, 4 semaines, 10 semaines, 14 semaines, 9 mois.☐
B. Naissance, 6 semaines, 12 semaines, 14 semaines, 9 mois.☐
C. Naissance, 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, 9 mois.☐

135. Cochez la dose correcte du vaccin Rotarix à administrer aux enfants de 0 à 11 mois
A. 0.05 ml.☐ B. 0.5 ml.☐ C. 2 ml.☐ D. 2 gouttes.☐

136. Parmi les populations suivantes, identifiez celles qui sont des cibles du PEV ivoirien de routine.
A. Femme en âge de reproduction.☐ C. Enfant de 0-11 mois.☐ E. Femme enceinte.☐
B. Enfant de 0 à 59 mois.☐ D. Fille de plus de 9 ans.☐ F. Enfant de 9 mois à 14 ans.☐

137. Parmi les groupe d'antigènes suivants, lequel doit recevoir un enfant de 10 semaine, conformément au calendrier vaccinal en vigueur en Côte d'Ivoire ?
A. Penta 3 + VP03+ Pcv13-3+ VPI+ Rota 3 + RR.☐ C. Penta 2 + VP0 3+ Pcv13-2 + Rota 2.☐
B. Penta 2 + VPO 2+ Pcv13-2+ Rota2.☐ D. Penta 3 + VP03+ Pcv13-3+ VPI+ Rota 3+ VAA.☐

138. Combien de doses de l'antigène d'hépatite B reçoit un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné
A. 1 dose.☐ B.3 doses.☐ C. 4 doses.☐

139. Combien de doses de l 'antigène diphtérie reçoit un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné ?
A. 1 dose.☐ B. 3 doses.☐ C. 4 doses.☐

140. Combien de doses de l'antigène coqueluche reçoit un enfant de 0 à 11 mois correctement vacciné ?
A. 1 dose.☐ B. 3 doses.☐ C. 4 doses.☐

141. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée doit recevoir :

A une dose de RR à 3 mois. ☐ C- une dose de RR à 6 mois. ☐ E- une dose de RR à 11 mois. ☐

B. une dose de RR à 9 mois. ☐ D- aucune dose de RR

142. Identifiez parmi ces maladies, celle qui est transmise par les injections à risque :

A. I 'hépatite A. ☐ B. I 'hépatite B. ☐ C. le tétanos. ☐

143. Parmi ces vaccins de rattrapage, indiquez la combinaison qui doit être injectée à un enfant de 11 mois non vacciné dès le 1er contact.

A. DTC1-HepB1-Hib1+ VPO0+Rota1+BCG. ☐ C. DTC1-HepB1-Hib1+ VPO0 + RR + Rota1. ☐

B. DTC2-Hep2-Hib2+ VPO1+ BCG+Rota2. ☐ D. DTC3-Hep3-Hib3+ VPO2+ VAA + Rota3. ☐

144. La vaccination se définit comme :

A. un acte qui consiste à administrer une substance biologique à un organisme vivant en vue d'induire en lui une immunité spécifique. ☐

B. un acte qui consiste à administrer une substance biologique à un organisme humain en vue d'induire en lui une immunité spécifique. ☐

C. un acte qui consiste à introduire un germe vivant atténué dans un organisme en vue de le prévenir contre une maladie donnée. ☐

145. Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont viraux :

A. Le RR. ☐ B. BCG. ☐ C. VAA. ☐ D. VPI. ☐

146. Identifier parmi les vaccins suivants, ceux qui sont inactivés :

A. VPI. ☐ B. Penta. ☐ C. VPO. ☐ D.RR. ☐

147. Identifier parmi les maladies suivantes, celles qui ne sont pas encore cibles du PEV İvoirien :

A. La tuberculose osseuse. ☐ B. Le tétanos néonatal. ☐ C. La coqueluche. ☐ D. L'hépatite A. ☐

148. Parmi les manifestations physiologiques suivantes, lesquelles contre-indiquent 'administration du vaccin Rotarix chez l'enfant:

A. irritabilité. ☐ C. Vomissements. ☐ E. Diarrhée. ☐

B. fièvre de 38°c. ☐ D. anorexie. ☐ F. invagination intestinale. ☐

149. Cochez les réponses correctes en rapport avec le vaccin PCV-13 :

A. il est administré en trois doses. ☐ C. il est administré en sous-cutané. ☐

B. il n'a aucune contre-indication. ☐ D. il est conservé entre 2 et 8°c. ☐ E. Il est lyophilisé. ☐

150. Identifier les informations qui sont justes pour le RR :

A. il est inactivé. ☐ C. il s'administre toujours à l'enfant à partir de 9mois. ☐

B. il provoque des réactions indésirables. ☐ D. il s'administre en sous-cutané. ☐

151. Parmi les contre-indications vaccinales, indiquez celles qui sont erronées :

A. altération d'état général de l'enfant. ☐ C. État de malnutrition de l'enfant. ☐

B. maladie grave nécessitant une hospitalisation. ☐ D. prématurité de l'enfant. ☐

152.Un enfant âgé de 2 semaines avant reçu sa dose de BCG. sa première dose d'Hépatite B et sa première dose de VPO:

A. est correctement vacciné. ☐

B. Est complètement vacciné. ☐ C. n'est ni correctement ni complètement vacciné. ☐

153. Un enfant de 4 mois qui n'a pas encore reçu sa 3e dose de Penta :

A. est correctement vacciné. ☐

B. Est complètement vacciné. ☐ C. n'est ni correcte ment ni complètement vacciné. ☐

154. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée ou présumée et/ou des signes et des symptômes de SIDA doit recevoir:

A. une dose de RR à 3 mois. ☐ C. une dose à 9 mois. ☐

B. une dose de RR à 6 mois. ☐ D. aucune dose de RR. ☐

155. Identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qui sont éligibles au test d'agitation des anatoxines :

A. Penta. ☐ B. Td. ☐ C. VPO. ☐

156. Pour un enfant âgé de 8 mois qui n'a jamais été vacciné, il faut lui administrer en priorité :

A. Le BCG. ☐ B. Le Penta. ☐ C. Le VPO. ☐

157. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui produisent du froid :

A. les chambres froides B. les réfrigérateurs C. Les emballages isothermes

158. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui conservent le froid :

A. les emballages isothermes. ☐ B. Les coussinets en mousse. ☐ C. Les congélateurs. ☐

159. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui permettent de monitorer la chaîne du froid au centre de santé

A. Les PCV. ☐ B. Le thermostat. ☐ C. Le thermomètre. ☐ D. L'accumulateur. ☐

160. Pour obtenir constamment du froid dans le réfrigérateur il faut :

A. installer dans un local frais à une distance de 15 à 30 cm du mur. ☐
B. surélever le réfrigérateur sur des cales hautes de 5 mm. ☐
C. limiter les pertes de froid. ☐

161. Parmi les vaccins suivants indiquez ceux qui sont bactériens

A. BCG. ☐ B. VPO. ☐ C. VPI. ☐ D. Penta. ☐ E. RR. ☐ F. VAA. ☐ G. Td. ☐

162. Parmi les vaccins suivant indiquez ceux qui sont injectables.

A. Penta. ☐ B. VPO. ☐ C. Rotarix. ☐ D. PCV-13. ☐

163. Cocher les bonnes réponses

A. À la 1ère CPN 1ere dose de Td. ☐
B. 7 mois après le Td1 3ème dose de Td. ☐
C. 1an après le Td 3 5ème dose de Td. ☐
D. 2 semaines après le Td1 2 ème dose de Td. ☐
E. 1an après le Td3 4 ème dose de Td. ☐

164. À quel rythme se fait le relevé de la feuille de température du réfrigérateur dans la gestion des vaccins et consommables ?

A. Bi quotidienne. ☐ B. Quotidienne. ☐ C. Hebdomadaire. ☐ D. Mensuelle. ☐

165. Quelles sont les cibles complémentaires du PEV ivoirien ?

A. Les jeunes filles de 9 ans. ☐
B. Les enfants de 9 mois à 14 ans. ☐
C. Les enfants de 0 à 5 ans. ☐
D. Les femmes enceintes. ☐
E. Les femmes en âge de reproduction. ☐
F. Les enfants de 0 à 11 mois. ☐

166. Identifier parmi les vaccins suivants, (celui) ceux qui (est) sont inactivé (s).

A. VPI. ☐ B. Rotarix. ☐ C. RR. ☐ D. VPO. ☐

167. Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont injectables

A. Penta. ☐ B. VPO. ☐ C. Rotarix. ☐ D. PCV-13. ☐

168. Un enfant de 2 mois correctement vacciné aura reçu dans son organisme

A. 11 antigènes. ☐ B. 06 antigènes. ☐ C. 09 antigènes. ☐ D. 08 antigènes. ☐

169. Cochez les bonnes correspondances entre les vaccins et les voies d'administration

A. VPO/voie intradermique. ☐
B. VAA/voie sous-cutanée. ☐
C. RR/voie intramusculaire. ☐
D. VPI / voie orale. ☐

170. Cochez les bonnes réponses suivant les correspondances entre les vaccins et les doses à administrer.

A. BCG=0,5 ml. ☐ B. Td=0,5 ml. ☐ C. RR= 0,05ml. ☐ D. VPI / 2 goutes. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

ANNEE 2022

EPREUVE D'ANATOMIEET PHYSIOLOGIE DES CELLULES ET TISSUS

Licence 1 IDE/SFM **Durée : 01 heure 00 min**

PARTIE1 : QCD

Répondre par A :vrai et par B:faux
Bonne réponse =+1 point réponse fausse =-1 point sans réponse =0 point

1. L'ossification fibreuse est caractérisée par la présence de maquette cartilagineuse. **A** ☐ **B** ☐
2. L'arrêt de croissance est situé après 25 ans. **A** ☐ **B** ☐
3. L'accroissement en épaisseur de l'os s'effectue grâce au périoste. **A** ☐ **B** ☐
4. La moelle osseuse jaune est logée dans le canal rachidien. **A** ☐ **B** ☐
5. La syndesmologie est I 'étude des articulations. **A** ☐ **B** ☐
6. La synovie est le liquide synovial. **A** ☐ **B** ☐
7. Des êtres vivants sont constitués d'une seule cellule. **A** ☐ **B** ☐
8. La mitochondrie fournit l'énergie à la cellule. **A** ☐ **B** ☐
9. Les sels minéraux sont fabriqués par l'organisme lui-même. **A** ☐ **B** ☐
10. Le tendon réunit deux os entre eux. **A** ☐ **B** ☐
11. Certaines cellules peuvent atteindre jusqu'à 100 cm de lon. **A** ☐ **B** ☐g
12. Toutes les cellules humaines ont la même forme. **A** ☐ **B** ☐
13. La membrane plasmique sépare le cytoplasme du milieu extérieur. **A** ☐ **B** ☐
14. La gaine de Myéline est une enveloppe mince et ininterrompue. **A** ☐ **B** ☐
15. Toute cellule possède un noyau. **A** ☐ **B** ☐
16. Les cellules humaines ont la même forme. **A** ☐ **B** ☐
17. La membrane cytoplasmique est la membrane qui limite une cellule. **A** ☐ **B** ☐
18. Les canaux de havers se trouvent dans le tissu compact de l'os. **A** ☐ **B** ☐
19. La moelle osseuse jaune est logée dans le canal médullaire. **A** ☐ **B** ☐
20. Le périoste est une membrane qui enveloppe seulement la diaphyse de 'os. **A** ☐ **B** ☐
21. Le sang n'est pas un tissu. **A** ☐ **B** ☐
22. Toutes les cellules sont immobiles. **A** ☐ **B** ☐
23. La membrane de la cellule est perméable. **A** ☐ **B** ☐
24. Un sportif possède beaucoup plus de muscles qu'un non sportif. **A** ☐ **B** ☐
25. Les épithéliums qui recouvrent les cavités ouvertes sur I 'environnement, sont appelés muqueuses. **A** ☐ **B** ☐
26. Le neurone est une cellule incapable de se diviser. **A** ☐ **B** ☐
27. Le système nerveux végétatif commande le fonctionnement de nos viscères. **A** ☐ **B** ☐
28. Les dendrites conduisent toujours les informations dans un seul sens de l'extérieur vers 'intérieur de la cellule. **A** ☐ **B** ☐
29. Le neurone peut posséder plusieurs dendrites. **A** ☐ **B** ☐
30. Il Ya deux fausses côtes. **A** ☐ **B** ☐

<u>PARTIE 2</u> : QCM

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

31. Identifiez les trois membranes de protection des méninges parmi celle qui sont énumérées en dessous :

A. La vieille mère. ☐
B. La pie-mère. ☐
C. La dure-mère. ☐
D. l'arachide. ☐
E. l'arachnoïde. ☐
F. le sarcolemme. ☐

32. Quels sont les rôles du liquide céphalo-rachidien à l'encéphale et à la moelle épinière ? :

A. Protection. ☐ D. épuration. ☐
B. De soutien. ☐ E. élaboration d'hormones. ☐
C. Nourricier. ☐ F. destruction de globules vieillis. ☐

33. L'être humain adulte normal est constitué de : (trois réponses)

A. 206 os. ☐ D. 104 ligaments. ☐
B. 181 articulations. ☐ E. 537 muscles. ☐
C. 306 tendons. ☐ F. 736 nerfs. ☐

34. Quelles sont les trois (3) principales fonctions des tissus épithéliaux parmi celle qui sont énumérées en dessous ?

A. Absorption. ☐ B. protection. ☐ C. Destruction. ☐ D. sécrétion. ☐

35. Le tissu conjonctif lâche comprend : cochez les trois (3) bonnes réponses

A. Le tissu adipeux. ☐ C. Le tissu poreux. ☐
B. Le tissu aréolaire. ☐ D. Le tissu réticulaire. ☐

36. Le tissu conjonctif aréolaire, le tissu le plus répandu de l'organisme a deux (2) principales fonctions. Laquelle n'en fait pas partie ?

A. Absorbe l'excédent de liquide en cas d'inflammation. ☐
B. Entretient les fonctions vitales de l'organisme. ☐
C. Protège les vaisseaux et nerfs. ☐

37. Quels sont les deux (2) éléments qui composent le système nerveux central ?

A. L'encéphale. ☐ C. la moelle jaune. ☐
B. La moelle osseuse. ☐ D. la moelle épinière. ☐

38. Il existe trois types d'articulation parmi ces items. Lesquels ?

A. Les amphibiens. ☐ D. les synarthroses. ☐
B. Les amphiarthroses. ☐ E. les ankyloses. ☐
C. Les diarthroses. ☐ F. les cals vicieux. ☐

39. Quel est l 'organe qui ne fait pas partie des organes qui permettent de se déplacer parmi ceux-ci?

A. Les OS. ☐ D. les muscles. ☐
B. Les ligaments. ☐ E. les articulations. ☐
C. Les tendons. ☐ F. les neurones. ☐

40. Deux propriétés caractérisent la cellule nerveuse. Lesquelles ?

A. Conductibilité. ☐ D. élasticité. ☐
B. Contractilité. ☐ E. excitabilité. ☐
C. Tonicité. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

ANNEE 2022

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Licence 1 IDE / SF. M **Durée : 01 heure 00min**

PARTIE1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse =- 1 point sans réponse = 0 point

1. La fièvre peut être la cause de la baisse de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. **A** ☐ **B** ☐
2. Les voies aériennes inférieures sont situées au-dessus du larynx. **A** ☐ **B** ☐
3. Le feuillet pariétal de la plèvre recouvre la face interne du thorax. **A** ☐ **B** ☐
4. Le CO_2 est principalement transporté sous forme la forme dissoute dans le plasma. **A** ☐ **B** ☐
5. La trachée se divise en bronches lobaires appelées bronche souche. **A** ☐ **B** ☐
6. La deuxième étape de la respiration est le transport de l'oxygène vers les cellules. **A** ☐ **B** ☐
7. Les cellules ciliées jouent un rôle de nettoyage de l'arbre trachéo-bronchique. **A** ☐ **B** ☐
8. La cavité pleurale est formée par deux feuillets dont le feuillet viscéral qui tapisse le poumon et le feuillet pariétal qui tapisse les côtes. **A** ☐ **B** ☐
9. Le poumon droit est divisé en trois (3) lobes par deux scissures. **A** ☐ **B** ☐
10. L'expiration calme est un phénomène passif. **A** ☐ **B** ☐
11. Les muscles intercostaux externes n'interviennent que lors de l'inspiration forcée. **A** ☐ **B** ☐
12. Les bronchioles terminales appartiennent à la zone respiratoire. **A** ☐ **B** ☐
13. Les bronchioles terminales se situent dans la zone de conduction. **A** ☐ **B** ☐
14. Les pneumocytes II produisent une substance tensio-active appelée surfactant. **A** ☐ **B** ☐
15. La ventilation pulmonaire est le 1er maillon de la chaîne respiratoire. **A** ☐ **B** ☐
16. Une maladie de la cage thoracique peut être responsable d'un trouble de la ventilation. **A** ☐ **B** ☐
17. La ventilation peut être appréciée par un examen appelé la gazométrie. **A** ☐ **B** ☐
18. L'échange au niveau de la membrane alvéolo-capillaire se fait par diffusion grâce à un gradient de pression. **A** ☐ **B** ☐
19. La ventilation se déroule en 2 phases : l'inspiration (entre d'air dans le poumon) et l'expiration (sortie de gaz du poumon) . **A** ☐ **B** ☐
20. La deuxième étape de la respiration assure l'hémostase. **A** ☐ **B** ☐
21. L'hypoxémie est la baisse de la Pa O, dans le sang. **A** ☐ **B** ☐
22. La pleurésie est I 'accumulation d'air dans la cavité pleurale. **A** ☐ **B** ☐
23. L'hypoxémie est la conséquence de l'hypoxie. **A** ☐ **B** ☐
24. Le poumon gauche comprend 2 lobes séparés par une seule scissure appelée la grande scissure. **A** ☐ **B** ☐
25. Le dioxygène est transporté principalement sous la forme liée à l'hémoglobine. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2 : QCM choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

26. Les phénomènes suivants sont observés au cours de l'expiration forcée :

A. Contraction des muscles intercostaux internes.☐
B. Contraction du diaphragme.☐
C. Contraction des muscles abdominaux.☐
D. Contraction des muscles intercostaux externes.☐
E. relâchement du diaphragme.☐
F. aucune réponse n'est juste.☐

27. Les phénomènes suivants sont observés au cours de l'inspiration calme (repos)

A. Contraction du diaphragme.☐
D. Contraction des muscles intercostaux internes.☐

B. relâchement du diaphragme.☐ E. Contraction des muscles intercostaux externes.☐
C. Contraction des muscles abdominaux.☐ F. aucune réponse n'est juste.☐

28. La contraction du diaphragme entraine :
A. La diminution du volume thoracique.☐ D. l'augmentation du volume thoracique.☐
B. L'entrée d'air dans les poumons.☐ E. l'augmentation de la pression intra thoracique.☐
C. La sortie d'air dans les poumons.☐ F. la diminution de la pression intra thoracique.☐

29. De la trachée à la bronchiole terminale, on observe les fonctions suivantes sauf une, laquelle ?
A. Conduire l'air.☐ D. réchauffer l'air.☐
B. Echanger les gaz respiratoires avec les capillaires.☐ E. humidifier I 'air.☐
C. Purifier l'air.☐ F. aucune proposition.☐

30. Dans le sang artériel (cochez la ou les proposition(s) fausse(s))
A. La pression en oxygène (Po2) varie entre 97 et 100 mm Hg.☐
B. La pression en dioxyde de carbone (Pco2 45 mm Hg.☐
C. La saturation en oxygène (So2) est de 45%.☐
D. Aucune des propositions n'est fausse.☐

31. La cage thoracique est constituée des os : cochez les propositions justes:
A. Le sternum en arrière.☐ C. les cotes en arrière.☐ E. les cotes latéralement.☐
B. Le diaphragme en bas.☐ D. les cotes en avant.☐ F. le rachis dorsal en arrière.☐

32. L'hémostase (cochez les propositions justes)
A. Se déroule pendant la deuxième étape de la respiration.☐
B. C'est l'enrichissement du sang en oxygène.☐
C. C'est la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine.☐
D. C'est l'appauvrissement du sang en dioxyde de carbone.☐
E. C'est la transformation de CO_2 en ion bicarbonate.☐

33. Le pH normal de l'organisme humain est compris entre :
A. 7,37 et 7,43.☐ B. 7,28 et 7,34.☐ C. 7,52 et 7,63.☐ D. 7,4 et 7,5.☐

34. La spirométrie est un examen qui mesure :
A- Les résistances pulmonaires.☐ C. les gaz du sang.☐ E. paco2.☐
B- Les volumes pulmonaires.☐ D. les débits ventilatoires.☐ F. aucune bonne réponse.☐

35. La saturation de I 'hémoglobine en oxygène dépend de : (choisir les bonnes réponses)
A- La concentration en 2,3 DPG dans les GR.☐ C. des émotions.☐ E. la PCO_2.☐
B- Le PO_2.☐ D. la fièvre.☐ F. Aucune bonne réponse.☐

36. Ces éléments des voies aériennes font partie de la zone d'échange des gaz respiratoires sauf deux. Lesquels ?
A- Les bronchioles respiratoires.☐ C. les bronchioles terminales.☐
B- La trachée.☐ D. les canaux alvéolaires.☐ E. sacs alvéolaires.☐

37. Les muscles de l'inspiration sont :
A- Les muscles abdominaux.☐ C. les intercostaux internes.☐ E. les scalènes.☐
B- Les intercostaux externes.☐ D. le diaphragme.☐ F. le muscle sterno-cléido-mastoidien.☐

38. Ranger en ordre les étapes de la chaine respiratoire
A- La ventilation.☐ C. la respiration interne ou cellulaire.☐
B- Les échanges alvéolo-capillaires.☐ D. le transport des gaz respiratoires.☐

39. Cochez parmi les propositions, celle qui n'est pas une des fonctions du poumon
A- Activation de la vitamine D.☐ C. défense.☐
B- Respiration.☐ D. épuration.☐ E. sécrétion de substance.☐

40. Dans le sang, l'oxygène est transporté sous (choisir la bonne réponse)
A- La forme liée à l'hémoglobine.☐ D. D'anhydrase.☐
B- La forme dissoute (20% de forme de transport) .☐ E. Aucune proposition n'est juste.☐
C- La forme d'ion bicarbonate.☐

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1LICENCE 1

ANNEE 2022

EPREUVE D'ANATOMIE OBSTETRICALE

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 45 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse =- 1 point sans réponse =0 point

1. Le gland est l'extrémité terminale de la verge**. A** ☐ **B** ☐
2. La période fœtale est une période de maturation et de croissance fœtale**. A** ☐ **B** ☐
3. Les glandes vestibulaires font partie des organes internes chez l'homme**. A** ☐ **B** ☐
4. La spermatogénèse a lieu dans les tubes séminifères des testicules**. A** ☐ **B** ☐
5. Les gamètes mâles sont les spermatozoïdes**. A** ☐ **B** ☐
6. La régulation du cycle menstruel fait intervenir uniquement le rétrocontrôle positif**. A** ☐ **B** ☐
7. Au cours de la grossesse, le corps utérin devient abdominal à partir du 3 mois**. A** ☐ **B** ☐
8. L'ovulation intervient au 14° jour d'un cycle menstruel de 28 jours**. A** ☐ **B** ☐
9. Au cours de l'ovulation, C'est le follicule mûr de De Graaf qui expulse l'ovocyte**. A** ☐ **B** ☐
10. La puberté tardive est caractérisée par I 'apparition de signes pubertaires au-delà de 15 ans**. A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2:QCM choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

11. Parmi ces évènements, lesquels sont des étapes de la fécondation

A. La capacitation**.** ☐
B. La réaction corticale**.** ☐
C. La réaction acrosomique**.** ☐
D. La fusion des membranes plasmiques**.** ☐
E. La fixation du spermatozoïde à la zone pellucide**.** ☐

12. Concernant la puberté masculine

A. Le développement testiculaire survient en moyenne à l'âge de 9,5 ans**.** ☐
B. La pilosité pubienne apparait 12 mois après le développement testiculaire**.** ☐
C. La croissance pubertaire démarre vers 13 ans**.** ☐
D. Le premier signe pubertaire est le développement testiculaire**.** ☐
E. L'augmentation de la taille de la verge débute vers I 'âge de 12,5ans**.** ☐

13. Au cours de la grossesse, la progestérone

A. Stimule la contractilité utérine**.** ☐
B. Entraine une élévation de la température**.** ☐
C. Augmente le stockage des graisses**.** ☐
D. Inhibe la lactation avant l'accouchement**.** ☐
E. Assure le maintien de la grossesse**.** ☐

14. Concernant l'appareil génital féminin

A. La vulve joue un rôle dans la sexualité**.** ☐
B. Le vagin est l'organe de la copulation**.** ☐
C. L'utérus joue un rôle dans la menstruation**.** ☐
D. Les trompes sont le lieu de la fécondation**.** ☐
E. Les ovaires produisent les gamètes femelles**.** ☐

15. Concernant I 'appareil génital masculin

A. Les testicules produisent le sperme et les hormones mâles**.** ☐

B. Les voies excrétrices assurent le transport du sperme. ☐
C. Les glandes annexes produisent le sperme. ☐
D. Le pénis est I 'organe de la copulation. ☐
E. Le scrotum soutient les testicules. ☐

16. Parmi ces signes digestifs, lesquels font partie des modifications normales de la grossesse ?

A. Constipation. ☐ B. Ulcère. ☐ C. Flatulence. ☐ D. Hémorroïdes. ☐ E. Pyrosis. ☐

17. Concernant le bassin obstétrical

A. Le détroit supérieur est limité en arrière par le promontoire. ☐
B. L'excavation est le lieu où le fœtus effectue le dégagement. ☐
C. L'excavation présente un rétrécissement : le détroit moyen. ☐
D. Le détroit inférieur est limité en arrière par la pointe du coccyx. ☐
E. Il est constitué du bassin mou et du bassin osseux. ☐

18. Concernant le cycle menstruel

A. Le cycle menstruel comporte une succession de trois phases. ☐
B. Les règles durent en moyenne 7 jours. ☐
C. Le corps jaune sécrète la progestérone uniquement. ☐
D. Le cycle menstruel est interrompu par la grossesse. ☐
E. La phase folliculaire est la première phase. ☐

19. Au cours de l'ovogénèse, la deuxième division de méiose s'achève

A. Pendant l'ovulation. ☐
B. Avant I 'ovulation. ☐
C. Après I 'ovulation. ☐
D. Après la fécondation. ☐
E. Pendant la fécondation. ☐

COACHING

ANNEE 2022

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1LICENCE 1

EPREUVE DE SEMIOLOGIE ET PATHOLOGIE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse =- 1 point sans réponse =0 point

1. La radiographie thoracique est indispensable pour le diagnostic de la bronchite aigue**. A** ☐ **B** ☐
2. Les épanchements pleuraux mixtes sont caractérisés par la présence simultanée d'air et de liquide dans la cavité pleurale**. A** ☐ **B** ☐
3. L'embolie pulmonaire peut être prise en charge dans les centres de santé de niveau primaire**. A** ☐ **B** ☐
4. L'atteinte pulmonaire est la localisation la plus fréquente de la tuberculose**. A** ☐ **B** ☐
5. La bronchite aigue est souvent d'origine virale**. A** ☐ **B** ☐
6. La ponction pleurale peut être réalisée par l' infirmier dans un centre périphérique lorsque le médecin est absent**. A** ☐ **B** ☐
7. L'asthme est une maladie aigue du parenchyme pulmonaire caractérisée par des épisodes récurrents de dyspnée sifflante**. A** ☐ **B** ☐
8. L'œdème aigu cardiogénique du poumon est caractérisé par une lésion de la membrane alvéolo-capillaire**.** **A** ☐ **B** ☐
9. L'épanchement pleural gazeux est encore appelé pneumothorax**. A** ☐ **B** ☐
10. La prise en charge de la pneumopathie aigue bactérienne sans signe de gravité ni de complication se fait en ambulatoire**. A** ☐ **B** ☐
11. Chez le sujet asthmatique, I 'inflammation de la muqueuse bronchique est responsable d'une hyperréactivité bronchique à court terme**. A** ☐ **B** ☐
12. Les antitussifs sont indiqués devant une hémoptysie**. A** ☐ **B** ☐
13. L'administration du bêta 2 mimétique est suffisante pour la prise en charge au long cours du sujet asthmatique**. A** ☐ **B** ☐
14. Le tabac est le premier facteur de risque du cancer du poumon**. A** ☐ **B** ☐
15. La nicotine est la substance de la dépendance du tabac**. A** ☐ **B** ☐
16. Au cours de l'examen pleuro-pulmonaire, I 'interrogatoire permet d'apprécier les caractéristiques des signes physiques présentés par le patient**. A** ☐ **B** ☐
17. La fréquence respiratoire normale chez l'adulte est comprise entre 12 et 16 cycles/minute**. A** ☐ **B** ☐
18. La toux est dite chronique lorsqu'elle évolue depuis plus de 03 mois**. A** ☐ **B** ☐
19. La tuberculose multi résistance désigne un cas où le bacille tuberculeux est résistant à la rifampicine ou à l'isoniazide**. A** ☐ **B** ☐
20. L'œdème aigu du poumon est une urgence diagnostique et thérapeutique**. A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2: QCM choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = O point sans réponse =0 point

21. Parmi ces propositions, trouvez la principale complication de la bronchite aigue

A. Toux persistante**.** ☐
B. Hémoptysie**.** ☐
C. Surinfection bronchite ou broncho-pulmonaire bactérienne**.** ☐

D. Abcès du poumon. ☐
E. Aggravation d'une pathologie pulmonaire préexistante. ☐

22. Le germe le plus fréquemment retrouvé au cours de la pneumonie franche lobaire aigue est : choisissez-la Bonne réponse :

A. Le pneumocoque. ☐ C. la chlamydia. ☐
B. le staphylocoque. ☐ D. le pseudomonas. ☐ E. le Klebsiella. ☐

23. Ces propositions concernant les facteurs de risque acquis de l'embolie pulmonaire sont justes Sauf une, laquelle ?

A. l'obésité. ☐ D. les interventions chirurgicales du pelvis. ☐
B. la grossesse. ☐ E. la mutation du facteur V de la coagulation. ☐
C. la contraception oestro-progestante. ☐

24. Parmi ces propositions concernant la phase humide de la bronchite aigue, 2 sont justes. Lesquelles ?

A. la température est très élevée (39°-40°C) . ☐ D. la vomique est présente. ☐
B. l'examen physique est pauvre. ☐ E. la toux est productive. ☐
C. la dyspnée est présente. ☐

25. Ces propositions concernant les signes de la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf 2. Lesquelles ?

A. début brutal. ☐ D. syndrome de condensation pulmonaire. ☐
B. toux chronique. ☐ E. fièvre vespérale. ☐
C. frisson. ☐

26. Le syndrome de condensation pulmonaire est composé de : (entourez la bonne réponse)

A. augmentation des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants. ☐
B. augmentation des vibrations vocales + tympanisme + souffle tubaire + diminution du murmure vésiculaire. ☐
C. abolition des vibrations vocales + matité + souffle tubaire. ☐
D. aucune réponse n'est juste. ☐
E. diminution des vibrations vocales + matité + souffle tubaire + râles crépitants. ☐

27. Les prodromes de la crise d'asthme sont les suivants sauf un : lequel ?

A. Rhinorrhée. ☐ B. toux quinteuse. ☐ C. hémoptysie. ☐ D. prurit. ☐ E. anxiété. ☐

28. La voie habituelle de contamination par le bacille de koch chez I 'homme est la voie:

A. Aérienne. ☐ B. Cutanée. ☐ C. Digestive. ☐ D. oculaire. ☐ E. Placentaire. ☐

29. Parmi ces signes, 2 ne font pas parti des signes d'imprégnation tuberculeuse : lesquels

A. Les sueurs nocturnes. ☐ C. la fièvre permanente et élevée. ☐
B. La perte de poids. ☐ D. la toux chronique. ☐ E. le manque d'appétit. ☐

30. Ces propositions concernant les signes de gravité de la pneumopathie aigue bactérienne sont justes sauf une, laquelle?

A. Fréquence respiratoire > 30 cycles/min. ☐ D. toux chronique. ☐
B. Trouble de la conscience. ☐ E. température < 35° ou >40°. ☐
C. Fréquence cardiaque > 125 battements/min. ☐

31. Les agents pathogènes les plus en cause de la bronchite aigue sont : (cochez la bonne réponse)

A. Mycobactérium tuberculosis. ☐ C. tabac. ☐
B. Pneumocoque. ☐ D. Virus. ☐ E. prédisposition génétique. ☐

32. Ces propositions concernant les signes de gravite d'un épanchement pleural sont justes sauf 2. Lesquelles ?

A. Le pouls paradoxal. ☐ C. la douleur thoracique. ☐
B. L'absence de signes de lutte respiratoire. ☐ D. les extrémités froides. ☐ E. la tachycardie. ☐

33. Parmi ces propositions, 2 sont justes concernant le traitement de la pneumopathie bactérienne communautaire sans signe de gravité ni complication : lesquelles ?

A. Hospitalisation. ☐ C. traitement ambulatoire. ☐
B. Durée du traitement :15 jours. ☐ D. Amoxicilline. ☐ E. bi-antibiothérapie. ☐

34. Concernant la bronchite aigue, 2 réponses sont justes : lesquelles ?

A. Elle est le plus souvent d'origine toxique. ☐ D. affection habituellement bénigne. ☐
B. Le diagnostic est clinique. ☐ E. affection très rare. ☐
C. Inflammation aigue de la plèvre. ☐

35. Concernant la prise en charge de l'embolie pulmonaire, 2 réponses ne sont pas justes : lesquelles ?

A. La prise en charge se fait dans un service spécialisé. ☐
B. Attendre les résultats des examens de certitude avant de débuter le traitement. ☐
C. Mise en condition du patient avant son évacuation. ☐
D. Le traitement repose sur les médicaments coagulants. ☐
E. C'est une urgence thérapeutique. ☐

36. Au cours du traitement de la tuberculose pulmonaire bacillifière, le contrôle bactériologique des crachats se fait selon le calendrier suivant : (choisissez la bonne réponse)

A. Au 2 ème, 5 ème et 6 ème mois de traitement. ☐
B. Au 1er, 5ème, et 6 ème mois de traitement. ☐
C. Au 2 ème, 4 ème, et 6 ème mois de traitement. ☐
D. Au 5 ème et 6 ème mois de traitement. ☐
E. Au 3ème, 5 ème et 8 ème mois de traitement. ☐

37. Le traitement de la crise d'asthme repose essentiellement sur un de ces médicaments :lequel?

A. Beta 2 agoniste de longue durée d'action par voie inhalée. ☐
B. Corticoïdes inhalé. ☐
C. Beta 2 agoniste de courte durée d'action par voie inhalée. ☐
D. Beta 2 agoniste de courte durée d'action par voie injectable. ☐
E. Beta 2 agoniste de longue durée d'action par voie injectable. ☐

38. Ces éléments traduisent un asthme aigu grave sauf un : lequel?

A. Difficulté à tousser. ☐
B. Une polypnée avec FR>30 cycles/min. ☐
C. Une tachycardie. ☐
D. Une douleur thoracique. ☐
E. un silence auscultatoire. ☐

39. Le traitement des cas de tuberculose pulmonaire commune repose sur ces médicaments sauf 1 : lequel?

A. Ethambutol. ☐ B. Rifampicine. ☐ C. Kanamycine. ☐ D. Pirazinamide. ☐ E. Isoniazide. ☐

40. Laquelle de ces associations est juste concernant le traitement de fond de l'asthme (traitement d'éviction de la crise d'asthme)

A. Beta 2 agoniste de courte durée d'action inhalé + corticoïdes inhalés. ☐
B. Beta 2 agoniste de courte durée d'action injectable+ corticoïdes inhalés. ☐
C. Beta 2 agoniste de longue durée d'action inhalé + corticoïdes injectable. ☐
D. Aucune de ces propositions n'est juste. ☐
E. Beta 2 agoniste de longue durée d'action + corticoïdes inhalés. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1LICENCE 1

ANNEE 2022

EPREUVE DE SYSTEME NATIONAL DE SANTE / PEV

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+0 ,5 point réponse fausse = - 0,5 point sans réponse =0 point

1. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix exorbitant. **A** ☐ **B** ☐
2. L'objectif principal du système de santé de la côte d'ivoire de la période colonial était la consolidation des acquis. **A** ☐ **B** ☐
3. Un système de santé efficace est toujours efficient. **A** ☐ **B** ☐
4. Un système de santé qui a la capacité d'apprécier une situation qui prévaut et de mesurer le niveau d'atteinte de ses objectifs est dit planifiable. **A** ☐ **B** ☐
5. Un système de santé qui atteint ses objectifs avec les moyens disponibles est efficient. **A** ☐ **B** ☐
6. L'inaccessibilité aux soins de santé est l'une des caractéristiques d'un système de santé. **A** ☐ **B** ☐
7. la globalité d'un système de santé se mesure par sa capacité à offrir des soins préventifs et des soins curatifs à la population. **A** ☐ **B** ☐
8. Pendant la période coloniale le personnel était en nombre réduit et formés sur le tas et à l'école de médecine Jules CADRE en France. **A** ☐ **B** ☐
9. Les techniciens de surfaces, les vigiles et les chauffeurs embauchés dans les structures de santé sont aussi considérés comme des ressources humaines pour la santé. **A** ☐ **B** ☐
10. Le Service d'Aide Médicale d'Urgence d'Abidjan est localisé à Yopougon. **A** ☐ **B** ☐
11. L'INSP d'Abidjan est localisé à proximité du CHU de Treichville. **A** ☐ **B** ☐
12. La perte de l'appétit est l'un des effets indésirables du rotarix. **A** ☐ **B** ☐
13. Tous les enfants de 0 à 11 mois peuvent recevoir aussi le VPO que le VPI. **A** ☐ **B** ☐
14. Le sérum est substance qui a le désavantage d'avoir un effet moins durable que le vaccin. **A** ☐ **B** ☐
15. Le BCG est un vaccin bactrien inactivé. **A** ☐ **B** ☐
16 les vaccins sont des substances biologiques qui doivent être conservés entre +2° et +8° C. **A** ☐ **B** ☐
17. Le VPO et le VPI protègent contre la même maladie. **A** ☐ **B** ☐
18. En matière de vaccination, l'intervalle minimum n'existe pas. **A** ☐ **B** ☐
19. MAPI signifie, Manifestation Post Immunisation. **A** ☐ **B** ☐
20. On parle de rupture de la chaine du froid si la température du réfrigérateur est inférieure à 2°C. **A** ☐ **B** ☐
21. A l'exception du BCG et du VPO, la dose à administrer pour les autres vaccins du PEV est de 0,5 ml. **A** ☐ **B** ☐
22. Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines. **A** ☐ **B** ☐
23. Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination. **A** ☐ **B** ☐
24. Les glacières et les accumulateurs de froid sont les matériels de production de froid. **A** ☐ **B** ☐
25. Le Penta est une association combinée d'antigènes. **A** ☐ **B** ☐
26. La population cible du vaccin antiamaril est composée des enfants de 0 à 11 mois. **A** ☐ **B** ☐
27. En matière de vaccination, l'intervalle minimum existe. **A** ☐ **B** ☐
28. La PCV permet d'apprécier la péremption des vaccins. **A** ☐ **B** ☐
29. Le VPO est un vaccin inactivé qui s'administre par voie orale. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2 : QCM

Bonne réponse = + 1 point réponse fausse = 0 point sans réponse = 0 point

30. Parmi les activités suivantes indiquez celles qui sont du domaine de la prévention

A. La vaccination. ☐
B. Le dépistage volontaire du VIH/SIDA. ☐
C. Les spots publicitaires relatifs aux problèmes de santé. ☐
D. La consultation prénatale. ☐
E. La sensibilisation en vue de l'utilisation des moustiquaires imprégnées. ☐

31. Combien de doses de l'antigène diphtérie que reçoit un enfant de 11 mois correctement vacciné ?

A. 1 dose . ☐ B. 3 doses . ☐ C. 4 doses . ☐

32. Parmi les vaccins suivants, indiquez ceux dont la voie d'administration est orale :

A. VPI . ☐ B. VPO . ☐ C. BCG . ☐ D. Penta . ☐ E. le rotarix. ☐

33. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont cibles du PEV ivoirien :

A. L'hépatite C . ☐ B. la diphtérie . ☐ C. la fièvre typhoïde . ☐ D. la méningite A . ☐

34. Indiquez l'ordre normal d'administration des antigènes suivants :

1. VPO 1 2. RR 3. VPI 4. PCV13-2

A(1,4,3,2) . ☐ B(1,3,4,2) . ☐ C(1,4,2,3) . ☐ D(1,3,2,4) . ☐

35. Parmi les données suivantes, indiquez celle qui correspond à la dose de Rotarix à administrer à un enfant de moins de 6 semaines

A. 0,05 ml . ☐ B. 0,5 ml. ☐ C. 2 ml . ☐ D. 2 gouttes . ☐

36. Parmi les groupes d'antigènes suivants, lequel doit recevoir un enfant de 10 semaines, conformément au calendrier vaccinal en vigueur en côte d'ivoire

A. Penta 3 +VPO 3 + PCV13-3+VPI + Rota 3 + RR. ☐ B. Penta 2+ VPO 3 + PCV13-2 + Rota 2. ☐
C. Penta 2 + VPO 2+ PCV13-2 + Rota 3. ☐ D. Penta 3 + VP0 3 + PCV13-3 + Rota 3 + VAA. ☐

37. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée doit recevoir

A. Une dose de RR à 3 mois. ☐ C. une dose de RR à 11 mois. ☐
B. Une dose de RR à 6 mois . ☐ D. une dose de RR à 9 mois. ☐ E. aucune dose de RR. ☐

38. Identifiez parmi les maladies suivantes, celles ne sont pas encore cibles du PEV ivoirien :

A. Le tétanos. ☐ B. la coqueluche. ☐ C. l'hépatite A. ☐ D. la fièvre typhoïde. ☐

39. Parmi les informations suivantes se rapportant au vaccin PCV-13, indiquez celles qui sont correctes:

A. Il est administré en trois doses. ☐ C. il n'a aucune contre-indication. ☐
B. Il est administré en sous-cutané. ☐ D. il est conservé entre 2 et 8°C . ☐ E. il est lyophilisé. ☐

40. Parmi les vaccins suivants indiquez ceux qui sont injectables

A. Penta. ☐ B. VPO. ☐ C. Rotarix. ☐ D. PCV-13. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1LICENCE 1

ANNEE 2022

EPREUVE DE SEMIOLOGIE MEDICALE

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = - 1 point sans réponse =0 point

1. La dyspnée se caractérise par des mouvements d'amplitude croissante et décroissante, puis pause. **A** ☐ **B** ☐
2. la dissection aortique aiguë est une douleur non brutale qui évoque un infarctus myocardique aigu. **A** ☐ **B** ☐
3. la douleur de l'angine de poitrine cède 2 à 5 minutes à la prise de trinitrine sublinguale. **A** ☐ **B** ☐
4. L'hépatalgie est une pesanteur douloureuse de la région du foie qui survient d'abord à l'effort puis à la marche. **A** ☐ **B** ☐
5. La phlébite est I 'inflammation de l'artère obstruée par le caillot de sang. **A** ☐ **B** ☐
6. Les palpitations sont souvent révélatrices d'un trouble du rythme respiratoire. **A** ☐ **B** ☐
7. La cyanose est coloration bleutée des téguments due à l'augmentation dans le sang capillaire de I 'hémoglobine réduit, localisée qui prédomine aux extrémités. **A** ☐ **B** ☐
8. À la percussion la matité moins nette et moins franche traduit la présence d'une condensation pulmonaire. **A** ☐ **B** ☐
9. Le diagnostic différentiel est I 'hypothèse que l'on pose par rapport à d'autres maladies voisines que l'on élimine une à une pour confirmer le diagnostic positif. **A** ☐ **B** ☐
10. La sémiologie est l'étude des signes des maladies. **A** ☐ **B** ☐
11. La classification des maladies qui désigne la nosologie évolue en fonction des progrès des connaissances. **A** ☐ **B** ☐
12. La maladie est considérée tantôt comme une indisposition tantôt comme une déviation d'un état. **A** ☐ **B** ☐
13. Les symptômes objectifs sont les manifestations de la maladie exprimés par le malade et non perçues par le médecin au cours de I 'examen clinique. **A** ☐ **B** ☐
14. Le diagnostic positif est fourni par l'interrogatoire, I 'examen clinique et les examens complémentaires. **A** ☐ **B** ☐
15. la vomique est le rejet brutal et massif d'une grande quantité de sang en faveurs d'un effort de toux. **A** ☐ **B** ☐
18. Dans la chylurie les urines ont un aspect laiteux. **A** ☐ **B** ☐
16 La dyspnée est une gêne respiratoire objective ressentie par le patient et entraînant des modifications visibles de la ventilation. **A** ☐ **B** ☐
17. La pyurie est la présence de pus dans les urines liée à une infection urinaire. **A** ☐ **B** ☐
19. Le reflux gastro œsophagien est le passage involontaire et sans effort de vomissement du contenu gastrique dans l'œsophage qui arrive quelquefois jusqu'à la bouche. **A** ☐ **B** ☐
20. l 'énurésie est une miction contrôlée qui survient au cours du sommeil. **A** ☐ **B** ☐
21. La polyurie est une diminution de la fréquence de l'urine avec augmentation de la diurèse. **A** ☐ **B** ☐
22. Les pathologies en rhumatologie peuvent se signaler par un prodrome fait de signes. **A** ☐ **B** ☐
23. La rétention vésicale est une impossibilité d'uriner occasionnant un globe vésical douloureux. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE2 : QCM

Bonne réponse = + 1 point réponse fausse = 0 point sans réponse = 0 point

24. Un des éléments suivants observé dans les douleurs thoraciques non cardiovasculaires un est intrus. Lequel ?

A. Algie précordiale d'origine nerveuse. ☐ C. douleur intercostale et hémi-ceinture. ☐
B. Douleur à type de crampe. ☐ D. douleur cervico-brachiale. ☐

25. Deux des signes suivants sont intrus à ceux de l'œdème aigu des poumons. Lesquels ?

A. Détresse respiratoire de survenue brutale. ☐ C. Sensation de chape de plomb sur les épaules. ☐
B. Toux peu productive et mélange de râles sous crépitants. ☐ D. Orthopnée. ☐

26. On parle de polyurie lorsque la diurèse est :

A. Supérieur à 100l par 24 heures. ☐ C. Supérieur à 3 I par 24 heures. ☐
B. Supérieur à 1,50 ml par 24 heures. ☐ D. Supérieur à 3,5 ml par 24 heures. ☐

27. Une impression de pesanteur abdominale ressentie en période postprandiale est marquée par

A. L'anorexie. ☐ C. l'éructation. ☐
B. la bouline. ☐ D. l'exagération de la soif. ☐

28. Parmi les éléments ci-dessous qui sont les causes directes de la maladie, l'un est des intrus. Lequel ?

A. Le sexe. ☐ B. la saison. ☐ C. la famille. ☐ D. la religion. ☐ E. l'âge. ☐

29. Trois des signes suivant sont ceux identifiés par le médecin lors de la consultation. Lesquels ?

A. Les signes fonctionnels généraux. ☐ C. les signes physiques. ☐ E. les signes. ☐
B. Les spécifiques. ☐ D. les signes récidivants. ☐

30. Devant un client qui présente une toux deux signes suivants ne tiennent pas lieu d'être précisé. Lesquels ?

A. La durée. ☐ C. la périodicité. ☐ E. la circonstance de survenue. ☐
B. Le mode de survenue. ☐ D. l'intensité. ☐

31. Indiquez deux caractéristiques d'une expectoration. Lesquels ?

A. La circonstance. ☐ B. le mode. ☐ C. l'heure. ☐ D. la pituite. ☐ E. l'odeur. ☐

32. Deux des réponses suivantes Sont les facteurs favorisant les colopathies fonctionnelles

A. L'anxiété. ☐ D. les séquelles de colite infectieuse ou médicamenteuse. ☐
B. L'ulcère gastroduodénal. ☐ E. la cirrhose. ☐
C. l'insuffisance cardiaque. ☐

33. L'angine de poitrine ou angor est marquée

B. Douleur thoracique a type de déchirure antéro-postérieure. ☐
A. Douleur thoracique à type de constriction. ☐ D. Douleur thoracique a type intercostale et hémi-ceint ure. ☐
C. Douleur latéro-thoracique à type de point de côté. ☐

34. La percussion fait rechercher à l'examen physique peut retrouver

A. La matité. ☐ C. les murmures vésiculaires. ☐
B. Les vibrations sonores du larynx. ☐ D. les mouvements respiratoires. ☐

35. Un des éléments suivant est caractéristique d'hémoptysies. Lequel ?

A. Sensation de chaleur rétro sternale. ☐ C. Hémo-sialorrhée. ☐
B. Saignement pharyngé. ☐ D. Hématémèse. ☐

36. Le diagnostic différentiel de l'hémoptysie est

A. Le cancer broncho-pulmonaire. ☐ B. La cyanose. ☐ C. l'épistaxis. ☐ D. la dilatation des bronches. ☐

37. Deux des éléments suivants sont la cause de la dyspnée. Lesquels ?

A. Apnée. ☐ B. asthme. ☐ C. phlébite. ☐ D. anorexie. ☐ E. insuffisance cardiaque. ☐

38. L'auscultation des foyers pulmonaires à l'examen physique fait retrouver

A. La matité. ☐ C. les murmures vésiculaires. ☐
B. Les vibrations sonores du larynx. ☐ D. les mouvements respiratoires. ☐

39. La douleur de la péricardite aigue est très voisine de

A. La douleur de l'embolie pulmonaire. ☐ C. la douleur de la dissection aortique aigue. ☐
B. La douleur de I 'infarctus myocardique. ☐ D. la douleur de l'hépatalgie. ☐

40. La syncope est

A. la perte de connaissance brutale, totale et brève avec une impression d'évanouissement. ☐
B. Une perte de connaissance brutale, totale brève avec une chute en hauteur. ☐
C. Une perte de connaissance imminente avec une impression de chute en hauteur. ☐
D. Une perte de connaissance brutale et totale avec un coma. ☐

41. Deux des éléments suivants sont des facteurs favorisants le reflux gastro-œsophagien. Lesquels ?

A. La mauvaise fermeture du cardia. ☐ E. le cancer de l'œsophage. ☐
B. L'anévrysme aortique volumineux. ☐ D. augmentation de la pression abdominale. ☐
C. I'yper-sialorrhée. ☐

42. À 'examen physique dans la pathologie digestive, la palpation abdominale permet de trouver

A. Un tympanisme. ☐ C. une abolition de la respiration abdominale. ☐
B. un gargouillement des fosses iliaques. ☐ D. une présence de timbre sonore. ☐

43. Deux des éléments suivants font partis des signes généraux non spécifique des maladies du rein, Lesquels ?

A. la protéinurie. ☐ B. l'hématurie. ☐ C. l'œdème. ☐ D. l'hypokaliémie. ☐ E. l'asthénie. ☐

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1 LICENCE 1

ANNEE 2022

EPREUVE DE SEMIOLOGIE PATHOLOGIE CHIRUGICALES

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = - 1 point sans réponse =0 point

1. Une fracture spiroïde est considérée comme une fracture simple. **A** ☐ **B** ☐
2. Une fracture bifocale est une fracture simple. **A** ☐ **B** ☐
3. Les déplacements selon la longueur comportent les chevauchements et les rotations. **A** ☐ **B** ☐
4. Les signes fonctionnels majeurs d'une fracture sont la douleur, le craquement et l'impotence fonctionnelle. **A** ☐ **B** ☐
5. On retrouve fréquemment un raccourcissement et une rotation au cours d'une fracture. **A** ☐ **B** ☐
6. La radiographie standard n'est pas utile au diagnostic des fractures. **A** ☐ **B** ☐
7. On dit qu'il y a entorse seulement lorsqu'on observe une rupture du tendon. **A** ☐ **B** ☐
8. Les muscles participent à la stabilisation de l'articulation de la hanche. **A** ☐ **B** ☐
9. L'accident du tableau de bord est un mécanisme observé au cours des luxations postérieure de la hanche. **A** ☐ **B** ☐
10. Il y a 6 variétés de luxations régulières de la hanche. **A** ☐ **B** ☐
11. La fracture du col fémorale est la seule lésion associée pouvant exister lors d'une luxation de la hanche. **A** ☐ **B** ☐
12. La raideur de la hanche est une complication secondaire pouvant survenir lors des luxations de la hanche. **A** ☐ **B** ☐
13. Le traitement des luxations de la hanche est orthopédique. **A** ☐ **B** ☐
14. Le valgus forcé est un mécanisme de survenue d'une entorse du genou. **A** ☐ **B** ☐
15. Il existe 4 types d'entorses selon la gravité. **A** ☐ **B** ☐
16. L'impotence fonctionnelle absolue est un signe fonctionnel dans les entorses du genou. **A** ☐ **B** ☐
17. Le test de lachman et trillât est un test de recherche de laxité ligamentaire. **A** ☐ **B** ☐
18. Le traitement des entorses du genou est essentiellement orthopédique. **A** ☐ **B** ☐
19. La rupture des ligaments est une entorse grave. **A** ☐ **B** ☐
20. L'étirement du ligament latéral interne du genou n'est pas une entorse du genou. **A** ☐ **B** ☐
21 Le varus forcé est un mécanisme de survenue d'une entorse du genou. **A** ☐ **B** ☐
22. Une fracture est une solution de continuité de l 'os. **A** ☐ **B** ☐
23. Lors du mécanisme direct, l'os est rompu à distance de la zone d'impact. **A** ☐ **B** ☐
24. La torsion osseuse est un mécanisme indirect de fracture. **A** ☐ **B** ☐
25. La fracture se définit exclusivement selon le type de trait. **A** ☐ **B** ☐
26. Le trait de fracture incomplet atteint les deux Corticales. **A** ☐ **B** ☐
27. Le trait spiroïde est un trait de fracture simple. **A** ☐ **B** ☐
28. Il existe 3 types de trait simple. **A** ☐ **B** ☐
29. Le chevauchement est un déplacement selon la longueur. **A** ☐ **B** ☐
30. Le craquement est un signe fonctionnel dans la fracture. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2: *QCM*

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

31. Hachurez l'alvéole du/des signes cliniques dans une luxation iliaque de la hanche:

A. Raccourcissement du membre. ☐ C. rotation externe du membre. ☐
B. Adduction. ☐ D. flexion du genou et de la hanche. ☐

32. Hachurez l'alvéole des signes cliniques présents dans une luxation ischiatique de la hanche:
A. Raccourcissement du membre. ☐ C. rotation interne du membre. ☐
B. Adduction. ☐ D. extension du genou et de la hanche. ☐

33. Entourez le ou les signes cliniques n'existant pas dans une luxation obturatrice de la hanche:
A. allongement du membre. ☐ C. rotation interne du membre. ☐
B. Abduction du membre. ☐ D. flexion du genou et de la hanche. ☐

34. Entourez la complication tardive pouvant survenir lors des luxations de la hanche :
A. Fracture du col fémoral. ☐ C. lésion du nerf sciatique. ☐
B. Coxarthrose. ☐ D. irréductibilité de la luxation. ☐

35. Entourez la/les complications immédiates pouvant survenir lors des entorses du genou :
A. lésion de l'artère poplitée. ☐ C. raideur du genou. ☐
B. lésion du nerf ulnaire. ☐ D. gonarthrose. ☐

36. Entourez la complication ne pouvant pas être observée lors des entorses du genou :
A. douleurs persistantes. ☐ C. œdème résiduel. ☐
B. raideur du genou. ☐ D. irréductibilité. ☐

37. Entourez les traits simples
A. oblique. ☐ C. transversal. ☐
B. spiroïde. ☐ D. comminutif. ☐

38. Entourez les déplacements selon l'axe
A. chevauchement. ☐ C. flexum. ☐
B. recurvatum. ☐ D. baïonnette. ☐

39. Entourez les signes physiques retrouvés lors d'une fracture
A. raccourcissement. ☐ C. une absence de douleur. ☐
B. rotation externe du pied. ☐ D. un claquement. ☐

40. Entourez les différentes formes anatomo-pathologies des luxations de l'épaule
A. luxation antérieure. ☐ C. luxation erecta. ☐
B. luxation antéro-postérieure. ☐ D. luxation moyenne. ☐

COACHING

ANNEE 2022

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

EPREUVE DE SONU

Licence 1 IDE / SF.M **Durée: 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = - 1 point sans réponse =0 point

1. Lorsque le diagnostic clinique de la grossesse au début est moins évident, on a recours à l'examen obstétrical pour la confirmation**. A** ☐ **B** ☐
2. La meilleure appréciation de l'utérus lors du diagnostic de la grossesse au début consiste à faire un toucher vaginal combiné au palper abdominal**. A** ☐ **B** ☐
3. Le diagnostic para clinique de la grossesse repose sur l'examen biologique à savoir la recherche qualitative des béta HCG dans les premières urines du matin et dans le sang**. A** ☐ **B** ☐
4. Lors de l'accouchement normal, le dégagement des épaules se fait après le dégagement de la tête**. A** ☐ **B** ☐
5- Pendant la délivrance, s'il y a adhérence des membranes, il est recommandé de recueillir le placenta dans les deux mains et faire une délivrance artificielle**. A** ☐ **B** ☐
6. Au cours de la délivrance, quand le placenta est bas inséré, la face maternelle sort la première: c'est le mode Baudelocque**. A** ☐ **B** ☐
7. La technique de la traction contrôlée du cordon consiste à administrer I 'ocytocine dans la minute qui suit la naissance de l'enfant, à faire la délivrance par traction contrôlée sur le cordon ombilical et à masser l'utérus**. A** ☐ **B** ☐
8. Toute aménorrhée chez une femme en âge de procréer est un signe clinique de grossesse**. A** ☐ **B** ☐
9. La glaire cervicale chez une gestante est abondante et fluide**. A** ☐ **B** ☐
10. La température constante supérieure à 37°C en début de grossesse est un signe sympathique de la grossesse**. A** ☐ **B** ☐
11. Deux (2) examens para cliniques permettent de faire le diagnostic de grossesse au début**. A** ☐ **B** ☐
12. Le diagnostic clinique de la grossesse se fait à l'échographie**. A** ☐ **B** ☐

Partie 2 : QCM

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

13. La femme en début de grossesse présente le signe sympathique suivant :

A. Col violacé**.** ☐ B. diarrhée**.** ☐ C. nausées**.** ☐ D. écoulement nasal**.** ☐

14. Le diagnostic clinique de la grossesse repose sur :

A. L'interrogatoire et le bilan prénatal**.** ☐ C. L'interrogatoire et les signes cliniques**.** ☐

B. L'interrogatoire et l'examen physique**.** ☐ D. L'interrogatoire et le toucher vaginal**.** ☐

15. L'examen au spéculum montre un col :

A. Rouge**.** ☐ B. pale**.** ☐ C. violacé**.** ☐ D. rose**.** ☐

16. L'examen physique en début de grossesse montre des organes génitaux externes :

A. Œdématiés **.** ☐ B. hyper pigmentés**.** ☐ C. Œdématiés et hyper pigmentés**.** ☐

17. Les contractions utérines du travail sont :

A. Douloureuses**.** ☐ B. régulières**.** ☐ C. intermittentes**.** ☐ D. toutes les réponses ci-dessus**.** ☐

18. Sous l'effet des contractions utérines, le travail se déroule en :

A. Quatre étapes**.** ☐ B. trois étapes**.** ☐ C. deux étapes**.** ☐

19. L'accouchement comporte :

A. Quatre phases **.** ☐ B. deux phases**.** ☐ C. trois phases**.** ☐

20. L'expulsion du fœtus représente :

A. La 1ère phase de l'accouchement**.** ☐

B. La 2e phase de l'accouchement**.** ☐

C. La 3 e phase de l'accouchement**.** ☐

21. Dans l'accouchement normal du sommet, la parie du fœtus qui est expulsée en dernière position est :

A. Les membres**.** ☐ B. la tête**.** ☐ C. le tronc**.** ☐

22. Dans la technologie de la traction contrôlée du cordon, l'ocytocine est administrée à la mère :

A. Avant l'accouchement. ☐ C. dans la minute qui suit l'accouchement. ☐
B. Dix (10) minutes après I 'accouchement. ☐ D. après le décollement du placenta. ☐

23. Dans le diagnostic de grossesse, le toucher vaginal combiné au palper révèle :

A. Un ramollissement de tout l'utérus. ☐
B. Un ramollissement de l'isthme. ☐
C. Un ramollissement du col. ☐

24. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies avant que la parturiente ne fasse les efforts expulsifs

A. Dilatation complète, poche des eaux intacte. ☐ C. Dilatation complète, poche des eau rompue. ☐
B. Dilatation avancée, poche des eaux intacte. ☐ D. Dilatation avancée, poche des eaux rompue. ☐

25. La grossesse au début est toujours accompagnée d'un groupe de signes appelés :

A. Signes empathiques. ☐ B. signes antipathiques. ☐ C. signes sympathiques. ☐

26. La première phase de l'accouchement est :

A. Délivrance. ☐ B. la progression du fœtus. ☐ C. l'expulsion du fœtus. ☐ D. travail. ☐

27. Les phases techniques de la GATPA sont

A. Installer l'accouchée en position gynécologique. ☐
B. Injecter dix unités d'ocytocine en IM immédiatement après l'expulsion du fœtus. ☐
C. Protéger la vie de la mère et du nouveau-né. ☐
D. Rompre la poche des eaux. ☐
E. traction contrôlée sur le cordon. ☐
F. massage de l'utérus. ☐

28. HCG signifie :

A. Hormone Cellulaire Générée. ☐
B. Hormone Çoelioscopique Glandulaire. ☐ C. Hormone Chorionique Gonadotrophine. ☐

29. Les signes suivants sont des signes sympathiques de la grossesse au début :

A. Œdèmes généralisés. ☐ C. bourdonnement. ☐ E. convulsions. ☐
B. Hyper sialorrhée. ☐ D. vomissements. ☐ F. pollakiurie. ☐

30. Lors du diagnostic clinique de la grossesse au début, parmi ces instruments ci-dessous, un seul est utilisé pour voir l'aspect du col

A. Thermomètre. ☐ B. mètre ruban. ☐ C. Speculum. ☐ D. tensiomètre. ☐

31. Le diagnostic biologique de la grossesse au début se fait par:

A. La recherche qualitative des béta HCG dans les premières urines du matin et dans le sang. ☐
B. Le toucher vaginal combiné au palper abdominal. ☐
C. L'examen au speculum. ☐ D. l'examen physique. ☐

32. Lors d'un accouchement normal, trois éléments interviennent

A. Le mobile fœtus. ☐ D. l'utérus ou moteur utérin qui loge le fœtus. ☐
B. L'engagement de la présentation. ☐ E. la dilatation du col. ☐
C. La formation de la poche des eaux. ☐ F. la filière pelvienne que le fœtus devra traverser. ☐

33. Le premier signe clinique de la grossesse au début, à l'interrogatoire est :

A. Vomissements. ☐ B. ménopause. ☐ C. aménorrhée secondaire. ☐ D. constipation. ☐

34. Parmi les propositions suivantes, choisir celle qui exprime le diagnostic de I 'engagement au toucher est le signe de farabeuf:

A. Une présentation est dite engagée lorsqu'au toucher vaginal on peut faire passer les deux doigts Vaginaux entre la présentation et la concavité sacrée. ☐
B. Une présentation est dite engagée lorsqu'au toucher vaginal on peut faire passer la main vaginale entre la présentation et la concavité sacrée. ☐
C. Une présentation est dite engagée lorsqu'au toucher vaginal on ne peut pas faire passer les deux doigts vaginaux entre la présentation et la concavité sacrée. ☐
D. Une présentation est dite engagée lorsqu'au toucher vaginal on ne peut faire passer le doigt Vaginal entre la présentation et la concavité sacrée. ☐

35. La délivrance c'est:

A. l'expulsion hors des voies génitales maternelles du placenta. ☐
B. l'expulsion hors des voies génitales maternelles du fœtus et ses annexes. ☐
C. l'expulsion hors des voies génitales maternelles des membranes. ☐
D. l'expulsion hors des voies génitales maternelles les annexes fœtales (placenta et membranes) . ☐

ANNEE 2022

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

EPREUVE DE TECHNIQUE DE SOINS DE BASE

Licence 1 IDE / SF.M

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = - 1 point sans réponse =0 point

1. Les heures de repos sont mêmes pour les patients**. A** ☐ **B** ☐
2. L'un des besoins fondamentaux de l'homme est le repos**. A** ☐ **B** ☐
3. Le malade a besoin de plus de médicaments que de repos pour retrouver les forces et santé**. A** ☐ **B** ☐
4. La non-réfection de lit du patient peut aggraver sa maladie**. A** ☐ **B** ☐
5. La toilette générale et la réfection de lit du patient sont à la charge des parents du malade**. A** ☐ **B** ☐
6. La réfection de lit occupé consiste à changer le linge sale du lit du malade par du linge propre sanitaire de lorsque celui-ci est aux toilettes**. A** ☐ **B** ☐
7. Un malade mal accueilli par l'agent de santé entraîne la mort de ce dernier**. A** ☐ **B** ☐
8. L'accueil consiste à recevoir les gens, à les diriger au cours de leur passage dans une structure sanitaire de manière à ce qu'ils soient satisfaits**. A** ☐ **B** ☐
9. L'apparence du service peut avoir un effet négatif sur le patient**. A** ☐ **B** ☐
10. Le bon accueil des malades est basé seulement sur la politesse et gentillesse**. A** ☐ **B** ☐
11. La visite à une personne malade est une action qui consiste à aller voir celui-ci par devoir**. A** ☐ **B** ☐
12. La visite doit se faire selon les horaires de la communauté**. A** ☐ **B** ☐
13. Tout visiteur est la bienvenue chez le malade**. A** ☐ **B** ☐
14. Les visites chez les patients doivent être contrôlées**. A** ☐ **B** ☐
15. Une chambre insalubre, et mal éclairée n'est pas un allié dans la prestation des soins de qualité**. A** ☐ **B** ☐
16. L'entretien de la chambre du patient doit être au plus deux fois par semaine**. A** ☐ **B** ☐
17. L'aération de la chambre du malade est un facteur de salubrité**. A** ☐ **B** ☐
18. Le réfrigérateur est accepté dans la chambre du malade**. A** ☐ **B** ☐
19. Le confort de la chambre contribue à la guérison du malade**. A** ☐ **B** ☐
20. L'hygiène sanitaire est un besoin de sécurité du malade**. A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2:***QCM*** (choisir la ou les bonne (s) réponse (s))

Bonne réponse +1 point réponse fausse = 0 point sans réponse = 0 point

21. Au cours de l'hospitalisation, trois actes sont à la charge des parents du malade parmi ceux qui sont énumérés en dessous. Lesquels ?

A. La toilette générale du malade**.** ☐
B. La réfection du lit**.** ☐
C. Participation à l'administration des traitements**.** ☐
D. discipliner les visiteurs à respecter le repos des autres malades**.** ☐
E. respecter le régime alimentaire**.** ☐
F. respecter les horaires du service**.** ☐

22. Quels sont les buts de la réfection de lit ? (Trois réponses)

A. Procurer un confort au malade hospitalisé**.** ☐
B. S'assurer que le personnel de santé est ponctuel au travail**.** ☐
C. Prévenir les escarres**.** ☐
D. Permettre au personnel de santé de faire les soins dans un environnent agréable**.** ☐
E. Faire plaisir à la famille**.** ☐

23. Quel est le rythme de lavage des murs et des vitres d'une structure sanitaire ? (deux réponses)

A. Une fois par semaine**.** ☐ C. au moins une fois par semaines**.** ☐
B. Tous les 15 jours**.** ☐ D. Une fois par an**.** ☐

24. Qu'est-ce que l'accueil à l'hôpital ? (1 réponse)

A. Recevoir seulement les malades. ☐
B. Etre poli avec les malades. ☐
C. Se mettre à la place du malade. ☐
D. Ensemble d'attitudes, de gestes et de choses pour satisfaire un besoin fondamental perturbé. ☐

25. Quel est le but de l'accueil dans une structure sanitaire ? (1 réponse)

A. Vanter les mérites de la structure. ☐
B. Soulager en quelque sorte le mal causé par la maladie. ☐
C. Réparer le tort causé par la famille. ☐
D. Expliquer le fonctionnement de la structure sanitaire aux clients. ☐

26. Quelles sont les conditions matérielles d'un bon accueil ? (quatre réponses)

A. Les poubelles doivent être placées très près des salles d'hospitalisations. ☐
B. La perturbation sonore doit être réduite au maximum. ☐
C. La discrétion doit être assurée. ☐
D. Le patient doit avoir de l'argent. ☐
E. L'environnement doit être propre. ☐
F. Des parterres de fleurs doivent être réalisées et les murs repeints, crépis ou chaulés. ☐

27. Quels sont les buts de la visite aux malades dans une structure sanitaire ? (Deux réponses)

A. Participer aux soins. ☐
B. Réconforter la personne malade. ☐
C. Alerter la communauté. ☐
D. divulguer le secret professionnel. ☐
E. soutenir celui qui est souffrant. ☐

28. Quelles sont les attitudes à éviter lors d'une visite à un malade ? (trois réponses)

A. Proposer son aide au malade. ☐
B. Commenter la maladie par rapport à d'autres cas vécus ou vus. ☐
C. Tenir des propos encourageants. ☐
D. Susciter les questions qui pourraient raviver certaines peines. ☐
E. Faire allusion à des pathologies semblables. ☐
F. Eviter les remarques qui pourraient raviver chez le malade certaines souffrances. ☐

29. Identifiez trois facteurs ne favorisant pas le repos

A. Tension ambiante désagréable. ☐
B. Pièce propre, aérée et sans désordre. ☐
C. Forte lumière. ☐
D. lit sans matelas. ☐
E. absence de bruit. ☐
F. absence de souci majeur. ☐

30. Quelles sont les conditions d 'un bon de repos ? (Trois réponses)

A. Laisser les heures de visites libres . ☐
B. Grand nettoyage aux heures indues. ☐
C. Manipulation de matériel. ☐
D. éduquer les malades et leur famille pour le respect des autres. ☐
E. Eviter de discuter à haute voix. ☐
F. Eviter de trainer les pas en marchant. ☐

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

ANNEE 2022

EPREUVE DE PEDIATRIE BLOC A

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+0.5 point réponse fausse = - 0.5 point sans réponse =0 point

1. KN est né à 40 semaines d'aménorrhée le 20 octobre 2022.KN a émis spontanément ses premières selles appelées méconium le 24 octobre 2022 ; le transit digestif de KN est normal**. A** ☐ **B** ☐
2. La mise au sein précoce signifie que le nouveau-né est mis au sein à partir de la deuxième heure de vie**. A** ☐ **B** ☐
3. Le syndrome extrapyramidal est I 'un des effets indésirables des antis émétisants**. A** ☐ **B** ☐
4. Chez le nouveau-né prématuré en détresse respiratoire le débit d'oxygène est compris entre 0,5 et 11/min**. A** ☐ **B** ☐
5. BC est âgé de 16 mois et souffre d'une diarrhée aigüe. L'agent infectieux identifié au laboratoire s'appelle Shiguelle. Je déduis que les selles de BC sont glaireuses**. A** ☐ **B** ☐
6. Les stries plantaires sont présentes sur les deux tiers antérieures de la plante des pieds du nouveau-né eutrophique né à terme**. A** ☐ **B** ☐
7. Lorsque la gestante est de conditions socioéconomiques défavorables, I 'agent de santé conseille de réaliser d'abord l'échographie avant le bilan biologique**. A** ☐ **B** ☐
8. Vous observez Dame BV en train de donner à téter à son enfant. Vous constatez que la nuque du bébé repose sur le pli du coude, le dos sur l'avant-bras et le ventre fait face à celui de la mère. Le nourrisson est bien positionné au sein**. A** ☐ **B** ☐
9. Le nouveau WT est né à 3000 grammes. Il est allaité exclusivement. Au 5 jours de vie, le poids était de 2700 grammes. La perte de poids de WT est physiologique**. A** ☐ **B** ☐
10. Le nourrisson K.F est amené par sa mère pour une diarrhée aigüe. Les yeux sont enfoncés et il boit avec avidité. K.F présente une déshydratation sévère**. A** ☐ **B** ☐
11. Pour protéger la femme enceinte du paludisme je conseille trois cures de sulfadoxine-pyriméthamine associées à la MILDA**. A** ☐ **B** ☐
12. KJ émet 8 selles moelles par jour depuis 5 jours. Elle est consciente et boit avec avidité. Le pli cutané abdominal d'efface lentement et les lèvres sont sèches. KJ a un poids de 10 kg. Je réhydrate KJ en 4 heures par voie orale avec 750 ml de soluté de réhydratation**. A** ☐ **B** ☐
13. KG est âgé de 36 mois. À l'examen la surface corporelle est de 1,2 m. le conclure que KG avait à la naissance une surface corporelle de 0,4 m^2**. A** ☐ **B** ☐
14. L'ocytocine, hormone excrétée par la posthypophyse, sous l'effet de la succion du mamelon, assure l'excrétion et l'éjection du lait maternel**. A** ☐ **B** ☐
15. Au cours de l'allaitement prépondérant, le nourrisson reçoit le lait maternel, les jus, l'eau et les médicaments**. A** ☐ **B** ☐
16. AK, adolescente de 16 ans est non vaccinée avant sa grossesse contre le tétanos. Au cours de sa grossesse, elle réalise sur conseil de la sage-femme une dose du vaccin antitétanique 1 semaine avant la naissance de son enfant. Son nouveau-né accouché à la maternité du centre urbain risque le tétanos néonatal**. A** ☐ **B** ☐
17. Chez le nouveau-né normal, la tontanelle anterieure a la forme d'un rectangle et se ferme en moyenne à 18 mois**. A** ☐ **B** ☐
18. AB accouche d'un nouveau-né, de sexe masculin. La sage-femme évalue l'APGAR du nouveau-né à la première minute et trouve 3. Le nouveau-né a une souffrance cérébrale sévère**. A** ☐ **B** ☐
19. ZT à J2 de vie, présente des yeux jaunes, et refuse le sein. La sage-femme conseille à la mère d'exprimer le lait et lui donner à la tasse. ZT n'arrive pas prendre le lait, la sage-femme décide de référer. La décision de la sage- femme est-elle justifiée**. A** ☐ **B** ☐
20. L'infection est la première cause de détresse respiratoire du prématuré**. A** ☐ **B** ☐
21. Pour prévenir le spina bifida chez le nouveau-né, J je conseille la gestante de prendre de l'acide folique (vitamine B9) à partir du deuxième trimestre de grossesse**. A** ☐ **B** ☐
22. De jour comme de nuit, la mère allaitante doit donner à téter à son enfant autant de fois qu'il réclame le Sein**. A** ☐ **B** ☐

23. La procédure de prise en charge de la PCIMNE comporte 6 étapes, la 3m étape porte sur l'identification du traitement**. A** ☐ **B** ☐
24. L'alimentation de complément permet au nourrisson de découvrir des saveurs d'autres nature que celle du lait**. A** ☐ **B** ☐
25. On parie de retard de maturation dentaire chez un nourrisson si ce dernier n'a aucune dent dans sa bouche à partir de 15 mois**. A** ☐ **B** ☐
26. La dose de vitamine K1 administrée en intramusculaire au nouveau-né eutrophique est de 1 mg
27. Le placenta prævia recouvrant hémorragique avec souffrance fœtale aigüe est une cause médicale de prématuré**. A** ☐ **B** ☐
28. Le maintien de la tête est une nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 6 mois**. A** ☐ **B** ☐
29. La succion du mamelon par le nouveau-né déclenche un influx nerveux qui stimule au niveau de l'antéhypophyse, la sécrétion de l'ocytocine**. A** ☐ **B** ☐
30. La mère allaitante doit boire en plus de l'eau contenue dans les aliments 1 litre d'eau par jour**. A** ☐ **B** ☐
31- La diète imposée au nourrisson par les parents protège le nourrisson de la déshydratation au cours de la diarrhée aigüe**. A** ☐ **B** ☐
32. Le nouveau -né eutrophique a un poids de naissance compris entre 2500 et 4000 grammes**. A** ☐ **B** ☐
33. Chez le nouveau-né normal, la fontanelle postérieure a la forme d'un losange**. A** ☐ **B** ☐
34. La crise génitale du nouveau-né est provoquée par une hormone sécrétée par l 'antéhypophyse appelée prolactine**. A** ☐ **B** ☐
35. Le reflexe prolactinique est déclenché chez la mère par le son émis par le nouveau-né**. A** ☐ **B** ☐
36. Est qualifié de prématuré tout nouveau-né dont le poids de naissance est inférieur à 2500g**. A** ☐ **B** ☐
37. Dans la stratégie PCIMEN, un enfant classé avec le code de couleur jaune est traité à l'hôpital de référence**. A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2 : QCM

Bonne réponse =+0.5 point réponse fausse = - 0.5 point sans réponse =0 point

38. L'adolescent est un enfant dont l'âge est compris :

A. 13 et 17 ans**.** ☐ B. 13 et 18 ans **.** ☐ C. 13 et 19 ans**.** ☐ D. 13 et 20 ans**.** ☐

39. La nouvelle performance psychomotrice attendue du nourrisson de 9 mois est .

A. Porte l'objet à la bouche**.** ☐ C. Suit du regard dans les deux directions**.** ☐
B. A peur du visage non familier**.** ☐ D. Tient la tête dans l'axe**.** ☐

40. Le poids théorique d'un enfant de 4 ans correctement nourri depuis la naissance est de :

A. 16 kg**.** ☐ B. 18 kg**.** ☐ C. 20 kg**.** ☐ D. 22 kg**.** ☐

41. La capacité d'absorption et de sécrétion du tube digestif est maintenue au cours de la diarrhée aiguë:

A. 25-35%**.** ☐ B. 35-40%**.** ☐ C. 40-45%**.** ☐ D. 50-70%**.** ☐

42. Le poids théorique d'un enfant de 7 ans correctement nourri depuis la naissance est de :

A. 16 kg**.** ☐ B. 18 kg**.** ☐ C. 20 kg**.** ☐ D. 22 kg**.** ☐

43. Une mère allaitement a perdu son mari un mois après l'accouchement. Elle consulte parce qu'elle n'a plus suffisamment de lait maternel qui sort des seins. Cochez la bonne proposition qui explique au plan physiologique la situation de cette mère

A. Le réflexe d'excrétion de lait est inhibé par la douleur morale**.** ☐
B. Le réflexe de production de lait est inhibé par la douleur morale**.** ☐
C. Le réflexe de sécrétion de lait est favorisé par la douleur morale**.** ☐
D. Le réflexe d'éjection du lait est favorisé par la douleur morale**.** ☐

44. Le nouveau-né ZQ âgé de 10 jours de vie est hospitalisé en néonatalogie depuis 5 jours. La mère vous interpelle parce que ses seins sont douloureux et durs. Parmi les propositions de traitements suivants, il y a un intrus. Cochez l 'intrus

A. Prendre un bain d'eau tiède**.** ☐ C. administrer un antibiotique**.** ☐
B. Administrer un antalgie pour soulager la douleur**.** ☐ D. aider à exprimer le lait des seins**.** ☐

45. Au cours de la physiologie de lactation, la posthypophyse libère une hormone. Cochez cette hormone parmi les propositions suivantes

A. Ocytocine**.** ☐ B. Calcitonine**.** ☐ C. Prolactine**.** ☐ D. Erythropoïétine**.** ☐

46. Vous recevez VR âgé de 5 mois, qui rejette par la bouche la totalité du contenu gastrique avec participation des muscles de l'abdomen et du diaphragme. Le signe que VR présente s'appelle :

A. Mérycisme. ☐ B. Régurgitation. ☐ C. Vomissement. ☐ D. vomique. ☐

47. À l'interrogatoire, la mère vous explique que VR répète ce signe au moins trois fois par semaine depuis sa naissance de la petite sœur, environ deux mois. La cause de ce trouble est due à:

A. Une parasitose. ☐ C. un paludisme non compliqué. ☐

B. Une gastroentérite. ☐ D. un manque d'affection. ☐

48. Le principal agent pathogène de la diarrhée aiguë bactérienne est :

A. Salmonelle. ☐ B. Escherichia coli. ☐ C. Shiguelle. ☐ D. Staphylocoque. ☐

49. La mauvaise prise du sein entraine les incidents suivants au cours de l'allaitement sauf un. Cochez cet Intrus

A. Engorgement mammaire. ☐ C. hypo galactorrhée. ☐

B. Abcès du sein. ☐ D. Crevasses. ☐

50. À l'âge de 18 mois, l'enfant est capable de :

A. Monter et descendre un escalier seul. ☐ C. reconnaître les différentes couleurs. ☐

B. Imiter les tâches ménagères de l'adulte. ☐ D. copier un carré sur un support. ☐

51. Un enfant de 3 ans :

A. Connaît son sexe et son âge. ☐ C. fait la bicyclette sans roue latérale. ☐

B. Copie un carré sans aide. ☐ D. reconnait sa droite et sa gauche. ☐

52. Le trait distinctif au plan des soins du groupe d'âge « 2 ans à 5 ans » est :

A . Le jeu. ☐ B. l'apprentissage. ☐ C. l'innocence. ☐ D. la fragilité. ☐

53. KI est âgé de 5 mois et présente une diarrhée aiguë avec signes sévères de déshydratation

A. KL boit normalement. ☐ C. KL est agité et conscient. ☐

B. KL a les yeux enfoncés. ☐ D. KL a les lèvres très sèches. ☐

54. Les causes suivantes sont responsables de vomissements aigus sauf une. Quelle est cette cause ?

A. Accès palustre. ☐ C. sténose hypertrophique du pylore. ☐

B. Otite moyenne aiguë. ☐ D. bronchiolite aiguë du nourrisson. ☐

55. MT est âgé de 3 ans. A l'examen, la surface corporelle est de 1 m². La surface corporelle de naissance de MT était de :

A. 0,2. ☐ B. 0,4. ☐ C. 0,5. ☐ D. 0,3. ☐

56. GH est âgé de 4 ans et correctement nourrit. La nouvelle acquisition psychomotrice attendue chez GH est:

A. Copier un rond. ☐ B. Copier un carré. ☐ C. copier une croix. ☐ D. dessiner un triangle. ☐

57. RR est né avec un poids de naissance de 3500 grammes. Il est allaité exclusivement. À l'âge de 3 mois le poids de RR est :

A. 4850 grammes. ☐ B. 530 grammes. ☐ C. 5700 grammes . ☐ D. 7000 grammes. ☐

58. Dans la stratégie PCIMEN, pour classer l'enfant les couleurs utilisées sont :

A. Rose, vert orange. ☐ B. rose, jaune, violet. ☐ C. rose, jaune, rouge. ☐ D. rose, vert, jaune. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 1

ANNEE 2022

EPREUVE D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DU MILIEU

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 01 heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = -1 point sans réponse =0 point

1. La turbidité peut être corrigée par la décantation, la filtration, la sédimentation. **A** ☐ **B** ☐
2. La saveur et l'odeur peuvent être améliorées en utilisant du désodorisant. **A** ☐ **B** ☐
3. La correction des défauts bactériologies de l 'eau consiste à débarrasser l 'eau des micro-organiques pathogènes qu'elle peut contenir. **A** ☐ **B** ☐
4. L'émulation a pour inconvénient de faire perdre à l'eau les gaz dissouts. **A** ☐ **B** ☐
5. La chloration consiste à purifier l'eau à l'aide de l'eau de javel. **A** ☐ **B** ☐
6. L'ionisation consiste à utiliser du sel de cuisine pour purifier l'eau. **A** ☐ **B** ☐
7. La filtration se fait à l'aide d'un filtre artisanal ou de filtre moderne. **A** ☐ **B** ☐
8. L'eau, source de vie représente un besoin vital et stratégique pour l 'homme. **A** ☐ **B** ☐
9. Les eaux souterraines sont les eaux contenues dans le sous-sol et celles qui émergent sous forme de sources. **A** ☐ **B** ☐
10. Les eaux souterraines sont aussi constituées par l'eau de pluie récoltée. **A** ☐ **B** ☐
11. Du point de vue chimique, une eau potable doit être minéralisée adéquatement. **A** ☐ **B** ☐
12. L'eau potable doit être dépourvue de germe pathogène. **A** ☐ **B** ☐
13. En zone rurale, ce sont les puits traditionnels qui sont les plus répandus. **A** ☐ **B** ☐
14. Les puits constituent le moyen le plus courant de captage des eaux souterraines. **A** ☐ **B** ☐
15. La notion de l'habitat se limite seulement au concept de logement ou abri qui sert à protéger l'homme contre les diverses agressions. **A** ☐ **B** ☐
16. les eaux résiduelles industrielles ne nécessitent pas une épuration et un traitement avant leur évacuation au niveau de la mer. **A** ☐ **B** ☐
17. Dans le traitement des ordures ménagères, l 'incinération est un procédé qui consiste à recycler les ordures ménagères d'un dépotoir. **A** ☐ **B** ☐
18. Le compostage consiste à transformer les déchets synthétiques en composte utilisable comme engrais pour les cultures maraîchères. **A** ☐ **B** ☐
19. Deux phases interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères. Ce sont : l'épuration et le traitement. **A** ☐ **B** ☐
20. Dans une habitation, les portes et fenêtres doivent être solides pour assurer la protection contre les agressions sont nécessaires. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2: QCM

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

21. Pour la construction d'un puits traditionnel, ces précautions sont nécessaires

A. Le puits doit être nettoyé et régulièrement désinfecté. ☐
B. Le puits doit avoir une margelle de 0,07 mètres de hauteur pour éviter les chutes des enfants et des animaux. ☐
C. Le puits doit être entouré d'un mur cimenté d'un rayon de 2 à 3 mètres. ☐
D. Le puits doit avoir un cuvelage d'une hauteur minimale de 0,3 mètres. ☐

22. Pour éviter la contamination d'une source, il faut :

A. Installer un périmètre de protection d'environ 2 à 3 mètres de diamètre autour. ☐
B. Interdire la construction de latrines en aval de la source. ☐
C. Eviter de déféquer ou de se laver à proximité de la source. ☐

23. Indiquez dans la liste, les critères relatifs aux besoins physiologiques dans un habitat salubre

A. Une absence d'humilité. ☐
B. La préservation de l'intimité. ☐
C. L'existence de confort. ☐
D. Un espace suffisant pour jeux des enfants. ☐
E. Une surface par individu de 4 à 6 m^2 pour éviter la promiscuité. ☐

24. Indiquez dans la liste, les critères relatifs aux besoins psychologiques dans un habitat salubre

A. Une aération et une ventilation suffisante. ☐
B. Un ensoleillement adéquat. ☐
C. Une protection suffisante contre les bruits. ☐
D. la possibilité d'assurer l'hygiène du logement. ☐
E. l'esthétique de l'habitat. ☐

25. Objectifs de I 'hygiène du milieu

A. Assurer la mortalité prématurée. ☐
B. Assurer les maladies et les traumatismes. ☐
C. assurer le bon rendement de I 'organisme humain. ☐
D. assurer le confort. ☐

26. Identifiez dans la liste proposée des différents types de pollution de l'eau, les intrus

A. Les pollutions domestiques. ☐
B. Les pollutions atmosphériques. ☐
C. Les pollutions industrielles. ☐
D. les pollutions cryoniques. ☐
E. les pollutions agricoles. ☐
F. les pollutions profuses ou individuelles. ☐

27. Identifiez les bonnes combinaisons qui déterminent les maladies liées à l'eau au type de défaut Chimique

Maladies: 1- la fluorose 2- la carie dentaire 3- le saturnisme 4- le goitre endémique
Défaut chimique: a -excès d'éléments, b- déficit d'éléments

A. (1, a) . ☐ B. (1, b) . ☐ C. (2, a) . ☐ D . (3, b) . ☐ E. (4, a) . ☐ F. (4, b) . ☐

28. Indiquez dans la liste proposée, les maladies parasitaires liées à l'eau :

A. La dysenterie bacillaire. ☐
B. La poliomyélite. ☐
C. les helminthiases . ☐
D. les schistosomiases . ☐
E. les hépatites virales. ☐
F. la fièvre typhoïde. ☐

29. Indiquez dans la liste proposée les qualités physiques d'une eau potables

A. Perfide. ☐
B. Chlorée. ☐
C. colorée. ☐
D. inodore. ☐
E. arriérée. ☐
F. insipide. ☐

30. Critères de choix d'une source d'approvisionnement en eau potable

A. L'insalubrité de la source. ☐
B. La régularité de la source. ☐
C. son aspect économique. ☐
D. son aspect historique. ☐

31. on distingue différents types de puits

A. Les puits secondaires. ☐
B. les puits foncés. ☐
C. les puits formés. ☐
D. les puits cartésiens. ☐

32.Pour la construction d'un puit traditionnel, ces précautions sont nécessaires

A. Le puits doit être placé près de toute source de contamination. ☐
B. En cas de terrain plat, le puits doit être situé au moins à 15 mètres de toute source de contamination. ☐
C. Avoir au moins 20 mètres de profondeur pour en accroitre la capacité et augmenter le rendement. ☐
D. En cas de terrain en pente, le puits doit être placé en amont des sources de contamination. ☐

33. Les moyens de lutte contre le péril fécal sont :

A. Porter des chaussures fermées. ☐
B. Assurer la potabilité de l'eau. ☐
C. Se laver proprement avant de manger. ☐
D. Se rincer les mains après les elles. ☐
E. ne manger que des aliments chauds et repas fumant. ☐
F. se laver les mains après chaque repas. ☐

34. Dans la liste ci-dessous, indiquez les conditions auxquelles l'installation d'une latrine doit obéir:

A. Placer la latrine en aval d'un puits ou d'une source d'eau. ☐
B. Prévoir entre la latrine et les puits, une distance de moins de 1,5 mètre. ☐
C. Le fond de la latrine doit être situé à moins 1.5 mètre au-dessus de la nappe aquifère. ☐
D. La construction d'une latrine dans des zones contenant des roches fissurées ou des formations calcaires doit être précédée d'une enquête minutieuse. ☐
E. L'emplacement de la latrine doit être dans un endroit bien sec et moins drainé. ☐

35. Comme avantages du système d'évacuation des excréta avec entraînement des matières, la fosse septique permet d'éviter:

A. La pollution du sol superficiel. ☐
B. La pollution industrielle. ☐

C. La contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. ☐
D. La propagation des déchets ménagers. ☐
E. L'accès des excréta aux mouches et aux rongeurs lorsque la fosse est soigneusement couverte. ☐
F. La stagnation des eaux usées. ☐

36. Les deux différents modes de transmission des maladies par les vecteurs :

A. La transmission psychologique. ☐
B. La transmission physiologique. ☐
C. La transmission biologique. ☐
D. La transmission mécanique. ☐
E. La transmission environnementale. ☐

37. La lutte contre les moustiques adultes recommande les gestes suivants :

A. Dormir sous un ventilateur. ☐
B. Dormir sous une MILDA. ☐
C. Déposer des feuillages aux portes et fenêtres. ☐
D. Pulvériser l'intérieur des maisons de désodorisant. ☐
E. Porter des vêtements longs et sombres à la tombée de la nuit. ☐
F. Utiliser des crèmes antimoustiques. ☐

38. La lutte contre les rongeurs repose essentiellement sur deux méthodes :

A. Les méthodes de lutte défensive. ☐
B. Les méthodes de lutte authentique. ☐
C. Les méthodes de lutte attractive. ☐
D. Les méthodes de lutte invasive. ☐
E. Les méthodes de lutte persuasive. ☐
F. Les méthodes de lutte offensive. ☐

39. Parmi les éléments de la liste, indiquez les effets du bruit sur la santé :

A. Lésion du pavillon de l'oreille. ☐
B. Les irritations. ☐
C. Les décibels. ☐
D. Baisse de l'attention et du rendement. ☐
E. hyperacousies qui peuvent aboutir à une surdité. ☐
F. les renforcements du caractère. ☐

40. L' eau intervient dans le développement des vecteurs de ces maladies ; lesquelles ?

A. Fièvre jaune. ☐ B. Tétanos. ☐ C. Tuberculose. ☐ D. Dracunculose. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE OBSTRETICALE

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 45 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = -1 point sans réponse =0 point

1. Les grossesses rapprochées sont un facteur de risque de décès maternels. **A** ☐ **B** ☐
2. L'avortement spontané à répétition est la survenue de trois avortement avec intervalle de grossesse à terme. **A** ☐ **B** ☐
3. En cas d'avortement spontané si la patiente est de rhésus négatif, il faut systématiquement réaliser le sérum µ anti-D. **A** ☐ **B** ☐
4. La délivrance constitue la deuxième phase du travail. **A** ☐ **B** ☐
5. La présentation est la partie du fœtus qui s'engage en premier au détroit inférieur du bassin. **A** ☐ **B** ☐
6. Les complications secondaires surviennent dans un délai de 24 heures après l'avortement. **A** ☐ **B** ☐
7. L'avortement provoqué clandestin est hémorragique, douloureux et incomplet. **A** ☐ **B** ☐
8. Les suites de couches sont marquées par la mise en place de la lactation. **A** ☐ **B** ☐
9. Les lochies sont sanglantes les quatre premiers jours du post-partum. **A** ☐ **B** ☐
10. Le globe utérin de sécurité doit être surveillé dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2*: QCM* Choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

11. La conduite à tenir devant un avortement tardif avec une délivrance incomplète est :

A. Curage digital. ☐
B. Curetage évacuateur. ☐
C. Administration d'ocytociques. ☐
D. administration d'antibiotiques. ☐
E. contrôle échographique. ☐

12. Les étapes du travail de l'accouchement sont :

A. L'effacement du col de l'utérus. ☐
B. La dilatation du col de l'utérus. ☐
C. La formation de la poche des eaux. ☐
D. la progression du fœtus. ☐
E. la formation du segment inférieur. ☐

13. Concernant l'accouchement :

A. La rotation intrapelvienne de la tête se fait presque toujours vers I 'avant (OP) . ☐
B. Les variétés antérieures font une rotation de 135°. ☐
C. La tête fœtale s'engage dans un des diamètres obliques du détroit supérieur. ☐
D. Le dégagement de la tête fœtale peut se faire en occipito-pubien. ☐
E. Le dégagement de la tête fœtale se fait uniquement en occipito-pubien. ☐

14. Les complications tardives de l'avortement provoqué sont :

A. Un abcès pelvien. ☐
B. Une dyspareunie. ☐
C. une dysménorrhée. ☐
D. Une béance du col. ☐
E. une infertilité. ☐

15. Les fonctions des SONUC sont:

A. Transfusion sanguine. ☐
B. Délivrance artificielle. ☐
C. Réanimation du nouveau-né. ☐
D. accouchement par voie basse avec assistance. ☐
E. extractions des produits retenus de la conception. ☐

16. Les signes de la menace d'avortement sont :

A- Utérus augmenté de taille en rapport avec l'âge gestationnel. ☐
B- Col parfois déhiscent fermé. ☐
C. Bon état général de la patiente. ☐
D- Ecoulement vaginal séro-sanguinolent. ☐

E- Débris fœtaux ou membranaires. ☐

17. Au cours de la consultation prénatale recentrée, les mesures préventives suivantes doivent être administrées :

A. Supplémentation en fer/fœtale. ☐
B. Supplémentation en oligo-éléments. ☐
C. Vaccination antitétanique. ☐
D. prévention du paludisme. ☐
E. prévention de la carence en iode. ☐

18. Concernant les présentations fœtales :

A- L'accouchement de la présentation du sommet se fait par voie basse. ☐
B- L'accouchement de la face variété antérieure se fait par césarienne. ☐
C- L 'accouchement de la présentation du front se fait obligatoirement par césarienne. ☐
D- L 'accouchement de la présentation du bregma peut se faire par césarienne. ☐
E- L'accouchement de la présentation de l'épaule peut se faire par césarienne. ☐

19. Les différents types délivrance normale sont :

A- La délivrance normale spontanée. ☐
B- La délivrance normale naturelle. ☐
C- La délivrance normale contrôlée. ☐
D. La délivrance normale dirigée. ☐
E. La délivrance normale artificielle. ☐

20. Parmi ces signes lesquels sont des modifications de l'utérus au cours de la grossesse:

A. Augmentation de taille de l'utérus. ☐
B. Augmentation de la largeur de l'utérus. ☐
C. Augmentation du volume de l'utérus. ☐
D. ramollissement de l'utérus. ☐
E. utérus globuleux, arrondi. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

EPREUVE DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 1heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+0,5 point réponse fausse = -0,5 point sans réponse =0 point

1. Les paroxysmes font partie des signes du tétanos. **A** ☐ **B** ☐
2. La rougeole sévit sous un mode épidémique en zone rurale. **A** ☐ **B** ☐
3. Dans la rougeole, il ne faut jamais laver I 'enfant au savon. **A** ☐ **B** ☐
4. Dans le choléra, il ne faut jamais donner de l'eau à boire au malade. **A** ☐ **B** ☐
5. L'orchite ourlienne est une localisation glandulaire de l'oreillon. **A** ☐ **B** ☐
6. Le R.A.A est aussi appelé maladie de bouillaud. **A** ☐ **B** ☐
7. Dans R.A.A, le germe en cause est streptocoque. **A** ☐ **B** ☐
8. Dans la maladie de bouillaud, l'atteinte articulaire est mobile. **A** ☐ **B** ☐
9. l'ovarite est une inflammation des ovaires et se traduit par des douleurs avec métrorragie. **A** ☐ **B** ☐
10. Le réservoir du poliovirus est exclusivement humain. **A** ☐ **B** ☐
11. La contamination de la poliomyélite est féco-orale. **A** ☐ **B** ☐
12. Dans la fièvre typhoïde, le malade présente une diarrhée fétide, liquide avec aspect jus de papaye. **A** ☐ **B** ☐
13. La constipation, l'anorexie font partis des signes des fièvres typhoïdes. **A** ☐ **B** ☐
14. Dans la fièvre typhoïde, le malade présente aussi des vestiges et une épistaxis. **A** ☐ **B** ☐
15. Dans la fièvre typhoïde, il n'existe pas de fièvre en plateau. **A** ☐ **B** ☐
16. La dissociation du pouls et de la température s'observent dans la méningite purulente. **A** ☐ **B** ☐
17. À l'examen du malade dans la fièvre typhoïde, il existe un météorisme abdominal, une splénomégalie et une langue saburrale. **A** ☐ **B** ☐
18. La péritonite est une complication digestive de la fièvre typhoïde. **A** ☐ **B** ☐
19. La gargouillement et la sensibilité de la fosse iliaque droite s'observe dans la rougeole. **A** ☐ **B** ☐
20. Le signe de koplick s'observe dans la rougeole. **A** ☐ **B** ☐
21. Le catarrhe oculo-respiratoire s'observe aussi dans la méningite purulente. **A** ☐ **B** ☐
22. Le diagnostic de la rougeole est essentiellement biologique. **A** ☐ **B** ☐
23. Dans la rougeole, les signes nerveux se caractérisent par les convulsions et la raideur de la nuque. **A** ☐ **B** ☐
24. Le signe de koplick se caractérise par l'apparition d'une éruption sur le corps de l'enfant. **A** ☐ **B** ☐
25. La rougeole n'est pas une maladie contagieuse. **A** ☐ **B** ☐
26. L'éruption de la rougeole est toujours ascendante. **A** ☐ **B** ☐
27. Dans la fièvre typhoïde, il existe une mode de contamination. **A** ☐ **B** ☐
28. La déshydratation et la malnutrition sont les complications générales de la rougeole. **A** ☐ **B** ☐
29. Le signe C.I.V.E T s'observe dans les méningites purulentes. **A** ☐ **B** ☐
30. Dans le choléra, il n'existe pas de déshydratation. **A** ☐ **B** ☐
31. Le vibrion cholérique est l'agent pathogène du tétanos. **A** ☐ **B** ☐
32. La réhydratation par voie veineuse est strictement interdite chez les clients présentant une déshydratation au plan C. **A** ☐ **B** ☐
33. La réhydratation au plan C fait appel au S.R.O. **A** ☐ **B** ☐
34. La constipation et la langue saburrale font partie des signes du choléra. **A** ☐ **B** ☐
35. Dans le choléra, le malade présente des éruptions cutanées. **A** ☐ **B** ☐
36. Dans le choléra, il existe trois stades de déshydratations. **A** ☐ **B** ☐
37. La réhydratation au plan C fait appel aux solutés. **A** ☐ **B** ☐
38. Il existe toujours un pli-cutané dans la déshydratation sévère. **A** ☐ **B** ☐
39. Pour qu'il ait tétanos, il faut trois conditions. **A** ☐ **B** ☐
40. Le bacille de Nicolaier est I 'agent pathogène du choléra. **A** ☐ **B** ☐
41. Le TRISMUS est le signe pathognomonique du tétanos. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2: QCM Choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

Cas clinique : vous recevez un enfant de 12 mois le 02 Février 2020, la mère témoigne que l'enfant a reçu le BCG et la première dose de DT coq à Marabadiassa où elle réside avec la carte de vaccination à l'appui.

42. Les signes suivants font partie des signes du syndrome méningé sauf deux. Lesquels ?

A. Raideur de la nuque. ☐ C. Epistaxis. ☐
B. Kerning positif. ☐ D. anorexie. ☐ E. brudzinsky positif. ☐

43. Les éléments suivants font partie du but du traitement du tétanos sauf deux. Lesquels ?

A. Augmenter la glycémie. ☐ D. neutraliser la toxine circulaire. ☐
B. Réduire les contractions. ☐ E. mettre le malade en confiance. ☐
C. détruire le germe. ☐ F. prévenir toutes les complications. ☐

44. Dans la coqueluche, les signes suivants font partie des complications mécaniques sauf deux. Lesquels ?

A. La constipation. ☐ C. hernie. ☐ E. Ulcération du frein de la langue. ☐
B. prolapsus rectal. ☐ D. Epistaxis. ☐ F. Insomnie. ☐

45. Quels vaccins feriez-vous lors de votre séance du 02 Février 2020

A. Le O2 Février 2020, méningite + rougeole + DT coq polio + RDV. ☐
B. Le 02 Février 2020, rougeole + DT coq polio + fièvre jaune + RDV. ☐
C. Le O2 Février 2020, DT coq + RDV. ☐
D. Le 02 Février 2020, hépatite + méningite + RDV. ☐
E. Le O2 Février 2020, rougeole F J- VPO Rota1 + RDV. ☐

46. la phase catarrhale de la coqueluche est caractérisée par une toux remarquable par :

A. Sa durée. ☐ C. vsa ténacité. ☐ E. sa prédominance nocturne. ☐
B. Son prolongement. ☐ D. Son aspect spasmodique. ☐ F. son caractère émétisante. ☐

47. Dans la coqueluche, la toux est à prédominance :

A. Diurne. ☐ B. post-prandiale. ☐ C. nocturne. ☐ D. matinale. ☐

48. Les signes du syndrome méningé sont caractérisés par le trépied méningitique. Lesquels ?

A Les vomissements en jets. ☐ C. céphalées intense en casque. ☐
B. La constipation. ☐ D. la diarrhée. ☐ E. Epistaxis. ☐

49. Le syndrome infectieux comporte les signes suivants sauf deux. Lesquels ?

A. Constipation. ☐ C. Oligurie. ☐ E. herpes péri-buccale. ☐
B. Langue saburrale. ☐ D. pouls rapide. ☐ F. Insomnie. ☐

50. Dans la coqueluche, on observe une toux :

A. Moussante. ☐ B. Quinteuse. ☐ C. Sèche. ☐ D. Expectoration. ☐

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

EPREUVE DE TECHNIQUE DE SOINS DE BASE

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 1heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux

Bonne réponse =+0,5 point réponse fausse = -0,5 point sans réponse =0 point

1. Les thermorécepteurs profonds envoient I 'information par voie nerveuse. **A** ☐ **B** ☐
2. La feuille de température est divisée en six parties. **A** ☐ **B** ☐
3. La courbe du pouls sur une feuille du pouls est notée en bleu. **A** ☐ **B** ☐
4. La pose de vessie de glace arrête certaines hémorragies. **A** ☐ **B** ☐
5. La vessie de glace se remplit au 1/3. **A** ☐ **B** ☐
6. La pose de la vessie de place se renouvelle toutes les 4 heures. **A** ☐ **B** ☐
7. La bouillotte permet de calmer la douleur. **A** ☐ **B** ☐
8. La déshydratation est un signe clinique de l'insolation. **A** ☐ **B** ☐
9. Le sexe n'a pas d'influence sur la température. **A** ☐ **B** ☐
10. L'hyperthermie n'est pas une élévation de la température. **A** ☐ **B** ☐
11. Avant de mettre le thermomètre médical à zéro, il faut d'abord secouer le patient. **A** ☐ **B** ☐
12. La réfection de lit occupé consiste à changer le linge sale du lit du malade impotent par du linge propre. **A** ☐ **B** ☐
13. La réfection de lit est un acte de soin qui assure au malade un mieux-être et contribue à la qualité de la prestation des services dans la statistique des besoins de dépendance du client. **A** ☐ **B** ☐
14. La toilette est un soin de confort et d'hygiène que l'agent de santé doit assurer lorsque le patient ne peut le faire lui-même. **A** ☐ **B** ☐
15. Pour les soins d'hygiènes des malades, le soignant doit savoir évaluer ce que le patient peut faire lui-même et dès que son état le permet et demander sa participation même si minime soit-elle. **A** ☐ **B** ☐
16. Pour la technique de la toilette du malade, il faut procéder avec méthode et agir segment par segment. **A** ☐ **B** ☐
17. La toilette intime comprend des temps différents selon qu'on l'effectue sur un homme ou une femme. **A** ☐ **B** ☐
18. La toilette générale d'un malade est un acte médical. **A** ☐ **B** ☐
19. La thermorégulation est un mécanisme physiologique qui maintient de façon permanente la température externe de I 'homme. **A** ☐ **B** ☐
20. La thermogénèse lutte contre le froid. **A** ☐ **B** ☐
21. Un seul thermomètre suffit pour tous les membres de la famille. **A** ☐ **B** ☐
22. La fréquence cardiaque est appelée aussi le pou. **A** ☐ **B** ☐
23. Le pouls permet de déceler les anomalies du fonctionnement du cœur. **A** ☐ **B** ☐
24. Les injections parentérales sont des soins évasifs. **A** ☐ **B** ☐
25. L'asepsie est un impératif dans les injections parentérales. **A** ☐ **B** ☐
26. Plus le chiffre de l'unité de mesure du calibre de l'aiguille est faible plus I 'aiguille est de gros calibre. **A** ☐ **B** ☐
27. Les ecchymoses et les hématomes se rencontrent uniquement dans les injections. **A** ☐ **B** ☐
28. La lipodystrophie est une complication de l'injection IV. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2: QCM Choisir la ou les bonne (s) réponse (s)
Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

29. ***Quelles sont les trois (03) mesures que peut entreprendre l'agent de santé paramédical pour abaisser la fièvre chez le malade hyperthermique***

A. Faire un bain du patient avec l'eau du réseau. ☐
B. Mettre le ventilateur ou le climatiseur. ☐
C. Faire un enveloppement humide avec une serviette ou un drap. ☐

D. Prescrire du paracétamol au patient. ☐
E. Injecter des médicaments antipyrétiques. ☐
F. Recouvrir le malade avec des draps. ☐

30. La température est représentée sur la feuille de température avec le stylo ?

A. Rouge. ☐ B. vert. ☐ C. bleu. ☐ D. noir. ☐

31. Le thermomètre médical doit rester combien de temps dans l'aisselle lorsqu'on doit mesurer la température d'un malade ?

A. Entre 15 et 20 minutes. ☐
B. Entre 5 et 10 minutes. ☐
C. entre 3 et 5 minutes. ☐
D. entre 1 et 3 minutes. ☐

32. Identifiez les trois (03) contre-indications de la prise de la température rectale chez un patient parmi celles énumérées en dessous

A. Les personnes cachexiques. ☐
B. Les enfants délirants. ☐
C. Les nouveau-nés atteints de rhinite. ☐
D. les personnes diarrhéiques. ☐
E. les abcès de l'anus. ☐
F. les personnes avec des hémorroïdes. ☐

33. Une injection parentérale :

A. Utilise le tractus digestif. ☐
B. Evite le tractus digestif. ☐
C. Utilise la voie percutanée. ☐
D. Utilise la voie rectale. ☐
E. Evite le tissu épithélial. ☐
F. permet un dosage plus précis. ☐

34. Les éléments ci-dessous font partie de la préparation d'une injection (trois réponses)

A. Vérifier l'état de la peau. ☐
B. L'identité du patient. ☐
C. Veiller au confort du patient. ☐
D. la prescription médicale. ☐
E. le respect de I 'intimité du patient. ☐
F. l'explication du soin. ☐

35. L'angle d'injection ID par rapport à la peau est de :

A. 15°. ☐ B. 25°. ☐ C. 45°. ☐

36. Dans la liste ci-dessous, la plus grosse aiguille est:

A. Aiguille G30. ☐ B Aiguille G25. ☐ C. Aiguille G18. ☐

37. Les injections IM peuvent se faire dans les zones ci-dessous ; lesquelles ?

A. Paroi abdominale. ☐
B. Face interne de la cuisse. ☐
C. Deltoïde. ☐
D. face antérieure de la cuisse. ☐
E. face antérieure du bras. ☐
F. région sous épineuse de I 'omoplate. ☐

38. S'agissant de l'injection IV, les assertions ci-dessous sont fausses ; lesquelles ?

A. Défaire le garrot avant la ponction. ☐
B. Prendre une aiguille à grosse calibre dessous. ☐
C. identifiez la veine à ponctionner. ☐
D. maintenir le garrot pendant l'injection. ☐
E. faire assoir ou couchez le patient avant l'injection. ☐
F. défaire le garrot avant I 'injection du produit. ☐

39. Identifiez les quatre (04) sites de prise de la température des cavités naturelles parmi ceux énumérés en dessous

A. La cavité orbitaire. ☐
B. La fosse nasale. ☐
C. la cavité buccale. ☐
D. le vagin. ☐
E. le rectum. ☐
F. la cavité auriculaire. ☐

40. Les éléments suivants sont des accessoires du lit sauf deux ; lesquels ?

A. La potence. ☐
B. Le lit mécanique Dupont. ☐
C. les cales butoir. ☐
D. le lit Guatheron. ☐
E. les portes-bassins, portes urinal. ☐

41. Pour la toilette complète ou celle d'un segment, le soignant doit se référer aux trois principes de base suivants. Lesquels ?

A. Le malade. ☐
B. Le confort. ☐
C. le matériel. ☐
D. la culture. ☐
E. la technique. ☐
F. la religion. ☐

42. La toilette se déroule habituellement en :

A. Quatre temps. ☐ B. Cinq temps. ☐ C. six temps. ☐ D. sept temps. ☐ E. huit temps. ☐

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

ANATOMIE DE L'APPAREIL URINAIRE ET PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 1heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux
Bonne réponse =+0,5 point réponse fausse = -0,5 point sans réponse =0 point

1. La brièveté de l'urètre féminin rend compte des infections. **A** ☐ **B** ☐
2. Les papilles se jettent dans les calices. **A** ☐ **B** ☐
3. L'éjaculation comporte essentiellement 2% de spermatozoïde. **A** ☐ **B** ☐
5. La régulation de la pression artérielle est assurée par la fonction endocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
4. La prostate est le siège de la première portion de l'urètre. **A** ☐ **B** ☐
6. La corticale rénale fait 1 cm d'épaisseur. **A** ☐ **B** ☐
7. La vessie est en rapport avec l'utérus en arrière. **A** ☐ **B** ☐
8. L'urètre présente plusieurs zones de rétrécissement. **A** ☐ **B** ☐
9. Le trigone vésical est aussi appelé le triangle de lieutau. **A** ☐ **B** ☐
10. Le testicule est une glande amphitrite. **A** ☐ **B** ☐
11. Le rein a une double fonction. **A** ☐ **B** ☐
12. Le bec de la prostate est en rapport avec le sphincter strié de l'urètre. **A** ☐ **B** ☐
13. L'urètre présente 3 zone de rétrécissement acquis. **A** ☐ **B** ☐
14. Le rapport sexuel est le seul moyen de reproduction chez les êtres humains. **A** ☐ **B** ☐
15. Le poids normal de la prostate est de 25 grammes. **A** ☐ **B** ☐
16. La cryptorchidie est l 'arrêt de la descente d'un ou des deux testicules. **A** ☐ **B** ☐
17. L'orchidectomie est l'ablation chirurgicale du testicule. **A** ☐ **B** ☐
18. L'urètre féminin est plus bref que l'urètre prostatique. **A** ☐ **B** ☐
19. Le vagin est en rapport avec la vessie par l'intermédiaire de l'aponévrose de Denonvilliers. **A** ☐ **B** ☐
20. La prostate est accessible au toucher rectal. **A** ☐ **B** ☐
21. Le pénis présente plusieurs corps érectiles. **A** ☐ **B** ☐
22. Le contrôle de l'érythropoïèse est assuré par la fonction endocrine du rein. **A** ☐ **B** ☐
23. La durée de vie d'un spermatozoïde est de 72h. **A** ☐ **B** ☐
24. La prostate est un organe sous vésical. **A** ☐ **B** ☐
25. L'ovaire foetal comporte à la naissance un million d'ovules. **A** ☐ **B** ☐

QCM (Q26-Q40) : choisis-la ou les bonnes réponses

26. La pression efficace de filtration est :
A. 25 mmHg. ☐ B. 30 mmHg. ☐ C. 70 mmHg. ☐
27. Les transferts tubaires sont:
A. Réabsorption. ☐ B. diffusion. ☐ C. excrétion. ☐ D. sécrétion. ☐ E. autre. ☐
28. L'angiotensine est :
A. Vaso-constricteur. ☐ B. vaso-dilatateur. ☐ C. autre. ☐
29. La rénine est synthétisée par :
A. Cellule épithelioide. ☐ C. cellule surrénale. ☐
B. Cellule de la maulu densa. ☐ D. autre. ☐
30. Le système rénie-angiotensive-aldostérone comporte les éléments suivants :
A. Rénine. ☐ B. Aldostérone. ☐ C. Œstrogène. ☐ D. angiotensine. ☐
31. Chez la femme, l'urètre est en rapport avec :
A. Vagin en arrière. ☐ B. Fascia de l'Alban en arrière. ☐ C. l'aponévrose de Denonvilliers. ☐ D. autre. ☐
32. La pression oncotique des protéines est :

A. 70 mmHg. ☐ B. 15 mmHg. ☐ C. 30 mmHg. ☐ D. autre. ☐

33. La pression hydrostatique dans la capsule de Bowman est :

A. 70 mmHg. ☐ B. 15 mmHg. ☐ C. 30 mmHg. ☐ D. autre. ☐

34. La vessie pleine mesure :

A. 10 cm. ☐ B. 12 cm. ☐ C. 24 cm. ☐ D. autre. ☐

35. Chez l'adulte, la capacité anatomique de la vessie est :

A. 2 à 6L. ☐ B. 2 à 3L. ☐ C. 3 à 6L. ☐ D. autre. ☐

36. Chez l'enfant de 6 ans, la capacité vésicale est :

A. 100 ml. ☐ B. 150 ml. ☐ C. 200 ml. ☐ D. autre. ☐

37. La vessie vide mesure :

A. 5 cm. ☐ B. 6 cm. ☐ C. 7 cm. ☐ D. autre. ☐

38. La longueur de la vessie est:

A. 5 cm. ☐ B. 6 cm. ☐ C. 8 cm. ☐ D. autre. ☐

39. La portion iliaque mesure:

A. 10 cm. ☐ B. 5 cm. ☐ C. 15 cm. ☐ D. autre. ☐

40. L'urètre présente :

A. 4 zones de rétrécissement. ☐ C. 3 zones de rétrécissement physiologique. ☐

B. 3 Zones de rétrécissement. ☐ D. autre. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

EPREUVE D'ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRES

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 1heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux
Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 point sans réponse =0 point

1. Pendant la systole ventriculaire, la valve mitrale est ouverte. **A** ☐ **B** ☐
2. La contractilité du cœur est assurée par le tissu nodal constitué. **A** ☐ **B** ☐
3. Les oreillettes sont séparées entre elles par le septum inter ventriculaire. **A** ☐ **B** ☐
4. La dépolarisation est phénomène aussi bien électrique que mécanique. **A** ☐ **B** ☐
5. Le cœur peut peser 300 g. **A** ☐ **B** ☐
6. L'innervation intrinsèque est assurée par le tissu nodal. **A** ☐ **B** ☐
7. Pendant la diastole ventriculaire, la valve mitrale est fermée. **A** ☐ **B** ☐
8. La valve aortique sépare le ventricule gauche de l'aorte. **A** ☐ **B** ☐
9. Le parasympathique innerve le cœur entier. **A** ☐ **B** ☐
10. Le tissu nodal est responsable de l'innervation intrinsèque du cœur. **A** ☐ **B** ☐
11. Le neurotransmetteur du sympathique est l'acétylcholine. **A** ☐ **B** ☐
12. Le débit cardiaque est la quantité de sang expulsée par chaque ventricule. **A** ☐ **B** ☐
13. La pointe (apex) du cœur est en regard du 6 espace intercostal gauche. **A** ☐ **B** ☐
14. La valve mitrale sépare l'oreillette gauche du ventricule droit. **A** ☐ **B** ☐
17. Le système neurovégétatif parasympathique est cardio-modérateur. **A** ☐ **B** ☐
15. Le péricarde est une enveloppe du cœur qui est composé de quatre (4) feuillets. **A** ☐ **B** ☐
16. Le myocarde est composé de deux (2) feuillets. **A** ☐ **B** ☐
18. Les activités électriques du cœur précèdent les activités mécaniques. **A** ☐ **B** ☐
19. Le cœur est composé de quatre (04) cavités. **A** ☐ **B** ☐

PARTIE2 : QCM choisir la ou les bonne (s) réponse (s)
Bonne réponse =+1 point réponse fausse = 0 sans réponse = 0 point

20. Sur un électrocardiogramme, la dépolarisation des ventricules est représentée par :
A. Onde P. ☐ C. marquée par le complexe QRS. ☐
B. Complexe QRS. ☐ D. onde T. ☐ E. intervalle QT. ☐

21. Les différentes faces du cœur sont les suivantes, sauf deux. Lesquelles ?
A. Face sterno-costale. ☐ C. face diaphragmatique. ☐
B. Base. ☐ D. face pulmonaire. ☐ E. apex. ☐

22. Les deux phénomènes du cœur sont :
A. Contraction ou systole. ☐ C. repolarisation. ☐ E. automatisme. ☐
B. Dépolarisation. ☐ D. relaxation ou diastole. ☐

23. Les différentes tuniques du cœur sont les suivantes, sauf deux. Lesquelles ?
A. Endocarde. ☐ B. péricarde. ☐ C. média. ☐ D. myocarde. ☐ E. adventice. ☐

24. Le volume de sang restant dans le ventricule à la fin de la systole est :
A. Volume Télédiastolique (VTD) . ☐ D. Débit cardiaque. ☐
B. Volume Télésystolique (VTS) . ☐ E. Pression artérielle. ☐
C. Volume d'éjection systolique (VES) . ☐

25. Le volume de sang du ventricule à chaque éjection est :
A. Volume Télédiastolique (VTD) . ☐ D. Débit cardiaque. ☐
B. Volume Télésystolique (VTS) . ☐ E. Pression artérielle. ☐
C. Volume d'éjection systolique (VES) . ☐

26. La fréquence cardiaque de base au repos est assurée par:

A. Le sympathique. ☐ C. Adrénaline. ☐ E. Autre. ☐

B. La Noradrénaline. ☐ D. le parasympathique. ☐

27. Les différents éléments constitutifs du tissu nodal sont les suivants sauf un. Lequel ?

A. Nœud sinusal. ☐ C. Faisceau de His. ☐ E. Péricarde. ☐

B. Nœud auriculo-ventriculaire. ☐ D. Réseau de Purkinje. ☐

28. La valeur du débit cardiaque chez un sujet jeune au repos est :

A. 4 Litres/minute. ☐ C. 5 litres : minutes. ☐

B. 5 Litres. ☐ D. 4,5 litres/minutes. ☐ E. autre. ☐

29. La circulation pulmonaire ou petite circulation comprend les éléments suivants sauf deux. Lesquels ?

A. Artères pulmonaires. ☐ C. veines pulmonaires. ☐

B. Aorte. ☐ D. Veines caves. ☐ E. Poumons. ☐

30. Le volume de sang dans le ventricule à la fin de la diastole est :

A. Volume Télédiastolique (VTD) . ☐ D. Débit cardiaque. ☐

B. Volume Télésystolique (VTS) . ☐ E. Pression artérielle. ☐

C. Volume d'éjection systolique (VES) . ☐

31. Sur un électrocardiogramme, la repolarisation des ventricules est représentée par :

A. Onde P. ☐ C. marquée par le complexe QRS. ☐ E. intervalle QT. ☐

B. Complexe QRS. ☐ D. onde T. ☐

32. Les méthodes non invasives d'études du cycle cardiaque suivante sont les suivantes, sauf une. Laquelle ?

A. Examen clinique. ☐ C. scanner cardiaque. ☐ E. Cathétérisme cardiaque. ☐

B. Echographie. ☐ D. imagerie par résonnance magnétique. ☐

COACHING

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE 2

ANNEE 2022

EPREUVE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Licence 1 IDE / SF.M **Durée : 1heure 00 min**

PARTIE 1 : QCD

Répondre par A : vrai et par B : faux
Bonne réponse =+0.5 point réponse fausse = -0.5 point sans réponse = 0 point

1. La mise en œuvre de la politique des soins de santé primaires en Côte d'ivoire est axée en partie sur la participation communautaire**. A** ☐ **B** ☐
2. En Côte d'ivoire la politique des soins de santé primaires comprend deux composantes curatives**. A** ☐ **B** ☐
3. En Côte d'ivoire la politique des soins de santé primaires comprend deux composantes préventives et trois composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐
4. En Côte d'ivoire la politique des soins de santé primaires comprend trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles**. A** ☐ **B** ☐
5. la pyramide sanitaire ivoirienne comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central**. A** ☐ **B** ☐
6. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend trois versants**. A** ☐ **B** ☐
7. La mise en œuvre effective de la politique des soins de santé primaires en Côte d'ivoire a débuté en 1993**. A** ☐ **B** ☐
8. Les soins de santé primaires sont des stratégies issues de la conférence internationale de Bamako pour réduire les inégalités dans la situation sociale des peuples**. A** ☐ **B** ☐
9. L'une des raisons pour lesquelles les centres de santé ne répondent pas toujours à l'attente des populations réside dans le fait que les populations elles-mêmes ne soient pas toujours associées aux activités du centre**. A** ☐ **B** ☐
10. L'objectif de la santé pour tous avant l'an 2000 a été défini par l'assemblée mondiale de la santé en 1977**.** **A** ☐ **B** ☐
11. La conférence au cours de laquelle la politique des soins de santé primaires a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS**. A** ☐ **B** ☐
12. Le district sanitaire est situé au niveau secondaire de la pyramide sanitaire ivoirienne**. A** ☐ **B** ☐
13. Les différents niveaux d'application des soins de santé primaires sont le niveau stratégique et le niveau de mise en œuvre des activités**. A** ☐ **B** ☐
14. Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires est aussi appelé périphérique**. A** ☐ **B** ☐
15. Le niveau d'appui des soins de santé primaires est aussi appelé niveau intermédiaire**. A** ☐ **B** ☐
16 la gestion du niveau secondaire est assurée par le Directeur départemental de la santé**. A** ☐ **B** ☐
17. La politique des soins de santé primaires définie à l'initiative de Bamako a mis un accent particulier sur la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile**. A** ☐ **B** ☐
18. Le début effectif de la mise en œuvre des activités des soins de santé en Côte d'ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé**. A** ☐ **B** ☐
19 Les soins de santé primaires sont adaptés car leur mise en œuvre tient contre des caractéristiques socioculturelles et des besoins de santé des populations**. A** ☐ **B** ☐
20. Les Soins de santé primaires sont intégrés car ils constituent une entité dépendante du système national de santé**. A** ☐ **B** ☐

PARTIE 2:QCM choisir la ou les bonne (s) réponse (s)

Bonne réponse =+0,5 point réponse fausse = O point sans réponse =0 point

21. Les trois niveaux d'applications de la stratégie des soins de santé primaires ont été définis :

A. Au Mali**.** ☐ B. En Zambie**.** ☐ C. Au Burkina Faso**.** ☐

22. L'initiative de Bamako a été lancée en:

A. 1987. ☐ B. 1985. ☐ C. 1978. ☐ D. 1977. ☐

23. Le nombre des composantes essentielles des soins de santé primaires est de :

A. 12 composantes. ☐ B. 06 composantes. ☐ C. 08 composantes. ☐ D. 10 composantes. ☐

24. La pyramide sanitaire de la Côte d'ivoire comprend :

A. Un versant gestionnaire et un versant prestataire. ☐

B. Un versant gestionnaire et un versant intermédiaire. ☐

C. Un versant périphérique et un versant gestionnaire. ☐

25. Le CHR signifie :

A. Centre hospitalier rural. ☐ C. Conseil hospitalier régional. ☐

B. hospitalier régional. ☐ D. Centre. ☐

26. En Côte d'ivoire la politique des soins de santé primaires comprend :

A. 02 composantes préventives et 03 composantes curatives. ☐

B. 03 composantes préventives et 02 composantes promotionnelles. ☐

C. 03 composantes préventives et 03 composantes promotionnelles. ☐

27. La pyramide sanitaire de la Côte d'ivoire comporte :

A. 06 niveaux. ☐ B. 04 niveaux. ☐ C. 03 niveaux. ☐ D. 05 niveaux. ☐

28. Parmi les établissements sanitaires suivants indiquez ceux qui se trouvent au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire

A. CSR. ☐ B. CHR. ☐ C. CSU. ☐ D. DIRECTION REGIONALE. ☐

29. Dans quelle ville les trois niveaux d'application de la politique des soins de santé primaires ont -il été définis ?

A. Lusaka. ☐ B. Bamako. ☐ C. Brazzaville. ☐

30. Quand est-ce que la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie ?

A. En septembre 1997. ☐ B. En septembre 1978. ☐ C. En mars 1987. ☐

31. Dans quelle ville, la politique des soins de santé primaires a-t-elle été définie pour la première fois?

A. Rome. ☐ B. Alma-Ata. ☐ C. Genève. ☐ D. Ata-alma. ☐

32. Cochez les phrases qui constituent des composantes des soins de santé primaires :

A Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de maladie auxquels la population est confrontée. ☐

B. Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale. ☐

C. Promotion et lutte contre les endémies locales. ☐

D. Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles. ☐

E. Vaccination contre les principales maladies endémiques. ☐

33. Le contenu de l'initiative de Bamako préconise entre autres :

A. Un accès prioritaire des femmes et des enfants aux soins de santé. ☐

B. Une autonomie de gestion au niveau local à travers les comités de gestion. ☐

C. Une interdiction des médicaments génériques dans les structures de santé. ☐

D. Une définition des niveaux d'application des soins de santé primaires. ☐

34. Parmi ces propositions de réponses, cochez celles qui sont bonnes :

A. Les soins de santé primaires sont financièrement accessibles car ils ne coutent pas cher. ☐

B. Les soins de santé primaires sont accessibles car ils favorisent l'automédication. ☐

C. Les soins de santé primaires sont accessibles car ils sont disponibles dans les centres de santé. ☐

35. Cochez les phrases qui constituent des composantes de soins de santé primaires :

A. Approvisionnement suffisante en eau saine. ☐

B. Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles. ☐

C. Education appropriée pour la santé en relation avec des problèmes de santé auxquels la population est confrontée. ☐

36. Le niveau de mise en œuvre des soins de santé primaires aussi appelé:

A. Niveau primaire. ☐ C. niveau intermédiaire. ☐

B. niveau secondaire. ☐ D. niveau périphérique. ☐

37. Cochez les phrases qui constituent des composantes de soins de santé primaires :

A. promotion et lutte contre les endémies locales. ☐
B. vaccination contre les principales maladies infectieuses. ☐
C. traitement des lésions courantes. ☐

38. L'objectif de santé pour tous en 2000 a été fixé par:

A. le ministère ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. ☐
B. les fonds des nations unies pour l'enfance. ☐
C. l'organisation mondiale de la santé. ☐
D. le bureau Afrique de l'OMS. ☐

COACHING