

ÉPREUVE DE PHARMACOLOGIE

1. La voie transmuqueuse permet une action focalisée du médicament ou passage dans la circulation générale.

Vrai

2. Afin d'éviter les résistances aux antibiotiques, il est donc important de :
 - a. Pratiquer un antibiogramme avant tout traitement (quand cela est possible).
 - b. De prendre un antibiotique face à toute maladie.
 - c. Respecter la durée de l'antibiotique.
 - d. Eviter l'automédication.

3. Biodisponibilité est la fraction de la dose administrée qui atteint la circulation générale.

Vrai

4. Spiramycine (ROVAMYCINE), Josamycine (JOSACINE), Clarithromycine (NAXY), Erythromycine (ERY), Roxithromycine (RULID), Azithromycine (ZITHROMAX) sont des macrolides.

Vrai

5. Les médicaments agissent sur la :
 - a. Sur le muscle en relâchant la fibre lisse ou bloquant la transmission nerf/muscle (action périphérique).
 - b. Sur la moelle osseuse en renforçant l'activité déficiente des neurones responsables de l'inhibition présynaptique (action médullaire).
 - c. Sur les structures centrales, en restaurant l'équilibre entre les influences inhibitrices et excitatrices descendantes (actions centrale).
6. Pour chaque médicament, il existe :
 - a. Une dose utile
 - b. Une dose usuelle
 - c. Une dose maximale
 - d. Une partielle

7. L'action du médicament est appelée effet pharmacocinétique.

Faux

8. La Benzathine-benzylpénicilline est une pénicilline retard bactériostatique.

Faux

9. Choisir la ou les bonnes réponses :

a. La pharmacodynamie décrit les effets de l'organisme produit sur un principe actif.

b. La pharmacodynamie décrit les effets qu'un principe actif produit sur l'organisme.

c. La pharmacodynamie est l'étude détaillée de l'interaction entre récepteur et substance active.

10. La substitution d'une spécialité par un générique :

a. Permet au pharmacien de délivrer une spécialité différente de celle prescrite si même.

b. Composition du principe actif, même dose et même forme pharmaceutique, mais les excipients peuvent différer.

c. Médicament générique, a un prix moins cher.

d. Sans avoir à informer le prescripteur.

11. Parmi ces combinaisons thérapeutiques, indiquez celle utilisée en première intention chez les sujets en dehors de la femme enceinte :

A- Artesunate+amodiquine

B- Artesunate+pyronaridine

C- Artesunate+injectable

D- Artesunate+dihydroartémisine

E- Artesunate recto caps

12. Les antispasmodiques (appelé aussi spasmocritique) constituent le traitement des manifestations spasmodiques et ou douloureuses des voies digestives et urinaires, ainsi qu'en gynécologie et obstétrique. Ils sont utilisés pour lutter contre les spasmes musculaires lisses.

Vrai

13. Un effet secondaire est une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies couramment utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique (OMS 1972)

Vrai

14. La posologie est l'étude des doses auxquelles doivent être administrés les médicaments pour donner un effet thérapeutique donné. On parle ainsi de posologie par prise ou par 24 heures.

Vrai

15. Les antibiotiques qui peuvent être utilisés chez les nourrissons, sont les pénicillines, les céphalosporines, les macrolides, les aminosides ou les glycopeptides.

Vrai

16. Les antibiotiques sont des substances chimiques élaborées par des micro-organismes capables d'inhiber la multiplication (action bactériostatique) ou de tuer (action bactéricide) d'autres micro-organismes.

Vrai

17. Les AINS peuvent entraîner des effets variables selon la période de grossesse :

- a. Des malformations congénitales au cours du premier trimestre, au moment de la formation des organes.
- b. Un risque de fausses couches, de retard de croissance intra-utérin, de travail prématuré ou d'hémorragie du post-partum.

18. Les antalgiques, ont pour rôle de diminuer la douleur, et les analgésiques, qui suppriment la sensibilité à la douleur et l'inflammation.

Vrai

19. Les différentes voies transmuqueuses sont :

- a. La voie sublinguale
- b. La voie rénale
- c. La voie vaginale
- d. La voie nasale
- e. La voie oculaire

20. Les glucocorticoïdes ou anti-inflammatoire stéroïdiens sont des médicaments indiqués par voie générale pour traiter :
- a. Les urticaires, œdème de Quincke, états allergiques sévères, choc anaphylactique.
 - b. Affections transpiratoires : asthme, insuffisance respiratoire, sarcoïdose.
 - c. Traitement de fond de l'asthme.

21. Parmi ces produits, indiquez les antisécrétoires anti-ulcèreux :

- A- Ranitidine
- B- Sucralfate
- C- Misoprostol
- D- Ipeprazole

22. Le paracétamol, aspirine, l'ibuprofène, le kétoprofène et le naproxène sont les recommandés dans la migraine.

Vrai

23. Choisir la ou les bonnes réponses :

Après la phase biopharmaceutique précédant le premier passage transmembranaire, la pharmacocinétique comprend quatre grandes étapes : ADME

- a. Absorption (A), Dispensation (D), Métabolisme (M), Excrétion (E)
- b. Absorption (A), Distribution (D), Métabolisme (M), Expression (E)
- c. Absorption (A), Distribution (D), Métabolisme (M), Excrétion (E)

24. Sélectionnez 4 options :

- a. L'utilisation irrationnelle ou due à des erreurs inhumaines
- b. Diagnostic erroné
- c. Erreur médicamenteuse
- d. Réaction médicamenteuse
- e. Automédication et ou non observance

25. Les médicaments pour faire baisser la fièvre sont :

- a. Paracétamol, acide acétylsalicylique, ibuprofène, métamizole
- b. Paracétamol, aspirine, ibuprofène, Noramidopyrine
- c. Paracétamol, acide acétylsalicylique, flurbiprofène, métamizole

26. Les antalgiques de palier 1 sont des traitements spécifiques de la crise de migraine.

Faux (si c'était niveau 1 ça allait vrai)

27. Les spécialités pharmaceutiques sont des médicaments :

- a. Préparées à l'avance, présentées sous un conditionnement standard et caractérisé par une dénomination spéciale.
- b. Préparées à l'avance selon une formule proposée par le laboratoire qui les fabrique et fixe leur dénomination.
- c. Représentent la majorité des médicaments vendus aujourd'hui
- d. Enregistrées sous Dénomination Commerciale avant et maintenant sous Dénomination Commune Internationale (DCI) tel retenu par l'OMS.

28. Indiquez les indications thérapeutiques qui se rapportent à l'ocytocine :

- A- curetage utérin ou IVG
- B- hémorragies de la délivrance et du post-partum après césarienne
- C- rétractation utérine, immédiatement après la naissance de l'enfant par césarienne
- D- Insuffisance de contractions utérine (en début ou en cours de travail)
- E- atonie utérine post-partum et hémorragies de la délivrance césarienne

29. Indiquez les indications thérapeutiques qui se rapportent à la méthylergométrine :

- A- curetage utérin ou IVG
- B- atonie utérine post-partum et hémorragies de la délivrance césarienne
- C- hémorragies de la délivrance et du post-partum après césarienne
- D- atonie de l'utérus après l'extraction de l'enfant

30. L'amoxicilline est une bêtalactamine de la famille des pénicillines retard

Vrai

31. Il existe 2 catégories de médicaments que le pharmacien conseille en officine :

- a. Les médicaments (conseils)
- b. Les médicaments (contrôle)
- c. Les médicaments (petit public)
- d. Les médicaments (grand public)

32. Mébérevine (DUSPATALIN ; SPASMOPRIV), Phloroglucinol (SPASFON, SPASMEX), Trimébutine (DEBRIDAT, TRIBUTINE), sont des antispasmodiques anticholinergiques musculotropes.

Faux

33. Le Métamizole est contre-indiqué au cours de la grossesse et l'allaitement.

Vrai

34. L'antibiogramme permet de définir les antibiotiques vis-à-vis desquels la souche bactérienne isolée est sensible et ainsi de guider la prescription et de surveiller la survenue et l'évolution des résistances acquises.

Vrai

35. Cochez-le ou les bonnes réponses :

- a. Le principe actif (PA) est la molécule qui dans un médicament possède un effet chimique.
- b. Le principe actif (PA) est la molécule qui dans un médicament possède un effet thérapeutique.
- c. Le principe actif (PA) est la molécule en très faible proportion dans le médicament par rapport aux excipients.

36. Cocher les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

- a. Bétaméthasone (CELESTENE)
- b. Célécoxib (CELEBREX)
- c. Dexaméthasone (DEXACYL)
- d. Triamcinolone (KENACORT-RETARD)
- e. Kétoprofène (PROFENID)

37. Sur le plan effets secondaires, les anti-inflammatoires provoquent une lésion de la muqueuse gastroduodénale.

Vrai ou faux

38. « On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques »

Vrai

39. Les CTA sont indiqués en première intention chez la femme enceinte uniquement au 2ème et 3ème trimestre.

Vrai ou faux

40. Le prescripteur peut être amené à modifier les doses selon différents facteurs tels que :

- L'âge du patient
- Le poids du patient
- L'état de santé du patient, notamment sa fonction rénale ou hépatique
- La tolérance du patient à l'égard de la substance active.

Vrai

41. La quinine est donnée en première intention à toute âge gestationnel.

Vrai ou faux

42. Un médicament princeps :

- a. Un médicament qui incorpore pour la première fois un principe actif qui a été isolé ou synthétisé par des laboratoires pharmaceutiques.
- b. Un médicament « original », protégé par un brevet d'une durée valable (de l'ordre de 10 ans) qui assure au laboratoire qui l'a déposé l'exclusivité de son exploitation et de sa commercialisation (il est le seul à pouvoir vendre un médicament avec principe actif)
- c.

43. Baclofène, Méphènesine, Methocarbamol, Thiocolchicoside sont des antispastiques d'action médullaire

Vrai

44. Le médicament est toute substance ou composition présentée comme :

A- possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales.

B- comprenant toutes substance ou composition pouvant être utilisé chez l'homme ou l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic biomédical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologie, immunologique ou métabolique. (Diagnostic médical en lieu et place de biomédical)

45. La prescription en DCI est présentée par les autorités de santé comme une mesure visant à améliorer la sécurité du patient, notamment :

A- en permettant une identification plus rapide des risques d'action médicamenteuses

B- en limitant les confusions entre les noms commerciaux

C- en supprimant le risque de prendre plusieurs médicaments portant des noms différents mais contenant un même principe actif

D- en limitant les risques pour un patient d'utiliser un principe actif auquel il est allergique

E- l'indépendance vis-à-vis stratégies commerciales des laboratoires

F- pour les patients, les prescriptions en DCI pourraient contribuer à mieux connaître le traitement et se traiter soi-même.

46. Indiquez-la ou les bonnes réponses ; un effet secondaire est toute réaction résultant d'un (...) selon l'OMS 2000 :

A- Mésusage

B- usage abusif

C- syndrome de sevrage tabagique

D- pharmacodépendance

E- erreur médicamenteuse et inefficacité thérapeutique

F- produit défectueux ou de mauvaise qualité

G- aucune réponse juste

47. Parmi ces effets, identifiez les effets indésirables graves :

A- Un décès

B- Une menace pour la vie du patient avant l'apparition de l'événement

C- Des séquelles ou incapacité notable et durable (incapacité signifiant toute impossibilité à réaliser des gestes de la vie courante)

D- Une nécessité d'hospitalisation ou d'un rapprochement d'hospitalisation

E- Une anomalie génitale ou d'une atteinte périnatale

49. La contraception hormonale met en œuvre trois mécanismes à savoir :

A- elle détourne l'ovulation

B- elle bloque l'ovulation

C- elle épaissit la glaire cervicale

D- elle empêche le passage des spermatozoïdes

E- elle fait obstacle à la nidation de l'embryon

50. Situez les caractéristiques de la contraception d'urgence :

- A- elle est réservée aux situations d'urgence et de détresse caractérisée
- B- elle permet d'éviter une grossesse dans tous les cas (échec dans 5-42% des cas)
- C- elle peut remplacer une contraception régulière
- D- ce n'est pas une méthode d'interruption de grossesse, c'est-à-dire ces médicaments ne provoquent pas d'interruption de grossesse déjà en cours.

51. Les vasculotropes et veinotoniques sont utilisés dans le traitement :

- A- des jambes lourdes
- B- des varicelles
- C- des hémorroïdes
- D- des épistaxis (saignements de nez)
- E- des gingivorragies (saignement des gencives spontanés)

52. Les différents types de vitamines sont sauf un. Lequel ?

- A- vitamine A(rétinol)
- B- vitamine B1(thiamine)
- C- vitamine C2
- D- vitamine B3
- E- vitamine B5
- F- vitamine K1

53. Les principaux oligoéléments utiles à l'organisme humain sont au nombre de

- A- 8
- B- 3
- C- 11
- D- 10
- E- autre

54. Il existe de nombreuses spécialisations possibles pour le pharmacien, à titre d'exemple, on a :

- A- biologiste
- B- radio pharmacie
- C- pharmacie hospitalière
- D- pharmacie industrielle
- E- pharmacie militaire
- F- toutes les réponses sont correctes

55. On distingue (...) voies principales d'administration.

Complétez les pointillés par le mot qui convient

A- 4

B- 10

C- 3

D-5

56. On distingue trois (3) voies principales d'administration.

FAUX

57. La posologie est l'étude des modalités d'administration des médicaments, mais recouvre également l'ensemble des modalités d'administration de la prise d'un médicament.

Vrai

58. La galénique est la science et l'art de conserver et de présenter les médicaments, de la manière la moins adaptée à leur mode d'administration, avec la garantie d'un dosage précis, d'une stabilité satisfaisante et d'une utilisation permettant l'observance d'un traitement.

FAUX

59. Les comprimés sont obtenus par compression de poudre.

VRAI

60. Un princeps est un médicament qui incorpore pour la première fois un principe actif qui a été isolé ou synthétisé par un laboratoire pharmaceutique.

VRAI

61. Le froid n'est pas un anti-inflammatoire naturel.

Faux

62. Sur le plan chimique, les anti-inflammatoires présentent des fonctions acides ou des caractères acides.

VRAI

63. Les enfants peuvent être atteints de migraine dès deux ans.

VRAI

64. L'antibiotique peut être préventif ou curatif. VRAI

65. Il existe 20 grandes familles d'antibiotiques.

VRAI

66. Les antifongique infectent la peau, les muqueuses, les cheveux, les ongles.

VRAI

67. La gélule est constituée de deux enveloppes de gélatine emboîtées qui renferment une poudre. Elle doit toujours être avalée avec de l'eau car elle risque sinon de se coller dans l'œsophage.

VRAI

68. Les médicaments homéopathiques sont des substances ne provoquant pas chez un individu sain des symptômes retrouvés chez un malade à qui ils peuvent donner la guérison.

Faux

69. Les médicaments allopathiques sont des produits dont l'action sur l'homme sain occasionne des phénomènes morbides autres que ceux qu'on observe chez le malade.

Vrai

70. Les antispasmodique musculotropes agissent directement sur la fibre musculaire lisse du tube digestif, des voies urinaires et du muscles utérin. **Vrai**

71. Sur le plan effet secondaire, les anti-inflammatoires provoquent une lésion de la muqueuse gastroduodénale. **Vrai**

72. L'antibiotique est défini par son spectre qui correspond à l'ensemble des bactéries sensibles à l'antibiotique. **Vrai**

73. L'amoxicilline est une bêtalactamine de la famille des pénicillines retard.

Faux

74. L'action du médicament est appelée effet pharmacologique **Vrai**