Table 2. Efficacy and safety outcomes

Outcome	Treatment (n=412)	Placebo (n=405)	Difference (95% CI)	p-value
Primary endpoint				
Change in HbA1c at week 24 (%)	-1.42 (-1.58, -1.26)	-0.31 (-0.47, -0.15)	-1.11 (-1.33, -0.89)	<0.001
Secondary endpoints				
Change in body weight (kg) †	-3.80 (-4.35, -3.25)	-0.90 (-1.42, -0.38)	-2.90 (-3.66, -2.14)	<0.001
Fasting plasma glucose (mmol/L)	-2.15 (-2.40, -1.90)	-0.48 (-0.73, -0.23)	-1.67 (-2.02, -1.32)	<0.001
Systolic blood pressure (mmHg) ‡	-5.20 (-6.80, -3.60)	-1.90 (-3.50, -0.30)	-3.30 (-5.56, -1.04)	0.004
Safety				
Any adverse event, n (%)	231 (56.1)	209 (51.6)	4.5 (-2.1, 11.1)	0.18
Serious adverse events, n (%)	18 (4.4)	15 (3.7)	0.7 (-2.2, 3.6)	0.64

† Measured in participants with baseline BMI of 27 or more.

‡ Seated measurement, mean of three readings.

CI, confidence interval.