
a closest conformer found
min RMSD to experiment (Å)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
etkdg
reset
gauss-iid
gauss-corr
perlin
b success rate
≤ 1.0 Å
≤ 0.5 Å
fraction of runs
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
etkdg
reset
gauss-iid
gauss-corr
perlin
c median min RMSD per molecule (Å)
imatinib (PDB) 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
dasatinib (PDB) 0.7 1.2 1.3 1.0 1.2
erlotinib (PDB) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6
gefitinib (PDB) 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8
sildenafil (PDB) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
rosiglitazone (PDB) 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9
oseltamivir-carboxylate (PDB) 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3
ibuprofen (PDB) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
indomethacin (PDB) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
biotin (PDB) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
methotrexate (PDB) 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8
tolbutamide (COD) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
aspirin (COD) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
fenofibrate (COD) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ketoprofen (COD) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ibuprofen-crystal (COD) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
etkdg
reset
gauss-iid
gauss-corr
perlin