

렌클로라이드에 회석되어 칼럼 크로마토그래피(실리카겔)에 의해 정제되었다. 칼럼의 용리(elution)는 메틸렌클로라이드, 메탄올 및 트라이에틸아민(95 : 5 : 1)로 행해졌다. 순수한 부분(fraction)들이 모아졌고 용매는 저압에서 제거되어 0.83g (70.9%)의 3-2-[4-(6-플로로벤조(D)아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-에틸-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도-(1,2-a)피리미딘-4-온(I)이 얻어졌다. 선택적으로, 반응 미정제 생성물은 적당한 유기용매 바람직하게는 에탄올 또는 4-메틸-2-펜탄온으로 부터 결정화에 의해 정제되었다.

^1H NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 7.71 dd, $J_1=8.8$ Hz, $J_2=5.2$ Hz, 1H, CH 방향족 ; 7.23 dd, $J_1=8.6$ Hz, $J_2=2.2$ Hz, 1H, CH 방향족 ; 7.05 ddd, $J_1=8.8$ Hz, $J_2=8.6$ Hz, $J_3=2.2$ Hz, 1H, CH 방향족 ; 3.09 t, $J=6.2$ Hz, 2H, CH_2 ; 3.18 d, $J=11.6$ Hz, 2H, CH_2 ; 3.08 m, 1H, CH ; 2.87 t, $J=6.6$ Hz, 2H, CH_2 ; 2.77 m, 2H, CH_2 ; 2.55 m, 2H, CH_2 ; 2.31 s, 3H, CH_3 ; 2.27 m, 2H, CH_2 ; 2.09 m, 4H, $2\times\text{CH}_2$; 1.96 m, 2H, CH_2 ; 1.89 m, 2H, CH_2 .

^{13}C NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 165.25-166.77, d, $J_{\text{C}-\text{F}}=249$ Hz, C 방향족 ; 163.88-163.75, d, $J_{\text{C}-\text{F}}=14$ Hz, C 방향족 ; 162.56 ; 161.09 C 방향족 ; 158.39 C 방향족 ; 155.87 C 방향족 ; 122.67-122.55 d, $J_{\text{C}-\text{F}}=11$ Hz, CH 방향족 ; 119.27C 방향족 ; 117.28 C 방향족 ; 112.35-112.10 d, $J_{\text{C}-\text{F}}=25$ Hz, CH 방향족 ; 97.48-97.21 d, $J_{\text{C}-\text{F}}=27$ Hz, CH 방향족 ; 56.68 CH_2 ; 53.35 CH_2 ; 42.66 CH_2 ; 34.59 CH_2 ; 31.41 CH_2 ; 30.53 CH_2 ; 23.74 CH_2 ; 21.95 CH_2 ; 21.24 CH_2 ; 19.20 CH_2 .

산업상 이용 가능성

본 발명은 항정신병적 성질에 대하여 약학적으로 활성인 리스페리돈을 제조하는데 이용될 수 있다.