

Observando a tabela 6, é possível verificar que a conservação dos solos com dados disponíveis após 1975, somente 6 propriedades utilizavam essa prática, já em 1980, houve um aumento de 1364 propriedades e para o ano de 1985 comparando-o com o ano de 1980, o aumento foi de 434 propriedades que praticam a conservação dos solos.

A prática mais utilizada é sem dúvida as curvas em nível que auxiliam o combate à erosão. Órgãos do governo estadual como a EMATER, tem auxiliado bastante o produtor tanto no manejo do solo como na construção de curvas em nível.

“As minhas terras não tinha curvas de nível, mas a técnica da EMATER, falou que eu tinha que fazer, porque a erosão já tava levando muita terra embora, então eu fiz porque com as curvas de nível até os rios ficam protegidos”.

O depoimento do agricultor José Beteto da Comunidade de Guairacá expressa a importância da assistência técnica na orientação do produtor sobre a melhor conservação da propriedade.

Portanto, acreditamos que este processo de modernização/ industrialização apenas aumentou ainda mais o problema agrário no Brasil, já que ocasionou uma diminuição da pequena propriedade. Porém, ainda podemos encontrar nestes espaços contemplados pelo o processo de modernização, pequenos produtores que continuam a produzir. Este processo que aparentemente atingiu todas as áreas do Norte Paranaense, na verdade ocorreu de forma diferenciada no caráter geográfico, econômico, técnico e social, que produziu desigualdades regionais e locais.

TABELA 6: Uso de Insumo e Conservação do Solo do Município de Londrina

	estabelecimentos	Adubos(químicos e orgânicos)	calcário	defensivos	Prática de conservação do solo
1970	5.580	1.153	-	-	-
1975	4.146	1.665	7	319	6
1980	3.654	2.072	615	2.821	1.370
1985	4.151	2.532	834	2.937	1.804
1995/96	3.119	2944	990	-	-

Fonte: IBGE: Censos Agropecuários do Paraná: 1970, 1975, 1980, 1985, 1995/96.