ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన విభాగం,

డిజిటల్ సాంకేతిక వ్యవసాయ కేంద్రం, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.

బులెటిన్ నెం. XXXVII/79/2026

# రాష్ట్ర రైతాంగానికి

# వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

## తేది: 02.10.2026(శనివారం) నుండి 07.10.2026 (బుధవారం) వరకు

గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

**గత మూడు రోజుల వాతావరణం:**

**గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్రంలో వాతావరణం పొడిగా ఉంది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32 నుండి 36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20 నుండి 24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.**

**రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణ విశ్లేషణ (ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1300 గంటల ఆధారంగా):**

**హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా ఉండవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22 నుండి 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.**

## వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

**వరి**

- పంట అంకురం దశ, పూత దశ నుండి పక్వ దశలో ఉంది.
- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు వరిలో ఆకుముడత ఆశించుటకు అనుకూలం. నివారణకు, 2 గ్రా. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ లేదా 0.3 మి.లీ. క్లోరాంట్రినిలిప్రోల్ లేదా 0.1మి.లీ. ఫ్లూబెండమైడ్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- వరిలో బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులు గమనించడమైనది. నివారణకు, ప్లాంటోమైసిన్ 0.2గ్రా. + కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లేదా అగ్రిమైసిన్ 0.4గ్రా. + కాపర్ఆక్సి క్లోరైడ్ 3గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- వరిలో కాండంతొలుచు పురుగు గమనించడమైనది. నివారణకు 0.3 మి. లీ. క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

**ప్రత్తి**

- పంట కాయలు అభివృద్ధి చెందే దశ నుండి కాయ పగిలే దశలో ఉంది
- ప్రత్తిలో పచ్చదోమ మరియు తామర పురుగులు గమనించినట్లయితే, నివారణకు 2మి. లీ. ఫిప్రోనిల్ లేదా 1.25 గ్రా. డైఫెన్ థయురాన్ లేదా 0.3 గ్రా. ఫ్లోనికామిడ్ లేదా 0.75 గ్రా. సల్ఫాక్సాఫ్లోర్ మందును 5మి.లీ. 1500 పిపియం వేపనూనెతో పాటు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రత్తిలో ప్రత్తిలో గులాబి రంగు పురుగు ఆశించుటకు అనుకూలం. నివారణకు
  - పొలం గట్లమీద ఉన్న వయ్యారి భామ కలుపు నివారించాలి
  - ఎకరాకు 4 లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి వరుసగా 2-3రోజులలో బుట్టకు 7-8 రెక్కల పురుగులు గమనించినట్లయితే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
  - నివారణకు 2మి.లీ. ప్రొఫెనోఫాస్ మందును 5మి.లీ. వేపనూనె 1500 పిపియంతో పాటు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
  - ఈ పురుగు నివారణకు మందుల పిచికారి ఉదయం 10 గంటల లోపు గాని లేదా సాయంత్రం 4గంటల తరువాత చేసుకోవాలి.

**మొక్కజొన్న**

- పంట పూత దశ నుండి గింజ గట్టి పడే దశలో ఉంది
- ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులలో మొక్కలు నేలలోని పోషకాలను గ్రహించలేకపోవడం వలన వడలిపోయినట్లు కనిపించును. నివారణకు 2% యూరియా లేదా 1% పొటాషియం నైట్రేట్ పంటపై పిచికారి చేయవలెను.

**సోయాచిక్కుడు**

- పంట కాయ అభివృద్ధి దశ నుండి పక్వ దశలో ఉంది
- సోయాచిక్కుడులో కాయ ఎండు తెగులు గమనించినట్లయితే, నివారణకు 2.5 గ్రా టెబుకోనజోల్ + సల్ఫర్‌ను లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

**కంది**

- పంట శాఖీయ ధశలో ఉంది
- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కంది పంటలో కాండం ఈగ గమనించినట్లయితే, నివారణకు 1గ్రా. ఎసిఫెట్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి
- కందిలో శనగపచ్చ పురుగు నివారణకు, ఈ క్రింది సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించాలి.
  - శనగ పచ్చ పురుగు లార్వాలను తినుటకు అనుగుణంగా ఎకరాకు 10-15 పక్షి స్థావరాలను ఏర్పరచాలి.
  - శనగ పచ్చ పురుగుల ఉనికిని గమనించుటకు ఎకరాకు 4 లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చాలి.
  - పురుగు గ్రుడ్లు, తొలిదశ లార్వాల నివారణకు, 5 శాతం వేపగింజల కషాయాన్ని పిచికారి చేయాలి.
  - ఉధృతి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు 1.5గ్రా. ఎసిఫేట్ లేదా 2మి.లీ. క్వినాల్ ఫాస్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

**వేరుశనగ**

- వేరుశనగలో పొగాకు లద్దె పురుగు గమనించడమైనది. నివారణకు,
  - జల్లెడ ఆకులు ఏరి పురుగులను నాశనం చేయాలి.
  - ఎకరానికి 10-15 పక్షి స్థావరాలను ఏర్పర్చుకోవాలి.
  - పురుగులు చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు 5శాతం వేపగింజల కషాయం పిచికారి చేయాలి.
  - ఎదిగిన లార్వా నివారణకు 1మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ లేదా 0.2మి.లీ. ఫ్లూబెండమైడ్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

**కూరగాయలు**

- మిరప, టమాట, వంగ మరియు బంతి పంటలను ఎత్తు మడులమీద నారు పోయడం ద్వారా నారుకుళ్ళు తెగులు నివారించవచ్చు.
- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తీగజాతి కూరగాయాలలో బూజు తెగులు ఆశించుటకు అనుకూలం. నివారణకు, 2.5 గ్రా. మాంకోజేబ్ లేదా 2 గ్రా, మెటలాక్సిల్ లేదా 2 గ్రా. కార్బండజిమ్ + మాంకోజేబ్ మిశ్రమ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మిరపలో తామర పురుగులు గమనించడమైనది. నివారణకు, 1.5గ్రా. అసిఫేట్ లేదా 2మి.లీ. ఫిప్రోనిల్ లేదా 0.3గ్రా. థయోమితాక్సం లేదా 1.0గ్రా. డైఫెన్ థయోరాన్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మిరపలో నల్లి (క్రింది ముడత) గమనించడమైనది. నివారణకు, 0.4గ్రా. ఎమమేక్టిన్ బెంజోఎట్ లేదా 1.5గ్రా. డైఫెన్ థయూరాన్ లేదా 1మి.లీ. స్పైరోమేసిఫెన్ లేదా 0.34మి.లీ. ఫెన్ ప్రోపాత్రిన్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

**పశుపోషణ**

- మబ్బుల వాతావరణం ఉండి గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండడం వలన పశువులు నీటిని ఎక్కువగా త్రాగుతాయి, కావున ఎక్కువ ప్రదేశాలలో తగినంత నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కెర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం వీటి నివారణకు, టీకాలు వేయించాలి.
  - గొర్రెలలో చిటుకు మరియు PPR
  - ఆవులు మరియు గేదేలలో గొంతువాపు వ్యాధి సోకుటకు అనుకూలం వీటి నివారణకు, టీకాలు వేయించాలి.
  - గొర్రెలలో మరియు చూడి పశువులకు నట్టల నివారణకు డీవార్మింగ్ చేయవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

# PROFESSOR JAYASHANKAR TELANGANA AGRICULTURAL UNIVERSITY

Agro Climate Research Unit (ACRU),
Centre for Digital Agriculture and Technology,
Rajendranagar, Hyderabad-30.

Bulletin No. XXXVII/79/2026

## WEATHER BASED AGRO ADVISORIES
## FOR TELANGANA STATE

FROM DATE: 02.10.2026 (Saturday) TO 07.10.2026 (Wednesday)

Grameen Krishi Mausam Seva (GKMS Project)

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT, NEW DELHI.

**Weather details of past 3 days:**

During last three days, dry weather prevailed over different parts of the State. The maximum and minimum temperatures ranged between 32ºC to 36ºC and 20ºC to 24ºC respectively.

**Weather forecast for the next 5 days (Based on today's forecast at 1300 hrs):**

As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, dry weather very likely to prevail over different parts of the state during next five days. The maximum and minimum temperatures are likely to range between 32ºC to 35ºC and 22ºC to 25ºC respectively.

## Weather based Agro Advisories

**Paddy**

- Crop is at Panicle Initiation, Flowering to Physiological Maturity stage.
- Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Leaf Folder in Rice. To control, spray Cartap Hydrochloride @ 2 g or Chlorantraniliprole @ 0.3 ml or Flubendiamide @ 0.1 ml per litre of water.
- Incidence of BLB is noticed in rice. To control, spray Plantomycin @ 0.2 g + Copper Oxy Chloride @ 3 g or Agrimycin 0.4g + Copper Oxy Chloride 3 g per liter of water.
- Incidence of Stem Borer is observed in Rice. To control, spray Chlorantraniliprole @ 0.3 ml per liter of water.

**Cotton**

- Crop is at Boll Development to Boll Burst stage.
- Jassids, Thrips incidence is noticed, to control spray Fipronil @2 ml or Diafenthiuron @1.25 g or Flonicamid @ 0.3 g or Sulfoxaflor @ 0.75g + Neem Oil 1500 ppm @ 5ml per litre of water.
- Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Pink Boll Worm in cotton. To control
  - Erect 4 pheromone traps per acre to monitor the moth population.
  - Initiate the control measures, if 7-8 no. of moth catches for 2-3 consecutive days observed.
  - Spray Profenophos @ 2 ml + Neem Oil 1500 ppm @ 5ml per liter of water.
  - Spraying should be done before 10 am or after 4 pm in the evening.

**Maize**

- Crop is at flowering to grain filling stage
- Prevailing dry spell conditions reduces the soil moisture availability and uptake of nutrients by plants and shows wilting symptoms. To minimize the effect, take up foliar spray of 2% urea or 1% potassium nitrate solution on crop plants.

**Soybean**

- Crop is at Pod development stage to physiological maturity stage
- If pod blight disease incidence is noticed spray Tebuconazole + Sulphur @2.5 g per litre of water to control the disease.

**Redgram**

- Crop is at vegetative stage
- Incidence of Stem fly is noticed. To control, spray Acephate @ 1.0 g per litre of water
- To control Helicoverpa in Redgram, adopt the following measures
  - Arrange 10-15 bird perches per acre to facilitate picking up of larvae
  - Arrange 4 pheromone traps per acre to monitor the pest
  - Spray 5 % NSKE to kill the eggs and early instar larvae
  - At initial stages advised to spray Acephate @ 1.5 g or Quinalphos @ 2 ml per liter of water.

**Groundnut**

- Incidence of Spodoptera is noticed in Groundnut. To control,

- Collect and destroy the affected leaves
- Arrange 10-15 bird perches per acre
- Spray 5% Neem oil to control early instar larvae.
- In severe incidence spray Novaluron @ 1ml or Flubendiamide @ 0.2 ml per liter of water.

**Vegetables**

- Take up the nursery of Chillies, Tomato, Brinjal and Marigold on raised beds to avoid damping off.
- Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Downy mildew in Cucurbits/Gourds. To control, spray Mancozeb @ 2.5 g or Metalaxyl @ 1 g or Carbendazim + Mancozeb @ 2 g per liter of water.
- Incidence of Thrips (upward curling) is noticed in chillies. To control, spray Acephate @ 1.5g or Fipronil @ 2 ml or Thiamethoxam @ 0.3g or Diafenthiuron @ 1 g per liter of water.
- Incidence of Mites (downward curling) is noticed in chillies. To control, spray Emamectin Benzoate @ 0.4g or Diafenthiuron @ 1.5 g Spiromesifen @ 1 ml or Fenpropathrin @ 0.34 ml per liter of water.

**Livestock**

- During humid days, animals tend to drink more, so keep multiple water points available.
- Prevailing weather conditions are congenial for the occurrence of
  - Ranikhet disease in poultry, ET and PPR in Sheep
  - Hemorrhagic, Septicemia, Foot and mouth disease in cattle and Buffaloes. To prevent the diseases, vaccinate the animals
  - Deworming in Sheep and Pregnant Buffaloes.

Principal Scientist (Agro) & Head