Imunizações
Doses aplicadas – desde 1994
Notas Técnicas

Origem dos dados

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações - API, sistema este gerido pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde, suas regionais e as Secretarias Municipais de Saúde.

As Secretarias Municipais de Saúde coletam, por meio do Boletim Diário de Doses Aplicadas de Vacinas, os quantitativos de indivíduos vacinados por faixa etária em cada Estabelecimento de Saúde (salas de vacina), consolidando essas informações nos Boletins Mensais, com registro no Sistema API em todas as instâncias.

A base de dados estadual é enviada mensalmente para a CGPNI/DEVEP/SVS/MS, quando então é consolidada a base nacional.

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação

O Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações - API coleta informações dos Boletins de Doses Aplicadas de Vacina.

Por meio da Internet, o DATASUS, em conjunto com a CGPNI, disponibiliza as principais informações para tabulação sobre as Bases de Dados do Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações - API:

Imunos

Tipo de imunobiológico aplicado, conforme a tabela de imunobiológicos.

Doses aplicadas

Número de doses aplicadas.

Ano

Ano de competência. Estão disponíveis os dados a partir de 1994.

Para 1994, não foram fornecidas informações para as seguintes UF: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Para 1995, não foram fornecidas informações para as seguintes UF: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins.

Para 1996, não foram fornecidas informações para a seguinte UF: Minas Gerais.

Local

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região metropolitana – RIDE, território da cidadania, macrorregião PNDR, Amazônia Legal, semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) de aplicação do imunobiológico.

Dose

Tipo de dose aplicada, de acordo com a tabela de imunobiológicos.

Faixa Etária

Faixa etária do indivíduo. A coleta segundo a faixa etária varia de acordo com o imunobiológico aplicado, conforme a tabela de imunobiológicos.

Assim, por exemplo, para BCG, a coleta é feita segundo as seguintes faixas etárias: menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 a 14 anos e 15 ou mais anos, não ocorrendo para as demais categorias. Se for pedida uma tabulação de doses de BCG na categoria de 5 a 9 anos (que é utilizada para Febre Amarela), nenhum registro será selecionado.

Outras formas de obtenção de informações

O DATASUS e a Secretaria de Vigilância em Saúde, por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, colocam à disposição da comunidade diversos meios para obter informações sobre Imunizações:

- No portal do Ministério da Saúde, na SVS, página do PNI, com dados consolidados de coberturas vacinais a partir de 1980;
- Anuário Estatístico, publicação anual, também disponível na Internet;
- Na publicação Programa Nacional de Imunizações - 30 anos;
- Nos Indicadores e Dados Básicos da Saúde;
- Na publicação "Atlas da Saúde do Brasil", da Secretaria de Vigilância em Saúde;
- Também podem ser obtidos dados de 1980 a 1985 e 1989, apenas por estado.

Formas de contato com a CGPNI

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS
Departamento de Vigilância Epidemiológica - DEVEP
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI
Carla Magda Allan Santos Domingues - Coordenadora Geral

(61)3213-8297
SCS Quadra 4, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar
CEP 70304-000 - Brasília, DF

Para maiores esclarecimentos sobre o PNI:
marcelo.chaves@saude.gov.br
(61)3213-8356
erik.silva@saude.gov.br
(61)3213-8340

Formas de contato com o DATASUS

Por correspondência ou ofício:

Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Departamento de Informática do SUS
Coordenação Geral de Disseminação de Informações em Saúde

Rua México, 128, 8º andar
CEP 20.031-142 - Castelo
Rio de Janeiro - RJ

Pela página do Datasus, através do **Fale conosco**.

Imunizações
Tabela de Imunobiológicos

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
BCG (BCG)	1994	1 dose (rotina) Dose 2 (indicações)	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 14 anos, 15 a 59 anos, 60 anos e mais
BCG - Hanseníase (BCG)	1994	1 dose	sem discriminação de idade
Contra Febre Amarela (FA)	1994	1 dose e 1 reforço a cada 10 anos	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Febre Tifoide (FT)	1995	3 doses ou 1 dose e 1 reforço	2 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	1994	4 doses	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 17 anos, 18 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Hepatite A (HA)	2000	2 doses e 1 reforço	1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Hepatite B (HB)	1994	3 doses (4ª dose somente para indicações)	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 10 anos, 11 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Influenza (INF)	2000	Menor de 1 ano a 8 anos: 2 doses em caso de primo vacinação 9 anos e mais: 1 dose	menor de 1 ano, 1 a 2 anos, 3 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Influenza (campanha) (INF)	1999	dose única	60 a 64 anos, 65 anos e mais
Contra Meningococo AC (MnAC)	1994	dose única	2 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Meningococo BC (MnBC)	1995	2 doses	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
Contra Meningococo Conjugada - C (MncC)	2002	3 doses	Menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Pneumococo 23 (Pn23)	1994	1 dose e 1 reforço	2 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Pneumococo Conjugada 7V (Pnc7)	2004	3 doses e 1 reforço de 1 a 4 anos	Menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Raiva Humana	1994 a 2003	3 doses e 1 reforço	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Raiva-Cultivo Celular/Diplóide (RC)	2000	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Raiva-Cultivo Celular/Vero (RV)	2003	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Raiva-Cultivo Celular/Embrionário (RG)	2005	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Rubéola (monovalente)	1995 a 2000	dose única	homens de 12 a 49 anos, não gestantes de 12 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Sarampo (monovalente)	1994 a 2003	2 doses	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 14 anos, 15 a 59 anos, 60 anos e mais
Contra Varicela Zoster (VZ)	2000	Menores de 12 anos: 1 doses Maiores de 12 anos: 2 doses	1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Dupla Adulto (dT)	1994	3 doses e 1 reforço	7 a 11 anos, gestantes de 12 a 14 anos, não gestantes de 12 a 14 anos, homens de 12 a 14 anos, gestantes de 15 a 49 anos, não gestantes de 15 a 49 anos, homens de 15 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 anos e mais
Dupla Infantil (DT)	1994	3 doses e 1 reforços	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos
Dupla Viral (SR)	2000 a 2004	dose única	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 11 anos, homens de 12 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 anos e mais

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
Dupla Viral (mulheres em idade fértil) (SR)	2000 a 2004	dose única	12 anos, 13 a 14 anos, 15 a 16 anos, 17 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos
Dupla Viral (implantação) (SR)	2000	dose única	1 a 11 anos
Dupla Viral (seguimento) (SR)	2000	dose única	1 a 4 anos
Hexavalente (HX)	2006	3 doses	menor de 1 ano
Inativada Contra Poliomielite (VIP)	2000	2 doses e 2 reforços	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 anos e mais
Oral Contra Poliomielite (VOP)	1994	3 doses e 2 reforços	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 anos e mais
Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP)	1994	dose única	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 anos e mais
Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP)	1994	dose única	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 anos e mais
Oral de Rotavírus Humano (RR)	2006	2 doses	menor de 1 ano (entre 6 e 24 semanas de vida)
Pentavalente (DTP+HB+Hib) (Penta)	2003	3 doses	menor de 1 ano
Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA)	2002	3 doses	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos
Toxóide Tetânico	1994 a	3 doses e reforço	7 a 11 anos, gestantes de 12 a 14 anos, não gestantes de 12 a 14 anos, homens de

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
	2000		12 a 14 anos, gestantes de 15 a 49 anos, não gestantes de 15 a 49 anos, homens de 15 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 anos e mais
Tríplice Acelular (DTPa)	2000	3 doses e 2 reforços	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos
Tríplice Bacteriana (DTP)	1994	3 doses e 2 reforços	menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos
Tríplice Viral (SCR)	1995	1 dose 2ª dose (4 a 6 anos)	menor de 1 ano (situação de bloqueio), 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 a 6 anos, 7 a 11 anos, homens de 12 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 anos e mais
Tríplice Viral (campanha) (SCR)	2004	Dose 1 e Dose 2	1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos
Tríplice Viral (mulheres em idade fértil) (SCR)	2002	1 dose	12 anos, 13 a 14 anos, 15 a 16 anos, 17 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos
Imunoglobulina humana anti-Hepatite B (IGHHB)	2000	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Imunoglobulina humana anti-Rábica (IGHR)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Imunoglobulina humana anti-Tetânica (IGHT)	2000	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Imunoglobulina humana anti-Varicela Zoster (IGHVZ)	2000	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
Soro anti-Aracnídico (AC)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Botrópico (BO)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Botrópico-Crotálico (BC)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Botrópico-Laquético (BL)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Botulínico (BTU)	2002	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Crotálico (CR)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Diftérico (SAD)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Elapídico (LP)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Escorpiônico (ES)	2001	De acordo com critérios de	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60

Tipo de imunobiológico	Períodos (a partir de)	Doses	Faixa etária, sexo e condição de gestação
		avaliação médica	anos e mais
Soro anti-Laquético	2001	dose única	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Latrodectus (LT)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Lonomia (LN)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Loxocélico (LX)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Rábico (RB)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais
Soro anti-Tetânico (SAT)	2001	De acordo com critérios de avaliação médica	menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais

Fonte: Programa Nacional de Imunizações

Nota: Os esquemas de doses e público-alvo (estratificação de faixas etárias, sexo e condições de gestação) variam ao longo do tempo. Esta tabela corresponde ao esquema vacinal recomendado; eventualmente, há situações reais ocorridas que não correspondem exatamente a este esquema.