

Chap4

ShangXiaojin

2022 年 12 月 14 日

目录

0.1	Numerical Differentiation and Integration	4
0.1.1	Ex	4
0.1.2	code	4
0.1.3	Ans	4
0.2	Richardson's Extrapolation	5
0.2.1	Ex	5
0.2.2	Ans	5
0.3	Composite Numerical Integration	6
0.3.1	Ex	6
0.3.2	code	6
0.3.3	Ans	7
0.4	Romberg Integration	7
0.4.1	Ex	7
0.4.2	code	8
0.4.3	Ans	9
0.5	Gaussian Quadrature	9
0.5.1	Ex	9
0.5.2	code	9
0.5.3	Ans	10
0.6	Multiple Integrals	10
0.6.1	Ex	10
0.6.2	code	10
0.6.3	Ans	11
0.7	addition	11

0.1 Numerical Differentiation and Integration

0.1.1 Ex

Use the formulas given in this section to determine , as accurately as possible , approximations for each missing entry in the following tables

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.1	-1.709847	
2.2	-1.373823	
2.3	-1.119214	
2.4	-0.9160143	
2.5	-0.7470223	
2.6	-0.6015966	

0.1.2 code

```
tic
format long
X = 2.1:0.1:2.6;
F = -[1.709847 1.373823 1.119214 0.9160143 0.7470223 0.6015966];
dig(X,F)
toc

function k = dig(X,F)
n = size(X,2);
h = X(2) - X(1);
k = zeros(1,n);
for i = 1:n
    if i >= 3 && n-i >= 2
        k(i) = (F(i-2) - 8*F(i-1) + 8*F(i+1) - F(i+2))/12*h;
    elseif i <= 2
        k(i) = (-25*F(i) + 48*F(i+1) - 36*F(i+2) + 16*F(i+3) - 3*F(i+4))/12*h;
    elseif n-i < 2
        k(i) = (25*F(i) - 48*F(i-1) + 36*F(i-2) - 16*F(i-3) + 3*F(i-4))/12*h;
    end
end
end
end
```

0.1.3 Ans

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.1	-1.709847	0.038993
2.2	-1.373823	0.028769
2.3	-1.119214	0.022497
2.4	-0.9160143	0.018378
2.5	-0.7470223	0.015442
2.6	-0.6015966	0.013555

0.2 Richardson's Extrapolation

0.2.1 Ex

- The forward-difference formula can be expressed as

$$f'(x_0) = \frac{1}{h}[f(x_0 + h) - f(x_0)] - \frac{h}{2}f''(x_0) - \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$

Use extrapolation to derive an $O(h^3)$ formula for $f'(x_0)$

- Suppose that $N(h)$ is an approximation to M for every $M > 0$ and that

$$M = N(h) + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + \dots$$

for some constants K_1, K_2, K_3 , use the value $N(h)$, $N(\frac{h}{3})$, and $N(\frac{h}{9})$ to produce an $O(h^3)$

0.2.2 Ans

Ex_1

$$f'(x_0) = \frac{1}{h}[f(x_0 + h) - f(x_0)] - \frac{h}{2}f''(x_0) - \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + O(h^3)$$

let $\frac{h}{2} = h$ such that

$$f'(x_0) = \frac{2}{h}[f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0)] - \frac{h}{4}f''(x_0) - \frac{h^2}{24}f'''(x_0) + O(h^3)$$

$$f'(x_0) = (2) - (1) = (4f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h) - 3f(x_0))/h + \frac{h^2}{12}f'''(x_0) + O(h^3)$$

Similaly, it can be obtained

$$f'(x_0) = (f(x_0 + h) + 32f(x_0 + \frac{h}{4}) - 12f(x_0 + \frac{h}{2}) - 21f(x_0))/h + O(h^3)$$

Ex_2

$$M = N(h) + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + \dots \quad (1)$$

$$N_2(h) = \frac{3N(\frac{h}{3}) - N(h)}{2} \quad (2)$$

$$N_3(h) = \frac{27N(\frac{h}{9}) - 12N(\frac{h}{3}) + N(h)}{16} \quad (3)$$

0.3 Composite Numerical Integration

0.3.1 Ex

Determine the values of n and h required to approximate

$$\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx$$

to within 10^{-4} . Use

- Composite Trapezoidal rule
- Composite Simpson's rule
- Composite Midpoint rule

0.3.2 code

function

- Composite Trapezoidal

```
function t = Com_Trap(f,x,x0,x1,n)
t = subs(f,x,x0) + subs(f,x,x1);
h = (x1-x0)/n;
t1 = 0;
for i = 1:n-1
    t1 = t1 + subs(f,x,x0 + i*h);
end
t = vpa((t + 2*t1)*(h/2));
end
```

- Composite Midpoint

```
function p = Com_mid(f,x,x0,x1,n)
k = (x1-x0)/n;
p = 0;
for i = 1:n
    p = k*subs(f,x,x0+k/2+(i-1)*k) + p;
end
end
```

- Composite Simpson

```

function g = Inte_Simpson(f,x,x0,x1,n)
g = subs(f,x,x0) + subs(f,x,x1);
k = (x1-x0)/n;
g1 = 0;
g2 = 0;
for i = 1:n/2
    g1 = subs(f,x,x0 + (2*i-1)*k) + g1;
end
for i = 1:n/2-1
    g2 = subs(f,x,x0 + 2*i*k) +g2;
end
g = (k/3) * (g + 2*g2 + 4*g1);
end

main body

syms x
f = exp(2*x)*sin(3*x);
real = vpa(int(f,x,0,2));
t = 0;
thate1 = abs(real - vpa(Com_mid(f,x,0,2,144)))
thate2 = abs(real - vpa(Com_Trap(f,x,0,2,205)))
thate3 = abs(real - vpa(Inte_Simpson(f,x,0,2,20)))

```

0.3.3 Ans

Method	n	thate
Mid	144	0.000995
Trap	205	0.000982
Simp	20	0.000669

0.4 Romberg Integration

0.4.1 Ex

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & 0 \leq x \leq 0.1 \\ 1.001 + 0.03(x - 0.1) + 0.3(x - 0.1)^2 + 2(x - 0.1)^3 & 0.1 \leq x \leq 0.2 \\ 1.009 + 0.15(x - 0.2) + 0.9(x - 0.2)^2 + 2(x - 0.2)^2 & 0.2 \leq x \leq 0.3 \end{cases} \quad (4)$$

Apply Romberg integration to the following integrals until $R_{n-1,n-1}$ and $R_{n,n}$ agree to within 10^{-4} .

0.4.2 code

```
clear , clc
```

```
syms x
```

```
f1 = x^3 + 1;
```

```
f2 = 1.001 + 0.03*(x - 0.1) + 0.3*(x-0.1)^2 + 2*(x-0.1)^3;
```

```
f3 = 1.009 + 0.15*(x - 0.2) + 0.9*(x - 0.2)^2 + 2*(x - 0.2)^3;
```

```
t1 = Com_Trap(f1 ,x,0 ,0.1 ,1);
```

```
t2 = Com_Trap(f1 ,x,0 ,0.1 ,2);
```

```
t3= Com_Trap(f1 ,x,0 ,0.1 ,4);
```

```
R1 = [t1 0 0;
```

```
      t2 t2 + 1/3*(t2 - t1) 0 ;
```

```
      t3 t3 + 1/3*(t3 - t2) 0 ];
```

```
R1(3,3) = R1(3,2) + 1/15*(R1(3,2)-R1(2,2));
```

```
t1 = Com_Trap(f2 ,x,0.1 ,0.2 ,1);
```

```
t2 = Com_Trap(f2 ,x,0.1 ,0.2 ,2);
```

```
t3= Com_Trap(f2 ,x,0.1 ,0.2 ,4);
```

```
R2 = [t1 0 0;
```

```
      t2 t2 + 1/3*(t2 - t1) 0 ;
```

```
      t3 t3 + 1/3*(t3 - t2) 0 ];
```

```
R2(3,3) = R2(3,2) + 1/15*(R2(3,2)-R2(2,2));
```

```
t1 = Com_Trap(f3 ,x,0.2 ,0.3 ,1);
```

```
t2 = Com_Trap(f3 ,x,0.2 ,0.3 ,2);
```

```
t3= Com_Trap(f3 ,x,0.2 ,0.3 ,4);
```

```
R3 = [t1 0 0;
```

```
      t2 t2 + 1/3*(t2 - t1) 0 ;
```

```
      t3 t3 + 1/3*(t3 - t2) 0 ];
```

```
R3(3,3) = R3(3,2) + 1/15*(R3(3,2)-R3(2,2));
```

```
R = R1 + R2 + R3
```


0.4.3 Ans

$$\begin{pmatrix} 0.30275 & 0 & 0 \\ 0.30250625 & 0.302425 & 0 \\ 0.3024453125 & 0.302425 & 0.302425 \end{pmatrix} \quad (5)$$

0.5 Gaussian Quadrature**0.5.1 Ex**

Approxiamate the following integrals using Gaussian Quadrature with $n = 2, 3, 4, 5$ to the exact values of the integrals.

- $\int_0^1 x^2 \sin(x) dx$

0.5.2 code

```
clc , clear
```

```
format long
```

```
f = @(x) (1/2)*((x+1)/2)^2*exp(-(x+1)/2);
```

```
t2 = f(-1/sqrt(3)) + f(1/sqrt(3));
```

```
A1=[0.7745966692 0.55555555556
```

```
0.00000000000 0.88888888889
```

```
-0.7745966692 0.55555555556];
```

```
t3 = 0; t4 = 0; t5 = 0;
```

```
for i = 1:3
```

```
    t3 = t3 + A1(i,2) * f(A1(i,1));
```

```
end
```

```
A2=[0.8611363116 0.3478548451
```

```
0.3399810436 0.6521451549
```

```
-0.3399810436 0.6521451549
```

```
-0.8611363116 0.3478548451];
```

```
for i = 1:4
```

```
    t4 = t4 + A2(i,2) * f(A2(i,1));
```

```
end
```

```
A3=[0.9061798459 0.2369268850
```

```
0.5384693101 0.4786286705
```

```
0.00000000000 0.56888888889
```

```
-0.5384693101 0.4786286705
```

```
-0.9061798459 0.2369268850];
```

```
for i = 1:5
```

```

t5 = t5 + A3(i,2) * f(A3(i,1));
end
[t2,t3,t4,t5]

```

0.5.3 Ans

n	P(x)
2	0.159410430966379
3	0.160595386815970
4	0.160602777514260
5	0.160602794113723

0.6 Mutiple Integrals

0.6.1 Ex

Use Algorithm with $n=m=4$, and Gaussian Quadrature with $n=3$ to approximate the following double integrals.

- $\int_0^{0.5} \int_0^{0.5} e^{y-x} dy dx$

0.6.2 code

- Gauss


```

clc , clear

syms x
syms y
f = 1/16 * exp((y-x)/4);
A = [0.7745966692  0.555555555556
0.0000000000  0.88888888889
-0.7745966692  0.555555555556];
f1 = A(1,2) * subs(f,y,A(1,1));
f2 = A(2,2) * subs(f,y,A(2,1));
f3 = A(3,2) * subs(f,y,A(3,1));
g1 = 0; g2 = 0; g3 = 0;
for i = 1:3
    g1 = g1 + A(i,2) * subs(f1,x,A(i,1));
end
for i = 1:3
    g2 = g2 + A(i,2) * subs(f2,x,A(i,1));
end

```

```

for i = 1:3
    g3 = g3 + A(i,2) * subs(f3,x,A(i,1));
end
g = vpa(g1 + g2 + g3)
real = 0.2552519304;
theta1 = abs(real - g)

```

- Simpson

```

clc,clear
syms x
syms y
f = exp(y-x);
A = [];
for i = 1:5
    A = [A subs(f,y,(i-1)*0.125)];
end
M = Inte_Simpson(A(1),x,0,0.5,4) + Inte_Simpson(A(5),x,0,0.5,4);
for i = 2:4
    if mod(i,2) == 0
        M = M+4*Inte_Simpson(A(i),x,0,0.5,4);
    elseif mod(i,2) > 0
        M = M+2*Inte_Simpson(A(i),x,0,0.5,4);
    end
end
Ans1 = vpa((0.125/3)*M)
theta2 = abs(0.2552519304 - Ans1)

```

0.6.3 Ans

Method	outcome	thate
Guass(n=3)	0.25525192651465210169986117556611	0.0000000038853478916375842275193296766305
Simpson	0.25525262154254027459421843780846	0.00000069114254028125677303472302062701

Guass(n=3) is more accurate than Simpson.

0.7 addition