ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

CHRU de Nancy

SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

Apprendre à mieux vivre au quotidien



Avec le programme

ESCLOR

ars Agence Régionale de Santé

Association des Sclérodermiques de France

CHRU NANCY

LARA LORRAINE AFFECTIONS RARES

fai2r

filières de santé maladies rares

Conçu pour vous accompagner tout au long des ateliers d'éducation thérapeutique du patient dédiés à la sclérodermie (ESCLOR), ce livret reprend pas à pas l'ensemble des ateliers qui vous seront proposés au fil de l'année.

Pensez à prendre votre livret pendant les ateliers pour le compléter avec vos notes.

Avec les ateliers d'éducation thérapeutique, ce support complémentaire vous permettra :

- d'ancrer vos connaissances sur la sclérodermie
- d'être plus autonome dans la vie quotidienne en faisant face aux situations difficiles
- de mieux gérer votre stress et vos émotions
- d'être mieux compris par votre entourage
- d'anticiper les situations à risque d'aggravation

Ce livret a été conçu :

Pour la conception graphique : Constance Tahay, étudiante à l'École Nationale Supérieure d'Art et de Design, stagiaire à l'Unité Transversale d'Éducation Thérapeutique (UTEP).

Et par une équipe pluridisciplinaire :

Sonia Guichon, infirmière coordinatrice du programme ETP ESCLOR
Pr Stéphane Zuily, médecin vasculaire coordinateur médical du programme ESCLOR
Dr Emmanuelle Boschetti, pharmacien hospitalier
Corentin Lamant, interne en pharmacie
Dr Emmanuelle Melgar, dermatologue
Dr Shirine Mohamed, médecin interniste
Dr Mickael Noyé, médecin vasculaire
Madeline Voyen, cheffe de projet, UTEP
Elise Colson, cheffe de projet, UTEP

Remerciements pour la relecture :
Nathalie Gwozdecki (déléguée régionale de l'Association des Sclérodermiques de France-ASF)
Gaelle Rivot et Sylvie Bastien (patientes)

Bonne lecture !





Sommaire



1.

La sclérodermie systémique : que sais-je vraiment ?




2.

Vivre avec une sclérodermie systémique : partage d'expérience




3.

Prendre un traitement tous les jours, pourquoi ?



4.

Scléroquizz




5.

Je prends soin de mes mains




6.

Faire de mon miroir mon allié



7.

Atelier ergothérapie



8.

Atelier kinésithérapie



1.

La sclérodermie systémique : que sais-je vraiment ?

Qu’est-ce que la sclérodermie systémique ?

Bonjour Sonia !
Je rencontre des difficultés pour expliquer à mon entourage (amis, famille, collègues) ce qu’est ma maladie : la « **sclérodermie systémique** ».
Comment puis-je la présenter simplement ?





Et bien, c’est une maladie **auto-immune rare** (6000 à 9000 personnes en France), principalement chez les femmes (4 femmes pour 1 homme).
Elle n’est **ni contagieuse**, **ni héréditaire**.
L’âge moyen de début se situe autour de 50 ans.
Elle est caractérisée principalement par le développement d’une **fibrose** qui est à l’origine d’un durcissement de la peau et qui peut toucher les organes comme les poumons, le tube digestif, les reins et le cœur.
Il s’y associe une **atteinte de petits vaisseaux** comme en témoigne le phénomène de Raynaud.

Et que veut dire « maladie auto-immune » ?





Le système immunitaire produisant les défenses de notre organisme (anticorps), s’attaque à nos propres cellules au lieu de lutter contre les infections dues à des virus ou des bactéries. Cela entraine des dégâts sur notre organisme. Cette maladie auto- immune est dite **systémique**, car elle est capable de toucher **plusieurs organes de notre corps**.

Qu’est-ce que la sclérodermie systémique ?

Et quelle est la cause ou les causes de cette maladie ?





On ne connaît pas les mécanismes exacts qui déclenchent la sclérodermie. Ils sont multiples et s’ajoutent les uns aux autres : prédisposition génétique (maladies auto-immunes dans la famille : lupus, thyroïdite, polyarthrite), exposition à certaines **substances toxiques** (silice, solvants organiques).
Certaines professions peuvent être exposées comme les mineurs, les maçons ou encore les personnes intervenant dans l’industrie du verre, de la porcelaine et de la céramique (prothésistes dentaires notamment).
Les sclérodermies systémiques associées à l’exposition à ces produits peuvent être reconnues comme des **maladies professionnelles**.


Mon médecin m’a dit qu’il existait différentes formes de la maladie : pouvez-vous m’en dire plus ?





Il existe la forme de sclérodermie systémique cutanée « **limitée** » : l’atteinte cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des poignets, elle peut toucher le visage mais épargne le thorax. Une autre forme est dite cutanée « **diffuse** », pour laquelle l’atteinte cutanée atteint les bras, les cuisses et/ou le thorax.

Symptômes et manifestations de la sclérodermie systémique



Douleurs articulaires

Fibrose pulmonaire

Phénomène de Raynaud

Calcinose

Fatigue

Pigmentation de la peau

Télangiectasie

Sclérodactylie

Ulcères digitaux

Sécheresse oculaire

Durcissement de la peau

Reflux gastro-oesophagien

Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

Troubles digestifs


Douleurs musculaires

Crise rénale


Rétrécissement des vaisseaux sanguins

Difficultés d'alimentation

Formes de la sclérodermie systémique



Limitée



Diffuse



Notes :



2.

Vivre avec une sclérodermie systémique : partage d’expérience

Vivre au quotidien avec une maladie chronique oblige la personne atteinte à se considérer comme malade et à faire le deuil de sa bonne santé, processus lent, difficile et tout à fait personnel, mais qui se vit aussi avec l'aide de l'entourage (famille, amis).

Chaque malade passera par plusieurs phases et chacun à son rythme. Sans ce véritable travail de deuil, le patient sclérodermique ne cessera de trouver inacceptable ce qui lui est arrivé. Il faut donc apprendre à vivre autrement et aménager son quotidien en fonction de son état de santé.

L'ASF, « l'**Association des Sclérodermiques de France** », est prête à vous écouter et vous accompagner.

Coordonnées :

Standard : 0820 620 615

Avec le dispositif **MonParcoursPsy**, toute personne peut bénéficier de séances remboursées chez un psychologue partenaire.

Site internet : https://monparcourspsy.sante.gouv.fr

Ce dispositif permet d'obtenir un accompagnement psychologique jusqu'à 12 séances remboursées par année civile, sur orientation d'un médecin (généraliste, gynécologue, médecin scolaire, protection maternelle et infantile, etc.).

Comment faire ?

Vous prenez rendez-vous chez un psychologue partenaire :
https://monparcourspsy.sante.gouv.fr/annuaire.

Il faut lui présenter le courrier d'adressage de votre médecin et votre attestation de carte Vitale papier indiquant vos droits (notamment si vous bénéficiez d'une exonération d'avance de frais, ce qui est le cas si les soins sont en lien avec une affection de longue durée). Les séances peuvent être réalisées à distance, à l'exception de la première (entretien d'évaluation).

Si vous devez régler le psychologue, les tarifs sont : 40 € pour la première séance et 50 € pour les suivantes. Aucun dépassement d'honoraire n'est possible. Le psychologue vous remet une feuille de soins. Pour vous faire rembourser, il faut envoyer à votre organisme d'assurance maladie (CPAM etc.), le courrier d'adressage de votre médecin et la feuille de soins complétée par le psychologue. Vous serez alors remboursé par votre organisme d'Assurance Maladie (60 %) et par votre complémentaire ou votre mutuelle (40 %).

Questions fréquentes concernant le dispositif :

- Éligibilité
- Début de parcours
- Accompagnent par le psychologue
- Remboursement
- ...

Retrouvez d'avantage de questions/réponses sur le site :
https://monparcourspsy.sante.gouv.fr/faq?tab=patient

Cartes photolangages

Les cartes photolangages utilisées pendant les séances d'éducation thérapeutique



Paroles de patients

« J'apprécie le déroulement de ces réunions et le dévouement de tous les professionnels de santé qui nous accompagnent pendant ces après-midis "parole/échanges »

« Je pense que ces rencontres avec d'autres patients sont bénéfiques. Cette maladie n'est pas connue et on se sent isolé »

« En parler, c'est déjà s'aider mutuellement »

Paroles de patients extraites des ateliers du programme ETP ESCLOR et du site de la FAI2R

Et vous ?

Indiquez si vous le souhaitez, votre ressenti et expérience à l'issue de l'atelier "vivre avec une sclérodermie, partage d'expérience"




Notes :



3.

Prendre un traitement tous les jours, pourquoi ?

Les symptômes de la sclérodermie systémique



LA PEAU

Fibrose

Démangeaisons

LE SYSTÈME DIGESTIF

Reflux

Troubles de la déglutition

Troubles de vidange gastrique

Constipation

Diarrhée



LE VISAGE

Fibrose
Télangiectasies



LE COEUR

Essoufflement
Palpitations
Douleurs
Fatigue



LES POUMONS

Essoufflement
Toux
Fatigue









LES ARTICULATIONS
LES MUSCLES ET LES TENDONS

Raideur
Douleur
Inflammation

LES MAINS/PIEDS

Raynaud
Douleur
Raideur
Ulcères
Calcinose
Fibrose
Œdème

Mode d’action des médicaments

La prise en charge est multi disciplinaire, coordonnée par les médecins du centre de compétences ou de référence des maladies rares, spécialistes de la sclérodermie, en lien étroit avec le médecin généraliste et les autres spécialistes s’occupant de votre état de santé (pneumologue, cardiologue etc.).


Il est essentiel d'avoir un **suivi régulier** qui doit être au minimum **annuel** au sein du centre de référence ou de compétences. Bien qu'il n'y ait pas de traitement curatif contre la sclérodermie, il existe des traitements efficaces qui aident à atténuer les symptômes et ralentir l'évolution de la maladie.



Phénomène de Raynaud

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D’ACTION DES MÉDICAMENTS
Les inhibiteurs calciques : les « - dipine » • Amlodipine (Amlor®) • Lercanidipine (Lercan®) • Nifédipine (génériques)	• *Hypotension artérielle* • *Œdèmes des membres inférieurs (« jambes gonflées »)* • *Maux de tête*	Relâche les vaisseaux sanguins : on parle de vasodilatation.
Les inhibiteurs des récepteurs à l’endothéline : • Bosentan (Tracleer®)	• *Hypotension artérielle* • *Œdèmes des membres inférieurs (« jambes gonflées »)*	
Autres : • Cures d’Ilomédine intra-veineuse uniquement en hospitalisation en cas d’ulcères digitaux • Cures thermales : thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc / Thermes Avène / Thermes de Royat		

Médicament dit « rétrocédable » c’est-à-dire à retirer dans une pharmacie hospitalière (du CHRU de Nancy ou de l’hôpital proche de votre domicile). Si vous avez un doute sur la disponibilité du produit dans l’hôpital le plus proche de chez vous, vous pouvez contacter le service « rétrocessions » de la pharmacie du CHRU Nancy au 03 83 15 44 65.



Reflux gastro-œsophagien

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : les « - prazole » : • Oméprazole (Mopral®) • Esoméprazole (Inexium®) • Rabéprazole (Pariet®) • Lansoprazole (Ogast®)	• *Maux de tête* • *Flatulences* • *Douleurs abdominales*	Diminue l'acidité gastrique
Anti-histaminique H2 : • Cimétidine compriméseffervescents Arrow	• *Somnolence* • *Maux de tête* • *Etourdissements*	
Les antireflux : • Gaviscon® (= Alginate de Sodium + Bicarbonate de Sodium) • Maalox® reflux		Forme un gel à la surface du contenu de l'estomac avec un effet « barrière »
Les anti-acides : • Phosphalugel® • Gelox® • Xolaam® • Moxydar®	• *Diarrhée* • *Constipation* • *Douleurs abdominales*	Neutralise l'acidité de l'estomac


À la différence des autres traitements évoqués dans le reflux gastro-oesophagien, les IPP sont à prendre tous les jours même en l'absence de symptômes.
Il existe des formes dispersibles (Ogastoro® par exemple) si vous avez des difficultés à avaler les comprimés ou les gélules.

Les comprimés effervescents contiennent du sel. La dose maximale journalière de Cimétidine effervescent est équivalente à 31 % de l'apport quotidien maximal de sel recommandé par l'OMS, ce qui est non négligeable. Si votre apport en sel doit être limité, il faut en tenir compte.

Les anti-histaminiques H2, les antireflux et les anti-acides sont à prendre au moment de l'apparition des troubles ou dans les circonstances pouvant les déclencher.

Les anti-reflux sont à prendre à distance (au moins 2 heures) des autres médicaments car ils diminuent l'absorption donc l'efficacité de nombreux autres médicaments.

Ces médicaments contiennent du sel. Si votre apport en sel doit être limité, il faut en tenir compte.



Blocage gastrique et œsophagien

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Les antagonistes dopaminergiques D2 : • Métoclopramide (Primperan®) • Dompéridone (Motilium®)	• *Maux de tête* • *Etourdissements* • *Palpitations*	Stimule les contractions musculaires intestinales et facilite le passage des aliments dans l'intestin



Syndrôme de Gougerot-Sjögren

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
• Aétholtritione (Sulfarlem®) • Les substituts salivaires : ○ Aequasyal® ○ Xeroleave® ○ Gum hydral® ○ …	• *Troubles digestifs mineurs (diarrhée, flatulence, météorisme)*	Le Sulfarlem® augmente la sécrétion de salive. Les substituts salivaires humectent et hydratent la bouche.
• Celluvisc® • Dulcilarmes® • Gel-larmes® • Lacrifluid® • Refresh® etc.	• *Légers picotements* • *Vision trouble passagère*	Les larmes artificielles lubrifient les yeux pour apporter un confort.



Fibrose pulmonaire

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Les immunosuppresseurs : • Mycophénolate mofétil (Cellcept®) • Azathioprine (Imurel®)	• *Troubles digestifs* • *Anémie* • *Susceptibilité accrue aux infections*	Diminue la réponse immunitaire et présente un effet anti-fibrotique
Les anti-fibrotiques : • Nintedanib (Ofev®)	• *Troubles digestifs* • *Perte de poids, diminution de l'appétit*	Effet anti-fibrotique par blocage de l'activité de cellules responsables du développement de la fibrose pulmonaire

Fibrose de la peau

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Méthotrexate (Imeth®, Metoject® etc.) en forme comprimés ou injectables (sous-cutanée)	• *Diarrhée, nausées* • *Sensibilité accrue aux infections* • *Diminution de l'appétit* • *Troubles du foie et du rein* • *Ulcérations buccales*	Ce médicament diminue la réponse immunitaire.
• Mycophénolate mofétil (Cellcept®)	• *Troubles digestifs* • *Anémie* • *Susceptibilité accrue aux infections*	Lutte contre la fibrose

Méthotrexate en une prise, une fois par semaine (jour fixe à définir), toujours associée à la prise de folates (vitamines B9) décalée de 48h.



Hypertension artérielle pulmonaire

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Les inhibiteurs des récepteurs à l'endothéline : • Bosentan (Tracleer®)	• *Hypotension artérielle* • *Maux de tête* • *Œdèmes des membres inférieurs (« jambes gonflées »* • *Anomalies du foie*	Ces médicaments relâchent les vaisseaux sanguins pulmonaires entrainant une baisse de la pression artérielle dans les artères du poumon.
Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type V : • Sildénafil (Revatio®) • Tadalafil (Adcirca®)	• *Maux de tête* • *Bouffées de chaleur* • *Congestion nasale*	
Agoniste du récepteur de la prostacycline : • Selexipag (Uptravi®)	• *Maux de tête* • *Bouffées de chaleur*	

Le Bosentan interagit avec de nombreux autres médicaments. Veillez à ne pas prendre de médicaments autres que ceux prescrits (automédication) sans l'accord de votre médecin référent



Douleurs articulaires et tendineuses


LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Antalgiques de palier I (contre les douleurs légères à modérées) • Paracétamol (Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan® etc.) • Nefopam (Acupan®)	*Rares cas de toxicité du foie en lien avec des prises trop importantes de Paracétamol*	
Antalgiques de palier II (contre les douleurs modérées à intenses) • Codéine + paracétamol (Codoliprane®, Dafalgan codéine®) • Tramadol + paracétamol (Ixprim®) • Tramadol (Topalgic®, Orozamudol®(ne pas dépasser 400mg par jour de tramadol)	• *Vertiges, confusion* • *Somnolence :* • *Nausées, vomissements* • *Constipation : Prendre un traitement laxatif en systématique lors d'un traitement par antalgique de palier III (morphine, oxycodone)*	
Antalgiques de palier III (contre les douleurs intenses) : • Morphine (Skenan®, Actiskenan®) • Oxycodone (Oxycontin®, Oxynorm®)		
En cas de douleurs inflammatoires invalidantes des articulations avec gonflements (arthrites) et réveil nocturne (sur prescription de votre médecin référent) : • Méthotrexate (Imeth®, Metoject® etc.) en forme comprimés ou injectables (sous-cutanée)	• *Diarrhée, nausées* • *Sensibilité accrue aux infections* • *Diminution de l'appétit* • *Troubles du foie et du rein* • *Ulcérations buccales*	Ce médicament diminue la réponse immunitaire et donc limite l'inflammation.

Si vous avez une prescription de paracétamol dans différents médicaments (Ixprim® et Dafalgan codéine® par exemple) :
- Espacer les prises de paracétamol quel que soit le médicament d'au moins 4h
- Tenir compte de la quantité totale de paracétamol prise sur la journée : maximum 4 grammes en tout par jour (dans certaines situations identifiées par votre médecin, cette quantité sera de 3 grammes par jour).

Ne pas associer des antalgiques de palier II et de palier III : il n'y a pas d'intérêt pour soulager vos douleurs.


Pour le Tramadol, la Morphine et l'Oxycodone :
Les formes à libération prolongée (LP) agissent sur 12h et doivent donc être prises en 2 prises par jour, à 12h d'intervalle.
Les formes dites immédiates peuvent être prises toutes les 4h à 6h en fonction des douleurs

Méthotrexate en une prise, une fois par semaine (jour fixe à définir), toujours associée à la prise de folates (vitamines B9) décalée de 48h.



Constipation

LES MÉDICAMENTS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS	MÉCANISME D'ACTION DES MÉDICAMENTS
Les laxatifs osmotiques : • Macrogol (Transipeg®, Movicol®) • Lactulose (Duphalac®)	• *Flatulences* • *Douleurs abdominales* • *Diarrhée*	Les laxatifs osmotiques conservent le liquide dans les intestins pour ramollir les selles et faciliter le transit.
• Paraffine (Lansoyl®)	• *Diarrhée*	La paraffine liquide agit par action mécanique en lubrifiant le contenu de l'intestin et en ramollissant les selles pour en faciliter l'expulsion.



Démangeaisons/prurit

LES PRODUITS UTILISÉS	LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS LES PLUS FRÉQUENTS
Produits pour hydrater la peau en vente libre : (liste non exhaustive) • Avène® gamme relipidante Xeracalm AD • Ducray® gamme Sensinol • La Roche Posay® gamme Lipikar • CeraVe • Jonzac® gamme Reactive etc. N'hésitez pas à demander conseil à votre dermatologue ou pharmacien qui saura vous orienter vers le produit le plus adapté à vos besoins.	



Ne pas hésiter à essayer différents produits afin de trouver celui qui vous convient le mieux

Pour les médicaments « rétrocédables » :

Votre médecin vous a prescrit des médicaments qui ne sont pas disponibles dans votre pharmacie de ville habituelle car ils suivent une règlementation particulière. La rétrocession se définit comme la dispensation de médicaments par la pharmacie hospitalière à des malades non hospitalisés. Elle est limitée à certains médicaments appelés médicaments « rétrocédables ».
Pour vous procurer ces médicaments, vous pouvez vous rendre à l'un des deux sites de la pharmacie du CHRU de Nancy :

- Pharmacie Brabois,

Adresse : rue du Morvan – 54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex (rez-de-chaussée du bâtiment principal)
Téléphone : 03 83 15 44 65 (de 8h30 à 17h00, du lundi au vendredi)
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi : 8h30 – 17h00
Si vous ne pouvez pas venir pendant les heures d'ouverture, présentez-vous au guichet intitulé « Pharmacie à Usage Intérieur », un service de garde est assuré (7j/7-24h/24). Afin de ne pas surcharger ce service de garde, merci de nous prévenir au préalable afin que vos médicaments puissent être préparés à l'avance par notre équipe de rétrocession

- Pharmacie de la Maternité Régionale de Nancy,

Adresse : 10, rue du Docteur Heydenreich 54000 NANCY
Téléphone : 03 83 34 36 39
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 - 13h et 14h - 17h, le samedi : 9h - 12h

- Une autre Pharmacie Hospitalière ayant une autorisation de rétrocession.
  Si vous habitez en dehors de l'agglomération nancéienne, contactez l'hôpital le plus proche de chez vous afin de savoir s'il est en mesure de vous dispenser ces médicaments. L'équipe de la pharmacie hospitalière du CHRU de Nancy pourra se mettre en contact avec celle de l'hôpital le plus proche de votre domicile pour vous mettre à disposition les médicaments « rétrocédables ».

Si vous ressentez un (ou des) symptôme(s) gênant(s) et que vous pensez qu'il est (sont) peut être en lien avec la prise d'un médicament, il est nécessaire d'en informer votre médecin généraliste / spécialiste référent.
Vous pouvez déclarer un effet indésirable d'un médicament en utilisant le portail de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé :

https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable/comment-declarer-si-vous-etes-patient-ou-usager

Contre-indications et précautions

LE TABAC, JE TROUVE MA MOTIVATION POUR M'EN DÉBARRASSER



Le tabagisme actif est fortement déconseillé chez les patients atteints de sclérodermie systémique. En effet, le tabac est notamment connu pour aggraver le phénomène de Raynaud, augmenter le risque d'agression de vos vaisseaux déjà fragilisés par la sclérodermie systémique, et peut diminuer l'efficacité de certains médicaments.

De plus, le tabac augmente de 100% votre risque de présenter une complication cardiovasculaire grave (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique) à 10 ans. Le tabagisme actif c'est 70 000 morts par an versus 3500 morts / an d'accidents de la route…

Stopper un tabagisme actif c'est réduire de 50% le risque d'infarctus / AVC à 10 ans, c'est réduire les conséquences à type de cancer (sein+++, poumon), c'est stopper l'action nocive du tabac avec un bénéfice sur vos vaisseaux immédiat : En 30 sec après une bouffée de tabac, vos vaisseaux sont atteints, l'arrêt de ce toxique permet de regagner une bonne vitalité de vos vaisseaux immédiatement.

Je sais qu'il faut arrêter, je veux le faire, je peux le faire, à moi de jouer !

Pour vous guider et vous aider dans l'arrêt du tabac :

- Site **Tabac info service**

  https://www.tabac-info-service.fr

- Ligne **téléphonique** de Tabac info service **39 89**

Elle vous met en relation avec des professionnels de l'arrêt du tabac. Vous profitez d'un accompagnement entièrement **gratuit**, avec un **suivi personnalisé**. Vous pouvez appeler quand vous voulez du **lundi au samedi**, de **8h à 20h**. Un conseiller répondra à vos premières questions. Si vous le souhaitez, il vous mettra en relation avec un tabacologue. Ensemble, vous pourrez faire le point sur votre tabagisme et trouver la stratégie d'arrêt qui vous convient le mieux. Ce sera toujours le même tabacologue qui vous accompagnera : vous fixerez avec lui des rendez-vous téléphoniques réguliers. C'est lui qui vous rappellera au moment que vous aurez choisi.

- **L'application** pour Iphone ou Androïd Tabac info service est disponible sur les plateformes de téléchargement.

- Au **CHRU de Nancy,** notre service de Tabacologie est joignable au **03 83 15 83 85**.

PRUDENCE, LES MÉDICAMENTS À NE PAS UTILISER

Les médicaments contenant des substances actives possédant des propriétés vasoconstrictrices (qui entrainent une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins) doivent être évités ou seront prescrits par un spécialiste avec la plus grande prudence chez les patients atteints de sclérodermie.



Quelques exemples de médicaments, « vasoconstricteurs »

- Des médicaments utilisés dans le traitement du **rhume**, disponibles dans les pharmacies de ville **sur ordonnance**, sont **contre-indiqués** avec votre pathologie. Ils contiennent de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine qui sont des vasoconstricteurs. Par voie orale, nous pouvons vous citer : Actifed Rhume®, Actifed Rhume jour et nuit®, Dolirhume®, Dolirhumepro®, Humex Rhume®, Nurofen Rhume®, Rhinadvil Rhume®, Rhinadvilcaps Rhume®, Rhinureflex®, Rhumagrip®

- Il existe des médicaments **sur ordonnance**, luttant aussi contre le **nez bouché** et administrés par voie nasale. Ils contiennent des vasoconstricteurs. Ils ne doivent donc pas être utilisés : Derinox®, Aturgyl®, Pernazene®, Rhino-sulfuryl®, Rhinofluimucil®, Humoxal®.

- Des médicaments luttant contre la **migraine** sont disponibles **sur ordonnance** : les « triptans » (almotriptan, zolmitriptan, rizatriptan etc.), l'ergotamine (Gynergene caféine®) ou la dihydroergotamine (Diergospray®). Ils sont administrés par voie orale ou nasale. En cas de migraine invalidante, ce type de traitement pourra être malgré tout prescrit mais en dernier recours à une dose minimale et avec précaution pour éviter que le phénomène de Raynaud ne s'aggrave.

- L'utilisation de certains bétabloquants dits « non cardiosélectifs » seront évités dans votre cas ou encore les collyres bétabloquants contre le glaucome. En cas de nécessité de prescription d'un béta-bloquant pour une bonne raison (atteinte cardiaque), ce type de traitement pourra être malgré tout prescrit par un cardiologue en connaissance de cause et à une dose minimale pour éviter que le phénomène de Raynaud ne s'aggrave.



→ Corticoïdes

Dans certaines formes de sclérodermie systémique – et au contraire des autres maladies auto-immunes –, l'utilisation de corticoïdes à haute dose risque d'entrainer une **complication sévère et urgente à traiter**, la **crise rénale sclérodermique**. Cette dernière est causée par un rétrécissement soudain des petits vaisseaux sanguins des reins, causant ainsi une diminution aiguë de la circulation de sang à ce niveau et menant rapidement à la perte de la fonction des reins. Parallèlement, une augmentation soudaine et importante de la pression artérielle survient. Les symptômes sont ceux d'une crise hypertensive : maux de tête nouveaux et importants, essoufflement marqué et même dans certains cas une crise d'épilepsie (convulsions).

Les molécules concernées sont par exemple : la prednisone Cortancyl® ou la prednisolone Solupred®.

C'est pourquoi les corticoïdes sont utilisés :

- UNIQUEMENT sur prescription médicale ou après avis auprès du médecin référent de la sclérodermie,
- A une dose ne dépassant pas **15mg/jour** (sauf contrordre de votre médecin référent du centre de référence).

→ Les **anti-inflammatoires non stéroïdien**s également appelés « AINS » (par exemple : diclofénac Voltarène®, **ibuprofène** Advil®, kétoprofène Profenid®, naproxène Apranax®, **l'aspirine** aux posologies permettant le traitement des douleurs ou encore de la fièvre- c'est-à-dire de 1 à 3g/jour -Aspegic® 500, Aspirine du Rhône®) sont à éviter chez les patients atteints de sclérodermie systémique notamment à cause de la présence de reflux gastroœsophagien pouvant être favorisé ou aggravé par la prise de ces derniers.

L'AUTOMÉDICATION : À EVITER


L'automédication se définit comme la prise d'un médicament, disponible avec ou sans prescription médicale, mais pris **sans avis médical**. Elle concerne :

- les médicaments en vente libre en pharmacie,
- les médicaments à base de plantes (phytothérapie),
- les huiles essentielles,
- les compléments alimentaires,
- les teintures-mères.


Toujours demander conseil à votre médecin et/ou votre pharmacien avant la prise de tout traitement. Il sera en mesure de vous dire si vous pouvez le prendre sans risque pour votre santé et s'assurer qu'il n'existe pas d'interactions avec vos traitements.

Ces produits peuvent **interagir** avec les autres médicaments que vous prenez, ce qui peut avoir des conséquences sur l'efficacité, voire la sécurité de votre traitement.
En prenant des médicaments sans avis médical, vous pourriez aussi masquer un symptôme important et cela pourrait entrainer un retard dans votre prise en charge.

Certains **aliments** peuvent aussi interagir avec votre traitement. Le **pamplemousse** par exemple, peut ralentir l'élimination de certains médicaments de votre corps et donc d'augmenter le risque d'apparition d'effets indésirables. Dans ce cas, votre médecin et votre pharmacien vous signaleront l'interaction.



PRÉCAUTIONS LORS DES VOYAGES



En cas de déplacement en **France**, si vous avez oublié d'emporter vos médicaments, vous pouvez avec votre ordonnance, vous les procurer dans n'importe quelle officine de ville. Si vous n'avez pas pris votre ordonnance, le pharmacien prendra contact avec votre pharmacien habituel qui a scanné votre prescription. S'il n'a pas vos médicaments en stock, il les commandera. La plupart du temps, ils seront disponibles dans la 1/2 journée.

Vous pouvez prendre une photo de votre ordonnance avec votre smartphone, ce qui vous permettra de toujours l'avoir avec vous.

En cas de voyage à **l'étranger**, il peut être nécessaire, selon votre état de santé, de discuter avec votre spécialiste pour savoir si le voyage est envisageable ou non, particulièrement si vous avez des problèmes cardiaques et/ou pulmonaires.

Si le voyage est possible, il est nécessaire de vous munir :

- D'un **courrier** de votre spécialiste (en anglais ou dans la langue du pays de destination) stipulant vos antécédents médicaux ainsi que vos traitements actuels en dénomination commune internationale (DCI, c'est-à-dire le nom des molécules). Votre pharmacien peut aussi noter sur l'ordonnance les noms des médicaments en DCI. Ce nom est identique quel que soit le pays de destination à la différence des « noms de fantaisie » qui varient d'un pays à l'autre (exemple : en France, Amlor® = amlodipine - en Allemagne, Norvasc® = amlodipine)
- De votre **dernière ordonnance** (de préférence en 2 exemplaires : par exemple, une dans votre sac et une dans votre valise)
- D'une **carte européenne d'assurance maladie** qui vous permettra d'être pris en charge gratuitement en cas de séjour dans un pays de l'union européenne. Vous pouvez la commander gratuitement sur :

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/votre-carte-vitale-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam/commander-une-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam

- Pensez à souscrire une assurance couvrant les frais médicaux, rapatriements sanitaires et hospitalisations à l'étranger si vous partez dans un pays hors union européenne.

Prévoyez une **quantité de médicaments** supérieure à la durée de votre voyage au cas où vous rencontreriez des problèmes pour revenir en France (intempéries, retard de transport, grève etc.).


Pour éviter tout problème à la douane dû au transport de médicaments vers l'étranger (plus particulièrement si vous êtes sous morphine ou oxycodone catégorisés comme stupéfiant), renseignez-vous concernant les documents à présenter sur le site du ministère des affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Si vous voyagez en **avion**, gardez vos médicaments avec vous, en cabine. Ne pas les mettre en soute pour 2 raisons : il peut y avoir un risque de congélation au cours du vol et pour éviter toute perte des médicaments dans vos bagages.

En cas de **décalage horaire**, vous prendrez vos médicaments à l'heure habituelle dans le pays de vos vacances.
Exemple : Si vous partez à Tokyo et que vous prenez de l'Amlor habituellement à 8h du matin vous le prendrez à 8h du matin heure de Tokyo.
Si vous avez un doute sur la gestion du décalage horaire, vous pouvez prendre contact avec votre équipe d'ETP « ESCLOR ».

Concernant **vaccins et voyage**, vous pouvez contacter le « centre de vaccination - Anti-amarile et conseils aux voyageurs » du CHRU de Nancy au **03 83 15 38 90**, du lundi au vendredi.

AUTOUR DE LA VACCINATION



Le bénéfice de la vaccination, a fortiori chez des sujets fragiles comme c'est le cas dans la sclérodermie, est formellement démontré. Il ne faut donc avoir aucune réticence à se vacciner.

Les vaccinations importantes, comme celles contre le **tétanos**, la **poliomyélite**, la **diphtérie** et la **coqueluche** sont nécessaires. Il est donc justifié de vérifier et de mettre à jour le carnet vaccinal si besoin. Vous pouvez par exemple dédier une consultation avec votre médecin traitant afin d'envisager la vaccination dans son ensemble.

Chez un patient sclérodermique, et plus particulièrement s'il prend des immunosuppresseurs, des corticoïdes ou s'il existe une atteinte pulmonaire, la vaccination contre le **pneumocoque** (au moins 5 ans avant un rappel) et contre la **grippe** (tous les ans) est vivement recommandée.

L'intérêt de la vaccination contre l'**hépatite B** doit être discuté avec votre médecin en fonction de votre situation : immunosuppression, séjour en pays d'endémie.


Si vous êtes traités par un **immunosuppresseur** (methotrexate, cellcept®, rituximab etc.) ou des corticoïdes, les **vaccins vivants atténués** sont **contre-indiqués**.
Ces vaccins sont constitués de germes (virus, bactérie) vivants qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux en gardant leur capacité à induire une protection chez la personne vaccinée. Ce type de vaccins est très efficace mais comme ils contiennent un agent infectieux vivant, ils sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées.

Quelques exemples de ces vaccins :
- Fièvre jaune
- Dengue
- Rougeole, oreillons, rubéole
- Varicelle
- ...

Pour toutes informations complémentaires concernant la vaccination :
https://vaccination-info-service.fr/



Notes :



4.

Scléroquizz

Outil : jeu de plateau



Le jeu de plateau Scléroquizz utilisé pendant les séances d'éducation thérapeutique

Le scléroquizz est un jeu de plateau concernant la sclérodermie. Il se présente un peu comme un **jeu de l'oie** et se joue à plusieurs, par équipe, lors de séances d'ETP (Education Thérapeutique du Patient). Il est constitué de questions concernant la sclérodermie réparties en 4 thématiques : « la maladie chronique », « vivre avec », « les traitements » et « qu'est-ce que c'est ? ». L'animateur(médecin, infirmier) pose les questions. Donner les bonnes réponses permet d'avancer son pion et de gagner. C'est un moment convivial et ludique qui favorise les échanges entre patients et soignants pour en apprendre davantage sur sa maladie et sa gestion au quotidien.

Pour continuer d'apprendre chez soi ou ailleurs, une version numérique du jeu est disponible depuis votre :

Smartphone (scanner le QRcode)
Sur PC : https://scléroquizz.web.app

Photos de la séance d'ETP "Scléroquizz"







L'application mobile Scléroquizz à utiliser seule ou dans le cadre des séances d'éducation thérapeutique






https://mirai-tech.fr



Notes :



5.

Je prends soin de mes mains

Le phénomène de Raynaud

DÉFINITION


Le **phénomène de Raynaud** est l'atteinte la plus fréquente chez les patients atteints de sclérodermie. Il est dû à un spasme réflexe des petits vaisseaux (vasoconstriction = diminution du diamètre des vaisseaux) généralement au niveau des doigts ou des orteils, le plus souvent déclenché par une exposition au froid, un changement de température mais également par les émotions (stress).

Le sang ne passe plus correctement dans les petits vaisseaux : les doigts ou les orteils deviennent donc blancs. Ce phénomène régresse en quelques minutes.

MÉCANISME



Circulation normale



Constriction d'un petit vaisseau sanguin



Blanc à cause du manque de débit sanguin



Bleu à cause du manque d'oxygène



Rouge quand le débit sanguin revient

MESURES DE PRÉVENTION

Mettre en place quelques mesures simples de prévention permet de réduire l'intensité et le nombre de crises.

- se protéger du froid ou des changements de températures brutaux en couvrant toutes les extrémités,
- éviter le refroidissement global de son corps par les portes d'entrée exposées au froid que sont la tête, le cou ou les pieds,
- protéger les mains lors de la manipulation d'objets froids ou humides par le port de gants isolants,
- maintenir son environnement à bonne température,




- Se vêtir en multi-couches.





- Quelques aides ci-dessous



ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS







Certaines substances aggravent le phénomène de Raynaud.
Le tabac, des anti-migraineux (triptans), les bétabloquants, certains médicaments contre le rhume pris par la bouche ou en spray nasal (vasoconstricteurs, voir la partie concernant « Prendre un traitement tous les jours, pourquoi ? »).
Signaler votre phénomène de Raynaud à votre pharmacien afin d'éviter de prendre des médicaments déconseillés, en vente libre.

Les inhibiteurs calciques (les noms des molécules finissant par « -dipine » comme l'amlodipine, la nifedipine ou encore la felodipine) ou le Bosentan (Tracleer©) aident à limiter le phénomène de Raynaud (voir la partie concernant « Prendre un traitement tous les jours, pourquoi ? »).

La sécheresse cutanée (= xérose de la peau) et les démangeaisons (= prurit)

Le traitement de la sécheresse cutanée est essentiellement basé sur l'**hydratation** de la peau en privilégiant les baumes, soin ultra-nourrissant riche en lipides, utilisés quotidiennement en massage. Ils nourrissent en profondeur les peaux sèches et fragiles, participent à la régénération du film hydrolipidique protecteur de la peau, préservent sa souplesse et permettent d'éviter les plaies.
Il existe de nombreuses références mais il faut bannir les produits contenant des parfums ou de l'alcool (éthanol).





PRODUITS HYDRATANTS

À adapter selon l'état de sécheresse de la peau

Plus gras
- CERAT
- BAUME

Plus liquide / Moins gras
- CRÈME
- LAIT

Quelques exemples de produits sont cités ci-dessous (différentes gammes de prix). N'hésitez pas à en tester plusieurs afin de voir celui qui vous conviendra le mieux. Il est possible de se procurer des échantillons en pharmacie ou parapharmacie afin de tester et trouver le produit qui vous procurera le plus de confort.

Tout le corps : (liste non exhaustive)

- CERAT DE GALIEN
- GLYCEROL/PARAFFINE/VASELINE (Dexeryl®)
- XERACALM AD (AD=anti démangeaisons)
- LIPIKAR Baume AP+ (AP=anti prurit)
- CERAVE Baume hydratant
- EXOMEGA Lait Emmolient
- ATODERM INTENSIVE BAUME

Existent souvent en **lait** ou en **baume**

Visage : (liste non exhaustive)

- Tolérance Hydra (Avène®)
- Toleriane Sensitive (La Roche-Posay®)

PRODUITS LAVANTS

Pour nettoyer votre peau sans l'agresser, il est possible d'utiliser des « huiles lavantes » et des « syndets » encore appelés « savons sans savons » ou « pains dermatologiques ».

Exemples : (liste non exhaustive)


- XERACALM Huile lavante (Avène®)
- LIPIKAR Syndet (La Roche-Posay®)
- CERAVE Huile lavante
- EXOMEGA Huile lavante (Aderma®)
- ATODERM Huile de douche (Bioderma®)

Pour faciliter la cicatrisation de plaies superficielles uniquement, vous pouvez utiliser les produits suivants : (liste non exhaustive)

- AQUAPHOR Baume réparateur (Eucerin®)
- CICALFATE PLUS (Avène®)
- CICAPLAST Baume B5 (La Roche-Posay®)
- CICABIO Pommade (Bioderma®)

Une application pluri-quotidienne est nécessaire pour éviter que la peau soit sèche et sensible aux agressions.
Il ne faut pas appliquer une crème sur une plaie ouverte.

Certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie du coût de ces produits dermo-cosmétiques, dans le cadre de votre sclérodermie. N'hésitez pas à prendre contact avec votre mutuelle pour savoir si un remboursement est possible (exemple : forfait annuel). Ils vous diront quels sont les justificatifs à fournir afin de pouvoir prétendre à ce remboursement (exemple : nom du produit noté sur l'ordonnance avec le traitement médicamenteux).




Autres atteintes

TÉLANGIECTASIE




Il s'agit de petites taches rouges localisées à la surface de la peau. Elles sont bénignes et indolores. Elles peuvent poser uniquement aux patients un problème esthétique. Des produits de maquillage peuvent les cacher : utilisation de fond de teint ou d'un stick vert sous le maquillage classique (le vert neutralise le rouge).
En cas de gêne excessive, le recours prudent à un traitement par laser peut être discuté au cas par cas.

CALCINOSE



Elle correspond à une accumulation de cristaux de calcium sous la peau comme du calcaire. Elle peut se compliquer d'ulcérations et de surinfections. La plupart du temps, l'accumulation s'extériorise spontanément. Si besoin, une légère incision en condition stérile est pratiquée par un chirurgien de la main, pour faciliter l'extériorisation de la calcinose, diminuer la douleur et l'infection.

ULCÈRE DIGITAL




Tout traumatisme est à risque d'ulcère digital : micro-traumatisme ou coupure (jardinage ou bricolage sans gants de protection,...), chocs répétés, le fait de se couper les ongles à ras.

Ces ulcères peuvent aussi apparaître spontanément. Afin d'éviter le risque infectieux, des soins locaux en 3 étapes sont nécessaires pour protéger la plaie :


Étape 1 : lavage des mains au savon doux
Étape 2 : tamponner pour sécher les mains
Étape 3 : couvrir et protéger par l'application d'un pansement

Éviter l'usage des antiseptiques qui sont agressifs pour la peau (le savon doux suffit au nettoyage), prévenir votre médecin référent qui vous donnera la conduite à tenir en cas d'apparition d'un ulcère ou d'**évolution défavorable** d'une plaie (rougeurs, chaleur, douleurs, fièvre ou écoulement **purulent**). En effet, un traitement antibiotique et/ou vasodilatateur pour augmenter l'irrigation dans les vaisseaux des doigts (ilomédine) peut être nécessaire pour améliorer la guérison de l'ulcère.

DÉCOUPE D'UN PANSEMENT



POSE D'UN PANSEMENT




L'automassage bien-être

Cet automassage consiste à se masser soi-même en mobilisant doucement les articulations afin de se détendre. Il doit être agréable, bénéfique, et indolore.
Veillez à vous installer dans un endroit calme, avec ou sans une musique d'ambiance. Vous réaliserez ces exercices à votre rythme. Pendant le massage, conservez une respiration profonde et calme.




Notes :



6.

Faire de mon miroir mon allié

Le maquillage-camouflage



2. Utilisez le stick jaune pour les imperfections bleutées




5. Dessinez les sourcils en faisant des petits traits






1. Utilisez une crème de soin hydratante puis une crème de teint compacte



2. Utilisez le stick vert pour les imperfections rouges





3. Superposez la crème de teint compacte sur la correction réalisée avec les 3 sticks




4. Fixez le maquillage avec la poudre mosaïque translucide



7. Colorez les lèvres avec la mine large du duo lèvres et contours



6. Redessinez la bouche avec la mine fine du duo lèvres et contours



2. Utilisez le stick corail pour les imperfections brunes



8. Prolongez la tenue du maquillage en pulvérisant l'eau thermale à environ 20 cm du maquillage

Le matériel nécessaire




Crème de soin hydratante



Crème de teint compacte




Fixateur maquillage



Sticks correcteurs



Crayon correcteur des sourcils



Duo lèvres contours



Eau thermale

Exemples de marques disponibles sur le marché

Il faut prendre soin de sa peau :

- Hydratation pour la rendre plus souple et moins fragile aux agressions extérieures
- Eviter les facteurs irritants et asséchants (soleil, savons autre que syndet cf partie « Je prends soin de mes mains », antiseptiques, parfum, solutions contenant de l'alcool…)
- Choisir les bons produits. En effet, la sclérose de la peau du visage ou la présence de télangiectasies peuvent justifier le recours à un maquillage correcteur doux et non agressif.

Quelques exemples de marques de cosmétiques respectueuses de la peau (liste non exhaustive) :

- Avène® : gamme Couvrance
- La Roche Posay® : gamme Toleriane
- Uriage® : Roséliane CC crème, Hyseac stick anti-imperfections et soin global teinté
- Cosmétiques de la marque Typology, Charlotte bio, Pomponne, The ordinary, Aroma-zone…

Il est possible de se procurer des échantillons en pharmacie ou parapharmacie afin de tester et trouver le produit qui vous procurera le plus de confort.

Tutoriels vidéo


Maquillages couvrants

La Roche-Posay ©

Avène ©



Notes :



7.

Atelier Ergothérapie

Aides

L'ensemble des atteintes musculaires, ostéo-articulaires, vasculaires et dermatologiques liées à la sclérodermie peut limiter les gestes simples de la vie quotidienne. Les **aides techniques** peuvent se révéler utiles pour accomplir les tâches rendues difficiles voire impossibles par la maladie. Les aides techniques utiles sont celles qui vous apporteront un bénéfice réel. Des **orthèses** de fonction ou de repos peuvent être proposées pour soulager les articulations, entretenir les mobilités et lutter contre les déformations.



Couteau ergonomique



Objet qui facilite la préhension d'un stylo



Enfile bouton



Mousse pour faciliter la préhension d'objets



Poignée de porte



Ciseaux ergonomiques




Poignée de porte



Ouvre bocaux



Notes :



8.

Atelier Kinésithérapie

RÉADAPTATION ET MAINTIEN DES FONCTIONS DE LA MAIN

La rééducation et la réadaptation fonctionnelle (capacité à maintenir, grâce à des exercices de kinésithérapie, une bonne fonction de sa main, ses articulations, sa bouche...) font partie du traitement médical des patients atteints de sclérodermie et doivent être prescrites le plus tôt possible dans la prise en charge.

De nombreux exercices d'auto-rééducation (la kinésithérapie réalisée par le patient) rapides et simples pouvant être réalisés en autonomie à domicile de façon quotidienne vous aideront à diminuer la douleur, assouplir et entretenir l'élasticité du derme et des muscles ainsi que la mobilité active des doigts.





AUTO RÉÉDUCATION ET MAINTIEN DE LA FONCTION BUCCALE

La maladie peut également avoir un impact sur l'ouverture de la bouche ainsi que sur les dents. En raison du durcissement de la peau du visage, les lèvres vont se rétracter progressivement entrainant une limitation de l'ouverture de la bouche. Des séances de kinésithérapie visant à corriger cette limitation de l'ouverture buccale peuvent être prescrites de façon à faciliter la réalisation des soins dentaires. Ces exercices de gymnastique faciale sont réalisés chez soi, tous les jours. Avant chaque séance, il convient d'hydrater convenablement les lèvres et commissures labiales.



ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE OU « APA »

Si vous souhaitez reprendre une activité physique importante pour votre bonne santé, des programmes dits « d'activité physique adaptée » existent au plus près de chez vous et peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.

Le dispositif régional **Prescri'mouv** couvre le territoire du Grand-Est et propose une offre locale en APA réalisée par des professionnels de l'activité physique (enseignants en activité physique adaptée, masseurs kinésithérapeutes ou éducateurs sportifs).

Ces professionnels sont formés à la prise en charge des maladies chroniques et capables de vous proposer un accompagnement à la reprise d'activité physique adaptée à vos besoins.

L'accompagnement proposé dans le cadre du dispositif Prescri'mouv est gratuit, à l'exception de l'inscription dans une association ou un club sportif pouvant nécessiter une participation financière dont le montant est défini par chaque structure. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, une prise en charge est possible.
Pour plus d'informations, vous pouvez parler d'APA avec votre médecin ou consulter le site *Prescrimouv, bougez plus pour mieux vivre en Grand Est* (prescrimouv-grandest.fr) ou téléphoner au **03 52 62 64 37**.



Notes :



AIDES ET DÉMARCHES :

Association des Sclérodermiques de France
Déléguée régionale : Nathalie Gwozdecki
Tél : 06 10 56 80 06
Mail : Asf.nathalie@orange.fr

Centre de consultations des pathologies professionnelles
Tél : 03 83 15 71 69
Mail : ccpp@chru-nancy.fr

CONTACTS :

- Centre de référence des Maladies auto-immunes et auto-inflammatoire systémiques rares de l'adulte : **03 83 15 36 14**
- Service de Médecine Vasculaire : **03 85 15 36 14**
- Service de Médecine interne et immunologique clinique : **03 83 15 48 00**
- CHRU de Nancy : **03 83 85 85 85**
- Institut Régional de Réadaptation : Centre Louis Pierquin Nancy : **03 83 52 97 00**

RÉFÉRENCES :

Sclérodermie systémique en 100 questions :

https://www.rhumatismes.net/index.php?p=111&id_bro=24&rub=les100q

Site FAI2R (filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares) :

https://www.fai2r.org/videos-pedagogiques/les-6-minutes-de-la-filiere/sclerodermie/

CHRU de Nancy : une application pour parler de sclérodermie :


https://www.estrepublicain.fr/sante/2022/06/28/chru-de-nancy-une-application-pour-parler-de-la-sclerodermie#:~:text=Lorraine%20CHRU%20de%20Nancy%20%3A%20une,scl%C3%A9rodermie%2C%20une%20maladie%20encore%20m%C3%A9connue.

Lorraine affections rares :

https://www.chu-nancy.fr/index.php/offre-de-soins/maladies-rares-lara

Association des sclérodermiques de France :

https://www.association-sclerodermie.fr





Sclérodermie systémique, apprendre
à mieux vivre au quotidien

Conception et réalisation : Constance TAHAY
Page de couverture : © Service communication CHRU
de Nancy
Édité en avril 2024