

1 平动与圆周运动

1.1 平动

- 位矢: $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$
- 位移: $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$
- 关系: $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$ $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$ $|d\vec{r}| = ds$
- 速度: $\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta\vec{r}/\Delta t = d\vec{r}/dt = dx/dt\vec{i} + dy/dt\vec{j} + dz/dt\vec{k}$
- 加速度: $\vec{a} = d\vec{v}/dt = d^2\vec{r}/dt^2 = d^2x/dt^2\vec{i} + d^2y/dt^2\vec{j} + d^2z/dt^2\vec{k}$

1.2 圆周运动

- 角速度: $\omega = d\theta/dt$
- 角加速度: $\alpha = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2$
- 线加速度: $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$
- 法向加速度: $a_n = v^2/R = R\omega^2$ (指向圆心)
- 切向加速度: $a_t = dv/dt = R\alpha$ (沿切线方向)
- 线速率: $v = R\omega$
- 弧长: $s = R\theta$
- 伽利略速度变换: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$

2 牛顿运动定律与惯性力

2.1 牛顿运动定律

- $\vec{F} = d\vec{p}/dt$, $\vec{p} = m\vec{v}$
- m 为常量时, $\vec{F} = md\vec{v}/dt = m\vec{a}$
- 重力: $\vec{P} = m\vec{g}$
- 弹簧力: $\vec{F} = -k\vec{x}$
- 摩擦力: 滑动摩擦 $f = \mu N$, 静摩擦 $f \leq \mu_s N$

2.2 惯性力

- 平动加速参照系: $\vec{F}_i = -m\vec{a}_0$
- 转动参照系: $\vec{F}_i = m\omega^2\vec{r}$

3 动量与能量

3.1 动量与冲量

- 动量: $\vec{p} = m\vec{v}$
- 冲量: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$
- 动量定理: $d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$, $\vec{p} - \vec{p}_0 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$
- 动量守恒定律: 若 $\vec{F}_{\text{外力}} = \sum_i \vec{F}_i = 0$, 则 $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$ 为常矢量

3.2 功与能

- 功: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, $W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- 一般形式: $W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz$
- 动能: $E_k = (1/2)mv^2$
- 动能定理:
 - 质点: $W_{AB} = (1/2)mv_B^2 - (1/2)mv_A^2$
 - 质点系: $W_{\text{外力}} + W_{\text{内力}} = E_k - E_{k0}$
- 保守力: 做功与路径无关的力
- 保守内力的功: $W_{\text{保守内力}} = -(E_{p_a} - E_{p_b}) = -\Delta E_p$
- 功能原理: $W_{\text{外力}} + W_{\text{非保守内力}} = \Delta E_k + \Delta E_p$
- 机械能守恒: 若 $W_{\text{外力}} + W_{\text{非保守内力}} = 0$, 则 $E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$

4 角动量与刚体转动

4.1 角动量与力矩

- 力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
- 角动量: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$
- 角动量定理: $\vec{M}_{\text{外力}} = d\vec{L}/dt$
- 角动量守恒: 若 $\vec{M}_{\text{外力}} = \sum \vec{M}_{\text{外力}} = 0$, 则 $\vec{L} = \sum \vec{L}_i$ 为常矢量

4.2 转动惯量与刚体转动

- 转动惯量：
 - 离散系统： $J = \sum m_i r_i^2$
 - 连续系统： $J = \int r^2 dm$
- 平行轴定理： $J = J_C + md^2$
- 刚体定轴转动：
 - 角动量： $L = J\omega$
 - 转动定律： $M = J\alpha = dL/dt$
 - 角动量定理： $\int_{t_1}^{t_2} M dt = L - L_0$
 - 力矩的功： $W = \int M d\theta$
 - 功率： $P = dW/dt = M\omega$
 - 转动动能： $E_k = (1/2)J\omega^2$
 - 动能定理： $\int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = (1/2)J\omega^2 - (1/2)J\omega_0^2$

5 静电场

5.1 基本定律

- 库仑定律： $\vec{F} = (1/4\pi\epsilon_0)q_1q_2/r^2\vec{e}_r$
- 场强： $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \int dq/(4\pi\epsilon_0 r^2)\vec{e}_r$
- 高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (1/\epsilon_0) \sum q_i$
- 环路定理： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

5.2 电势与导体

- 电势： $V_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- 带电体电势： $V = \sum V_i = \int dq/(4\pi\epsilon_0 r)$
- 导体静电平衡：
 - 电场：导体内 $\vec{E} = 0$ ，表面 \vec{E} 垂直表面
 - 电势：导体是等势体，表面是等势面
 - 电荷：分布在表面，空腔内有电荷时内表面有等量异种电荷
- 电介质高斯定理： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$

6 磁场

6.1 基本定律

- 毕奥-萨伐尔定律: $d\vec{B} = \mu_0 I d\vec{l} \times \vec{e}_r / (4\pi r^2)$
- 磁场高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
- 安培环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

6.2 典型磁场

- 载流长直导线: $B = \mu_0 I (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) / (4\pi r)$
- 无限长直导线: $B = \mu_0 I / 2\pi r$
- 长直螺线管: $B = \mu_0 n I (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) / 2$
- 无限长螺线管: $B = \mu_0 n I$

6.3 磁力与磁介质

- 洛伦兹力: $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$
- 安培力: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$
- 磁介质:
 - 高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
 - 环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$
 - 本构关系: $\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H} = \mu \vec{H}$

7 电磁感应

- 法拉第定律: $\varepsilon = -d\Phi/dt$
- 动生电动势: $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
- 感生电动势: $\varepsilon = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\iint_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S}$
- 自感: $\Phi = LI, \varepsilon_L = -LdI/dt$
- 自感磁能: $W_m = (1/2)LI^2$
- 互感: $\Phi_2 = MI_1, \varepsilon_2 = -MdI_1/dt$
- 磁能密度: $w_m = (1/2)B^2/\mu = (1/2)\mu H^2 = (1/2)BH$