

Kronhjort

Latinsk navn: *Cervus elaphus*
 Familie: Hjortefamilien
 Orden: Parrettåede, drøvtyggende hovdyr
 Klasse: Pattedyr
 Underrække: Hvirveldyr

Kendetegn

Kronhjortehannen har et stort kroneformet gevir og vejer gennemsnitlig 150 kg, men kan komme helt op på 230 kg. Hunnen har ikke gevir og vejer omkring 90 kg. Skulderhøjden er 120-140 cm. Begge har en lysebrun sommerdragt, mens de er grå om vinteren. Kronhjorte er Danmarks største vildtlevende pattedyr.

Hanhjort med hinder

Forekomst

I Danmark findes kronhjorte vildtlevende i Jylland og på Sjælland, i det øvrige land kun i dyrehaver.

Føde

Kronhjorte lever af mest af græsser og skudspidser af lyng og nåletræer. Desuden spiser de blade af løvtræer og buske, svampe, laver mm.

De kan anrette skade på marker ved at spise af korn og rodfrugter og kan desuden skrælle barken af træstammer og grene.


Drøvtygger

Kronhjortenes føde består af plantedele, der i cellevæggene indeholder kulhydratet cellulose. Cellulose kan ikke nedbrydes af de enzymer pattedyr har i deres fordøjelsessystem. Alligevel sker der en fordøjelse:

Hjorte har ligesom andre drøvtyggere, fx køer, en karakteristisk mave, der er opdelt i fire afsnit – vom, netmave, bladmave og løbe. I vommen findes store mængder af mikroorganismer, bakterier og encellede dyr, der ved hjælp af enzymet cellulase, kan nedbryde den cellulose, som dyret ikke selv kan omsætte. Mikroorganismene lever af de tilførte organiske stoffer, herunder cellulose, og hjorten får dermed omdannet cellulose til stoffer, som den er i stand til at optage. Begge parter har glæde af at leve sammen: det kaldes symbiose.

Når føden er sunket, gylpes den kort efter op igen, gennemtygges og blandes med store mængder spyt. Herved findeles føden og fordøjelsen lettes. Da der ikke er ilt tilstede i vommen, vil der ske en gæring af de organiske stoffer til forskellige organiske syrer. Når disse optages fra vommen til blodet, kan de transporteres ud til cellerne, hvor der er ilt.

drøvtyggermave



Her nedbrydes de videre, og derved frigives energi.

Den findelte føde ledes fra vommen over i netmaven og gennem bladmaven til løben. Løben er det egentlige maveafsnit, hvor føden blandes med fordøjelsvæsker til den sidste nedbrydning. Her nedbrydes nogle af mikroorganismene, idet hjortens mavesyre og enzymer spalter mikroorganismernes proteiner til aminosyrer. Aminosyrerne optages fra hjortens tyndtarm til blodet, der transporter dem ud til cellerne.

Hjorte er tilpasset til hurtigt at indtage en stor mængde føde og derefter finde et godt skjulested, hvor føden kan tygges og fordøjes.

Livscyklus og vækst

I begyndelsen af september kommer de voksne hjorte i brunst. Hanhjortene søger til særlige brunstpladser i hindernes (hunhjorte) område. Den stærkeste han fordriver de andre hanner fra brunstpladsen og prøver samtidigt at lokke hinderne ind i området. En hjort, der forsvaret en brunstplads, kaldes en pladshjort. Pladshjorten brøler for at advare andre hjorte og markerer samtidigt

over for hinderne, at den er parat til at parre sig. På fugtige områder i skoven skraber pladshjorten fordybninger i skovbunden, der er så store, at hjorten kan ligge i hullet. Den danner et såkaldt søle ved at vand og mudder blandes med sæd og duftstoffer, som hjorten ruller sig i. Den får derved en stærk lugt, der antagelig tiltrækker hunnerne, og gør den mere imponerende over for rivaler.

Hjorten holder flokken af hinder sammen og søger at holde andre hanner borte. Direkte kampe mellem rivaler forekommer normalt kun mellem jævnbyrdige modstandere, selv her bliver det ofte kun til en demonstration af kraft ved at jorden pløjes op og ved megen brølen. Føler en hjort sig underlegen vil den vige pladsen uden kamp.

Hindens brunst er kortvarig antagelig er den kun parringsvillig i ganske få timer, men i dagene forud udsender hinden en særlig brunstfært (lugt), der gør hannen interesseret. Efter parringen er hinden drægtig i 227-241 dage, og kalven bliver født i maj-juni, hvor der er rigelig føde.

Tilpasning og betydning i økosystemet

Kronhjorte lever i flokke, som på åbent terræn kan bestå i et stort antal dyr, men normalt består en flok af 8-10 dyr eller endnu færre. Flokken giver tryghed og yder beskyttelse mod fjender. En flok af kronbjør af sætter duftspor i vegetationen og i luften omkring sig fra duftkirtler på foden og ved halen. Hvis et dyr kommer væk fra flokken, kan det hurtigt få farten af duftsporet og finde tilbage til flokken.

En erfaren moderhind er fører i flokken. Hinderne og de yngre dyr

færdes i det bedste terræn, hvor der er mest føde og dækning, mens de ældre hanner uden for brunsttiden holder sig borte fra flokken og ofte lever i mere ugunstige fødeområder.

Hjortene er natdyr, der har størst aktivitet i morgen- og aftentimerne, hvor de søger deres føde. Det er de tider på døgnet, hvor hjortene bemærkes mindst af deres fjender, hvilket spiller en rolle, når der er kid i flokken.

Hjorte er flere år gamle før de opnår den styrke og gevirudvikling, der tillader dem at have en brunstplads. Derfor er det kun nogle få af hannerne, der parrer sig med hinder. Desuden er deres fødebetingelser ikke optimale, idet de bliver skubbet ud i yderområderne af de ældre hjorte. Der sker således en naturlig udvælgelse af de sundeste dyr. Ved at undgå stor konkurrence om føde og terræn kan det bevirke, at et område kan rumme en større bestand, end det ellers ville være tilfældet: områdets bæreevne forøges.

Kronhjorte er imponerende og smukke dyr, som vi kan glæde os over især i dyrehaver, hvor de ikke er sky over for mennesker. Men deres kød kan også anvendes. En del dyr skydes for at regulere bestanden, og kødet kan anvendes til lækker mad. Netop hjortekød er en stor delikatesse, som mange sætter pris på. Derfor er man også begyndt at holde kronhjorte i hjortefarme. De kan græsse på arealer, der ikke kan dyrkes, og derved kan nye områder inddrages i landbruget. Man skal dog være opmærksom på, at der kan ske smitteoverførsel af sygdomme, som kan overføres mellem vilde og opdrættede hjorte og derfor sørge for en skarp adskillelse af disse.

