

SORBONNE UNIVERSITÉ

TRAVAUX D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE

---

# Autour du théorème de Dvoretzky

---

*"It soon became clear that an outstanding breakthrough in Geometric Functional Analysis had been achieved."*

Vitali Milman à propos du théorème de Dvoretzky dans *Dvoretzky theorem - thirty years later*

Mathieu GALLO

*Enseignant* : Omer Friedland

date

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>1 Préliminaire</b>	<b>5</b>
1.1 Mesures de Haar . . . . .	5
1.2 Concentration de la mesure . . . . .	6
1.3 Ellipsoïdes . . . . .	10
1.4 Loi gaussienne . . . . .	12
<b>2 Démonstration du théorème de Dvoretzky</b>	<b>13</b>
2.1 Lemmes d'approximations . . . . .	13
2.2 Démonstration du théorème de Dvoretzky . . . . .	16
<b>3 Sections presque euclidiennes de <math>\ell_p^n</math></b>	<b>19</b>
3.1 cas $1 \leq p < 2$ . . . . .	20
3.2 cas $2 \leq p < \infty$ . . . . .	20
3.3 cas $p = \infty$ . . . . .	22
<b>A - Inégalité de Prékopa-Leindler</b>	<b>24</b>
<b>B - Martingales &amp; Inégalité de Khinchine</b>	<b>27</b>

## INTRODUCTION

---

Le mémoire suivant suit la série de lectures de Gideon Schechman , "Euclidean sections of convex bodies" [1].

Alexandre Grothendieck en 1956 dans son article "Sur certaines classes de suites dans les espaces de Banach et le théorème de Dvoretzky-Rogers" [2], inspiré par le lemme de Dvoretzky-Rogers (1950) propose une conjecture à laquelle Aryeh Dvoretzky répondra positivement en 1961, aboutissant au résultat suivant :

**Théorème 1** (A. Dvoretzky, 1961). Il existe une fonction  $k : ]0, 1[ \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , tel que  $\forall \varepsilon \in ]0, 1[$ ,  $k(\varepsilon, n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout compact convexe symétrique  $K \subset \mathbb{R}^n$ , il existe  $V \underset{\text{s.e.v}}{\subset} \mathbb{R}^n$  tels que :

- (i)  $\dim V = k(\varepsilon, n)$
- (ii)  $\exists r > 0$  tel que ,  $r.(V \cap B_2^n) \subset V \cap K \subset (1 + \varepsilon)r.(V \cap B_2^n)$

Dans le papier original de Dvoretzky l'estimation de  $k$  était :

$$k(\varepsilon, n) \geq c(\varepsilon) \sqrt{\frac{\log n}{\log \log n}} \quad \text{pour un } c(\varepsilon) > 0$$

Vitali Milman en 1971 donna une nouvelle preuve du théorème de Dvoretzky en utilisant le phénomène de concentration de la mesure [3], il a de plus amélioré le théorème en donnant l'estimation de la dépendance en  $n$  pour la dimension de  $V$  :  $k(\varepsilon, n) \geq c(\varepsilon) \cdot \log(n)$ .

**Théorème 2** (V. Milman, 1971). Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe une constante  $c > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout compact convexe symétrique  $K \subset \mathbb{R}^n$ , il existe  $V \underset{\text{s.e.v}}{\subset} \mathbb{R}^n$  tels que :


- (i)  $\dim V \geq c \cdot \log(n)$
- (ii)  $\exists r > 0$  tel que ,  $r.(V \cap B_2^n) \subset V \cap K \subset (1 + \varepsilon)r.(V \cap B_2^n)$

La dépendance de  $c$  par rapport à  $\varepsilon$  donné par V.Milman était  $c \sim \frac{\varepsilon^2}{\log \frac{1}{\varepsilon}}$  [3], c'est cette dépendance qui sera démontrée dans ce mémoire. Y.Gordon a montré en 1988 l'on pouvait prendre  $c \sim \varepsilon^2$  avec les mêmes outils que V.Milman dans [4], plus récemment en 2006, G.Schechtman a montré que l'on pouvait prouver le théorème de Dvoretzky avec la même preuve que V. Milman pour  $c \sim \varepsilon^2$  en construisant de manière plus précise le  $\theta$ -net [5] (voir preuve de **théorème 2.4**) .

**Notation.** Pour la suite on utilisera les notations :

- $|\cdot|_n$  la norme euclidienne sur  $\mathbb{R}^n$ , ou  $|\cdot|$  si il n'y a pas d'ambiguïté sur la dimension.
- $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n ; |x| = 1\}$ , la  $(n-1)$ -sphère euclidienne.

Commençons par donner une légère interprétation géométrique du théorème, prenons l'exemple de  $K = B_{\|\cdot\|_\infty}$  dans le cas  $n = 2$  la distance entre un point situé sur un quart du cercle et le coin le plus proche est  $\sqrt{2} - 1$ , nous pouvons facilement généraliser cela pour  $n > 2$ . Prenons par exemple les points  $A = (\frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}) \in S^{n-1}$  et  $B = (1, \dots, 1) \in \partial B_\infty^n$  le coin de  $B_\infty^n$  le plus proche de  $A$ , on peut joindre  $A$  aux points  $e_j \in \partial B_\infty^n \cap S^{n-1}$  de la base canonique pour  $1 \leq j \leq n$ , et on a les distances suivantes :




$$|A - e_j| = \sqrt{2(1 - \frac{1}{\sqrt{n}})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{2}$$

$$|e_i - e_j| = \sqrt{2} \text{ pour } i \neq j$$

$$|A - B| = \sqrt{n} - 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

$$|e_j - B| = \sqrt{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Donc lorsque  $n$  est grand, si l'on se place sur la  $(n-1)$ -sphère euclidienne,  $B_\infty^n$  semble être formé de  $2^n$  "piques" qui sont de plus en plus grands avec  $n$ . Mais le théorème de Dvoretzky nous affirme qu'il existe une section  $C$  de  $B_\infty^n$  de dimension supérieure à  $c \log n$  où  $c$  ne dépendant



pas de  $n$ , tel que  $C$  soit arbitrairement proche de la boule euclidienne, c'est-à-dire une section sur laquelle on ne voit pas ces "piques". En terme plus mathématique, pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $V \subset \mathbb{R}^n$  s.e.v de dimension plus grande que  $c(\varepsilon) \log n$  tel que pour un certain  $r > 0$  :

$$r.(V \cap B_2^n) \subset V \cap B_\infty^n \subset (1 + \varepsilon)r.(V \cap B_2^n)$$

Nous allons maintenant donner une reformulation du théorème de Dvoretzky en terme de norme, en utilisant la relation entre un compact convexe symétrique  $K$  et la norme  $\|y\|_K = \inf\{\lambda ; \frac{y}{\lambda} \in K\}$ .

**Définition.** Soit  $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$  deux espaces normés et  $C > 0$ , on dit que  $X$  s'injecte  $C$ -continûment dans  $Y$ , si il existe  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  tel que pour tout  $x \in X$

$$\|x\|_X \leq \|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X$$

**Théorème 3.** Pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $c > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour toute normes  $\|\cdot\|$  sur  $\mathbb{R}^n$ ,  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1 + \varepsilon)$ -continûment dans  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  pour un  $k \geq c \cdot \log(n)$ .

Montrons que le **théorème 2** et le **théorème 3** sont équivalents.

(2) $\Rightarrow$ (3)

Posons  $K = \text{Adh}(B_{\|\cdot\|}(\mathbf{0}, 1)) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$  et appliquons le théorème 2, celui-ci nous procure un sous-espace  $V$  de  $\mathbb{R}^n$ , avec  $\dim V := k \geq c \cdot \log(n)$  et  $V \cap K$  est  $\varepsilon$ -euclidien. Donnons-nous une base orthonormée  $\{v_j\}_{1 \leq j \leq k}$  de  $V$  et posons

$$T: \begin{array}{ll} (\mathbb{R}^k, |\cdot|_k) & \mapsto (V, \|\cdot\|) \\ \sum_{i=1}^k x_i e_i & \rightarrow \sum_{i=1}^k x_i v_i \end{array}$$

Soit  $x \in \mathbb{R}^k$  tel que  $\|Tx\| = 1$ , comme  $K \cap V$  est  $\varepsilon$ -euclidien on a que

$$r \leq |Tx|_n \leq (1 + \varepsilon)r, \text{ pour un } r > 0$$

Remarquons que  $|Tx|_n = |x|_k$ , donc

$$r \leq |x|_k \leq (1 + \varepsilon)r$$

Il suffit d'appliquer cela à  $\frac{x}{\|Tx\|}$  pour  $x \neq 0$

$$r\|Tx\| \leq |x|_k \leq (1 + \varepsilon)r\|Tx\|$$

$$\frac{1}{(1 + \varepsilon)r} |x|_k \leq \|Tx\| \leq \frac{1}{r} |x|_k$$

$$r|x|_k \leq \|\tilde{T}x\| \leq (1 + \varepsilon)r|x|_k$$

avec  $\tilde{T} = r(1 + \varepsilon)T$ , remarquons que la quantité importante est  $\|T\| \cdot \|T^{-1}\| = \|\tilde{T}\| \cdot \|\tilde{T}^{-1}\| \leq 1 + \varepsilon$ .

(3) $\Rightarrow$ (2)

Soit  $\varepsilon > 0$ , par le théorème 3 il existe  $c > 0$  tel que pour tous  $n \in \mathbb{N}$  il existe un  $k > c \cdot \log(n)$  et  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1 + \varepsilon)$ -continûment dans  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  pour n'importe quelle norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathbb{R}^n$ . Considérons un compact convexe symétrique  $K \subset \mathbb{R}^n$  et  $\|y\| = \inf\left\{\lambda > 0; \frac{y}{\lambda} \in K\right\}$ , alors  $\exists T: \ell_2^k \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  linéaire tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^k, |x| \leq \|Tx\| \leq (1 + \varepsilon)|x|$$

ceci implique immédiatement que  $T$  est injective, notons  $V = \text{Im} T$ , alors la co-restriction à  $V$  de  $T$  est bijective. Soit  $y \in \partial(K \cap V)$ , c'est-à-dire  $\|y\| = 1$ , on sait qu'il existe un unique  $x \in \mathbb{R}^k$  tel que  $Tx = y$ , on en déduit donc

$$|x| \leq 1 \leq (1 + \varepsilon)|x| \iff \frac{1}{1 + \varepsilon} \leq |x| \leq 1$$

Donc  $y \in T(B_2^k) \Rightarrow \frac{y}{1+\varepsilon} \in K \cap V$  et  $\frac{y}{1+\varepsilon} \in K \cap V \Rightarrow y \in T(B_2^k)$  et finalement :

$$\frac{1}{1+\varepsilon} T(B_2^k) \subset K \cap V \subset T(B_2^k)$$

Pour conclure nous nous référençons au **lemme 1.6** qui sera démontré par la suite qui dit que toutes ellipsoïdes de dimension  $k$  admettent une section de dimension  $[k/2]$  qui soit un multiple d'une boule euclidienne.

## 1 PRÉLIMINAIRE

---

### 1.1. MESURES DE HAAR

La mesure de Haar est une notion introduite par Alfred Haar en 1933, il démontre que dans tout groupe localement compact à base dénombrable il existe une mesure borélienne invariante par translation à gauche, en 1935 John V. Neumann montre que de plus cette mesure est unique à un coefficient multiplicatif près, nous admettons le théorème suivant (voir [9]).

**Définition & Théorème** (Mesures de Haar). Soit  $(X, d)$  un espace métrique,  $G$  un groupe topologique localement compact qui agit sur  $X$  et tel que :

$$\forall x, y \in X \quad \forall g \in G, \quad d(gx, gy) = d(x, y) \quad (\star)$$

alors il existe une unique mesure à un coefficient multiplicatif près, régulière définie sur les boréliens de  $X$  qui est invariante sous l'action de  $G$ , cette mesure est appelée mesure de Haar de  $X$  (où  $G$  est sous-entendu).

Les deux exemples suivants d'espace métrique vérifient  $(\star)$  pour  $G = O(n)$ ,

- (i)  $X = S^{n-1}$  muni de la distance euclidienne
- (ii)  $X = O(n)$  avec la norme  $\|T\| = \sup_{|x|=1} |Tx|$

**Notation.** Par le théorème précédent on peut définir sans ambiguïté  $\mu$  et  $\nu$  les mesures de Haar normalisées respectivement sur  $S^{n-1}$  et  $O(n)$ .

Montrons quelques propriétés qui seront utiles par la suite.

**Lemme 1.1.** Soit  $f \in C(S^{n-1})$  et  $Y = (g_1, \dots, g_n)$  où les  $\{g_i\}_{1 \leq i \leq n}$  sont i.i.d suivant une loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ , alors

$$\int_{S^{n-1}} f d\mu = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{Y}{|Y|} \right) \right]$$

*Démonstration.* Par unicité de la mesure de Haar , il nous suffit de montrer que pour tous  $M \in O(n)$  et  $f \in C(S^{n-1})$  :

$$\mathbb{E} \left[ f \left( \frac{MY}{|MY|} \right) \right] = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{Y}{|Y|} \right) \right]$$

$$\mathbb{E} \left[ f \left( \frac{MY}{|MY|} \right) \right] = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} f \left( \frac{My}{|y|} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2}|y|^2 \right\} dy_1 \dots dy_n = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{1}{|\det M|} f \left( \frac{y}{|y|} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2}|M^{-1}y|^2 \right\} dy_1 \dots dy_n$$

comme  $|\det M| = 1$  et  $|M^{-1}y| = |y|$ , on a :

$$\mathbb{E} \left[ f \left( \frac{MY}{|MY|} \right) \right] = \mathbb{E} \left[ f \left( \frac{Y}{|Y|} \right) \right]$$

□

**Lemme 1.2.** Soit  $A \subset S^{n-1}$  un borélien alors pour tous  $x \in S^{n-1}$

$$\nu(T \in O(n) ; Tx \in A) = \mu(A)$$

*Démonstration.* Soit  $M \in O(n)$  et  $x \in S^{n-1}$  alors  $\omega_x$  définie par

$$\omega_x(A) = \nu(T \in O(n) ; Tx \in A)$$

vérifie les propriétés suivantes :

$$\omega_x(MA) = \nu(T \in O(n) ; M^T Tx \in A) = \nu(T \in O(n) ; Tx \in A) = \omega_x(A)$$

$$\omega_x(\emptyset) = 0$$

$$\begin{aligned} \omega_x \left( \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) &= \nu \left( T \in O(n) ; Tx \in \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \nu \left( \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} \{T \in O(n) ; Tx \in A_i\} \right) \\ &= \sum_{i \in \mathbb{N}} \nu(T \in O(n) ; Tx \in A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \omega_x(A_i) \end{aligned}$$

L'unicité de la mesure de Haar nous permet de conclure que  $\omega_x = \mu$ , en particulier  $\omega_x$  ne dépend pas de  $x$ . □

## 1.2. CONCENTRATION DE LA MESURE

Le phénomène de concentration de la mesure a été mis en avant par V.Milman étendant les travaux de P.Lévy et son inégalité isopérimétrique. On peut formuler la question que cherche à résoudre le théorème comme cela : étant donné  $(X, d)$  un espace métrique muni d'une mesure de probabilité  $P$ , on cherche à regarder où les fonctions 1-Lipschitziennes sont essentiellement

constantes. Considérons  $f$  une fonctions 1-Lipschitzienne de  $X$  dans  $\mathbb{R}$  et notons  $m_f$  sa médiane, c'est a dire le réel tel que

$$P(f \geq m_f) \geq \frac{1}{2} \quad \& \quad P(f \leq m_f) \geq \frac{1}{2}$$

L'assertion  $f$  est essentiellement constante se traduit par le faite que l'on puisse donner une borne supérieur à  $P(|f - m_f| \geq \varepsilon)$ , pour  $\varepsilon \geq 0$ .

Pour un ensemble  $A$  et  $\varepsilon > 0$  on définit son  $\varepsilon$ -élargissement  $A_\varepsilon$  par :

$$A_\varepsilon = \{x \in X ; d(x, A) \leq \varepsilon\}$$

Dans la suite on montre une égalité de concentration sur la sphère.

**Théorème 1.3.** Soit  $A \in \text{Bor}(S^{n-1})$  tel que  $\mu(A) \geq \frac{1}{2}$ , alors pour tous  $t > 0$  :

$$\mu(A_t) \geq 1 - 2e^{-\frac{nt^2}{4}}$$

*Démonstration.* Si  $t > 2$  alors  $A_t = S^{n-1}$ , on peut donc supposer  $t < 2$ . Soit  $x \in A$  et  $y \in A_t^c$  alors

$$\begin{aligned} \left| \frac{x+y}{2} \right|^2 &= \frac{|x|^2}{2} + \frac{|y|^2}{2} - \left| \frac{x-y}{2} \right|^2 = 1 - \frac{|x-y|^2}{4} \\ &\leq 1 - \frac{t^2}{4} \end{aligned}$$

or

$$\left(1 - \frac{t^2}{8}\right)^2 = 1 - \frac{t^2}{4} + \frac{t^4}{8^2} \geq 1 - \frac{t^2}{4}$$

et donc

$$\left| \frac{x-y}{2} \right| \leq 1 - \frac{t^2}{8}$$

Posons

- $\tilde{A} = \{ax ; a \in [0, 1], x \in A\}$
- $\tilde{B} = \{ax ; a \in [0, 1], x \in A_t^c\}$

et donnons nous  $X = ax \in \tilde{A}$  et  $Y = by \in \tilde{B}$ , dans le calcul qui suit le rôle de  $a$  et  $b$  sont symétrique fixons alors  $a \leq b$ ,

$$\begin{aligned} \left| \frac{X+Y}{2} \right| &= \left| \frac{ax+yb}{2} \right| \\ &= b \left| \frac{\frac{a}{b}x+y}{2} \right| \\ &\leq \left| \frac{a}{b} \left( \frac{x+y}{2} \right) + \left( 1 - \frac{a}{b} \right) \frac{y}{2} \right| \\ &\leq \frac{a}{b} \left| \frac{x+y}{2} \right| + \left( 1 - \frac{a}{b} \right) \left| \frac{y}{2} \right| \end{aligned}$$



Or pour  $t \leq 2$

$$1 - \frac{t^2}{8} \geq \frac{1}{2} = \left| \frac{y}{2} \right|$$

et donc

$$\left| \frac{X+Y}{2} \right| \leq 1 - \frac{t^2}{8}$$

c'est-à-dire,

$$\frac{\tilde{A} + \tilde{B}}{2} \subset \left(1 - \frac{t^2}{8}\right) B_2^n$$

Remarquons que  $\mu$  peut s'exprimer géométriquement comme  $\mu(C) = \frac{\lambda(\{tx; t \in [0,1], x \in C\})}{\lambda(B_2^n)}$ , pour  $C$  un borélien de  $S^{n-1}$ . Donc  $\mu(A) = \frac{\lambda(\tilde{A})}{\lambda(B_2^n)}$ , par l'inégalité de Brunn-Minkowsky (**corollaire A.3**)

$$\left(1 - \frac{t^2}{8}\right)^n \lambda(B_2^n) \geq \lambda\left(\frac{\tilde{A} + \tilde{B}}{2}\right) \geq \sqrt{\lambda(\tilde{A})\lambda(\tilde{B})} = \lambda(B_2^n) \sqrt{\mu(A)\mu(A_t^c)}$$

Or  $\sqrt{\mu(A)\mu(A_t^c)} \geq \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \mu(A_t))}$  et finalement :

$$\mu(A_t) \geq 1 - 2\left(1 - \frac{t^2}{8}\right)^{2n} \geq 1 - 2e^{-\frac{t^2 n}{4}}$$

□

Le corollaire qui suit est fondamentale dans la démonstrations du théorème de Dvoretzky.

**Corollaire 1.4** (concentration de la mesure sur la sphère). Pour tout  $t > 0$  et toute fonction  $f$ ,  $L$ -Lipschitzienne de  $S^{n-1}$  dans  $\mathbb{R}$  pour un  $L > 0$  on a :

$$\mu\{|f - \mathbb{E}[f]| > t\} \leq 4e^{-\beta \frac{t^2}{L^2}}$$

où  $\mathbb{E}[f] = \int_{S^{n-1}} f d\mu$  et  $\beta > 0$  une constante universelle.

*Démonstration.* Commençons par le montrer pour  $L = 1$ , donnons nous  $m_f$  une médiane de  $f$  et posons  $A = \{f \leq m_f\}$ , alors

$$\begin{aligned} x \in A_t &\Rightarrow \exists y \in A, d(x, y) < t \\ &\Rightarrow |f(x) - f(y)| < Lt = t \\ &\Rightarrow f(x) - m_f \leq f(x) - f(y) + f(y) - m_f \\ &\Rightarrow f(x) \leq m_f + t \end{aligned}$$

donc  $A_t \subset \{f \leq m_f + t\} \iff \{f > m_f + t\} \subset A_t^c$ ,

$$\mu(f > m_f + t) \leq \mu(A_t^c) \leq 2e^{-\frac{t^2 n}{4}}$$

En appliquant exactement le même procédé avec  $A = \{f \geq m_f\}$  et on obtient :

$$\mu(f < m_f - t) \leq 2e^{-\frac{t^2 n}{4}}$$

Il nous faut maintenant remplacer la médiane par  $\mathbb{E}[f]$ , on a l'inégalité suivante :

$$\begin{aligned} |m_f - \int_{S^{n-1}} f d\mu| &\leq \int_{S^{n-1}} |m_f - f| d\mu \\ &\leq \int_0^{+\infty} \mu(|m_f - f| > t) dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} 4e^{-\frac{t^2 n}{4}} dt = 4\sqrt{\frac{\pi}{n}} \end{aligned}$$

Posons  $\alpha = \frac{\sqrt{\log(2)}}{2\sqrt{\pi} + \sqrt{\log(2)}} \Rightarrow 2e^{\frac{-4\pi\alpha^2}{(1-\alpha)^2}} = 1$ , si  $t > \frac{4}{1-\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{n}}$  alors

$$\begin{aligned} \mu(f > \mathbb{E}[f] + t) &\leq \mu(f > m_f - 4\sqrt{\frac{\pi}{n}} + t) \\ &\leq \mu(f > m_f + \alpha t) \\ &\leq 2e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}} \end{aligned}$$

Similairement :

$$\begin{aligned} \mu(f < \mathbb{E}[f] - t) &\leq \mu(f < m_f + 4\sqrt{\frac{\pi}{n}} - t) \\ &\leq \mu(f < m_f - \alpha t) \\ &\leq 2e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}} \end{aligned}$$

Si  $t \leq \frac{4}{1-\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{n}}$  alors

$$2e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}} \geq 2e^{\frac{-4\pi\alpha^2}{(1-\alpha)^2}} = 1$$

Dans ce cas il n'y a rien à montrer et finalement dans tous les cas on obtient :

$$\begin{aligned} \mu(f > \mathbb{E}[f] + t) &\leq 2e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}} \\ \mu(f < \mathbb{E}[f] - t) &\leq 2e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}} \end{aligned}$$

C'est-à-dire :

$$\mu(|f - \mathbb{E}[f]| > t) \leq 4e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4}}$$

Pour  $L \neq 1$  il suffit d'appliquer ce qui précède à  $\frac{f}{L}$ ,

$$\mu(|f - \mathbb{E}[f]| > t) \leq 4e^{-\alpha^2 \frac{t^2 n}{4L^2}}$$

□

### 1.3. ELLIPSOÏDES

Dans cette partie nous montrons plusieurs propriétés sur les ellipsoïdes, commençons par les définir :

**Définition.** On appelle ellipsoïde de  $\mathbb{R}^n$  l'image de la boule unité euclidienne par un élément de  $GL(n)$ .

Donnons une définition alternative d'un ellipsoïde.

**Proposition 1.5.** Pour toute ellipsoïde  $\mathcal{E}$  il existe  $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$  et  $v_1, \dots, v_n$  une base orthonormée tel que :

$$\mathcal{E} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n ; \sum_{i=1}^n \frac{\langle x, v_i \rangle^2}{\alpha_i^2} < 1 \right\}$$

*Démonstration.* Donnons nous  $A \in GL(n)$  tel que  $AB_2^n = \mathcal{E}$

$$|Ax|^2 = x^T A^T A x$$

$A^T A$  est symétrique, soit  $\lambda$  une de ses valeurs propres et  $v$  un vecteur propre associé, alors

$$0 < |Av|^2 = v^T \lambda v = \lambda |v|^2$$

Donc les valeurs propres de  $A^T A$  sont strictement positives, Comme elle est symétrique, elle est donc diagonalisable dans une base orthonormée, donnons nous  $(\lambda_i)_{i \leq n}$  et  $(v_i)_{i \leq n}$  une base orthonormée tel que  $A^T A v_i = \lambda_i^2 v_i$  pour tous  $1 \leq i \leq n$  et définissons les quantités suivantes :

- $P$  la matrice définie par  $P v_j = \lambda_j v_j$
- $u_j = \lambda_j^{-1} A v_j$

Montrons que les  $u_j$  forment une base orthonormée :

$$\begin{aligned} \langle u_i, u_j \rangle &= \lambda_j^{-1} v_j^T A^T \lambda_i^{-1} A v_i \\ &= \lambda_j^{-1} \lambda_i^{-1} v_j^T (A^T A v_i) \\ &= \lambda_j^{-1} \lambda_i^{-1} v_j^T \lambda_i^2 v_i \\ &= \frac{\lambda_i}{\lambda_j} \langle v_j, v_i \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Soit  $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i \in S^{n-1}$

$$\begin{aligned} y &= Ax = x_1 A v_1 + \dots + x_n A v_n \\ &= x_1 \lambda_1 u_1 + \dots + x_n \lambda_n u_n \end{aligned}$$

Les composante de  $y$  dans la base  $\{u_j\}_{j \leq n}$  sont  $\langle y, u_j \rangle = x_j \lambda_j$ , donc :

$$\frac{\langle y, u_1 \rangle^2}{\lambda_1^2} + \dots + \frac{\langle y, u_n \rangle^2}{\lambda_n^2} = x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$$

Et finalement  $\partial \mathcal{E} = \{y \in \mathbb{R}^n ; \frac{\langle y, u_1 \rangle^2}{\lambda_1^2} + \dots + \frac{\langle y, u_n \rangle^2}{\lambda_n^2} = 1\}$ . □

Démontrons maintenant le lemme que nous avons utiliser dans l'introduction :

**Lemme 1.6.** Soit  $\mathcal{E}$  un ellipsoïde de  $\mathbb{R}^n$ , alors  $\exists \lambda > 0$  et  $V \subset_{\text{s.e.v}} \mathbb{R}^n$  de dimension  $\lceil \frac{n}{2} \rceil$  tel que :

$$\mathcal{E} \cap V = \lambda B_2^n \cap V$$

*Démonstration.* Quitte à effectuer une rotation on peut supposer que  $\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n ; \sum_{i=1}^n a_i x_i^2 < 1\}$  pour  $0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ . Posons  $\lambda = \text{Mediane}(a_1, \dots, a_n)$  et

$$F = \{x \in \mathbb{R}^n ; \forall i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \sqrt{\lambda - a_i} x_i = \sqrt{a_{n+1-i} - \lambda} x_{n+1-i}\}$$

Alors pour tous  $x \in F$  nous avons  $\forall i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  :

$$a_i x_i^2 + a_{n+1-i} x_{n+1-i}^2 = \lambda(x_i^2 + x_{n+1-i}^2)$$

d'où

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i^2 = \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2$$

□

Nous admettons le résultat de F.John :

**Définition & Théorème** (Ellipsoïde de John). Tous compact convexe symétrique d'intérieur non vide contient un unique ellipsoïde de volume maximale, elle est appelée ellipsoïde de John.

**Remarque 1.7.** Soit  $K \subset \mathbb{R}^n$  un compact convexe symétrique et  $D = u(B_2^n)$  (avec  $u \in GL(n)$ ) son ellipsoïde de John, notons alors  $C =: u^{-1}(K)$  dont l'ellipsoïde de John est  $B_2^n$ , supposons que

$$r(B_2^n \cap W) \subset C \cap W \subset r(1 + \varepsilon)(B_2^n \cap W)$$

alors

$$u^{-1}(r(D \cap uW)) \subset u^{-1}(K \cap uW) \subset u^{-1}(r(1 + \varepsilon)(D \cap uW))$$

$$r(D \cap uW) \subset K \cap uW \subset r(1 + \varepsilon)(D \cap uW)$$

Le **lemme 1.6** nous permet de conclure que quitte à diviser la dimension du sous-espace  $W$  par deux, on peut se restreindre à montrer le théorème de Dvoretzky pour des compacts dont la boule euclidienne est l'ellipsoïde de John sans perte de généralité.

## 1.4. LOI GAUSSIENNE

Pour la preuve du théorème de Dvoretzky nous aurons besoins de deux résultat sur les variables aléatoires gaussiennes, ce premier combiner avec **lemme 1.2** nous seras utile pour calculer des intégrales par rapport à la mesure de Haar sur la  $(n-1)$ -sphère.

**Lemme 1.8.** Soit  $g = (g_1, \dots, g_n)$  des variables aléatoire i.i.d suivant une loi gaussienne, alors  $\frac{g}{|g|}$  et  $|g|$  sont indépendants.

*Démonstration.* Posons  $Y = \frac{g}{|g|}$  et  $R = |g|$  alors

$$\mathbb{E}[f(Y)g(R)] = \int_{\mathbb{R}^n} f\left(\frac{x_1}{|x|}, \dots, \frac{x_n}{|x|}\right) g(|x|) \exp\left(-\frac{|x|^2}{2}\right) dx_1 \dots dx_n$$

en passant en coordonnées sphériques

$$\begin{aligned} x_1 &= r \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-1} \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1} \\ x_3 &= r \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-3} \cos \theta_{n-2} \\ &\vdots \\ x_n &= r \cos \theta_1 \end{aligned}$$

On a le déterminant suivant :

$$dx_1 \dots dx_n = r^{n-1} \prod_{1 \leq i \leq n-1} (|\sin \theta_i|)^{n-1-i} dr d\theta_1 \dots d\theta_{n-1}$$

d'où :

$$\mathbb{E}[f(Y)g(R)] = \int_{\mathbb{R}^n} f \circ \varphi(\theta) g(r) \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r^{n-1} \prod_{1 \leq i \leq n-1} (|\sin \theta_i|)^{n-1-i} dr d\theta_1 \dots d\theta_{n-1}$$

$$\mathbb{E}[f(Y)g(R)] = \int_{\mathbb{R}^+} g(r) \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r^{n-1} dr \int_{[0, \pi]^{n-2} \times ]0, 2\pi[} f \circ \varphi(\theta) \prod_{1 \leq i \leq n-1} (|\sin \theta_i|)^{n-1-i} d\theta_1 \dots d\theta_{n-1}$$

où  $\varphi(\theta) = (\sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-1}, \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \sin \theta_1 \dots \sin \theta_{n-3} \cos \theta_{n-2}, \dots, \cos \theta_1)$ . □

Nous aurons besoins de trouver un minorant pour  $\int_{S^{n-1}} \|x\| d\mu(x)$  pour une norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathbb{R}^n$  et pour cela nous utiliserons le lemme suivant :

**Lemme 1.9.** il existe  $c > 0$  tel que  $\forall N > 1$  et  $\{g_i\}_{1 \leq i \leq N}$  des variables aléatoire i.i.d suivant une loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  on ait :

$$\mathbb{E}\left[\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i|\right] \geq c \sqrt{\log N}$$

où  $\tilde{N} = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$  est la partie entière supérieure de  $\frac{N}{2}$ .

*Démonstration.* Commençons par montrer que pour  $n > 1$ ,  $\mathbb{P}(|g_1| > \sqrt{\log n}) \geq \frac{1}{n}$ , on a :

$$\mathbb{P}(|g_1| > \sqrt{\log n}) = 2 \int_{\sqrt{\log n}}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \geq \int_{\sqrt{\log n}}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx \quad \text{pour } x > \sqrt{\log(2)}$$

$$\int_{\sqrt{\log n}}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \left[ -\frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{t} \right]_{\sqrt{\log n}}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{n \log n}} > \frac{1}{n}$$

Donc

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i| \leq \sqrt{\log N}\right) = \mathbb{P}\left(|g_1| \leq \sqrt{\log N}\right)^{\tilde{N}} = \left(1 - \mathbb{P}\left(|g_1| > \sqrt{\log N}\right)\right)^{\tilde{N}}$$

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i| \leq \sqrt{\log N}\right) \leq \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{\tilde{N}} \leq e^{-\frac{\tilde{N}}{N}} \leq e^{-\frac{1}{2}}$$

Ce qui équivaut à

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i| > \sqrt{\log N}\right) \geq 1 - e^{-\frac{1}{2}}$$

Par l'inégalité de Markov on a finalement :

$$\mathbb{E}\left[\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i|\right] \geq \mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq \tilde{N}} |g_i| > \sqrt{\log N}\right) \sqrt{\log N} \geq (1 - e^{-\frac{1}{2}}) \sqrt{\log N}$$

avec  $c = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$

□

## 2 DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE DVORETZKY

### 2.1. LEMMES D'APPROXIMATIONS

Avant de débiter la démonstration du théorème de Dvoretzky, nous allons avoir besoins de plusieurs lemmes, et de la définition suivante :

**Définition.** Soit  $(X, d)$  un espace métrique et  $\theta > 0$ , on dit que  $A \subset X$  est un  $\theta$ -net si

- (i)  $A$  est de cardinal fini.
- (ii)  $\forall x \in X$ ,  $\exists y \in A$  tel que  $d(x, y) \leq \theta$

Montrons maintenant que sur une section de la  $(n-1)$ -sphère on peut trouver un  $\theta$ -net de cardinal borné par une quantité qui varie exponentiellement avec la dimension de la section.

**Lemme 2.1.** Pour tous  $0 < \theta < 1$ ,  $V \subset_{\text{s.e.v}} \mathbb{R}^n$  de dimension  $k > 0$ , alors il existe un  $\theta$ -net sur  $V \cap S^{n-1}$  de cardinal inférieur à  $\left(\frac{3}{\theta}\right)^k$ .

*Démonstration.* Notons  $B_V(x, r) = \{y \in V ; |x - y| < r\}$  la boule de centre  $x \in V$  et de rayon  $r \geq 0$ , soit  $N = \{x_i\}_{i=1, \dots, m}$  un sous-ensemble de  $V \cap S^{n-1}$  maximal pour la propriété :  $x, y \in N$ ,

$|x - y| \geq \theta$ , c'est-à-dire pour tous  $x \in V \cap S^{n-1} \setminus N$  il existe  $i \leq m$  tel que  $|x - x_i| < \theta$ , donc  $N$  est un  $\theta$ -net et les  $\{B_V(x_i, \theta/2)\}_{i=1, \dots, m}$  sont donc disjoints deux à deux et toutes contenues dans  $B_V(0, 1 + \frac{\theta}{2})$  d'où :

$$m \text{Vol}(B_V(x_1, \frac{\theta}{2})) = \sum_{i=1}^m \text{Vol}(B_V(x_i, \frac{\theta}{2})) = \text{Vol}(\cup_{1 \leq i \leq m} B_V(x_i, \frac{\theta}{2})) \leq \text{Vol}(B_V(0, 1 + \frac{\theta}{2}))$$

$$m \leq \frac{\text{Vol}(B_V(0, 1 + \frac{\theta}{2}))}{\text{Vol}(B_V(x_1, \frac{\theta}{2}))}$$

Par homogénéité de la mesure de Lebesgue :

$$m \leq \left( \frac{1 + \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \right)^k = \left( 1 + \frac{2}{\theta} \right)^k < \left( \frac{3}{\theta} \right)^k$$

□

Le petit lemme qui suit nous permet d'approcher les points de la  $(n-1)$ -sphère par des points situés sur un  $\theta$ -net.

**Lemme 2.2.** Soient  $x \in S^{n-1}$ ,  $A$  un  $\theta$ -net pour un  $1 > \theta > 0$ , alors il existe  $(y_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset A$  et  $(\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$  tel que

$$x = \sum_{i=0}^{+\infty} y_i \beta_i \quad \text{et} \quad \forall i \in \mathbb{N}, \beta_i \leq \theta^i$$

*Démonstration.* Comme  $A$  est un  $\theta$ -net alors il existe  $y_0 \in A$  tel que  $|x - y_0| < \theta$ , et donc

$$x = y_0 + \lambda_1 x'$$

avec  $\lambda_1 = |x - y_0| \leq \theta$  et  $x' = \frac{x - y_0}{\lambda_1} \in S^{n-1}$ , on peut donc itérer le même procédé sur  $x'$  et réitérer indéfiniment :

$$\begin{array}{lll} x = y_0 + \lambda_1(y_1 + \lambda_2 x'') = y_0 + \lambda_1 y_1 + \lambda_1 \lambda_2 x'' & \text{avec} & \lambda_2 \leq \theta, y_1 \in A \text{ et } x'' \in S^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ x = y_0 + \sum_{i=1}^N y_i \left( \prod_{1 \leq k \leq i} \lambda_k \right) + \tilde{x} \prod_{1 \leq k \leq N+1} \lambda_k & \text{avec} & \forall i \leq N+1 \lambda_i \leq \theta, y_i \in A \text{ et } \tilde{x} \in S^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

Si l'on pose  $S_N = y_0 + \sum_{i=1}^N y_i \left( \prod_{1 \leq k \leq i} \lambda_k \right)$ , alors :

$$|x - S_N| \leq |\lambda_1 \dots \lambda_N| |\tilde{x}| \leq \theta^N \rightarrow 0 \quad \text{avec } N \rightarrow \infty$$

il ne reste plus qu'à poser  $\beta_0 = 1$  et pour  $i > 0$ ,  $\beta_i = \prod_{1 \leq k \leq i} \lambda_k \leq \theta^i$  et l'on a :

$$x = \sum_{i=0}^{+\infty} \beta_i y_i$$

□

Le **lemme 2.3** va nous permettre de passer d'un ensemble de grande  $\mu$ -mesure a un grand sous-espace au sens des dimensions.

**Lemme 2.3.**  $\forall \varepsilon > 0$ , il existe  $1 > \theta > 0$  tel que pour tous  $n \in \mathbb{N}$ , si l'on a  $A$  un  $\theta$ -net sur  $V \cap S^{n-1}$  pour  $V \subset \mathbb{R}^n$  de dimension  $k$ ,  $\|\cdot\|$  une norme sur  $\mathbb{R}^n$  et  $T \in GL(n)$ , tel que :

$$\forall x \in A, \quad (1 - \theta) \leq \|Tx\| \leq (1 + \theta)$$

alors ,

$$\forall x \in V, \quad \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}} |x| \leq \|Tx\| \leq \sqrt{1 + \varepsilon} |x|$$

de plus si  $\varepsilon \leq \frac{1}{9}$ , on peu prendre  $\theta = \frac{\varepsilon}{9}$

*Démonstration.* Soient  $1 > \theta > 0$ ,  $A$  un  $\theta$ -net sur  $S^{n-1} \cap V$  et  $x \in S^{n-1} \cap V$  par le **lemme 2.2**, il existe  $(y_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset A$  et  $(\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$  tel que

$$x = \sum_{i=0}^{+\infty} y_i \beta_i \quad \text{et} \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad \beta_i \leq \theta^i$$

Notons  $T = (a_1, \dots, a_n)$

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \left\| T \sum_{i=0}^{+\infty} y_i \beta_i \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=0}^{+\infty} \beta_i \sum_{p=1}^n y_{i,p} a_p \right\| \\ &\leq \sum_{i=0}^{+\infty} \theta^i \left\| \sum_{p=1}^n y_{i,p} a_p \right\| \\ &\leq \sum_{i=0}^{+\infty} \theta^i \|Ty_i\| \\ &\leq \sum_{i=0}^{+\infty} \theta^i (1 + \theta) = \frac{1 + \theta}{1 - \theta} \end{aligned}$$

de même :

$$\begin{aligned} \|Tx\| &\geq \|Ty_0\| - \|Tx - Ty_0\| \\ &= (1 - \theta) - \left\| \sum_{p=1}^n a_p \sum_{i=1}^{+\infty} \beta_i y_{i,p} \right\| \\ &\geq (1 - \theta) - \sum_{i=1}^{+\infty} \theta^i \|Ty_i\| \\ &\geq \left( (1 - \theta) - \theta \frac{1 + \theta}{1 - \theta} \right) = \frac{1 - 3\theta}{1 - \theta} \end{aligned}$$

Il suffit donc de prendre  $\theta$  tel que

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \varepsilon} &\geq \frac{1 + \theta}{1 - \theta} \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}} &\leq \frac{1 - 3\theta}{1 - \theta} \end{aligned}$$



et pour tous  $x \in V \setminus \{0\}$  on a

$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} \leq \|T \frac{x}{|x|}\| \leq \sqrt{1+\varepsilon}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} |x| \leq \|Tx\| \leq |x| \sqrt{1+\varepsilon}$$

Ce qui fini la première partie de la preuve, dans la suite on suppose  $\varepsilon \leq \frac{1}{9}$ . On cherche  $\theta =: \theta(\varepsilon) \in ]0, 1[$ , tel que  $\sqrt{1+\varepsilon} \geq \max(\frac{1-\theta}{1-3\theta}, \frac{1+\theta}{1-\theta})$ , sachant que  $\varepsilon$  va être petit supposons  $\theta \leq \frac{1}{3}$  alors

$$\frac{1-\theta}{1-3\theta} - \frac{1+\theta}{1-\theta} = \frac{4\theta^2}{(1-3\theta)(1-\theta)} > 0$$

Donc  $\sqrt{1+\varepsilon} \geq \frac{1-\theta}{1-3\theta}$

$$1+\varepsilon \geq \left(\frac{1-\theta}{1-3\theta}\right)^2$$

$$(9\varepsilon+8)\theta^2 - 2(3\varepsilon+2)\theta + \varepsilon \geq 0$$

les deux racines de ce polynôme sont  $0 < \frac{3\varepsilon+2-2\sqrt{1+\varepsilon}}{8+9\varepsilon} < \frac{3\varepsilon+2+2\sqrt{1+\varepsilon}}{8+9\varepsilon}$ , on cherche donc un  $\theta$  dans  $]0, \frac{3\varepsilon+2-2\sqrt{1+\varepsilon}}{8+9\varepsilon}]$ . Pour finir

$$\frac{3\varepsilon+2-2\sqrt{1+\varepsilon}}{8+9\varepsilon} \geq \frac{3\varepsilon+2-2-2\varepsilon}{8+9\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{8+9\varepsilon}$$

$$\geq \frac{\varepsilon}{9}$$

donc pour  $\varepsilon \in ]0, 9^{-1}[$  on peu prendre  $\theta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{9}$ . □

## 2.2. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE DVORETZKY

La démonstration du théorème de Dvoretzky repose sur le **théorème 2.4** et la **proposition 2.7** qui sont démontrer dans cette partie. Dans un premier temps nous donnons un résultat de V.Milman qui est en grande partie la preuve du théorème de Dvoretzky.

**Théorème 2.4.** Pour tous  $\varepsilon > 0$  il existe  $c(\varepsilon) > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et pour toute norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathbb{R}^n$ , il existe  $V \underset{\text{s.e.v}}{\subset} \mathbb{R}^n$  tel que  $\dim V \geq c(\varepsilon) \left(\frac{M}{b}\right)^2 n$  et pour tout  $x \in V$  :

$$|x| \frac{M}{\sqrt{1+\varepsilon}} \leq \|x\| \leq M \sqrt{1+\varepsilon} |x|$$

Où  $M = \int_{S^{n-1}} \|x\| d\mu(x)$  et  $b > 0$  le plus petit réel tel que  $\|\cdot\| \leq b|\cdot|$

*Démonstration.* Soit  $\varepsilon > 0$ ,  $\theta =: \theta(\varepsilon) \in ]0, 1[$  donné par le **lemme 2.3**,  $V_0 = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$  pour un  $k \leq n$  entier que l'on fixeras plus tard et  $A$  un  $\theta$ -net sur  $V_0 \cap S^{n-1}$  avec  $|A| < \left(\frac{3}{\theta}\right)^k$ , alors

$$\nu\left(\bigcap_{x \in A} \{T \in O(n); |\|Tx\| - M| \leq M\theta\}\right) = 1 - \nu\left(\bigcup_{x \in A} \{T \in O(n); |\|Tx\| - M| > M\theta\}\right)$$

$$\geq 1 - |A| \nu(T \in O(n); |\|Ty\| - M| > M\theta) \quad \text{pour un } y \in A$$

$$\geq 1 - |A| \mu(y \in S^{n-1}; |\|y\| - M| > M\theta) \quad \text{par le lemme 1.2}$$

En appliquant la concentration de la mesure et en utilisant  $|A| \leq \left(\frac{3}{\theta}\right)^k$ ,

$$\nu\left(\bigcap_{x \in A} \{T \in O(n) ; ||Tx|| - M| \leq M\theta\}\right) > 1 - 4\left(\frac{3}{\theta}\right)^k e^{-\beta \frac{\theta^2 M^2}{b^2} n}$$

pour un  $\beta \in ]0, 1[$ .

Donc tant que  $4\left(\frac{3}{\theta}\right)^k e^{-\beta \frac{\theta^2 M^2}{b^2} n} \leq 1$  on peut trouver  $T \in O(n)$  tel que pour tout  $x \in A$  :

$$||Tx|| - M| \leq M\theta \quad (\star)$$

Posons alors  $c(\theta) = \frac{\theta^2 \beta}{4 \log(\frac{3}{\theta})}$  et  $\kappa(\theta) = c(\theta) \left(\frac{M}{b}\right)^2 n$ , on veut donc montrer qu'il existe un  $k \geq \kappa(\theta)$  entier pour le quelle on puisse trouver un  $T \in O(n)$  qui vérifie  $(\star)$ . Trivialement si  $\kappa(\theta) < 1$  alors  $k = 1$  convient car toute 1-section est euclidienne, on suppose donc  $\kappa(\theta) \geq 1$  ce qui équivaut à  $\frac{\theta^2 M^2 n \beta}{4b^2} \geq \log(\frac{3}{\theta})$ . Fixons  $k$  entier tel que  $\kappa(\theta) \leq k \leq 2\kappa(\theta)$ , possible car  $\kappa(\theta) \geq 1$ , alors

$$\begin{aligned} \nu\left(\bigcap_{x \in A} \{T \in O(n) ; ||Tx|| - M| \leq M\theta\}\right) &> 1 - 4 \exp\left(2\kappa(\theta) \log\left(\frac{3}{\theta}\right) - \frac{\theta^2 M^2 n \beta}{b^2}\right) \\ &> 1 - 4e^{-\frac{\theta^2 M^2 n \beta}{2b^2}} \\ &> 1 - \frac{4}{3^2} \theta^2 > 0 \quad \text{car } \frac{\theta^2 M^2 n \beta}{2b^2} \geq 2 \log\left(\frac{3}{\theta}\right) \end{aligned}$$

Donc il existe  $T \in O(n)$  tel que pour tous  $x \in A$  on ait  $||Tx|| - M| \leq M\theta$ , c'est à dire

$$M(1 - \theta) \leq ||Tx|| \leq M(1 + \theta)$$

Par le **lemme 2.3** pour tous  $x \in V_0$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}} |x| M \leq ||Tx|| \leq \sqrt{1 + \varepsilon} |x| M$$

Il suffit donc de prendre  $V = TV_0$  pour conclure.  $\square$

**Remarque 2.5.** Pour  $\varepsilon < 9^{-1}$  on peut prendre  $\theta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{9}$  et donc  $c(\varepsilon) = c_0 \frac{\varepsilon^2}{\log(\frac{c_1}{\varepsilon})}$  pour  $c_0, c_1 > 0$ .

Il ne nous reste plus qu'à donner une borne inférieure à  $\frac{M}{b}$ , pour cela nous allons utiliser la **remarque 1.7** et le lemme suivant :

**Lemme 2.6** (Dvoretzky-Rogers). Soit  $||\cdot||$  une norme sur  $\mathbb{R}^n$  tel que  $B_2^n$  est l'ellipsoïde de John de  $B_{||\cdot||}$ , alors il existe une base orthonormée  $\{x_i\}_{i=1, \dots, n}$  tel que  $\forall 1 \leq i \leq n$

$$e^{-1} \left(1 - \frac{i-1}{n}\right) \leq ||x_i|| \leq 1$$

*Démonstration.*  $S^{n-1}$  est compact et  $\|\cdot\|$  continue, on peut donc prendre un  $x_1 \in S^{n-1}$  qui maximise  $\|\cdot\|$  c'est à dire  $\|x_1\| = 1$ , supposons que l'on ai  $x_1, \dots, x_{k-1}$  avec  $k \leq n$  tel que pour tous  $1 \leq i \leq k-1$ ,  $x_i$  maximise  $\|\cdot\|$  sur  $S^{n-1} \setminus \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1}) \neq \emptyset$  car les  $\{x_i\}_{i=1, \dots, k-1}$  sont orthogonaux deux à deux. On peut donc répéter le procédé pour trouver  $x_k$  qui maximise  $S^{n-1} \setminus \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1})$ , par récurrence on peut donc avoir  $n$  vecteurs avec ses propriétés. Fixons  $1 \leq k \leq n$ ,  $a, b \in \mathbb{R}^*$  et définissons :

$$\mathcal{E} = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i ; \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{a_i}{a}\right)^2 + \sum_{i=k}^n \left(\frac{b_i}{b}\right)^2 \leq 1 \right\}$$

Supposons  $\sum_{i=1}^n a_i x_i \in \mathcal{E}$ , alors  $\sum_{i=1}^{k-1} a_i x_i \in aB_2^n$  et donc  $\|\sum_{i=1}^{k-1} a_i x_i\| \leq a$ . Si  $x \in \text{Vect}(x_k, \dots, x_n) \cap B_2^n$  on a  $\|x\| \leq \|x_k\|$  par construction, et donc  $\sum_{i=k}^n a_i x_i \in bB_2^n \Rightarrow \|\sum_{i=k}^n a_i x_i\| \leq b\|x_k\|$ , ce qui nous donne la majoration suivante

$$\left\| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\| \leq \left\| \sum_{i=1}^{k-1} a_i x_i \right\| + \left\| \sum_{i=k}^n a_i x_i \right\| \leq a + b\|x_k\|$$

Posons  $\phi \in GL(n)$  définit par  $\phi(\sum_{i=1}^n a_i x_i) = \sum_{i=1}^{k-1} a a_i x_i + \sum_{i=k}^n b a_i x_i$  on a  $\phi = \text{diag}(\overbrace{a, \dots, a}^{(k-1) \times}, \overbrace{b, \dots, b}^{(n-k+1) \times})$  et donc  $\det \phi = a^{k-1} b^{n-k+1}$  d'où :

$$\int_{\mathcal{E}} dx_1 \dots dx_n = \int_{B_2^n} \det \phi dx_1 \dots dx_n = a^{k-1} b^{n-k+1} \int_{B_2^n} dx_1 \dots dx_n$$

On prend  $a + b\|x_k\| = 1$  de sorte que  $\mathcal{E} \subset K$ , comme  $B_2^n$  est l'ellipsoïde de volume maximale incluse dans  $K$ , on a que

$$1 \geq \frac{\int_{\mathcal{E}} dx_1 \dots dx_n}{\int_{B_2^n} dx_1 \dots dx_n} = a^{k-1} b^{n-k+1}$$

Fixons donc pour  $k \geq 2$ ,  $b = \frac{1-a}{\|x_k\|}$  et  $a = \frac{k-1}{n}$ , en remplaçant dans l'inégalité on obtient :

$$1 \geq a^{k-1} \left( \frac{1-a}{\|x_k\|} \right)^{n-k+1} \iff \|x_k\| \geq a^{\frac{k-1}{n-k+1}} (1-a) = \left( \frac{k-1}{n} \right)^{\frac{k-1}{n-k+1}} \left( 1 - \frac{k-1}{n} \right)$$

et  $\log a^{\frac{k-1}{n-k+1}} = \frac{k-1}{n-k+1} \log \left( \frac{k-1}{n} \right) > -1$ .

□

**Proposition 2.7.** Soit  $\|\cdot\|$  une norme sur  $\mathbb{R}^n$  tel que  $B_2^n$  est l'ellipsoïde de John de  $B_{\|\cdot\|}$ , alors il existe  $c > 0$  tel que

$$M =: \int_{S^{n-1}} \|x\| d\mu(x) \geq c \sqrt{\frac{\log n}{n}}$$

*Démonstration.* Par le lemme de Dvoretzky-Rogers il existe une base orthonormée  $x_1, \dots, x_n$  tel que pour  $1 \leq i \leq \tilde{n} = \lceil \frac{n}{2} \rceil$  la partie entière supérieure de  $\frac{n}{2}$ ,  $\|x_i\| \geq e^{-1} \left(1 - \frac{\tilde{n}-1}{n}\right) \geq e^{-1} \left(1 - \frac{\frac{n}{2}+1-1}{n}\right) = (2e)^{-1}$ . Comme  $\mu$  est invariante par composition par une transformation orthogonale on a que

$$M =: \int_{S^{n-1}} \left\| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\| d\mu(a) = \int_{S^{n-1}} \left\| \sum_{i=1}^{n-1} a_i x_i - a_n x_n \right\| d\mu(a)$$

et donc

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2} \int_{S^{n-1}} \left\| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\| d\mu(a) + \frac{1}{2} \int_{S^{n-1}} \left\| \sum_{i=1}^{n-1} a_i x_i - a_n x_n \right\| d\mu(a) \\ &\geq \frac{1}{2} \int_{S^{n-1}} 2 \max \left\{ \left\| \sum_{i=1}^{n-1} a_i x_i \right\|, \|a_n x_n\| \right\} d\mu(a) \geq \dots \geq \int_{S^{n-1}} \max_{1 \leq i \leq n} \{ |a_i| \|x_i\| \} d\mu(a) \\ &\geq \int_{S^{n-1}} \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} \{ |a_i| \|x_i\| \} d\mu(a) \geq (2e)^{-1} \int_{S^{n-1}} \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |a_i| d\mu(a) \end{aligned}$$

Soit  $(g_1, \dots, g_n)$ , des variables aléatoire i.i.d de loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  alors

$$\int_{S^{n-1}} \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |a_i| d\mu(a) = \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^n g_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |g_i| \right]$$

Par le **lemme 1.8**  $(\sum_{i=1}^n g_i^2)^{-\frac{1}{2}}(g_1, \dots, g_n)$  et  $(\sum_{i=1}^n g_i^2)^{\frac{1}{2}}$  sont des variables aléatoires indépendantes, on a donc

$$\mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^n g_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |g_i| \right] \cdot \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^n g_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right] = \mathbb{E} \left[ \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |g_i| \right]$$

la fonction racine carré est concave, par l'inégalité de Jensen on a donc :

$$\mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^n g_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right] \leq \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^n g_i^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \mathbb{E}[g_1^2]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n}$$

Et finalement par le **lemme 1.9**, il existe  $K > 0$  tel que :

$$M \geq \frac{1}{2e\sqrt{n}} \mathbb{E} \left[ \max_{1 \leq i \leq \tilde{n}} |g_i| \right] \geq \frac{K}{2e} \sqrt{\frac{\log n}{n}}$$

□

On peut donc réunir la **proposition 2.7** et le **théorème 2.4** pour obtenir  $k \geq c(\varepsilon) \log n$  lorsque  $B_2^n$  est l'ellipsoïde de John pour  $B_{\|\cdot\|}$ , en utilisant la **remarque 1.7** quitte à diviser  $k$  par 2, on peut généralisé à toutes les normes et donc conclure la démonstration du théorème de Dvoretzky.

### 3 SECTIONS PRESQUE EUCLIDIENNES DE $\ell_p^N$

**Définition.** (Dimension critique) Soit  $X = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  pour  $\|\cdot\|$  une norme sur  $\mathbb{R}^n$ , pour  $\varepsilon > 0$  on note  $k(X, \varepsilon)$  le plus grand entier tel que pour tout  $k \leq k(X, \varepsilon)$ ,  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1 + \varepsilon)$ -continûment dans  $X$ .

### 3.1. CAS $1 \leq p < 2$

**Proposition 3.1.** Soit  $1 \leq p < 2$ , pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $c(\varepsilon) > 0$  tel que pour tout  $n \geq 2$ , alors

$$k(\ell_p^n, \varepsilon) \geq c(\varepsilon)n$$

*Démonstration.* Par l'inégalité de Hölder  $\|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}}|x|$ , c'est-à-dire  $b \leq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}}$ . Comme les normes sont des applications convexes, par l'inégalité de Jensen :

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\right] \geq \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[|x_i|^p]\right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Et donc

$$\begin{aligned} M &=: \int_{S^{n-1}} \|x\|_p d\mu(x) \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{\|x\|_p}{|x|}\right] \\ &= \frac{\mathbb{E}[\|x\|_p]}{\mathbb{E}[|x|]} \geq n^{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

Par le **théorème 2.4**  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1+\varepsilon)$ -continûment dans  $\ell_p^n$  pour un  $k \geq c(\varepsilon)(\frac{M}{b})^2 n = \tilde{c}(\varepsilon)n$ .  $\square$

### 3.2. CAS $2 \leq p < \infty$

On pourrait utiliser la même inégalité que dans la **proposition 3.1**, cela nous donnerais une estimation de l'ordre de  $k \geq c(\varepsilon)n^{\frac{2}{p}}$  (car ici  $b \leq 1$ ), mais il se trouve que l'on peut donner de meilleur estimation en séparant les cas en deux, lorsque  $k$  est petit devant  $n$  on a la proposition suivante :

**Proposition 3.2.** Pour tout  $\varepsilon > 0$  et  $2 \leq p$ , il existe  $c_p(\varepsilon) > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  avec  $p < \log n$ , alors

$$k(\ell_p^n, \varepsilon) \geq c_p(\varepsilon)n^{\frac{2}{p}}$$

*Démonstration.*

$$M =: \int_{S^{n-1}} \|x\|^p d\mu(x) = \mathbb{E}\left[\frac{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}}{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}}\right] = \frac{\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\right]}{\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}\right]}$$

Par l'inégalité de Hölder on a  $\|x\|_p \leq |x|$ , donc  $b \leq 1$ . Posons  $m = \lfloor e^p \rfloor$  et divisons  $\{1, \dots, n\}$  en  $N = \lceil \frac{n}{m} \rceil$  parties disjointes  $I_1, \dots, I_N$  tel que pour  $j < N$ ,  $\text{card}(I_j) = m$ , on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{i=1}^n |g_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] &= \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{j \leq N} \sum_{i \in I_j} |g_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \\ &\geq \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{j \leq N} (\max_{i \in I_j} |g_i|)^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \\ &\geq \left( \sum_{j \leq N} (\mathbb{E}[\max_{i \in I_j} |g_i|])^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\geq (N-1)^{\frac{1}{p}} c \sqrt{\log m} \text{ par le lemme 1.9} \end{aligned}$$

Où  $c > 0$  est une constante universelle, de plus :

$$\begin{aligned} \frac{(N-1)^{\frac{1}{p}}}{N^{\frac{1}{p}}} &= \left( \frac{N-1}{N} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\geq \left( 1 - \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{p}} = 2^{-\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

Car  $N \geq 2$  par hypothèse, et finalement :

$$\begin{aligned} M &\geq N^{\frac{1}{p}} 2^{-\frac{1}{p}} c \sqrt{\log \lfloor e^p \rfloor} n^{-\frac{1}{2}} \\ &\geq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{2}} C_p \end{aligned}$$

Où  $C_p = 2^{-\frac{1}{p}} c \sqrt{\log \lfloor e^p \rfloor} \underset{p \rightarrow \infty}{\sim} c \sqrt{p}$ .

Par le **théorème 2.4**  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1 + \varepsilon)$ -continûment dans  $\ell_p^n$ , pour

$$\begin{aligned} k &\geq c(\varepsilon) \left( \frac{E}{b} \right)^2 n \\ &\geq c_p(\varepsilon) n^{\frac{2}{p}}, \text{ avec } c_p(\varepsilon) = c(\varepsilon) C_p^2 \underset{p \rightarrow \infty}{\sim} \tilde{c}(\varepsilon) p \end{aligned}$$

□

**Remarque 3.3.** Dans le cas contraire si  $p \geq \log n$ , alors  $n^{\frac{2}{p}} \leq e^2$  donc dans ce cas la meilleur estimation est celle donné par le théorème de Dvoretzky.

Pour la proposition suivante nous allons utiliser l'inégalité de Khinchine qui est démontré dans l'annexe B.

**Proposition 3.4.** Soit  $2 < p < \infty$  et  $0 < \varepsilon < 1$ , alors il existe  $c_p(\varepsilon) > 0$  tel que,

$$k(\ell_p^n, \varepsilon) \leq c_p(\varepsilon) n^{\frac{2}{p}}$$

*Démonstration.* Considérons  $T = (a_{ij})_{j \leq k}^{i \leq n} \subset \mathbb{R}^n$  tel que pour tout  $x \in \mathbb{R}^k$

$$|x| \leq \|Tx\|_p \leq (1 + \varepsilon)|x|$$

Notons  $r_i(t) = \text{sign}(\sin(\pi 2^i t))$  pour  $t \in ]0, 1[$ ,  $i \in \mathbb{N}^*$  (voir annexe B pour les détails).

$$\forall t \in ]0, 1[, \quad |(r_1(t), \dots, r_k(t))| \leq \|T(r_1(t), \dots, r_k(t))\|_p \leq (1 + \varepsilon)|(r_1(t), \dots, r_k(t))|$$

Or  $|(r_1(t), \dots, r_k(t))|^2 = \sum_{i=1}^k r_i^2(t) = k$  presque sûrement. En intégrant entre 0 et 1 :

$$k^{\frac{p}{2}} \leq \sum_{i=1}^n \int_0^1 \left| \sum_{j=1}^k a_{ij} r_j(t) \right|^p dt$$

Par l'inégalité de Khinchine (**théorème B.3**)  $\exists B_p > 0$  tel que :

$$\left( \int_0^1 \left| \sum_{j=1}^k a_{ij} r_j(t) \right|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq B_p \left( \sum_{j=1}^k a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$k^{\frac{p}{2}} \leq \sum_{i=1}^n B_p^p \left( \sum_{j=1}^k a_{ij}^2 \right)^{\frac{p}{2}} \quad (\star)$$

Fixons  $1 \leq v \leq n$ , alors pour  $x = (a_{vj})_{j \leq k}$ , on a

$$\sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^k a_{ij} a_{vj} \right|^p \geq \left| \sum_{j=1}^k a_{vj}^2 \right|^p$$

et donc :

$$\left| \sum_{j=1}^k a_{vj}^2 \right|^p \leq \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^k a_{ij} a_{vj} \right|^p \leq (1 + \varepsilon)^p \left| \sum_{j=1}^k a_{vj}^2 \right|^{\frac{p}{2}}$$

c'est-à-dire  $\left| \sum_{j=1}^k a_{vj}^2 \right|^{\frac{1}{2}} \leq 1 + \varepsilon$ , et finalement en injectant dans  $(\star)$  :

$$k \leq B_p^2 (1 + \varepsilon)^2 n^{\frac{2}{p}}$$

□

**Remarque 3.5.** Dans la démonstration de l'inégalité de Khinchine, on montre que

$$B_p = \left( 2p \int_0^{+\infty} s^{p-1} e^{-\frac{s^2}{4}} ds \right)^{\frac{1}{p}}$$

### 3.3. CAS $P = \infty$

**Proposition 3.6.** Soit  $0 < \varepsilon \leq \frac{1}{32}$ , il existe  $c, C > 0$  des constantes universelles tel que :

$$k(\ell_\infty^n, \varepsilon) \leq \frac{C \log(n)}{\log(\frac{1}{c\varepsilon})}$$

*Démonstration.* Soit  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$  tel que pour tous  $x \in \mathbb{R}^k$ ,

$$\frac{1}{1+\varepsilon}|x| \leq \|Tx\|_\infty \leq |x|$$

Comme  $1-\varepsilon \leq \frac{1}{1+\varepsilon}$ , en posant  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^k$  les lignes de  $T$  dans la base canonique, alors

$$(1-\varepsilon)|x| \leq \max_{i \leq n} | \langle a_i, x \rangle | \leq |x|$$

En prenant  $x = a_p$  on obtient  $(1-\varepsilon)|a_p| \leq \max_{i \leq n} | \langle a_i, a_p \rangle | \leq |a_p| \Rightarrow |a_p|^2 \leq |a_p| \Rightarrow |a_p| \leq 1$ .

Prenons  $x \in S^{k-1}$ , alors il existe  $i \leq n$  tel que  $| \langle a_i, x \rangle | \geq (1-\varepsilon)$ , donc

$$|x - a_i|^2 = |x|^2 + |a_i|^2 - 2 \langle x, a_i \rangle \leq 2 - 2(1-\varepsilon) = 2\varepsilon$$

Prenons  $1 > |x| > 1 - \sqrt{2\varepsilon}$ , alors il existe  $i$  tel que  $|\frac{x}{|x|} - a_i| \leq \sqrt{2\varepsilon}$  et donc :

$$\begin{aligned} |x - a_i| &\leq \left| x - \frac{x}{|x|} \right| + \left| \frac{x}{|x|} - a_i \right| \\ &\leq |1 - |x|| + \sqrt{2\varepsilon} \\ &\leq 2\sqrt{2\varepsilon} \end{aligned}$$

Donc  $\bigcup_{i \leq n} B_2^k(a_i, 2\sqrt{2\varepsilon})$  contient  $B_2^k \setminus (1 - \sqrt{2\varepsilon})B_2^k$ .

$$n(2\sqrt{2\varepsilon})^k \lambda(B_2^k) \geq \lambda\left(\bigcup_{i \leq n} B_2^k(a_i, 2\sqrt{2\varepsilon})\right) \geq \lambda(B_2^k \setminus (1 - \sqrt{2\varepsilon})B_2^k) = \lambda(B_2^k) - (1 - \sqrt{2\varepsilon})^k \lambda(B_2^k)$$

$$n(2\sqrt{2\varepsilon})^k \geq 1 - (1 - \sqrt{2\varepsilon})^k \geq \sqrt{2\varepsilon}(1 - \sqrt{2\varepsilon})^{k-1}$$

car

$$\begin{aligned} (1 - \sqrt{2\varepsilon})^k &= (1 - \sqrt{2\varepsilon})^{k-1} - \sqrt{2\varepsilon}(1 - \sqrt{2\varepsilon})^{k-1} \\ &\leq 1 - \sqrt{2\varepsilon}(1 - \sqrt{2\varepsilon})^{k-1} \end{aligned}$$

Alors pour  $\varepsilon < \frac{1}{32}$  on a  $\frac{1}{2\sqrt{2\varepsilon}} - \frac{1}{2} > \frac{7}{16\sqrt{2\varepsilon}}$  et donc

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2\sqrt{2\varepsilon}} - \frac{1}{2} \right)^{k-1} \\ &\geq \frac{1}{2} \left( \frac{7}{16\sqrt{2\varepsilon}} \right)^{k-1} \\ &\geq \frac{1}{2} \left( \frac{7}{16\sqrt{2\varepsilon}} \right)^{\frac{k}{2}} \end{aligned}$$

et donc

$$k \leq \frac{2 \log n}{\log \left( \frac{7}{16\sqrt{2\varepsilon}} \right)}$$

□



**Proposition 3.7.** Soit  $0 < \varepsilon < 1$ ,  $\ell_2^k$  s'injecte  $(1 + \varepsilon)$ -continûment dans  $\ell_\infty^n$  pour  $k = \left\lceil \frac{\log n}{\log(\frac{3}{\varepsilon})} \right\rceil$

*Démonstration.* Comme  $(\frac{3}{\varepsilon})^k \leq n$  on peut prendre un  $\varepsilon$ -net sur  $S^{k-1}$  de cardinal  $n$ , donnons nous  $\{y_i\}_{i \leq n}$  un tel  $\varepsilon$ -net et

$$T: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^k & \rightarrow & \mathbb{R}^n \\ x & \rightarrow & (1 + \varepsilon)(\langle x, y_i \rangle)_{i \leq n} \end{array}$$

Alors pour tout  $x \in S^{k-1}$ , il existe  $i \leq n$  tel que  $|x - y_i| < \varepsilon$ , alors

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 &> |x - y_i|^2 = |x|^2 + |y_i|^2 - 2\langle x, y_i \rangle \\ &= 2(1 - \langle x, y_i \rangle) \end{aligned}$$

$$\langle x, y_i \rangle > 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} \geq \frac{1}{1 + \varepsilon}$$

Car  $1 - \frac{\varepsilon^2}{2} - \frac{1}{1 + \varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2(1 + \varepsilon)}(1 - \varepsilon)(\varepsilon + 2) > 0$ , finalement avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$1 \geq \max_{1 \leq j \leq n} |\langle x, y_j \rangle| \geq |\langle x, y_i \rangle| \geq \frac{1}{1 + \varepsilon}$$

C'est à dire pour tout  $x \in S^{k-1}$

$$1 \leq \|Tx\|_\infty \leq 1 + \varepsilon$$

□

## A - INÉGALITÉ DE PRÉKOPA-LEINDLER

Le but de cette annexe est de démontrer l'inégalité de Brunn-Minkowsky utilisé dans la démonstration du **corollaire 1.4**, nous allons pour cela monter une inégalité plus générale, celle de Prékopa-Leindler.

**Lemme A.1.** Soit  $A, B$  deux compact non vide de  $\mathbb{R}$ , alors

$$\lambda(A + B) \geq \lambda(A) + \lambda(B)$$

*Démonstration.* Comme la mesure de Lebesgue est invariante par translation on peut supposer que  $\max\{x \in A\} = 0$  et  $\min\{x \in B\} = 0$ , alors  $A \cup B \subset A + B$ ,

$$\lambda(A + B) \geq \lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B)$$

□

**Théorème A.2** (Prékopa-Leindler). Soit  $\alpha \in ]0, 1[$ ,  $f, g, h \in L^\infty(\mathbb{R}^n, [0, +\infty))$  tel que pour tout  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$h(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq f(x)^\alpha g(y)^{1-\alpha}$$

alors

$$\int_{\mathbb{R}^n} h d\lambda \geq \left( \int_{\mathbb{R}^n} f d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}^n} g d\lambda \right)^{1-\alpha}$$

*Démonstration.* Commençons par le montrer pour  $n = 1$  et  $f, g$  de norme infinie égale à 1.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} \int_0^{f(x)} dt dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_0^{\|f\|_\infty} \mathbb{1}_{\{f(x) > t\}} dt dx \\ &= \int_0^1 \lambda(x; f(x) > t) dt \end{aligned}$$

et de même pour  $g$ , posons alors  $A(t) = \{x \in \mathbb{R}; f(x) > t\}$  et  $B(t) = \{x \in \mathbb{R}; g(x) > t\}$ , on a alors

$$\begin{aligned} z \in \alpha A(t) + (1 - \alpha)B(t) &\Rightarrow z = \alpha x + (1 - \alpha)y, \text{ avec } x \in A(t) \text{ et } y \in B(t) \\ &\Rightarrow h(x) \geq f(x)^\alpha g(y)^{1-\alpha} > t \end{aligned}$$

et donc  $\alpha A(t) + (1 - \alpha)B(t) \subset \{x \in \mathbb{R}; h(x) > t\}$ , par le **lemme A.1** ,

$$\begin{aligned} \alpha \lambda(A(t)) + (1 - \alpha)\lambda(B(t)) &\leq \lambda(\alpha A(t) + (1 - \alpha)B(t)) \\ &\leq \lambda(x \in \mathbb{R}; h(x) > t) \end{aligned}$$

En utilisant la concavité du logarithme on a l'inégalité suivante

$$\begin{aligned} \left( \int_{\mathbb{R}} f d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}} g d\lambda \right)^{1-\alpha} &\leq \alpha \int_{\mathbb{R}} f d\lambda + (1 - \alpha) \int_{\mathbb{R}} g d\lambda \\ &\leq \int_0^1 \alpha \lambda(A(t)) + (1 - \alpha)\lambda(B(t)) dt \\ &\leq \int_0^1 \lambda(x \in \mathbb{R}; h(x) > t) dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} \lambda(x \in \mathbb{R}; h(x) > t) dt = \int_{\mathbb{R}} h d\lambda \end{aligned}$$

Pour  $f, g$  de norme infinie différente de 1, posons  $\tilde{f} = \frac{f}{\|f\|_\infty}$ ,  $\tilde{g} = \frac{g}{\|g\|_\infty}$  et  $\tilde{h} = \frac{h}{\|f\|_\infty^\alpha \|g\|_\infty^{1-\alpha}}$ , on a tous de suite  $\tilde{h}(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \tilde{f}^\alpha(x) \tilde{g}^{1-\alpha}(y)$  en appliquant ce qui précède on obtient :

$$\left( \int_{\mathbb{R}} f d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}} g d\lambda \right)^{1-\alpha} \leq \int_{\mathbb{R}} h d\lambda$$

Ce qui fini la preuve pour le cas  $n = 1$ , si  $n > 1$  supposons que pour tous entier inférieur à  $n$  l'inégalité soit montrer et posons  $f_t : \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow [0, +\infty)$  pour  $t \in \mathbb{R}$  et de même pour  $g$  et  $h$ .

$$x \rightarrow f(t, x)$$

Pour  $t, s \in \mathbb{R}$  et  $x, y \in \mathbb{R}^{n-1}$ ,

$$h_{s\alpha+(1-\alpha)t}(\alpha x + (1-\alpha)y) \geq f_s(x)^\alpha g_t(y)^{1-\alpha}$$

donc par hypothèse :

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} h_{s\alpha+(1-\alpha)t} d\lambda \geq \left( \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_s d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}^{n-1}} g_t d\lambda \right)^{1-\alpha}$$

Donc les trois fonction  $F, G, H$  définit par

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_t d\lambda \quad \& \quad G(t) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} g_t d\lambda \quad \& \quad H(t) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} h_t d\lambda$$

vérifie :

$$H(\alpha s + (1-\alpha)t) \geq F(t)^\alpha G(s)^{1-\alpha}$$

Donc par le cas  $n = 1$ ,

$$\int_{\mathbb{R}} H d\lambda \geq \left( \int_{\mathbb{R}} F d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}} G d\lambda \right)^{1-\alpha}$$

Ce qui permet de conclure la preuve par récurrence. □

**Corollaire A.3** (Brunn-Minkowsky). Soit  $A, B$  deux compact non vide de  $\mathbb{R}^n$  on a

- (i) Pour  $\alpha \in ]0, 1[$ ,  $\lambda(\alpha A + (1-\alpha)B) \geq \lambda(A)^\alpha \lambda(B)^{1-\alpha}$
- (ii)  $\lambda(A+B)^{\frac{1}{n}} \geq \lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}$

*Démonstration.* (i) Prenons  $f = \mathbb{1}_A$ ,  $g = \mathbb{1}_B$  et  $h = \mathbb{1}_{\alpha A + (1-\alpha)B}$ , alors  $f, g, h$  vérifie les hypothèses du théorème de Prékopa-Leindler par conséquent ,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} h d\lambda &\geq \left( \int_{\mathbb{R}^n} f d\lambda \right)^\alpha \left( \int_{\mathbb{R}^n} g d\lambda \right)^{1-\alpha} \\ \lambda(\alpha A + (1-\alpha)B) &\geq \lambda(A)^\alpha \lambda(B)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

(ii) On a

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}} \lambda(A+B)^{\frac{1}{n}} &= \lambda\left(\frac{A+B}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}}\right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lambda\left(\frac{\lambda(A)^{\frac{1}{n}}}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}} \frac{A}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}}} + \frac{\lambda(B)^{\frac{1}{n}}}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}} \frac{B}{\lambda(B)^{\frac{1}{n}}}\right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Appliquons le point (i) aux ensembles  $\frac{A}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}}}$  et  $\frac{B}{\lambda(B)^{\frac{1}{n}}}$  avec  $\alpha = \frac{\lambda(A)^{\frac{1}{n}}}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}}$ , on obtient

$$\frac{1}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}} + \lambda(B)^{\frac{1}{n}}} \lambda(A+B)^{\frac{1}{n}} \geq \lambda\left(\frac{A}{\lambda(A)^{\frac{1}{n}}}\right)^{\alpha/n} \lambda\left(\frac{B}{\lambda(B)^{\frac{1}{n}}}\right)^{(1-\alpha)/n} = 1$$

□

## B - MARTINGALES & INÉGALITÉ DE KHINCHINE

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  un espace probabilisé,  $\mathcal{G}$  une sous tribus de  $\mathcal{F}$ , pour tous  $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$  par le théorème de Randon-Nikodym il existe un unique  $h \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$  tel que pour tous  $A \in \mathcal{G}$  on ait

$$\int_A h dP = \int_A f dP$$

**Notation.** Par la suite on note  $h = \mathbb{E}(f|\mathcal{G})$  l'espérance conditionnelle de  $f$ .

Donnons quelques propriétés associées :

### Proposition B.1.

- (i) Pour toute sous tribus  $\mathcal{H}$  de  $\mathcal{G}$  on a  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(f|\mathcal{H})$ .
- (ii) Pour tous  $g \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ,  $\mathbb{E}(f \cdot g|\mathcal{G}) = g \cdot \mathbb{E}(f|\mathcal{G})$ .
- (iii) Si  $f$  et  $\mathcal{G}$  sont indépendant alors  $\mathbb{E}(f|\mathcal{G}) = \mathbb{E}[f]$ .
- (iv) Si  $f$  est  $\mathcal{G}$  mesurable alors  $\mathbb{E}(f|\mathcal{G}) = f$ .

*Démonstration.* (i) Par définition  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{G})|\mathcal{H})$  est l'unique fonction de  $L^1(\Omega, \mathcal{H}, P)$  tel que pour tous  $A \in \mathcal{H} \subset \mathcal{G}$  :

$$\int_A \mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{G})|\mathcal{H}) dP = \int_A \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP = \int_A f dP$$

Par unicité  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(f|\mathcal{H})$ .

(ii) Nous allons le montrer en plusieurs étapes, premièrement si  $g = \mathbb{1}_B$  pour  $B \in \mathcal{F}$  alors pour tous  $A \in \mathcal{G}$

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}(\mathbb{1}_B f|\mathcal{G}) dP &= \int_A \mathbb{1}_B f dP \\ &= \int_{A \cap B} f dP \\ &= \int_{A \cap B} \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP \quad \text{car } A \cap B \in \mathcal{G} \\ &= \int_A \mathbb{1}_B \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP \end{aligned}$$

Par unicité  $\mathbb{E}(\mathbb{1}_B f|\mathcal{G}) = \mathbb{1}_B \mathbb{E}(f|\mathcal{G})$ . La linéarité de l'espérance permet de conclure pour des fonctions en escaliers, or pour toute fonction positive  $g$  mesurable il existe une suite de fonctions en escalier  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  croissante tel que  $g = \lim g_n$  presque partout, et donc par le théorème de convergence monotone pour  $A \in \mathcal{G}$  :

$$\int_A g f dP = \lim_n \int_A g_n f dP = \lim_n \int_A \mathbb{E}(g_n \cdot f|\mathcal{G}) dP = \lim_n \int_A g_n \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP = \int_A g \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP$$

finalement si  $g$  est une fonction mesurable alors on écrit  $g = |g|\mathbb{1}_{\{g>0\}} - |g|\mathbb{1}_{\{g<0\}}$  et on applique le point précédent à  $|g|\mathbb{1}_{\{g>0\}}$  et  $|g|\mathbb{1}_{\{g<0\}}$ .

(iii) Soit  $A \in \mathcal{G}$ ,

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}(f|\mathcal{G}) dP &= \int_A f dP \\ &= \mathbb{E}[f] \cdot \mathbb{E}[\mathbb{1}_A] \quad \text{par indépendance} \\ &= \int_A \mathbb{E}[f] dP \end{aligned}$$

L'unicité permet de conclure.

(iv) Évident par la définition et l'unicité. □

**Lemme B.2.** Soit  $f \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ,  $\{\emptyset, \Omega\} = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}_N = \mathcal{F}$ , alors pour tous  $\varepsilon > 0$  :

$$P(|f - \mathbb{E}[f]| > \varepsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{4 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty}\right)$$

Où  $d_i = \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i) - \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_{i-1})$

*Démonstration.* En utilisant l'inégalité  $e^x \leq x + e^{x^2}$  on a pour tous  $\lambda \neq 0$  :

$$\mathbb{E}(e^{\lambda d_i} | \mathcal{F}_{i-1}) \leq \mathbb{E}(\lambda d_i | \mathcal{F}_{i-1}) + \mathbb{E}(e^{\lambda^2 d_i^2} | \mathcal{F}_{i-1})$$

Remarquons alors que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\lambda d_i | \mathcal{F}_{i-1}) &= \lambda \mathbb{E}(d_i | \mathcal{F}_{i-1}) \\ &= \lambda \mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i) | \mathcal{F}_{i-1}) - \lambda \mathbb{E}(\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_{i-1}) | \mathcal{F}_{i-1}) \\ &= \lambda \mathbb{E}(f | \mathcal{F}_{i-1}) - \lambda \mathbb{E}(f | \mathcal{F}_{i-1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

On a donc finalement

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{\lambda d_i} | \mathcal{F}_{i-1}) &\leq \mathbb{E}(e^{\lambda^2 d_i^2} | \mathcal{F}_{i-1}) \\ &\leq \mathbb{E}(e^{\lambda^2 \|d_i\|_\infty^2} | \mathcal{F}_{i-1}) \\ &\leq e^{\lambda^2 \|d_i\|_\infty^2} \end{aligned}$$

En utilisant la **proposition B.1.ii** on obtient :

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right) | \mathcal{F}_{i-1}\right)\right) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^{i-1} \lambda d_j\right) e^{\lambda d_i} | \mathcal{F}_{i-1}\right)\right) = \mathbb{E}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^{i-1} \lambda d_j\right) \mathbb{E}(e^{\lambda d_i} | \mathcal{F}_{i-1})\right)$$

D'où :

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right) \middle| \mathcal{F}_{i-1}\right)\right) \leq \mathbb{E}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^{i-1} e^{\lambda d_j}\right)\right) e^{\lambda^2 \|d_i\|_\infty^2}$$

d'autre part on a  $\mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right) \middle| \mathcal{F}_{i-1}\right)\right) = \mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right)\right)$  et donc on a

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right)\right) \leq \mathbb{E}\left(\exp\left(\sum_{j=1}^{i-1} e^{\lambda d_j}\right)\right) e^{\lambda^2 \|d_i\|_\infty^2}$$

Par récurrence on obtient :

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda \sum_{j=1}^i d_j\right)\right) \leq \exp\left(\lambda^2 \sum_{j=1}^i \|d_j\|_\infty^2\right) \quad (\star)$$

Remarquons maintenant ceci :

$$\sum_{i=1}^N d_i = \mathbb{E}(f | \mathcal{F}) - \mathbb{E}(f | \{\emptyset, \Omega\}) = f - \mathbb{E}[f]$$

Donc pour tous  $\lambda > 0$ ,

$$\begin{aligned} P(f - \mathbb{E}[f] > \varepsilon) &= P\left(\sum_{i=1}^N d_i > \varepsilon\right) \\ &= P\left(\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^N d_i - \varepsilon \lambda\right) > 1\right) \\ &\leq \mathbb{E}\left[\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^N d_i - \varepsilon \lambda\right)\right] \quad \text{par l'inégalité de Markov} \\ &\leq \exp\left(\lambda^2 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty^2\right) e^{-\varepsilon \lambda} \quad \text{par } (\star) \end{aligned}$$

de même

$$\begin{aligned} P(\mathbb{E}[f] - f > \varepsilon) &= P\left(-\sum_{i=1}^N d_i > \varepsilon\right) \\ &= P\left(\exp\left(-\varepsilon \lambda - \lambda \sum_{i=1}^N d_i\right) > 1\right) \\ &\leq \mathbb{E}\left[\exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^N d_i\right)\right] e^{-\varepsilon \lambda} \quad \text{par l'inégalité de Markov} \\ &\leq \exp\left(\lambda^2 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty^2\right) e^{-\varepsilon \lambda} \quad \text{par } (\star) \end{aligned}$$

finalement

$$P(|f - \mathbb{E}[f]| > \varepsilon) \leq 2 \exp\left(\lambda^2 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty^2\right) e^{-\varepsilon \lambda}$$

avec  $\lambda = \frac{\varepsilon}{2 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty^2}$  on obtient le resultat rechercher :

$$P(|f - \mathbb{E}[f]| > \varepsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{4 \sum_{i=1}^N \|d_i\|_\infty^2}\right)$$

□

**Définition & Proposition.** On note  $r_k \in L^2([0,1])$  définie par :

$$r_k(t) = \text{sign}(\sin(\pi 2^k t))$$

les  $(r_k)_{k \in \mathbb{N}}$  sont appelées fonctions de Rademacher et elles vérifient les propriétés suivantes :

- (i) Pour  $p \neq q$ ,  $r_p$  et  $r_q$  sont orthogonaux dans  $L^2$ .
- (ii) Pour tous  $j \in \mathbb{N}^*$ ,  $\int_0^1 r_j d\lambda = 0$ .

*Démonstration.* (i) Supposons  $p < q$ , on a l'égalité suivante :

$$\int_0^1 \text{sign}(\sin \pi 2^p t) \text{sign}(\sin \pi 2^q t) dt = \sum_{i=0}^{2^p-1} \int_{i2^{-p}}^{(i+1)2^{-p}} \text{sign}(\sin \pi 2^p t) \text{sign}(\sin \pi 2^q t) dt$$

Or pour tout  $t \in ]i2^{-p}, (i+1)2^{-p}[$ , on a  $\text{sign}(\sin \pi 2^p t) = (-1)^i$  et de plus

$$\pi 2^q t \in ]i2^{q-p}\pi, (i+1)2^{q-p}\pi[$$

un intervalle de taille un multiple de  $2\pi$ , et pour finir  $\text{sign}(\sin \pi 2^q t)$  prends les valeurs 1 et  $-1$  sur des intervalles de mêmes longueurs pour  $t \in ]i2^{-p}, (i+1)2^{-p}[$ , donc chaque termes de la somme est nulle.

(ii) Pour  $t \in ]0,1[$  on a  $\pi 2^j t \in ]0, 2^j \pi[$  un intervalle de taille un multiple de  $2\pi$ , donc  $\sin(\pi 2^j t)$  prend des valeurs positives et négatives sur des ensembles de mêmes mesures, et donc  $\int_0^1 r_j d\lambda = 0$ . □

**Théorème B.3** (Inégalité de Khinchine). Pour tous  $1 \leq p < \infty$ , il existe des constantes  $0 < A_p < B_p$  tel que pour tous  $n$  et tous  $(a_i)_{i \leq n} \subset \mathbb{R}$  :

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{A_p} \leq \left(\int_0^1 \left|\sum_{i=1}^n a_i r_i(t)\right|^p dt\right)^{\frac{1}{p}} \leq B_p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

*Démonstration.* Soit  $(a_i)_{i \leq n} \neq (0, \dots, 0)$ , posons  $b_i = \frac{a_i}{(\sum_{i=1}^n a_i^2)^{\frac{1}{2}}}$  et  $f = \sum_{i=1}^n b_i r_i$ , on veut appliquer le lemme qui précède à  $f$ , pour cela il nous faut définir une suite de sous-tribus de  $\text{Bor}([0,1])$ ,

on la construit de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_0 &= \{\emptyset, [0, 1]\} \\ \mathcal{F}_1 &= \sigma(r_1) \\ \mathcal{F}_2 &= \sigma(r_1, r_2) \\ &\vdots \\ \mathcal{F}_n &= \sigma(r_1, \dots, r_n) \\ \mathcal{F}_{n+1} &= \text{Bor}([0, 1])\end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned}d_i &= \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i) - \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_{i-1}) \\ &= \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(b_j r_j|\mathcal{F}_i) - \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(b_j r_j|\mathcal{F}_{i-1})\end{aligned}$$

remarquons alors que

- Si  $1 \leq j \leq i < n$ ,  $r_j$  est  $\mathcal{F}_j \subset \mathcal{F}_i$  mesurable, donc  $\mathbb{E}(r_j|\mathcal{F}_i) = r_j$ .
- Si  $j > i$ ,  $r_j$  est indépendante de  $\mathcal{F}_i$  et donc  $\mathbb{E}(r_j|\mathcal{F}_i) = \mathbb{E}(r_j) = 0$

et donc si  $1 < i \leq n$  :

$$d_i = \sum_{j=1}^i b_j r_j - \sum_{j=1}^{i-1} b_j r_j = b_i r_i$$

et

$$\begin{aligned}d_1 &= b_1 r_1 - \mathbb{E}(b_1 r_1) = b_1 r_1 \\ d_{n+1} &= \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) - \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_n) = f - f = 0\end{aligned}$$

et l'on obtient :

$$\sum_{i=1}^{n+1} \|d_i\|_\infty^2 = \sum_{i=1}^n |b_i|^2 = 1$$

par le **lemme B.2** pour tous  $\varepsilon > 0$  :

$$\lambda(|f| > \varepsilon) \leq 2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{4}\right)$$

Par changement de variable  $s^p = t$  on obtient :

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f|^p d\lambda &= \int_0^{+\infty} \lambda(|f|^p > t) dt = \int_0^{+\infty} p s^{p-1} \lambda(|f| > s) ds \\ &\leq 2p \int_0^{+\infty} s^{p-1} e^{-\frac{s^2}{4}} ds \\ &\leq B_p^p\end{aligned}$$

avec  $B_p = \left(2p \int_0^{+\infty} s^{p-1} e^{-\frac{s^2}{4}} ds\right)^{\frac{1}{p}}$ .

Donc pour  $p \geq 2$  :

$$1 = \left(\int_0^1 |f|^2 d\lambda\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 |f|^p d\lambda\right)^{\frac{1}{p}} \leq B_p$$



$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 \left|\sum_{i=1}^n a_i r_i\right|^p d\lambda\right)^{\frac{1}{p}} \leq B_p \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Pour  $p = 1$ , soit  $\theta \in ]0, 1[$  alors

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f|^2 d\lambda &= \int_0^1 |f|^{2\theta} |f|^{2(1-\theta)} d\lambda \leq \left(\int_0^1 |f| d\lambda\right)^{2\theta} \left(\int_0^1 |f|^4 d\lambda\right)^{\frac{1-\theta}{2}} \\ 1 &= \left(\int_0^1 |f|^2 d\lambda\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 |f| d\lambda\right)^{\theta} B_4^{1-\theta} \end{aligned}$$

Avec  $\theta = \frac{1}{3}$  on obtient :

$$B_4^{-2} \leq \int_0^1 |f| d\lambda$$

Et pour  $1 \leq p < 2$  on a finalement :

$$B_4^{-2} \leq \int_0^1 |f| d\lambda \leq \left(\int_0^1 |f|^p d\lambda\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_0^1 |f|^2 d\lambda\right)^{\frac{1}{2}} = 1$$

c'est-à-dire

$$B_4^{-2} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 \left|\sum_{i=1}^n a_i r_i\right|^p d\lambda\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

□

## RÉFÉRENCES

---

- [1] G. SCHECHTMAN, “Euclidean sections of convex bodies,” 2008.
- [2] A. GROTHENDIECK, “Sur certains classes de suites dans les espaces de Banach, et le théorème de Dvoretzky-Rogers,” 1956.
- [3] V. MILMAN, “New proof of the theorem of A. Dvoretzky on intersections of convex bodies,” 1971.
- [4] Y. GORDON, “On Milman’s inequality and random subspaces which escape through a mesh in  $\mathbb{R}^n$ ,” 1988.
- [5] G. SCHECHTMAN, “A remark concerning the dependence on  $\varepsilon$  in dvoretzky’s theorem,” 1989.
- [6] G. SCHECHTMAN, “Concentration results and applications,” 2003.
- [7] G. PISIER, *The volume of convex bodies and Banach space geometry*. Cambridge University Press, 1989.
- [8] V. MILMAN, “Dvoretzky theorem - thirty years later,” 1992.
- [9] V. MILMAN et G. SCHECHTMAN, *Asymptotic theory of finite dimensional normed space*. Springer, 1986.