

TP Principes et Méthodes Statistiques

Gabriel Sarrazin, Nejmeddine Douma, Simon Rabourg

Avril 2015

1 Analyse des défauts de cuves

2 Vérifications expérimentales à base de simulations

1. Il est possible de simuler n échantillons de la loi $Pa(a,b)$ car nous connaissons sa fonction de répartition.

$P_a(a,b)$ est une fonction continue, elle peut donc s'apparenter à une loi uniforme. Dans un premier temps, simuler n échantillons de cette loi va donc consister à tirer, au hasard, n valeurs aléatoires sur l'intervalle $[0,1]$. Connaissant la fonction de répartition de la loi $P_a(a,b)$, nous allons ensuite calculer l'image inverse $F^{-1}(U_i)$ pour obtenir un échantillon de loi $P_a(a,b)$ et nous ferons cela pour les n valeurs obtenues sur $[0,1]$

Nous pouvons représenter cette méthode sous forme d'un graphique : en mettant en ordonnée les n valeurs de la loi U_i et en abscisse la projection pour chacune de ses valeurs de son image inverse ($F^{-1}(U_i)$).

2. En suivant la méthode décrite précédemment, nous avons simulé m échantillon de taille n avec différentes valeurs pour m, n et a .




FIGURE 1 – Graphe des proportions d'IC(α) contenant la valeur exacte de a pour différentes valeurs de α

Nous avons ensuite, pour chaque échantillon de taille n , calculer l'intervalle de confiance bilatéral. Pour cela nous avons utilisé l'intervalle de confiance trouvé en première partie qui s'utilise avec $Y = \ln \frac{X}{2}$. A chaque fois que a est bien contenu dans cet intervalle, nous incrémentons une variable compteur. La proportion Pr d'IC contenant a est donc $Pr = \text{Compteur}/m$.

Afin que cela soit plus représentatif, nous avons tracé un graphique avec les différentes proportions obtenues en fonction des α . (Voir figure page 3)

Nous pouvons voir qu'il existe une linéarité entre la proportion et les α . Plus on augmente le nombre d'échantillon m et leur taille n et plus l'approximation est exacte. Ces points ont été obtenus pour les valeurs de $m = 100$, $n = 10, 30, 50, 100, 200, 500$, $a = 3, 5, 10, 20, 50$ et $\alpha = 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, \dots, 0.80, 0.90, 0.95, 0.99$.

Quand on simule un grand nombre m d'échantillons de taille n de la loi $P_a(a, 2)$ alors la proportion d'IC(α) contenant a est approximativement égale à $1 - \alpha$.

3. Afin d'estimer le paramètre a , nous disposons de trois méthodes : la méthode des moments, la méthode du maximum de vraisemblance qui nous mènent au même résultat pour l'estimation du paramètre a et nous pouvons aussi déterminer l'estimateur sans biais de variance minimale si celui-ci existe.

Pour chaque échantillon (m en tout) nous mis au point sur R une fonction qui calcule les estimateurs proposés, qui estime le biais et l'erreur quadratique de chaque estimateur, et qui fait une moyenne pour chacun de ces résultats. Par ces résultats, nous pouvons tracer un histogramme des estimateurs obtenus avec en rouge : la moyenne de ces estimateurs et en bleu : la valeur exacte de a pour laquelle il faut être la plus proche.

Pour chaque graphique voici les moyennes des biais et des EQM obtenus pour chaque estimateur :

- Moyenne des biais EMV 1.691318 Moyenne des biais ESBVM -0.6469459 Moyenne des EQM EMV 38.3953 Moyenne des EQM ESBVM 23.16078
- Moyenne des biais EMV 0.7355605 Moyenne des biais ESBVM 0.1987825 Moyenne des EQM EMV 6.691049 Moyenne des EQM ESBVM 5.589889
- Moyenne des biais EMV 0.08228447 Moyenne des biais ESBVM -0.1193612 Moyenne des EQM EMV 1.867297 Moyenne des EQM ESBVM 1.801097
- Moyenne des biais EMV 0.1657237 Moyenne des biais ESBVM 0.06406643 Moyenne des EQM EMV 0.8215394 Moyenne des EQM ESBVM 0.7823774
- Moyenne des biais EMV 0.02238977 Moyenne des biais ESBVM 0.002344989 Moyenne des EQM EMV 0.207069 Moyenne des EQM ESBVM 0.2057478

Après analyse des résultats et des graphiques, nous pouvons en déduire que le meilleur estimateur est l'*ESBVM* car il possède le biais et l'erreur quadratique moyenne le plus faible sur l'ensemble des échantillons. Il faut noter que plus la taille des échantillons est élevée, plus les estimateurs sont précis. Nous pouvons tout de même constater que quelque soit la taille de l'échantillon, l'*ESBVM* est le meilleur estimateur.




FIGURE 2 – Histogramme des EMV et ESBVM pour $m = 100n = 5a = 10$




FIGURE 3 – Histogramme des EMV et ESBVM pour $m = 100n = 20a = 10$




FIGURE 4 – Histogramme des EMV et ESBVM pour $m = 100n = 50a = 10$




FIGURE 5 – Histogramme des EMV et ESBVM pour $m = 100n = 100a = 10$




FIGURE 6 – Histogramme des EMV et ESBVM pour $m = 500n = 5a = 10$