

FATTI DI ALGEBRA

TEORIA DEI GRUPPI

Nel seguito G indica un qualsiasi gruppo, viene indicata con e l'unità del gruppo. La notazione usata è quella moltiplicativa. $H \subseteq G$ indica che H è sottogruppo di G (eventualmente coincidente). $H \trianglelefteq G$ indica che H è un sottogruppo normale di G .

- Due qualsiasi laterali destri di $H \subseteq G$ in G (Ha e Hb) sono in corrispondenza biunivoca attraverso la funzione $ah \mapsto bh$
- Esiste inoltre una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei laterali destri e quello dei laterali sinistri di uno stesso sottogruppo H
- **(Teorema di Lagrange)** G finito e $H \subseteq G$, allora $\text{ord } H \mid \text{ord } G$
- G finito, $a \in G$ allora $\text{ord } a \mid \text{ord } G$ e $a^{\text{ord } G} = e$
- **(Ciclicità degli ordini primi)** G finito con ordine primo ($\text{ord } G = p \in \mathbb{P}$), allora G è ciclico
- **(Sottogruppo prodotto)** $H, K \subseteq G$. Allora $HK \subseteq G \Leftrightarrow HK = KH$
- **(Ordine del prodotto)** $H, K \subseteq G$ con H e K sottogruppi finiti. Supponiamo che $HK \subseteq G$. Allora $\text{ord } (HK) = \frac{\text{ord } (H)\text{ord } (K)}{\text{ord } (H \cap K)}$
- **(Definizione di sottogruppo normale)** $N \trianglelefteq G \Leftrightarrow \forall x \in G \quad xHx^{-1} = H \Leftrightarrow \forall x \in G \quad xHx^{-1} \subseteq H \Leftrightarrow \forall x \in G \quad xH = Hx$
- **(Gruppo quoziente)** Se $N \trianglelefteq G$, allora anche G/N è un gruppo. Inoltre se G è finito, vale $\text{ord } (G/N) = \frac{\text{ord } (G)}{\text{ord } (N)}$
- **(Proiezione al quoziente)** $N \trianglelefteq G$. $\Phi : G \mapsto G/N$ definita da $\Phi(g) = Ng$ è un omomorfismo surgettivo.
- **(Gruppi abeliani hanno tutti i sottogruppi normali)** G abeliano. $N \subseteq G \implies N \trianglelefteq G$.
- **(Controimmagine di un normale è normale)** $N' \trianglelefteq G', \Phi : G \rightarrow G'$. Allora $\Phi^{-1}(N') \trianglelefteq G$.
- **(Immagine di un normale con morfismo surgettivo è normale)** $N \trianglelefteq G, \Phi : G \rightarrow G'$ omomorfismo sugettivo. Allora $\Phi(N) \trianglelefteq G'$.
- **(Normalità del Ker)** $\Phi : G \mapsto H$ omomorfismo surgettivo. $K = \text{Ker } \Phi \implies K \trianglelefteq G$
- **(L'immagine è un sottogruppo)** $\Phi : G \rightarrow G'$ omomorfismo. $\text{Im } \Phi \subseteq G'$ (ma NON è detto che sia normale)
- **(Immagini inverse)** $\Phi : G \mapsto H$ omomorfismo. $\text{Ker } \Phi = K \implies \Phi^{-1}\Phi(x) = Kx$
- **(Primo teorema di Omomorfismo)** $\Phi : G \mapsto H$ omomorfismo surgettivo con $K = \text{Ker } \Phi$. Allora $G/K \cong H$.
- **(Teorema di Cauchy)** Sia $p \in \mathbb{P}$ t.c. $p \mid \text{ord } G$. Esiste allora $a \neq e$ t.c. $a^p = e$
- **(Teorema di Sylow)** Sia $p \in \mathbb{P}$ t.c. $p^\alpha \mid \text{ord } G, p^{\alpha+1} \nmid \text{ord } G$. Allora G ha un sottogruppo di ordine p^α . Inoltre se G è abeliano tale sottogruppo è unico.
- **(Corrispondenza tra gruppi normali)** Sia $\Phi : G \mapsto G'$ omomorfismo surgettivo. $K = \text{Ker } \Phi$. Dato $H' \subseteq G'$ si definisca $H = \{x \in G \mid \Phi(x) \in H'\}$. Si ha che $H \subseteq G$ t.c. $K \subseteq H$. Inoltre se $H' \trianglelefteq G'$ allora $H \trianglelefteq G$. L'associare H' ad H stabilisce una corrispondenza biunivoca dell'insieme di tutti i sottogruppi di G' sull'insieme di tutti i sottogruppi di G che contengono K

- **(Secondo teorema di Omomorfismo)** $\Phi : G \mapsto G'$ omomorfismo surgettivo, $K = \text{Ker } \Phi$. Si prenda ora $N' \trianglelefteq G'$ e sia $N = \{x \in G \mid \Phi(x) \in N'\}$. Allora $G/N \cong G'/N'$ oppure, in modo equivalente, $G/N \cong (G/K)/(N/K)$.
- **(Il centro è un sottogruppo normale)** $Z(G) \trianglelefteq G$.
- **(Caratterizzazione degli automorfismi interni)** $\text{Int } G \cong G/Z$ con $Z = Z(G)$ centro di G . Inoltre $\text{Int } G \trianglelefteq \text{Aut } G$

PARTICOLARI TIPI DI GRUPPI

- **(I gruppi ciclici sono abeliani)** G ciclico $\implies G$ abeliano. (Segue dall'associatività dell'operazione di gruppo)
- **(Ciclicità dei gruppi con ordine primo)** G gruppo. $\text{ord } G = p \in \mathbb{P} \implies G$ è ciclico. (Basta usare Cauchy)
- **(Esiste un unico gruppo ciclico di ogni ordine)** G gruppo ciclico. $\text{ord } G = n \implies G \cong \mathbb{Z}_n$
- **(Abelianità di Gruppo con quoziente sul centro ciclico)** G gruppo. $G/Z(G)$ ciclico $\implies G$ abeliano

CONTROESEMPI

- **(Gruppo non abeliano con tutti i sottogruppi normali)** $Q_8 = \{1, i, j, k, -1, -i, -j, -k\}$ con le regole di moltiplicazione tra quaternioni. ($i^2 = j^2 = k^2 = 1, ij = k, ji = -k, \dots$)

TRUCCHI VARI

- Se non sai cosa fare, può essere utile considerare il gruppo ciclico generato da un elemento $\langle a \rangle$
- Il modo più utile di usare l'informazione $\text{MCD}(a, b) = 1$ è tramite Bézout: $\exists s, t \text{ t.c. } as + bt = 1$, soprattutto se a e b sono ordini di gruppi.
- Se $N \trianglelefteq G$, $x^{i_G(N)} \in N$ (poiché $i_G(N)$ è l'ordine del gruppo quoziente G/N)
- Se $G^k \subseteq G$, allora $G^k \trianglelefteq G$. (Segue banalmente da $ga^k g^{-1} = (ga g^{-1})^k$)

CARATTERISTICHE DI S_n

- S_n NON è abeliano per $n \geq 3$. Infatti (12) e (13) non commutano
- Il centro di S_n è banale per $n \geq 3$. Per questo motivo S_n NON è nilpotente per $n \geq 3$
- S_n per $n \neq 2, 6$ è un gruppo completo poiché non ha centro ed ogni automorfismo è interno

LAYOUT COMPLETO DI S_4

S_4 è il gruppo delle permutazioni di quattro elementi. A_4 è il gruppo delle permutazioni pari. V_4 è il gruppo dei prodotti di 2-cicli disgiunti ($V_4 = \{(), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$). D_8 è il gruppo diedrale di ordine otto.

S_4 contiene le seguenti permutazioni:

- 1 identità: $()$
- 6 2-cicli: $(12), (13), (14), (23), (24), (34)$

- 3 prodotti di 2-cicli: $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$
- 8 3-cicli: $(123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243)$
- 6 4-cicli: $(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)$

Altre caratteristiche di S_4 :

- Abbiamo che S_4 è risolubile considerando la catena $(e) \subseteq V_4 \subseteq A_4 \subseteq S_4$
- $A_4 \trianglelefteq S_4$ (Poiché ha indice 2)
- $V_4 \trianglelefteq S_4$ (conti)
- $D_8 \subseteq S_4$ (prendendo $D_8 = \{(), (1234), (13)(24), (1432), (12)(34), (14)(23), (13)(24)\}$)