

ADATOK A PROJEKTRŐL

A „Népesedési folyamatok javítása helyi szinten egészségfejlesztési módszerekkel” elnevezésű IPOP ROHU00259-es elnevezésű projekt a **Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülete a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központtal** partnerségben az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program támogatásával valósul meg. A célkitűzések között szerepel egy **Egészségvédelmi – Felvilágosító Iroda** kialakítása és működtetése, feladata a megelőzés fontossága és az egészséges életmód népszerűsítése, egészségnevelési és tanácsadói tevékenységek ellátása. A projekt összköltségvetése 2.386.793,01 euro.

A PROJEKT CÉLJA

Szűrés, prevenció, egészséges életmód – együtt a hosszabb életért.

Kapcsolat

Szatmárnémeti Egészségfejlesztési Iroda

Szatmárnémeti, Ștefan cel Mare utca 13. szám

Telefonszám: 0742 021 316

Email: contact@vitacenter.ro, www.vitacenter.ro

Jelen szórólap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.



Boldog Scheffler János Központ



Ministerul Sănătății și Protecției Sociale
sanatate.gov.ro

Interreg



Az Európai Unió
társfinanszírozásával

Románia - Magyarország

Népesedési folyamatok javítása
helyi szinten egészségfejlesztési
módszerekkel - IPOP, ROHU00259

LEGYEN EGY LÉPÉSEL
A PROSZTATARÁK ELŐTT!



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

www.interreg-rohu.eu



GUVERNUL ROMÂNIEI

A prosztatarak a prosztatán fellépő szabályozatlan sejtszaporulat következménye. Világszerte évente 1,3 millió férfinál diagnosztizálnak prosztatarakot, ami évi 220.000 halálesetért felelős. Ez a második leggyakoribb daganatos megbetegedés globális szinten a férfiak körében a tüdőrák után.

A prosztatata daganata rendkívül lassan is növekedhet, ezért a páciens állapota úgy rosszabbodhat, hogy nem észlel közben figyelmeztető jeleket.


A PROSZTATARÁK OKAI ÉS RIZIKÓFAKTORAI:

- az életkor – 50 év fölöttieknél gyakrabban alakulhat ki
- amennyiben a családban előfordult prosztatata-
emlő vagy petefészek-rák
- zsíros táplálkozás, elhízottság
- dohányzás, ülő életforma

A PROSZTATARÁK TÜNETEI:

- vizelési zavarok a gyakori vizelési inger ellenére
- gyakori vizelés
- az érzet, hogy a húgyhólyag nem ürült ki teljesen
- véres vizelet és ondó

**Legyen egy lépéssel
a prosztatarak előtt!**



A szűrés célja, hogy még a tünetek megjelenése előtt felismerjék a megbetegedést, a prosztatarakot pedig a kezdeti állapotában azonosítsák.



A prosztatarak túlélési aránya jóval nagyobb, amennyiben időben felismerik a betegséget és elkezdik a megfelelő kezelést.

A szűrővizsgálat során a vérből ún. PSA-meghatározást (prosztatá specifikus antigén) végeznek. A magas PSA-érték további vizsgálatokat tesz szükségessé.

A szűrés minden férfi számára ajánlott, akinél fellépnek a tünetek, az 50. életévüket betöltöttök esetében pedig két évente érdemes megismételni azt.

Forduljon orvoshoz, amennyiben a tünetek jelentkeztek Önnél vagy magas PSA-értéket állapítottak meg.