Métrica RAPM: Evaluación del impacto ofensivo y defensivo de los jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina

Tesina de grado

Estudiante: Simón Pedro Gazze

Director: Andrés Sosa

Codirectora: Cristina Cuesta

Fecha: 17 de septiembre de 2026





Agradecimientos

Todo este recorrido no podría haber sido posible sin la gente que me acompañó y estuvo a mi lado a lo largo de estos años. Estoy muy agradecido. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte.

En primer lugar quiero agradecer a mi papá y a mi mamá, Fernando y Mirna, por no haber dudado ni un segundo de mí, hasta en los momentos más difíciles. Son mi espejo y me enorgullece mucho ser su hijo.

A mis hermanos, Caetano y Felipe, por ser mi sostén y alegría, tanto en Rosario como en Reconquista. Gracias por aguantarme y siempre sacarme una sonrisa.

A Sofía, mi compañera, mi cómplice y todo, por estar a mi lado en todo momento, desde el día uno. Gracias por tu amor que no entiende de distancias y por tu confianza en mí, que me hace creer que todo lo puedo.

A mis amigos de Reconquista (LB) porque cada vez que vuelvo siento como si nunca me hubiera ido.

A mi grupo de la facultad, el cual se convirtió en mucho más que un grupo de estudio, porque con ustedes empecé a disfrutar mucho más el cursado. Particularmente a Malena, Manuel y Román, con los cuales, a base de risas y estudio, preparamos (y aprobamos) una por una las materias que se pusieron en nuestro camino.

A mi equipo de trabajo, por brindarme el tiempo para avanzar con la tesina siempre que lo necesité y acompañarme, con un oído siempre a disposición, durante todo este proceso.

A Cristina, Andrés y Nacho, por ser mis guías en este camino y, principalmente, por la paciencia que tuvieron conmigo. Su acompañamiento fue fundamental para que este trabajo llegue a buen puerto.

A todos los docentes de la Licenciatura en Estadística de la UNR, sobre los cuales tengo un respeto y una admiración enormes, por su buena voluntad, su calidez y su gran vocación que

inspira a seguir sus pasos.

Por último, a la Universidad Nacional de Rosario. Pública, gratuita y de calidad. Por ser un espacio no solo de formación del más alto nivel, sino también un lugar de encuentro, desarrollo y contención.

Resumen

El crecimiento de la analítica deportiva ha impulsado el desarrollo de métricas destinadas a evaluar con mayor precisión la contribución de los jugadores al rendimiento de sus equipos. Particularmente en el básquetbol, las estadísticas individuales derivadas del *box score* presentan limitaciones para capturar el impacto real de los jugadores sobre el resultado del juego. Una de las medidas desarrolladas con este propósito es el *plus-minus*, que registra la diferencia de puntos generada mientras un jugador permanece en cancha. Sin embargo, esta métrica presenta dificultades para aislar el efecto propio de cada jugador respecto del contexto en el que participa. En respuesta a esta problemática surge el *Regularized Adjusted Plus Minus* (RAPM), una medida basada en modelos estadísticos que estima el impacto ofensivo y defensivo de cada jugador controlando simultáneamente la presencia de compañeros y rivales en cancha.

El objetivo de este trabajo es estimar el impacto individual de los jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina durante la temporada 2024/2025 mediante distintos modelos estadísticos dentro del enfoque RAPM, construyendo rankings que permitan identificar y comparar sus contribuciones ofensivas y defensivas. Asimismo, se analizaron distintas alternativas metodológicas para abordar problemas recurrentes en este tipo de modelos, particularmente la multicolinealidad entre jugadores y la presencia de coeficientes extremos asociados a jugadores con escasa participación en cancha.

Las acciones de juego registradas fueron agrupadas en posesiones, que constituyen la unidad de análisis utilizada para la estimación de las métricas propuestas. Inicialmente, se ajustaron modelos de regresión lineal múltiple, incorporando distintas técnicas de regularización. Posteriormente, se implementaron modelos de regresión logística multinomial que representan de manera más adecuada la naturaleza discreta de la variable respuesta. A partir de las probabilidades estimadas por estos modelos se construyó una métrica basada en puntos esperados por posesión (EPTS). Finalmente, se implementó una versión ponderada de esta métrica, denominada wEPTS, que incorpora la participación de cada jugador relativa a las posesiones de su equipo con el objetivo de penalizar a los jugadores con poco tiempo de juego.

Los resultados obtenidos muestran que esta métrica presentó un desempeño superior al de las alternativas propuestas, de acuerdo con los distintos criterios de validación utilizados.

Hasta donde se ha podido relevar, este estudio constituye una de las primeras aplicaciones de métricas basadas en el enfoque RAPM en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina y aporta una metodología reproducible para la evaluación objetiva del rendimiento individual de los jugadores, contribuyendo al desarrollo de herramientas de analítica deportiva en el contexto del básquetbol argentino.

Palabras clave: básquetbol, analítica en el deporte, Liga Nacional de Básquet, plus-minus, RAPM, regresión logística multinomial, regularización.

Contenido

Agradecimientos

Resumen

1 Introducción **1**

Sports Analytics 1

Analítica deportiva en el básquetbol argentino 2

Medidas de desempeño para jugadores de básquetbol 3

Regularized Adjusted Plus Minus (RAPM) 4

1.1 Objetivos 6

1.1.1 Objetivo general 6

1.1.2 Objetivos específicos 6

1.2 Organización de la tesina 7

2 Datos **8**

2.1 Generación de la base de datos a partir de técnicas de Web Scraping 8

2.1.1 Listado de links de los partidos 8

2.1.2 Base de datos *play-by-play* 10

2.1.3 Tabla de jugadores-equipos 12

2.2 Preprocesamiento de los datos 13

2.2.1 Integración del *box score* con el *play-by-play* 13

2.2.2 Identificación de los quintetos en cancha al momento de la acción 13

2.3 Generación de la base de datos *poss-by-poss* 15

2.3.1 Eliminación de acciones no relevantes para la posesión 16
2.3.2 Manejo de otro tipo de acciones particulares 17
2.3.3 Identificación de la finalización de las posesiones 19
2.3.4 Cálculo y validación de los puntos por posesión 20
2.3.5 Identificación de jugadores ofensivos y defensivos en cancha 22
2.4 Base de datos final: *poss-by-poss* 22

3 Metodología **24**

3.1 Modelos propuestos 24
3.1.1 Modelo de regresión lineal múltiple 24
3.1.2 Modelo logístico multinomial 26
3.2 EPTS y wEPTS 28
3.2.1 *Expected points* (EPTS) 29
3.2.2 *Weighted expected points* (wEPTS) 30
3.3 Estimación de los RAPMs 32
3.3.1 Método de mínimos cuadrados 32
3.3.2 Método de máxima verosimilitud 32
3.4 Multicolinealidad 33
3.5 Tratamiento de los jugadores con poco tiempo de juego (*Low time players - LTP*) 35
3.6 Métodos de regularización 36
3.6.1 Regresión Ridge o Regularización L_2 37
3.6.2 Lasso o Regularización L_1 38
3.6.3 Elastic Net 40

3.7 Selección de hiperparámetros óptimos 41
3.8 Comparación de modelos 42
3.8.1 Bondad de ajuste 43
3.8.2 Evaluación de la consistencia de los resultados 45
3.8.3 Criterios de validación externa 46

4 Resultados **48**

4.1 Análisis descriptivo 48
4.1.1 Puntos por posesión 48
4.1.2 Rendimiento de los equipos 49
4.1.3 Análisis de *plus-minus* 51
4.1.4 Análisis del *plus-minus* por cada 100 posesiones 52
4.1.5 Análisis del *plus-minus* estandarizado por equipo 55
4.2 Métricas basadas en modelos estadísticos 58
4.2.1 RAPM 59
4.2.2 EPTS 60
4.2.3 wEPTS 61
4.3 Comparación de modelos 64
4.3.1 Bondad de ajuste 64
4.3.2 Consistencia 66
4.3.3 Validación externa 68
4.4 Rankings de jugadores 73

5 Discusión **79**

5.1 Interpretación y discusión de los resultados 79

5.2 Aportes del trabajo 80

5.3 Limitaciones del trabajo 81

5.4 Propuestas de extensión del trabajo 82

6 Conclusiones **84**

7 Bibliografía **86**

8 Anexo **88**

8.1 Controles de consistencia y corrección de errores en la base de datos 88

8.2 Detección de errores en el marcador parcial: caso *QUIMSA vs BOCA (019/10/2024 11:30)* 89

1 Introducción

Sports Analytics

Sports Analytics o analítica en el deporte es un término que refiere a la aplicación de métodos estadísticos para describir, explicar y/o predecir fenómenos vinculados al rendimiento deportivo, tanto a nivel individual como colectivo, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de entrenadores o *staff* técnico antes, durante y después de los partidos.

A pesar de que las primeras aplicaciones al análisis de datos al deporte se remontan a mediados del siglo XX, el impulso más significativo ocurrió a partir del año 2000, en particular en el béisbol, con la popularización del enfoque conocido como *sabermetrics*[1]. Desde entonces, la práctica se extendió a otros deportes como el básquetbol, el fútbol o el tenis; dando lugar a una nueva cultura de toma de decisiones basada en evidencia. Hoy en día, los equipos profesionales, las ligas y las federaciones emplean departamentos especializados en análisis de datos para optimizar estrategias de juego, evaluar el rendimiento de jugadores, prevenir lesiones y gestionar recursos económicos de manera más eficiente.

El básquetbol es uno de los deportes que más ha incorporado el análisis estadístico en su evolución reciente. Dicha evolución se desarrolla partiendo de las primeras métricas derivadas del *box score* (resumen estructurado de los resultados de un partido), continuando por el desarrollo de bases de datos *play-by-play* (registro de cada una de las acciones del partido), a partir de la década del 2000, hasta la incorporación más reciente de tecnologías de *player tracking* (sistema que utiliza cámaras y software de visión artificial en los estadios para registrar los movimientos de jugadores y pelotas en tiempo real). En base a esta información, se han desarrollado distintas herramientas estadísticas para poder estudiar la eficiencia de los jugadores, la eficiencia de los lanzamientos al aro, el desempeño de los equipos, la importancia en la creación de espacios, entre otras cosas.

[1]Término utilizado para referirse al análisis estadístico del béisbol, basado en la recopilación y estudio sistemático de datos con el fin de comprender y cuantificar el desempeño de los jugadores y equipos. El nombre proviene de SABR (*Society for American Baseball Research*).

Analítica deportiva en el básquetbol argentino

El creciente interés por la analítica deportiva que se ha evidenciado en los últimos años en distintos países del mundo, ha empezado a captar la atención de las entidades deportivas en Argentina. En particular, durante 2025, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) y la Asociación de Clubes (AdC) anunciaron la ampliación de su alianza con Catapult (empresa australiana de tecnología deportiva), integrando equipamiento de *wearables* (GPS) y software de videoanálisis para las 19 franquicias de la Liga Nacional, las 34 de la Liga Argentina y las selecciones nacionales en todas las ramas. Por su parte, en el ámbito educativo, el Instituto CAB (creado en 2023) realizó un convenio con Sports Data Campus (España) para ofrecer, en agosto de 2025, el primer curso de *Big Data aplicado al básquetbol* en Argentina, con el objetivo de que entrenadores y *staff* técnico colaboren en proyectos reales de CAB, aportando soluciones basadas en datos sobre rendimiento, *scouting* y optimización de procesos (Confederación Argentina de Básquetbol, 2025).

Estas iniciativas dan indicio de que estamos ante un momento ideal para profundizar en el estudio y la aplicación del análisis de datos en el básquetbol. Se trata de un área que comienza a reconocerse como un componente fundamental tanto para mejorar el rendimiento deportivo de los equipos como para impulsar el desarrollo del negocio en torno al deporte. Sin embargo, el potencial de la analítica aplicada al básquetbol en Argentina aún pareciera encontrarse lejos de estar plenamente aprovechado.

En este marco, y con el fin de caracterizar el estado de situación del análisis de datos en el básquet argentino, se relevan los proyectos e iniciativas actualmente activos en el país vinculados a la estadística y la tecnología aplicada al deporte. Estos son:

- *CHAS All Stats*, dirigido por Facundo Salas y Sebastián Fiol, ambos entrenadores de básquetbol Nivel 3 Eneba, especialistas en estadísticas avanzadas y analistas de datos en equipos profesionales. Ofrecen servicios de análisis táctico y brindan cursos de estadísticas avanzadas.

- *Básquet Advance*, dirigido por el entrenador Cristian Sánchez, ofrece informes pre/post partido con estadísticas avanzadas y tendencias clave para entrenadores y *scouts*.

Ambos proyectos ofrecen herramientas muy importantes y de gran valor tanto para los equipos como para el desarrollo del análisis de datos en el deporte. Sin embargo, a partir del relevamiento realizado, no se identificó en estas iniciativas la participación de profesionales con formación específica en estadística o matemática.

En este contexto, la incorporación de profesionales de estas disciplinas que trabajen en conjunto con entrenadores y cuerpos técnicos representa una oportunidad para conformar equipos interdisciplinarios que combinen el conocimiento deportivo con herramientas estadísticas y matemáticas. Esta articulación permitiría ampliar las posibilidades de análisis, incorporar nuevas metodologías y fortalecer las herramientas actualmente disponibles, potenciando el desarrollo del básquet argentino y contribuyendo a elevar su nivel competitivo en un futuro.

Medidas de desempeño para jugadores de básquetbol

Desde la consolidación del *box score* en el básquetbol profesional, durante la década de 1950, empezaron a calcularse las primeras medidas de desempeño para los jugadores, como pueden ser los puntos, rebotes, asistencias, etc. Durante mucho tiempo estas métricas constituyeron una de las formas más tradicionales de evaluar el rendimiento individual en el básquetbol. Su amplia disponibilidad y fácil interpretación las convirtieron en el principal insumo para comparar jugadores, otorgar premios o negociar contratos. Estas medidas suelen agruparse en un conjunto de estadísticas denominadas *bottom-up*, las cuales se calculan en función de las acciones individuales de los jugadores, es decir, si un jugador realiza una acción que se asocia con un resultado positivo para el equipo, la calificación de ese jugador aumenta, mientras que la calificación de los demás jugadores, que no participaron en la jugada, permanece sin cambios. Pero estas medidas presentan algunas limitaciones importantes, ya que solo capturan una parte de los eventos relevantes del partido (acciones como una defensa asfixiante, buenas rotaciones defensivas o pases rápidos para iniciar una posesión no están contempladas) y no necesariamente

reflejan el impacto real de un jugador en las victorias de su equipo, que constituye, en última instancia, el resultado de interés a evaluar.

Por otra parte, las medidas *top-down* se basan en el rendimiento del equipo en su conjunto, y el crédito por dicho rendimiento se distribuye entre los jugadores que estuvieron involucrados en el partido, sin importar qué acciones puntuales hayan realizado.

Con la idea de que lo más importante en un partido es ganar, y entendiendo que las estadísticas tradicionales son solo una medida imperfecta de muchas de las contribuciones que realizan los jugadores a la victoria, este trabajo busca "pensar más allá del *box score*" y se centra en estadísticas *top-down*, más precisamente en la medida *plus-minus*. Esta estadística registra los cambios que se producen en el marcador durante los minutos en que el jugador de interés está en cancha, partiendo de la idea de que los equipos deberían rendir mejor (reflejado en un *plus-minus* más alto) cuando sus buenos jugadores están en cancha que cuando no lo están. Sin embargo, esta métrica posee una deficiencia clave: **la calificación de cada jugador depende en gran medida de la calidad de sus compañeros en el campo**. Por ejemplo: un jugador de rol dentro de un gran equipo puede registrar un mayor *plus-minus* que una superestrella en un equipo con mal desempeño.

Regularized Adjusted Plus Minus **(RAPM)**

La deficiencia anteriormente mencionada se ha intentado solucionar implementando modelos matemáticos que incorporen los efectos tanto de los compañeros presentes en cancha como de los rivales en ese momento, buscando aislar el efecto real de los jugadores en la cancha. El primero en realizar una publicación sobre el tema fue Dan Rosenbaum (2004), el cual planteó un modelo de regresión lineal múltiple en base a observaciones provenientes de partidos de las temporadas 2002-2003 y 2003-2004 de la *National Basketball Association* (NBA). Como unidad de análisis se utilizaron segmentos de partidos donde no ocurrían sustituciones, la variable respuesta fue la diferencia en el marcador entre el equipo local y el visitante en ese segmento; y como variables explicativas se postularon variables dicotómicas para cada uno

de los jugadores que habían jugado al menos un partido en esas temporadas. Finalmente las métricas de desempeño se correspondían con los coeficientes estimados que acompañaban a las "Dummies" de cada jugador, dichas estimaciones se realizaron mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Esta medida se conoce como *Adjusted Plus Minus* (APM).

A pesar de que estas métricas presentaban una solución innovadora a la problemática inicial, Rosenbaum señaló que las estimaciones obtenidas no resultaron muy precisas. El modelo propuesto presentaba estimaciones con mucho error, debido a un claro problema de multicolinealidad ya que muchos de los jugadores compartían una gran cantidad de minutos juntos en cancha, y se necesitaba de una gran cantidad observaciones de varias temporadas para que el modelo pudiera separar el efecto propio de cada jugador.

Para solucionar esta problemática, se plantea la métrica RAPM introducida por Sill (2010) en la cual se aborda el problema de la multicolinealidad mediante estimaciones de los parámetros realizadas con métodos de regularización, particularmente utilizando la Regresión Ridge. Este método de regularización es el más abordado a lo largo de toda la literatura relevante sobre RAPM hasta la fecha.

Otro de los problemas recurrentes en estos modelos está relacionado con la inclusión de jugadores que participan muy pocos minutos en cancha (*LTPs - Low time Players*). Cuando un jugador juega muy poco, el modelo solo tiene unas pocas observaciones (segmentos) para evaluarlo, y si particularmente en esas observaciones el equipo tiene un muy buen desempeño (probablemente por casualidad); entonces el modelo no puede diferenciar si el efecto es propio del jugador y estima coeficientes extremos. Para solucionar estos casos se han contemplado las siguientes alternativas: 1) excluir a los jugadores con pocos minutos dentro de las temporadas (por ejemplo: Rosenbaum (2004) excluye a los jugadores con menos de 250 minutos, Ilardi (2007) excluye a lo jugadores con menos de 400 minutos, etc), 2) utilizar una gran cantidad de observaciones (Ilardi & Barzilai (2008) incorpora información de 5 temporadas), 3) plantear métodos de estimación de los parámetros que penalicen a este tipo de jugadores.

En los últimos años, muchos investigadores han publicado trabajos orientados a mejorar

los resultados de las métricas RAPM. En este trabajo se toma como referencia central el artículo titulado **Lasso multinomial performance indicators for in-play basketball data** (Damoulaki et al., 2025), el cual presenta diferencias importantes respecto de los estudios previos. Dicho artículo utiliza posesiones (definidas, según Kubatko et al. (2007), como el periodo que comienza cuando un equipo obtiene el control de la pelota y termina cuando cede su control al rival) como unidad de análisis, los puntos anotados en esas posesiones como variable respuesta y emplea modelos logísticos multinomiales que representan de manera más adecuada la naturaleza de la respuesta.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

El objetivo general de esta tesina es estimar el aporte individual de los jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina durante la temporada 2024/2025 mediante modelos estadísticos y construir rankings que permitan identificar a los jugadores con mayor impacto en el desempeño de sus equipos.

1.1.2 Objetivos específicos

1) Generar una base de datos del tipo *play-by-play* para la temporada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, mediante técnicas de *web scraping*.

2) Diferenciar el aporte ofensivo y defensivo de cada uno de los jugadores de la liga, obteniendo finalmente rankings que identifiquen a los mejores jugadores en cada rubro.

3) Desarrollar una metodología adecuada que permita abordar el problema de los coeficientes extremos asociados a los jugadores con pocos minutos de juego (*LTPs*) durante la temporada.

4) Comparar modelos en base a distintos criterios de evaluación, considerando su capacidad para resumir de manera consistente y precisa el aporte ofensivo y defensivo de cada jugador en relación con el desempeño de su equipo.

1.2 Organización de la tesina

El trabajo se organiza de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se describe el proceso de generación y procesamiento de los datos. Se detalla la construcción de la base *play-by-play* mediante técnicas de *web scraping*, las etapas de limpieza y preprocesamiento de la información y la generación de la base *poss-by-poss* utilizada para el ajuste de los modelos estadísticos.

En el Capítulo 3 se desarrolla la metodología estadística empleada en el trabajo. Se presentan los modelos propuestos, las métricas derivadas de los mismos, los principales problemas que suelen presentarse en este tipo de enfoques y las técnicas de regularización utilizadas para abordarlos. Finalmente, se describen los criterios adoptados para comparar el desempeño de los distintos modelos considerados.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos. Inicialmente, se realiza un análisis descriptivo de los datos y de distintas medidas basadas en *plus-minus*. Posteriormente, se analizan los rankings obtenidos mediante RAPM, EPTS y wEPTS y se comparan las distintas alternativas propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación definidos previamente. Por último, se presentan los rankings de los jugadores mejor valorados según su aporte ofensivo, defensivo y total.

En el Capítulo 5 se discuten los resultados, aportes y limitaciones del enfoque adoptado, y se plantean posibles líneas de investigación futura.

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las principales conclusiones del trabajo, sintetizando los resultados más relevantes obtenidos a partir de la comparación de los distintos modelos.

2 Datos

Una parte central de esta tesina está dedicada a la construcción de una base de datos *play-by-play* correspondiente a la temporada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina (LNB). Este tipo de base registra de manera secuencial todas las acciones ocurridas dentro de un partido. Dado que no existe una fuente oficial que provea los datos en formato estructurado y descargable para su análisis estadístico, se diseña y ejecuta un proceso de *web scraping* que permite recolectar, integrar y depurar la información de manera sistemática y reproducible. Los datos necesarios se extraen del sitio web oficial de la Liga Nacional de Básquet mediante librerías de Python como `Selenium` y `BeautifulSoup`.

Posteriormente, se realiza un preprocesamiento orientado a transformar los eventos crudos en un *dataset* apto para cumplir los objetivos específicos de este trabajo. Como resultado, se obtiene una base de datos ordenada cronológicamente, en la que cada fila corresponde a una posesión del partido e incluye la cantidad de puntos anotados y la identificación de los jugadores que participan en ella, diferenciando sus roles ofensivos y defensivos. Debido a que bajo esta metodología se registra cada una de las posesiones del partido de manera secuencial, esta estructura final se denomina como: base de datos *poss-by-poss*.

2.1 Generación de la base de datos a partir de técnicas de Web Scraping

2.1.1 Listado de links de los partidos

El primer paso consiste en la identificación y recopilación de los enlaces a las páginas web que contienen las estadísticas individuales de todos los partidos incluidos en el período de estudio (378 partidos de temporada regular). Para ello, se accede a la página de la Liga Nacional, sección Fixture, la cual presenta una tabla dinámica con los encuentros disputados y permite acceder a la información detallada de cada partido.



Figura 1: Fixture dentro de la página web de la LNB.

En la Figura 1 se muestra la interfaz del sitio web, donde se visualiza el listado completo de partidos de la temporada para el rango de fechas seleccionado. Dado que no puede automatizarse la obtención de cada uno de estos links, se procede a copiar manualmente el *DOM* (*Document Object Model*) de la página y a pegarlo en un archivo de texto.




Figura 2: Inspección de la página web.

A partir de dicho archivo de texto, se utiliza la librería `BeautifulSoup` de Python para recorrer la estructura del DOM, identificando previamente los elementos que contienen los enlaces de cada partido. En la Figura 2 se observa que esta información se encuentra dentro de las clases "fila-tabla-calendarios datos-estadisticos", las cuales se recorren para obtener los respectivos enlaces a las páginas de estadísticas de cada partido, los nombres de los equipos participantes,

la fecha y hora del encuentro y el resultado final, para cada uno de los 378 partidos disputados en la temporada regular. Se obtiene finalmente un diccionario que contiene toda esta información.

Dicho diccionario constituye el insumo básico para el proceso posterior de scraping masivo, sobre el cual se itera para obtener así la información correspondiente a cada una de las acciones registradas en cada partido. Esta estrategia permite, además, asegurar la reproducibilidad del proceso, ya que el listado de partidos es eliminado de la página web una vez terminada la temporada, quedando fijado y documentado de manera explícita para su uso, en caso de ser requerido.

2.1.2 Base de datos *play-by-play*

Una vez obtenido el listado completo de enlaces correspondientes a cada uno de los partidos en el período de estudio, se procede a la extracción del registro de acciones del partido (*play-by-play*). Para esto, se accede individualmente a la página de estadísticas de cada encuentro, desarrollada mediante el sistema Gesdeportiva (https://www.gesdeportiva.es/es/), particularmente a la pestaña denominada “En vivo”, donde se presenta el detalle secuencial de los eventos.

La Figura 3 muestra esta pestaña del sitio web, la cual contiene una tabla que se genera dinámicamente donde se registran, en orden cronológico, todas las acciones ocurridas durante el partido.




Figura 3: Pestaña en vivo dentro de la página web de estadísticas de un partido

En dicha tabla, cada acción del partido se encuentra representada como un elemento que incluye información textual sobre el tipo de acción (por ejemplo, lanzamiento convertido, falta, pérdida, etc), el jugador que realiza dicha acción, el cuarto de juego, el tiempo restante en el cuarto y, en caso de ser una acción donde se generan puntos, el marcador parcial en ese momento del partido. Esta información se extrae y almacena sistemáticamente en una estructura tabular, conservando el orden temporal de las acciones.


Este procedimiento se aplica de forma idéntica a todos los partidos de la temporada analizada, utilizando como insumo los enlaces previamente identificados. Finalmente, los registros de acciones obtenidos para cada encuentro se concatenan en una única base de datos *play-by-play*. Para conservar la correspondencia entre cada acción y su partido de origen, se incorpora un identificador construido a partir de los nombres de los equipos participantes y la fecha y hora del encuentro. También se añaden las variables correspondientes al equipo local y visitante,

obtenidas previamente a partir del fixture.

Es importante destacar que el *dataset* resultante constituye una secuencia detallada de eventos, pero en su forma original no incluye una identificación explícita del equipo asociado a cada acción, lo cual resulta indispensable a la hora de realizar los análisis posteriores.

2.1.3 Tabla de jugadores-equipos

Para resolver el problema de falta de identificación del equipo asociado a cada acción, se obtiene dicha información a partir de los datos provenientes del *box score*, localizados en la pestaña "Estadísticas" de la página web del partido (Figura 4). Aquí se encuentran las estadísticas individuales de cada uno de los jugadores anotados en la planilla de ambos equipos.


CAB

En vivo | Estadísticas | Mejores jugadores | Mapa de tiro | Comparativa

FERRO 84

PEÑAROL (MDP) 82

FERRO

Entrenador:
FERNANDEZ, FEDERICO IGNACIO

		Nombre	Min	PTS	Tiros 2P A/I	Tiros 2P %	Tiros 3P A/I	Tiros 3P %	TL A/I	TL %	Rebotes Def.	Rebotes Ofe.	Rebotes Tot.	AS	REC	PÉR	TAP Com.	TAP Rec.
	2	GONZALEZ, M.	00:00	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 *	LEZCANO, E.	32:07	14	7/10	70	0/5	0	0/1	0	4	0	4	2	0	3	1	1
	5 *	LADO, M.	21:24	11	4/8	50	0/0	0	3/4	75	2	0	2	1	0	2	0	2
	6	MARTINEZ, J.	22:18	5	1/3	33	1/7	14	0/0	0	2	1	3	1	2	1	0	0
	7	ROVERES, A.	07:03	2	1/1	100	0/2	0	0/0	0	2	1	3	0	0	0	0	0
	9 *	RODRIGUEZ, F.	20:11	3	0/1	0	1/4	25	0/0	0	6	0	6	0	1	0	0	0
	10	WOLINSKY, F.	00:00	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 *	GALLEGOS, R.	32:29	19	6/9	66	0/3	0	7/7	100	8	1	9	5	1	2	0	0
	13	RODRIGUEZ, C.	05:57	0	0/1	0	0/0	0	0/0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	14	DIEZ, A.	26:35	10	4/7	57	0/0	0	2/2	100	3	2	5	1	0	2	0	1
	21	SPANO, T.	34:05	6	2/5	40	0/1	0	2/2	100	4	0	4	6	2	3	0	1
	93 *	FIERRO, M.	22:51	14	3/3	100	2/4	50	2/2	100	8	1	9	0	0	0	0	0
		TOTALES	225:00	84	28/48	58	4/26	15	16/18	88	39	6	45	16	8	13	1	5

PEÑAROL (MDP)

Figura 4: Ejemplo del box score de un partido

La información se organiza en dos tablas con estadísticas individuales de los jugadores, una

correspondiente al equipo local y otra al equipo visitante, las cuales aparecen en el mismo orden en que se muestran los nombres de los equipos en la interfaz del sitio web. A partir de la estructura HTML de dichas tablas, se extrae para cada jugador su nombre completo, el equipo al que pertenece y la cantidad de minutos disputados en dicho partido, generándose así una tabla de correspondencia jugador–equipo.

La tabla obtenida constituye un diccionario que permite asociar a cada jugador con su respectivo equipo y es utilizada posteriormente como insumo para realizar dicha correspondencia en cada acción de la base *play-by-play*.

2.2 Preprocesamiento de los datos

2.2.1 Integración del *box score* con el *play-by-play*

Una vez construida la tabla jugadores-equipos, se procede a integrar dicha información con la base de datos *play-by-play*. Para ello, los nombres de los jugadores se normalizan previamente con el objetivo de reducir posibles inconsistencias de formato (espacios adicionales, diferencias menores de escritura), y luego se utiliza la correspondencia jugador–equipo para asignar a cada acción del *play-by-play* el equipo del jugador involucrado.

De este modo, cada acción queda asociada explícitamente a uno de los dos equipos del partido, aun cuando dicha información no se encuentre disponible de forma directa en el registro original del *play-by-play*. Este procedimiento permite identificar qué jugadores se encuentran en cancha para cada uno de los equipos, permitiendo construir los quintetos en cada momento del partido.

2.2.2 Identificación de los quintetos en cancha al momento de la acción

A partir de la nueva tabla generada, se construye la presencia de los jugadores en cancha a lo largo del partido. Para ello, se identifican las acciones asociadas a sustituciones, distinguiendo entre entradas (acción = ENTRA A PISTA) y salidas de jugadores (acción = ABANDONA LA PISTA), tal como se observa en la Figura 5.




Figura 5: Ejemplo de secuencia de acciones con sustitución

El conjunto de jugadores en cancha se actualiza a medida que se recorren las acciones del partido, reiniciándose al comienzo de cada cuarto. De este modo, para cada instante del juego se obtiene el conjunto de jugadores activos en cancha.

Utilizando la tabla jugadores-equipos construida previamente, cada jugador en cancha se asigna al equipo local o visitante, permitiendo reconstruir los quintetos de ambos equipos en cada acción del partido. Este paso resulta esencial para caracterizar el contexto en el que ocurre cada acción, ya que, al conocer el equipo al que pertenece el jugador que realiza la acción, se pueden identificar simultáneamente los jugadores ofensivos y defensivos presentes en cancha en cada momento.

Una vez reconstruidos los quintetos en cancha para cada acción, se realizan controles de consistencia sobre su conformación, verificando que la cantidad de jugadores registrados para cada equipo sea compatible con una situación regular de juego. Estos controles resultan especialmente relevantes debido a que la información del *play-by-play* es cargada manualmente por las mesas de control durante el desarrollo altamente dinámico de los partidos, por lo que pueden presentarse errores en la registración de eventos. El detalle de los controles realizados y de las inconsistencias detectadas y corregidas se presenta en el Anexo.

2.3 Generación de la base de datos *poss-by-poss*

Como resultado del trabajo realizado en las Secciones 2.1 y 2.2, se obtiene una base de datos unificada donde cada fila se corresponde con cada una de las jugadas o acciones que suceden dentro del partido, incluyendo información relevante para este trabajo como el marcador del partido al momento de la acción, la composición de los quintetos en cancha y la condición de local o visitante de los equipos. Sin embargo, para poder aplicar los modelos estadísticos, resulta necesario agrupar estas acciones en **posesiones**, entendidas como el conjunto de acciones ocurridas antes de que cambie el control de la pelota.

Para llevar a cabo este proceso es necesario definir una metodología adecuada que permita diferenciar qué acciones pertenecen a una misma posesión y en qué momento comienza una

distinta.

2.3.1 Eliminación de acciones no relevantes para la posesión

Este procedimiento no puede realizarse de manera directa, ya que, a pesar de contar con información secuencial sobre el equipo responsable de cada acción, no todo cambio en el equipo asociado a una acción implica necesariamente un cambio de posesión del balón. Existen situaciones en las que se registran acciones del equipo defensor dentro de una posesión del equipo atacante. A las cuales se decide por llamar como "acciones intrusas". Un ejemplo de la contabilización correcta e incorrecta de las posesiones a partir de la secuencia de acciones se presenta en la Figura 6.




Figura 6: Comparación entre distintas formas de contabilizar las posesiones

Luego de hacer una revisión manual en un conjunto limitado de partidos, se llega a la definición de que el conjunto de acciones presentes en el Cuadro 1 suelen ser siempre acciones intrusas o nunca resultan informativas para la delimitación de las posesiones. En consecuencia se decide eliminar las filas en las que ocurren estas acciones en la base de datos. Estas acciones son:

Cuadro 1: Acciones eliminadas por no ser informativas para la delimitación de las posesiones

N°	Acción
1	ENTRA A PISTA
2	INICIO DEL PERIODO
3	FINAL DEL PERIODO
4	ABANDONA LA PISTA
5	TAPON REALIZADO
6	TECNICA
7	TECNICA BANQUILLO (C)
8	TECNICA BANQUILLO (B)
9	TECNICA DESCALIFICANTE
10	TECNICA DESCALIFICANTE ACOMPAÑANTE NO PARTICIPA
11	TECNICA-E (ALINEACIÓN ILEGAL)
12	TIEMPO MUERTO SOLICITADO
13	ANTIDEPORTIVA

2.3.2 Manejo de otro tipo de acciones particulares

1) Tratamiento de la flecha de alternancia

En el básquetbol bajo reglamento FIBA, la flecha de alternancia determina la posesión del balón en los inicios de cuarto o en situaciones de salto entre dos. Cuando este evento aparece registrado en el *play-by-play*, el equipo que obtiene la posesión es el opuesto al que figura inicialmente asociado a la acción.

Para corregir este comportamiento, se implementa una regla que invierte el equipo asignado a la acción en presencia de una flecha de alternancia, garantizando la correcta identificación del equipo en control del balón.

2) Eliminación de rebotes defensivos al final de cada cuarto

Se detecta que, en algunos casos, el *play-by-play* registra un rebote defensivo como última acción de un cuarto. Como esta situación sucede quedando unos pocos segundos para terminar el cuarto, no debe ser contabilizada como una posesión real, por lo que se eliminan dichas acciones de la base de datos.

3) Reglas específicas para el tratamiento de faltas ofensivas

Las faltas ofensivas representan un caso particular dentro del *play-by-play*, ya que no son diferenciadas de las faltas defensivas en la descripción de la acción, y tienen una diferencia fundamental a la hora de definir las posesiones. Por un lado, las faltas defensivas corresponden a una "acción intrusa" y deben ser eliminadas de la base, mientras que las faltas ofensivas siempre implican un cambio inmediato de posesión y, en ocasiones, pueden ser la única acción que realice un equipo dentro de una posesión, como se observa en la Figura 7. Por ello, en esos casos la acción debe conservarse.

En consecuencia, se desarrolla un conjunto de reglas basadas en el contexto de la acción previa para decidir si una falta debe ser conservada o eliminada del registro. Particularmente, se establece la siguiente regla: una falta debe conservarse si el equipo que la comete es distinto al equipo que realizó la acción inmediata anterior, siempre que dicha acción previa sea

1) un lanzamiento fallido,
2) una pérdida de balón,
3) una anotación con una separación temporal suficiente[2] que indique el transcurso de una nueva posesión.

Todas las faltas que no cumplen esta condición se eliminan para evitar errores en el conteo de posesiones.

[2]Si a una anotación le sigue una falta inmediata del rival, resulta ser la denominada "falta y conversión" la cual forma parte de la misma posesión.



Figura 7: Ejemplo de falta ofensiva en una secuencia de acciones

2.3.3 Identificación de la finalización de las posesiones

Una vez realizadas estas tareas de preprocesamiento, se incorpora un identificador preliminar de posesión, basado en dos criterios fundamentales: el cambio de equipo en control del balón y el cambio de cuarto. De manera que cada vez que ocurre alguno de estos eventos, se identifica el inicio de una nueva posesión. Esto se encuentra ejemplificado en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Ejemplo de secuencia de acciones diferenciando cada posesión

Cuarto	Tiempo	Acción	Jugador	Equipo	...	Posesión
1	00:08:54	TIRO DE 3 FALLADO	Stenta, Nicolas	Boca Juniors		4
1	00:09:12	REBOTE DEFENSIVO #11	Vildoza, Jose Ignacio	Boca Juniors		4
1	00:09:13	TIRO DE 3 FALLADO	Buemo, Carlos Emanuel	Atenas		3
1	00:09:18	FALTA RECIBIDA	Buendia, Carlos Manuel	Atenas		3
1	00:09:32	TRIPLE	Piñero, Facundo	Boca Juniors		2
1	00:09:42	REBOTE DEFENSIVO #11	Vildoza, Jose Ignacio	Boca Juniors		2
1	00:09:43	TIRO DE 2 FALLADO	Oberto, Juan Cruz Mateo	Atenas		1

Finalmente, se conserva para cada una de ellas la última acción registrada, correspondiente al cierre de la posesión, y se descartan las acciones intermedias. De esta forma, la base pasa de contener una fila por acción a contener una fila por posesión.

2.3.4 Cálculo y validación de los puntos por posesión

En primera instancia, para obtener la cantidad de puntos generados en cada posesión, se calcula la diferencia entre el puntaje acumulado del equipo atacante al final de la posesión y el puntaje acumulado registrado al cierre de la posesión inmediatamente anterior. De esta manera, cada posesión queda caracterizada por una variable discreta que representa su resultado ofensivo en términos de puntos anotados. El Cuadro 3 muestra el resultado de este procedimiento para las mismas posesiones presentadas previamente en el Cuadro 2, ahora reducidas a una fila por posesión e incorporando la cantidad de puntos anotados.

Cuadro 3: Ejemplo de estructura con una fila por posesión

Cuarto	Tiempo	Acción	Jugador	Equipo	...	Posesión	Puntos
1	00:08:54	TIRO DE 3 FALLADO	Stenta, Nicolas	Boca Juniors		4	0
1	00:09:13	TIRO DE 3 FALLADO	Buemo, Carlos Emanuel	Atenas		3	0
1	00:09:32	TRIPLE	Piñero, Facundo	Boca Juniors		2	3
1	00:09:43	TIRO DE 2 FALLADO	Oberto, Juan Cruz Mateo	Atenas		1	0

Sin embargo, durante el análisis descriptivo de esta variable, se detectan valores incompatibles con la lógica del juego, observándose posesiones con puntos por posesión “negativos” como -4 y -2 puntos, así como también posesiones con resultados muy elevados (6,7 y 8 puntos). Estos últimos, a pesar de ser factibles, son muy poco comunes. Por este motivo se realiza una revisión manual de los partidos involucrados con el objetivo de identificar el origen del problema.

La inspección de los registros permite comprobar que, en cinco partidos, el marcador acumulado informado en el código HTML presenta errores de actualización. Como consecuencia, el cálculo inicial de los puntos anotados en cada posesión, basado en la diferencia entre los marcadores al

inicio y al final de la posesión, produce valores incorrectos. En el Anexo se presenta en detalle uno de los casos detectados.

Para subsanar estos inconvenientes, se redefine el procedimiento de cálculo de los puntos por posesión. En lugar de utilizar el marcador acumulado informado por el sitio web, se reconstruye el marcador de manera independiente a partir de las acciones registradas en el *play-by-play*. Para ello se consideran únicamente las tres acciones capaces de modificar el tanteador: TIRO LIBRE ANOTADO (+1 punto), CANASTA DE 2 PUNTOS (+2 puntos) y TRIPLE (+3 puntos). A partir de estas acciones se calculan de forma acumulativa los puntos convertidos por cada equipo a lo largo de los partidos, obteniéndose marcadores reconstruidos que reemplazan a los obtenidos originalmente mediante el proceso de *scraping*.

Como resultado de esta corrección, la variable puntos por posesión pasa a tomar únicamente valores comprendidos entre 0 y 7 puntos, eliminándose los valores imposibles detectados inicialmente.

Es importante destacar que, aún después de estas correcciones, algunas de las posesiones continuaron presentando puntos inusualmente altos, por lo que también se realiza una revisión del contexto de aquellas posesiones con resultados extremos. Esta revisión permite identificar inconsistencias en la secuencia cronológica de algunas acciones registradas en el *play-by-play*. En particular, se identifican situaciones en las que dos acciones de anotación del mismo equipo aparecen de manera consecutiva, sin que exista una acción intermedia del equipo rival que justifique la continuidad de la posesión. Estas inconsistencias pueden deberse a errores en la carga manual de la información realizada durante el partido y constituyen una limitación inherente a la calidad de los datos disponibles. Si bien estos casos son poco frecuentes, generan incertidumbre principalmente en las posesiones con cinco, seis o siete puntos, cuya ocurrencia es muy poco común en condiciones normales de juego.

En este sentido, mientras que en la base de datos utilizada por Damoulaki et al. (2025) las posesiones con más de 3 puntos representan aproximadamente el 0,1 % del total, en la base construida para este trabajo dicha proporción asciende al 0,3 %, lo que podría ser consistente

con la presencia de errores de carga no detectados en la totalidad de los partidos. Sin embargo, no puede descartarse que también responda a la idiosincrasia propia del juego en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, en comparación con la NBA. Por los alcances de esta tesina, estas observaciones se conservan en la base de datos.

2.3.5 Identificación de jugadores ofensivos y defensivos en cancha

Con el objetivo de poder distinguir la participación individual de los jugadores en cada posesión, se utiliza la información de los quintetos en cancha previamente reconstruidos durante el preprocesamiento. Para cada posesión se identifican los cinco jugadores del equipo atacante y los cinco jugadores del equipo defensor.

A partir de esta información se construye una representación matricial de jugadores por posesión, donde cada jugador de la temporada cuenta con dos variables indicadoras. La primer variable indicadora toma el valor 1 si el jugador forma parte del quinteto ofensivo y 0 en caso contrario; mientras que la segunda variable indicadora toma el valor -1 si el jugador forma parte del quinteto defensivo, y 0 en otro caso. Este esquema permite modelar de manera explícita la contribución ofensiva y defensiva de manera independiente para cada uno de los jugadores que participan en al menos un partido dentro de la temporada en estudio.

2.4 Base de datos final: *poss-by-poss*

A través de este proceso, se genera una base de datos que permite modelar la cantidad de puntos por posesión teniendo en cuenta los jugadores presentes en cancha. La base cuenta con la información correspondiente a 58.625 posesiones, asociadas a 378 partidos disputados en la temporada en estudio.

Las variables presentes son las siguientes:

`puntos` = Cantidad de puntos en la posesión.

`cuarto` = Cuarto en el que se desarrolla la posesión.

`tiempo` = Tiempo restante del cuarto en el momento que finaliza la acción.

`equipo` = Nombre del equipo que está atacando en la posesión.

`condicion` = Condición de localía del equipo que está atacando en la posesión.

Y se cuenta con variables indicadoras referentes a las presencias ofensivas y defensivas al momento de la posesión para cada uno de los jugadores que hayan completado al menos una posesión a lo largo de la temporada. Se identifican 346 jugadores que cumplen esa condición en esta temporada, contabilizando de esta manera otras 692 (346 indicadoras ofensivas y 346 indicadoras defensivas) variables adicionales dentro del *dataset*.

3 Metodología

Con el fin de sintetizar adecuadamente la contribución ofensiva y defensiva de los jugadores, se comparan los resultados provistos por modelos con distintas características. Para identificar cuál de ellos brinda los mejores resultados, se definen procedimientos adecuados para su evaluación y comparación. Los distintos modelos utilizados, las formas de estimación de sus parámetros y los métodos empleados para compararlos se presentan a continuación.

3.1 Modelos propuestos

3.1.1 Modelo de regresión lineal múltiple

Los modelos más utilizados en la literatura relevante sobre RAPMs son los **modelos de regresión lineal múltiple**, los cuales modelan el comportamiento de la variable respuesta *puntos en la posesión i* (y_i) en función de P = 2K variables explicativas dicotómicas, correspondientes a las apariciones ofensivas y defensivas de K jugadores.

El componente aleatorio del modelo supone que las variables respuesta Y_i son independientes y siguen una distribución normal, con variancia constante σ^2. Por su parte, el componente sistemático establece una relación lineal y aditiva entre la esperanza de la variable respuesta y las variables explicativas. El modelo se expresa como:

$$\begin{cases} y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), \\ \mu_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^{K} \beta_k^o x_{ik}^o + \sum_{k=1}^{K} \beta_k^d x_{ik}^d, \end{cases} \tag{1}$$

para $i = 1, ..., n$, donde n: es el número total de posesiones disputadas, K es el número total de jugadores en el análisis, y_i es la variable respuesta correspondiente al número de puntos realizados en la posesión i, μ_i es la cantidad esperada de puntos anotados en la posesión i, x_{ik}^o es la indicadora ofensiva del jugador k en la posesión i (1 si el jugador k se encuentra en ataque en la posesión i, 0 en otro caso), x_{ik}^d es la indicadora defensiva del jugador k en la posesión i

(-1 si el jugador k se encuentra en defensa en la posesión i, 0 en otro caso), β_0 es el intercepto del modelo, β_k^o es el coeficiente ofensivo del jugador k (ORAPM), β_k^d es el coeficiente defensivo del jugador k (DRAPM).

Este modelo es de sencilla aplicación y ha sido ampliamente utilizado por distintos analistas que trabajan con este tipo de métricas. Sin embargo, la variable respuesta utilizada en este trabajo es discreta y toma un conjunto reducido de valores enteros (entre 0 y 7 puntos), mientras que el modelo de regresión múltiple supone una distribución normal para dicha respuesta. Por este motivo, esta distribución no resulta del todo adecuada para representar la naturaleza de la variable de interés.

3.1.1.1 Interpretación de los coeficientes Las medidas de eficiencia ofensiva (ORAPM) y defensiva (DRAPM) están representadas por los coeficientes asociados a las variables indicadoras ofensivas y defensivas de cada jugador, denotados por β_k^o y β_k^d, respectivamente. Estos coeficientes cuantifican el aporte marginal esperado de cada jugador sobre la cantidad de puntos anotados por posesión.

Un mayor valor en el coeficiente ORAPM está asociado a una mayor cantidad de puntos anotados esperados por posesión. Por otra parte, debido a que las variables defensivas se codifican con valores 0 y -1, un valor mayor del DRAPM está asociado a una menor cantidad esperada de puntos recibidos. Por lo tanto, en ambos casos, valores mayores representan una contribución más favorable al rendimiento del equipo.

En este modelo, la comparación entre dos jugadores resulta muy útil e intuitiva. En particular, la diferencia entre dos coeficientes representa el cambio esperado en la cantidad de puntos anotados por posesión cuando un jugador reemplaza a otro, manteniendo constantes todos los demás jugadores presentes en cancha. Esta interpretación puede ilustrarse mediante el siguiente ejemplo.

Si denotamos a los dos quintetos que están disputando la posesión como el quinteto ofensivo A (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) y el quinteto defensivo B (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5), la cantidad esperada de puntos

anotados por el equipo atacante viene dada por

$$\mu_1 = \beta_0 + \beta^o_{a_1} + \beta^o_{a_2} + \beta^o_{a_3} + \beta^o_{a_4} + \beta^o_{a_5} - \beta^d_{b_1} - \beta^d_{b_2} - \beta^d_{b_3} - \beta^d_{b_4} - \beta^d_{b_5}.$$

Si se asume que el jugador a_6 reemplaza al jugador a_1, manteniéndose sin modificaciones los restantes nueve jugadores. En ese caso, la cantidad esperada de puntos se modifica a:

$$\mu_2 = \beta_0 + \beta^o_{a_6} + \beta^o_{a_2} + \beta^o_{a_3} + \beta^o_{a_4} + \beta^o_{a_5} - \beta^d_{b_1} - \beta^d_{b_2} - \beta^d_{b_3} - \beta^d_{b_4} - \beta^d_{b_5}.$$

Entonces $\mu_2 - \mu_1 = \beta^o_{a_6} - \beta^o_{a_1}$ representa la diferencia de puntos esperados anotados por el equipo A cuando el jugador a_6 reemplaza al jugador a_1, y todos los demás jugadores se mantienen constantes. De esta manera, si $\beta^o_{a_6} > \beta^o_{a_1}$ se espera que el equipo atacante anote una mayor cantidad de puntos por posesión con el jugador a_6 en cancha, por lo que su contribución ofensiva resulta mayor.

De manera análoga, para la interpretación de los coeficientes defensivos, si el jugador b_6 reemplaza al jugador b_1 la cantidad esperada de puntos anotados por el equipo atacante es

$$\mu_3 = \beta_0 + \beta^o_{a_1} + \beta^o_{a_2} + \beta^o_{a_3} + \beta^o_{a_4} + \beta^o_{a_5} - \beta^d_{b_6} - \beta^d_{b_2} - \beta^d_{b_3} - \beta^d_{b_4} - \beta^d_{b_5}.$$

Entonces $\mu_3 - \mu_1 = -\beta^d_{b_6} + \beta^d_{b_1}$ representa la diferencia de puntos esperados recibidos por el equipo B cuando el jugador b_6 reemplaza al jugador b_1, y todos los demás jugadores se mantienen constantes. De esta manera, si $\beta^d_{b_6}$ es mayor a $\beta^d_{b_1}$, la cantidad esperada de puntos recibidos será menor y la contribución defensiva del jugador b_6 será mayor que la del jugador b_1.

3.1.2 Modelo logístico multinomial

Si bien el modelo de regresión lineal permite obtener una interpretación directa de los efectos ofensivos y defensivos de los jugadores, como se menciona en la Sección 3.1.1, la variable

respuesta considerada en este trabajo es discreta. En este sentido, resulta de interés considerar una especificación alternativa que contemple esta característica, por lo que se implementan modelos de **regresión logística multinomial**.

Recordando que y_i es igual a la cantidad de puntos en la posesión i, la nueva variable respuesta se recategoriza de la siguiente manera:

$$y_i^M = \begin{cases} y_i, & \text{para } y_i \in \{0,1,2\} \\ 3, & \text{para } y_i \geq 3. \end{cases} \tag{2}$$

Para representar formalmente la respuesta multinomial, se define el vector de variables indicadoras

$$\boldsymbol{y}_i = (y_{i0}, y_{i1}, y_{i2}, y_{i3}),$$

donde $y_{ic} = 1$ si $y_i^M = c$ y $y_{ic} = 0$ en otro caso. Por lo tanto,

$$\boldsymbol{y}_i \sim Multinomial(1, \boldsymbol{\pi}_i),$$

con $\boldsymbol{\pi_i} = (\pi_{i0}, \pi_{i1}, \pi_{i2}, \pi_{i3})$ y $\sum_{c=0}^{3} \pi_{ic} = 1$.

Resultando $\pi_{i0}, \pi_{i1}, \pi_{i2}$ y π_{i3} las probabilidades respectivas de no anotar, de anotar 1 punto, de anotar 2 puntos y de anotar 3 puntos o más en la posesión i.

Luego se construye el modelo logístico multinomial con categoría de referencia, eligiendo como categoría de referencia a 0 puntos anotados:

$$log(\frac{\pi_{ic}}{\pi_{i0}}) = \beta_{0c} + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kc}^o x_{ik}^o + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kc}^d x_{ik}^d \quad \text{con } c \in \{1,2,3\}. \tag{3}$$

Las variables explicativas x_{ik}^o y x_{ik}^d se definen al igual que en (1). Este modelo describe el efecto de los jugadores en cada uno de los tres logits correspondientes a las categorías diferentes de

cero, permitiendo calcular el aporte ofensivo y defensivo de cada jugador para cada tipo de anotación.

Las probabilidades multinomiales vienen dadas por las siguientes ecuaciones

$$\pi_{ic} = \frac{exp(\boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{\beta}_c)}{1 + \sum_{h=1}^{3} exp(\boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{\beta}_h)}, \qquad c \in \{0, 1, 2, 3\}, \tag{4}$$

con $\boldsymbol{\beta}_0 = \mathbf{0}$.

3.1.2.1 Interpretación de los coeficientes Para cada jugador k, un mayor valor en alguno de los coeficientes ofensivos (β^o_{k1},β^o_{k2},β^o_{k3}) se encuentra asociado a un mayor valor en la razón de *odds* de anotar 1, 2 o 3 puntos o más, respecto de no anotar. Mientras que, a valores más grandes en los coeficientes defensivos (β^d_{k1},β^d_{k2},β^d_{k3}), menor será cada una de las respectivas razones de *odds* correspondientes.

De igual manera, como el objetivo de esta tesina está centrado en obtener una medida única que resuma la contribución de un jugador en el desempeño ofensivo y defensivo de su equipo, estos coeficientes no se interpretan de manera individual, sino que sirven como base para la construcción de una métrica unificada.

3.2 EPTS y wEPTS

El modelo logístico multinomial proporciona, para cada jugador, tres coeficientes ofensivos y tres defensivos, correspondientes a su contribución sobre las razones de odds de anotar uno, dos y tres puntos o más, respectivamente, en comparación con no anotar. Si bien estos coeficientes permiten analizar por separado el efecto de cada jugador sobre los distintos tipos de anotación, el objetivo de esta tesina es obtener una medida única que resuma su contribución al desempeño ofensivo y defensivo de su equipo. Con este propósito, a partir de las probabilidades estimadas por el modelo, se construyen las métricas EPTS y wEPTS.

3.2.1 *Expected points* (EPTS)

A diferencia del modelo de regresión lineal múltiple, el cambio en la cantidad esperada de puntos al sustituir un jugador por otro no sólo está determinado por los coeficientes de ambos jugadores, sino también por los coeficientes de sus cuatro compañeros y de los cinco jugadores rivales. Por lo tanto, siguiendo la estrategia propuesta por Damoulaki et al. (2025), se evalúa a cada jugador bajo un escenario simplificado. En este escenario, el único jugador con coeficiente distinto de cero es el jugador de interés, mientras que todos los demás jugadores presentes en cancha pertenecen al grupo de referencia, es decir, poseen coeficientes iguales a cero. De este modo, la cantidad esperada de puntos por posesión refleja exclusivamente la contribución ofensiva o defensiva del jugador evaluado.

La contribución ofensiva se obtiene calculando la cantidad de puntos esperada por posesión que anota el equipo de dicho jugador cuando él está incluido ofensivamente, bajo el escenario simplificado. De manera similar, la contribución defensiva de un jugador se obtiene mediante la cantidad esperada de puntos concedidos por posesión por el equipo de dicho jugador cuando él está en el quinteto y todos los demás jugadores en cancha pertenecen al grupo de referencia. A esta nueva métrica se la denomina *Expected Points* (EPTS).

$$EPTS_k^r = E(y_i \mid x_{ik}^r \neq 0,\, \boldsymbol{x}_{i\setminus k}^r = \mathbf{0},\, \boldsymbol{x}_i^{\overline{r}} = \mathbf{0}), \quad r \in \{o, d\}. \tag{5}$$

Estas dos medidas, $EPTS^o$ y $EPTS^d$, son funciones de los coeficientes ofensivos y defensivos del modelo multinomial ajustado. Se obtienen mediante

$$EPTS_k^r = \pi_{k1}^r + 2\pi_{k2}^r + 3,0306\pi_{k3}^r, \quad r \in \{o, d\}, \tag{6}$$

donde π_{kc}^o son las probabilidades estimadas mediante un modelo de regresión logística multinomial de anotar uno, dos o tres puntos o más, respectivamente, por posesión del equipo del jugador k, cuando este se encuentra incluido en la alineación y tanto sus compañeros como

los jugadores del equipo rival pertenecen al grupo de referencia, es decir, presentan coeficientes iguales a cero. De manera similar, π^d_{kc} son las probabilidades de que el equipo oponente al del jugador k anote uno, dos o tres puntos o más, respectivamente, por posesión, cuando dicho jugador está incluido en la alineación y el resto de los jugadores pertenecen al grupo de referencia. Estas probabilidades vienen dadas por:

$$\pi^r_{kc} = \frac{exp(\mu^r_{kc})}{1 + exp(\mu^r_{k1}) + exp(\mu^r_{k2}) + exp(\mu^r_{k3})} \quad \text{con } \mu^o_{kc} = \beta_{0c} + \beta^o_{kc} \quad \text{y } \mu^d_{kc} = \beta_{0c} - \beta^d_{kc}.$$

Vale destacar que, el valor del coeficiente que acompaña a la categoría "3 puntos o más" corresponde al promedio empírico de puntos en esta categoría superior a partir de la distribución observada:

$$\frac{3(8134) + 4(143) + 5(45) + 6(6) + 7(1)}{8134 + 143 + 45 + 6 + 1} = 3,0306.$$

Finalmente se obtiene una medida de desempeño ofensivo y defensivo para cada jugador, donde un mayor valor de $EPTS^o$ indica una mayor cantidad esperada de puntos anotados por posesión cuando el jugador participa ofensivamente, mientras que un menor valor de $EPTS^d$ representa una menor cantidad esperada de puntos concedidos por posesión cuando el jugador integra el equipo defensor.

3.2.2 *Weighted expected points* (wEPTS)

Una versión ponderada de los EPTS se obtiene teniendo en cuenta la participación del jugador a lo largo de la temporada. Para ello, se realiza una ponderación según la proporción de posesiones de su equipo en las que el jugador de interés estuvo en cancha. De esta manera, el EPTS ponderado (wEPTS) se define como:

$$
\begin{aligned}
wEPTS_k^r &= E(y_i \mid \boldsymbol{x}_{i\setminus k}^r = \mathbf{0},\, \boldsymbol{x}_i^{\bar{r}} = \mathbf{0},\, T_i^r = t_k) \\
&= P(x_{ik}^r \neq 0 \mid T_i^r = t_k)\, E(y_i \mid x_{ik}^r \neq 0, \boldsymbol{x}_{i\setminus k}^r = \mathbf{0},\, \boldsymbol{x}_i^{\bar{r}} = \mathbf{0}) \\
&\quad + P(x_{ik}^r = 0 \mid T_i^r = t_k)\, E(y_i \mid x_{ik}^r = 0, \boldsymbol{x}_{i\setminus k}^r = \mathbf{0},\, \boldsymbol{x}_i^{\bar{r}} = \mathbf{0}) \\
&= W_k^r\, EPTS_k^r + (1 - W_k^r)\, EPTS_0,
\end{aligned} \tag{7}
$$

donde $r \in \{o, d\}$.

$EPTS_0$ representa la cantidad esperada de puntos por posesión bajo el escenario en el que todos los jugadores presentes en cancha pertenecen al grupo de referencia. Dado que en este escenario todos los coeficientes ofensivos y defensivos asociados a los jugadores son iguales a cero, este valor depende únicamente de los interceptos del modelo y es el mismo tanto para la evaluación ofensiva como defensiva. De esta manera,

$$
EPTS_0 = \frac{exp(\beta_{01}) + 2exp(\beta_{02}) + 3{,}0304exp(\beta_{03})}{1 + exp(\beta_{01}) + exp(\beta_{02}) + exp(\beta_{03})}. \tag{8}
$$

Por su parte, el peso W_k^r se estima como:

$$
\hat{W}_k^r = \frac{n_k^r}{n_{t_k}^r} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{I}(x_{ik}^r \neq 0)}{\sum_{i=1}^n \mathcal{I}(T_i^r = t_k)}, \tag{9}
$$

donde $\mathcal{I}(A)$ es una variable indicadora que vale 1 en caso de que A sea verdadero y 0 en caso contrario, T_i^r es el equipo en ataque ($r = o$) o en defensa ($r = d$) en la posesión i, t_k es el equipo del jugador k, n_k^r es el número de posesiones en las que el jugador k participa en el quinteto en ataque o defensa en la temporada y $n_{t_k}^r$ es el número de posesiones en las que el equipo del jugador k se encuentra en ataque o defensa en la temporada.

3.3 Estimación de los RAPMs

3.3.1 Método de mínimos cuadrados

En el modelo de regresión lineal múltiple, los parámetros se estiman mediante el método de mínimos cuadrados, siendo la función a minimizar:

$$S = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \mu_i)^2. \tag{10}$$

Los estimadores de β_l se definen como aquellos que minimizan la suma de cuadrados S, y se denotan como $\hat{\beta}_0, \ldots, \hat{\beta}_P$. De esta manera, se obtienen los siguientes coeficientes estimados:

$$\hat{\beta}_l = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{il}^* y_i}{\sum_{i=1}^{n} (x_{il}^*)^2}, \tag{11}$$

para $l = 0, ..., P$, donde x_{il}^* son los valores de la l-ésima variable explicativa x_l después de haber sido ajustada por todas las demás variables explicativas $x_0, ..., x_P$ excepto x_l. La variable explicativa ajustada x_l^* es aquella parte de x_l que no puede ser explicada mediante una regresión sobre las otras variables explicativas (Dunn y Smyth, 2018).

3.3.2 Método de máxima verosimilitud

En el modelo logístico multinomial, los parámetros asociados a las distintas categorías de respuesta se estiman conjuntamente a partir de las tres ecuaciones logit. En general, las estimaciones de máxima verosimilitud se obtienen maximizando la log-verosimilitud multinomial,

$$L_m(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{c=0}^{3} y_{ic} log(\pi_{ic}), \tag{12}$$

o equivalentemente minimizando la log-verosimilitud negativa ($-L_m(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y})$).

A diferencia del modelo lineal estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios, la estimación de los coeficientes del modelo logístico multinomial no posee una solución cerrada, por lo que debe recurrirse a algoritmos iterativos para obtener los resultados. En este trabajo, dichos modelos se ajustan mediante la librería `glmnet` del software estadístico R, la cual utiliza algoritmos de descenso cíclico por coordenadas para minimizar la función objetivo penalizada.

3.4 Multicolinealidad

En los modelos de regresión múltiple, la multicolinealidad hace referencia a la existencia de dependencias lineales o casi lineales entre las columnas de la matriz de diseño. Cuando estas dependencias son exactas, la matriz $X'X$ resulta singular y los parámetros no pueden estimarse mediante mínimos cuadrados ordinarios. Cuando las dependencias son aproximadas, las estimaciones pueden calcularse, pero presentan una variancia elevada, dando lugar a coeficientes muy sensibles a cambios relativamente pequeños en los datos.

En los modelos RAPM la multicolinealidad aparece de manera natural debido a la estructura propia del juego. Esto se debe a que, al tener muchos jugadores que comparten una gran proporción de sus minutos en cancha con los mismos compañeros, existe una fuerte dependencia entre las columnas correspondientes a la matriz de diseño, como puede identificarse en el Cuadro 4. Como resultado, el modelo dispone de poca información para distinguir cuál de los jugadores es realmente responsable del rendimiento observado durante esas posesiones.

Este problema resulta especialmente relevante en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, donde la cantidad de observaciones disponibles es considerablemente menor que en competencias como la NBA, donde la cantidad de partidos disputados por cada equipo (82 partidos en la NBA contra 38 en la LNB) y la duración de cada cuarto (12 minutos en la NBA contra 10 minutos en la LNB) son mayores.

Cuadro 4: Pares de jugadores que compartieron la mayor proporción de posesiones durante la temporada regular.

Jugador A	Jugador B	Posesiones juntos	% de A con B	% de B con A	Correlación ofensiva
Barreiro, A.	Brocal, A.	3.893	80.9	84.1	0.819
Brussino, J.	Miller, T.	2.753	81.2	79.9	0.800
Andujar, L.	Thornton, W.	3.302	77.9	81.2	0.788
Lugarini, B.	Vildoza, L.	2.629	77.3	79.6	0.779
Thomas Jr, M.	Thornton, W.	3.132	78.4	77.0	0.769
Pomoli Larraburu, N.	Vildoza, L.	2.507	77.3	75.9	0.759
Defelippo, J.	Shriver, D.	3.084	76.6	75.7	0.755
Barral, P.	Mata, M.	2.874	75.7	75.3	0.747
Lugarini, B.	Pomoli Larraburu, N.	2.533	74.5	78.1	0.757
Cabrera, M.	Vallejos, R.	3.038	78.9	74.1	0.757

Para cada par, el % de A con B se calcula como el cociente entre la cantidad de posesiones compartidas por ambos jugadores y el total de posesiones disputadas por el jugador A, mientras que % de B con A se obtiene de manera análoga, utilizando como denominador las posesiones disputadas por este último. Por su parte, la correlación ofensiva corresponde al coeficiente de correlación de Pearson entre las variables indicadoras de presencia ofensiva de ambos jugadores. Debido a que las correlaciones defensivas presentan valores muy similares, estas no se incluyen en el cuadro.

Para abordar este problema, distintos autores recurrieron a estimaciones basadas en métodos de regularización mediante los cuales se introduce deliberadamente sesgo en las estimaciones con el objetivo de reducir su variancia. Este compromiso entre sesgo y variancia suele traducirse en una disminución del error de predicción y en estimaciones considerablemente más estables. Por otra parte, diversos autores destacaron las ventajas de disponer de una mayor cantidad de datos, incorporando en muchos casos información de varias temporadas. Sin embargo, esta estrategia no se implementa en el presente trabajo, ya que, una vez finalizada cada temporada de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina, los enlaces a los partidos dejan de estar disponibles, imposibilitando el acceso a la información histórica necesaria para reconstruir las bases de datos.

3.5 Tratamiento de los jugadores con poco tiempo de juego (*Low time players - LTP*)

Se identifican 346 jugadores que participaron en al menos una posesión a lo largo de la temporada, lo que representa un promedio de 17,3 jugadores utilizados por equipo. En la Figura 8 se observa que la distribución de posesiones presenta una marcada asimetría, con jugadores que participaron en apenas una o dos posesiones, mientras que otros, titulares indiscutibles, participaron en más de 4000 posesiones.




Figura 8: Distribución de posesiones disputadas por jugador

Las estimaciones de los coeficientes de jugadores que juegan muy poco, y por lo tanto, cuentan con muy pocas observaciones en la base, se ven fuertemente afectadas y presentan coeficientes extremos. Para intentar solucionar esta problemática, dentro de la literatura relevante sobre RAPM, se han definido distintos criterios de exclusión de jugadores en base a la cantidad de minutos que disputaron en las temporadas analizadas.

Rosenbaum (2004) propone excluir a los jugadores con menos de 250 minutos disputados,

mientras que Ilardi (2007) e Ilardi y Barzilai (2008) utilizan un umbral de 400 minutos. Sill (2010) evalúa distintos puntos de corte, comprendidos entre 800 y 1200 minutos, seleccionando el más adecuado mediante validación cruzada. En un enfoque diferente, Gong y Chen (2024) no eliminan a estos jugadores, sino que agrupan a aquellos con menos de 10 minutos por partido en una categoría específica, representando al 20% del total de jugadores, y les asignan un prior particular dentro de su modelo bayesiano. Mientras que en el artículo de referencia de este trabajo, Damoulaki et al. (2025) excluye a los jugadores con menos de 200 minutos, lo que representa el 32% de los jugadores de su base de datos.

Considerando los antecedentes presentados y dado que la posesión constituye la unidad de análisis utilizada en los modelos RAPM desarrollados en este trabajo, se define el criterio de exclusión en función de la cantidad de posesiones disputadas por cada jugador, en lugar de los minutos jugados. En particular, se excluyen aquellos jugadores que participaron en menos de 500 posesiones durante la temporada, lo que representa 117 jugadores (33,8 % del total).

Cabe destacar que la exclusión de jugadores con poco tiempo de juego no elimina completamente este problema de sobreestimación de coeficientes, ya que continúan existiendo diferencias importantes en la cantidad de observaciones disponibles para cada jugador. Por este motivo, además del criterio de exclusión adoptado, en los modelos propuestos se emplean métodos de regularización, los cuales penalizan la magnitud de los coeficientes estimados cuando la información disponible resulta insuficiente.

3.6 Métodos de regularización

El modelo planteado presenta variables predictoras altamente correlacionadas debido a que muchos de los jugadores comparten gran parte del tiempo en cancha, por lo que el ajuste con mínimos cuadrados ordinarios o mediante máxima verosimilitud se torna inestable. Con el objetivo de abordar este problema, se realizan estimaciones mediante métodos de regularización (o *shrinkage*), los cuales incorporan un término de penalización a la función de pérdida para controlar la magnitud de los coeficientes estimados. Esta técnica provoca que las estimaciones

sean sesgadas, pero a cambio de una reducción en la variancia (James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021)).

En el caso de los modelos logísticos multinomiales, cada variable explicativa posee un coeficiente asociado a cada una de las tres ecuaciones logit. En su implementación mediante la librería `glmnet` se utiliza una penalización agrupada, de modo que los tres coeficientes correspondientes a una misma variable explicativa se consideran como un único grupo. Esta característica resulta relevante para las penalizaciones que incorporan un componente L_1, ya que las variables explicativas permanecen activas o se anulan simultáneamente en las tres categorías de respuesta.

Por otra parte, para expresar las funciones objetivo penalizadas de acuerdo con `glmnet`, se utilizan versiones reescaladas de las funciones de pérdida definidas en la Sección 3.3. En particular, para los modelos normales se divide la suma de cuadrados por $2n$, mientras que para los modelos multinomiales se divide la log-verosimilitud negativa por n. Estas modificaciones no alteran las estimaciones obtenidas en ausencia de regularización, pero sí afectan la escala relativa de la penalización y, por lo tanto, los valores del hiperparámetro λ.

3.6.1 Regresión Ridge o Regularización L_2

El método más utilizado en la bibliografía relevante sobre RAPM es la regresión Ridge. Esta técnica, propuesta originalmente por Hoerl y Kennard (1970), incorpora una penalización cuadrática (L_2) sobre los coeficientes del modelo.

Para el modelo de regresión lineal múltiple los coeficientes estimados $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ se obtienen minimizando la función de pérdida (S) modificada de la siguiente manera:

$$S^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2n}(y_i - \mu_i)^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{P} \beta_l^2 = S + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{P} \beta_l^2 \tag{13}$$

Al igual que en mínimos cuadrados ordinarios, la regresión Ridge busca coeficientes estimados que ajusten bien a los datos, minimizando la suma de cuadrados del error. Por otro lado, el segundo término, $\lambda \sum_{l=1}^{P} \beta_l^2$, es menor cuando $\beta_1, ..., \beta_P$ son más cercanos a cero. De esta

manera, este término penalizador tiene el efecto de contraer los coeficientes estimados hacia cero.

El *trade-off* entre estos dos criterios es controlado por el hiperparámetro $\lambda \geq 0$, el cual controla el efecto relativo de estos dos términos en los coeficientes de regresión estimados. La estimación es igual a la de mínimos cuadrados cuando $\lambda = 0$ (no hay penalización) y a medida que λ aumenta, la penalización se vuelve más dominante y los coeficientes tienden a 0.

Por otro lado, en el caso del modelo logístico multinomial, el parámetro de penalización se agrega a la función de log-verosimilitud, de manera tal que la función a minimizar resulta:

$$L_m^*(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{c=0}^{3} y_{ic} log(\pi_{ic}) + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{P}\sum_{c=1}^{3}\beta_{lc}^2 = -\frac{1}{n}L_m(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) + \frac{\lambda}{2}\sum_{l=1}^{P}\sum_{c=1}^{3}\beta_{lc}^2, \qquad (14)$$

en ambos casos, el valor del λ se selecciona mediante validación cruzada. Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con la penalización L1 (Sección 3.6.2), la agrupación de los tres coeficientes de un mismo jugador no introduce ninguna diferencia en la penalización Ridge.

Una característica de la penalización L_2 es que, en general, no produce coeficientes exactamente iguales a cero para valores finitos de λ. Esto se debe a que el término de penalización asociado a cada coeficiente (β_l^2) es suave y diferenciable en cero, por lo que no existe un cambio abrupto en el criterio de optimización cuando un coeficiente alcanza dicho valor. En consecuencia, Ridge reduce la magnitud de los efectos estimados pero conserva habitualmente a todos los predictores dentro del modelo.

3.6.2 Lasso o Regularización L_1

La técnica Lasso, propuesta por Tibshirani (1996), constituye una alternativa a Ridge que, además de contraer la magnitud de los coeficientes, puede llevar algunos de ellos exactamente a cero. De esta manera, el método realiza simultáneamente regularización y selección de variables. La intención de aplicar esta técnica está basada en su posible utilidad para abordar el problema de los coeficientes extremos que presentan los jugadores que juegan pocos minutos. A diferencia

de la penalización cuadrática utilizada por Ridge, Lasso incorpora una penalización L_1, basada en la suma de los valores absolutos de los coeficientes. Para el modelo de regresión lineal múltiple la función de pérdida resulta:

$$S^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2n}(y_i - \mu_i)^2 + \lambda \sum_{l=1}^{P} |\beta_l| = S + \lambda \sum_{l=1}^{P} |\beta_l|. \tag{15}$$

En esta técnica se presenta la función ($|\beta_l|$), la cual no es diferenciable en cero y presenta un punto anguloso en dicho valor. Esta característica permite que, para determinados valores de λ, el mínimo de la función objetivo se alcance exactamente en $\beta_l = 0$. En su interpretación geométrica, la restricción L_1 presenta vértices sobre los ejes correspondientes a coeficientes nulos, mientras que la restricción L_2 de Ridge posee una superficie suave. Como consecuencia, Lasso no solo contrae los coeficientes, sino que puede anular completamente algunos de ellos. En este caso valores grandes de λ incrementan la penalización, llevando a que un mayor número de coeficientes se reduzcan exactamente a cero.

Por otro lado, considerando la penalización agrupada mencionada al inicio de esta sección, en el modelo logístico multinomial la penalización L1 no se aplica a cada coeficiente individualmente, sino a la norma L2 del vector formado por los tres coeficientes asociados a cada jugador. Esta variante se conoce en la literatura como *group Lasso* (Yuan & Lin, 2006), y resulta en:

$$L_m^*(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{c=0}^{3} y_{ic} log(\pi_{ic}) + \lambda \sum_{l=1}^{P} \sqrt{\beta_{l1}^2 + \beta_{l2}^2 + \beta_{l3}^2} = -\frac{1}{n} L_m(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) + \lambda \sum_{l=1}^{P} \sqrt{\beta_{l1}^2 + \beta_{l2}^2 + \beta_{l3}^2}. \tag{16}$$

En este caso, al tratarse de una penalización agrupada, la anulación ocurre a nivel de grupo, donde los tres coeficientes asociados a un mismo predictor ($\beta_{l1}, \beta_{l2}, \beta_{l3}$) se anulan de manera conjunta, o ninguno de ellos lo hace.

3.6.3 Elastic Net

Lasso presenta una limitación relevante cuando existen grupos de predictores fuertemente correlacionados. En estas situaciones puede seleccionar uno de ellos y contraer los restantes a cero, aun cuando varios contengan información similar sobre la variable respuesta. Como consecuencia, pequeñas modificaciones en los datos pueden cambiar cuál de las variables correlacionadas se contrae a cero.

Elastic Net, propuesto por Zou y Hastie (2005), combina las penalizaciones L_1 y L_2 con el objetivo de reunir las principales propiedades de ambos métodos. La componente L_1 permite anular algunos coeficientes y, por lo tanto, realizar selección de variables. La componente L_2, en cambio, favorece que predictores altamente correlacionados reciban coeficientes similares, evitando que el modelo seleccione arbitrariamente uno de ellos y elimine al resto.

Esta característica resulta particularmente apropiada para los modelos RAPM, donde es habitual encontrar jugadores que comparten una proporción elevada de sus posesiones. Frente a este escenario, Elastic Net permite evitar en cierta medida la selección arbitraria de uno solo de los jugadores realizada por Lasso, sin renunciar completamente a la capacidad de producir coeficientes nulos. Para el modelo de regresión lineal múltiple la función de pérdida viene dada por:

$$S^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2n}(y_i - \mu_i)^2 + \lambda[\alpha \sum_{l=1}^{P} |\beta_l| + \frac{(1-\alpha)}{2} \sum_{l=1}^{P} \beta_l^2] = S + \lambda[\alpha \sum_{l=1}^{P} |\beta_l| + \frac{(1-\alpha)}{2} \sum_{l=1}^{P} \beta_l^2], \quad (17)$$

mientras que para el modelo logístico multinomial resulta:

$$\begin{aligned} L_m^*(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{c=0}^{3} y_{ic} log(\pi_{ic}) + \lambda \left[\alpha \sum_{l=1}^{P} \sqrt{\beta_{l1}^2 + \beta_{l2}^2 + \beta_{l3}^2} + \frac{(1-\alpha)}{2} \sum_{l=1}^{P} \sum_{c=1}^{3} \beta_{lc}^2 \right] \\ &= -\frac{1}{n} L_m(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{y}) + \lambda \left[\alpha \sum_{l=1}^{P} \sqrt{\beta_{l1}^2 + \beta_{l2}^2 + \beta_{l3}^2} + \frac{(1-\alpha)}{2} \sum_{l=1}^{P} \sum_{c=1}^{3} \beta_{lc}^2 \right], \end{aligned} \quad (18)$$

donde λ controla la intensidad de la regularización, mientras que $\alpha \in [0, 1]$ determina cuánto peso se asigna a cada penalización. Para $\alpha = 0$ se obtiene Ridge y para $\alpha = 1$ se obtiene Lasso. Los valores intermedios permiten distintos compromisos entre contracción y selección de variables.

3.7 Selección de hiperparámetros óptimos

Los modelos que incorporan técnicas de regularización (Ridge, Lasso y Elastic Net) requieren la selección de uno o más hiperparámetros que controlan la intensidad de la penalización. En particular, Ridge y Lasso dependen únicamente del parámetro de regularización λ, mientras que Elastic Net incorpora además el parámetro α, que determina la combinación entre las penalizaciones L_1 y L_2.

La selección de estos hiperparámetros se realiza mediante una búsqueda exhaustiva (*Grid Search*) sobre un conjunto predefinido de valores candidatos. Para cada combinación de hiperparámetros se ajusta el modelo utilizando validación cruzada de 10 particiones (*10-Fold Cross-Validation*), seleccionándose aquella que minimiza el error cuadrático medio en la regresión lineal múltiple y la *deviance* en la regresión logística multinomial, calculados como el promedio de dichas métricas sobre los conjuntos de validación.

La *deviance* es una medida de discrepancia basada en la log-verosimilitud, que compara el ajuste del modelo estimado con el de un modelo saturado. Valores menores indican una menor discrepancia respecto de los resultados observados y, por lo tanto, un mejor ajuste.

Es importante resaltar que se asignan **partidos completos** dentro de cada partición. De este modo, las posesiones de un mismo encuentro no quedan repartidas entre entrenamiento y validación. Las particiones generadas se replican exactamente para la selección de hiperparámetros en cada uno de los modelos.

3.8 Comparación de modelos

A partir del ajuste de los modelos mediante cada una de las técnicas de regularización, se obtiene para cada jugador una valoración ofensiva y otra defensiva. Estas valoraciones se utilizan para construir, de manera separada, un ranking ofensivo y uno defensivo para cada combinación de métrica y técnica de regularización. En el caso del RAPM, ambos rankings se ordenan de mayor a menor según los coeficientes ORAPM y DRAPM estimados, dado que los valores más elevados representan contribuciones más favorables en los dos componentes. Para EPTS y wEPTS, los rankings ofensivos también se ordenan de mayor a menor, mientras que los defensivos se ordenan de menor a mayor, ya que un menor valor representa una menor cantidad esperada de puntos concedidos. De este modo, las primeras posiciones de cada ranking corresponden a los jugadores con las valoraciones más favorables en el componente considerado.

Una vez obtenidos los rankings de jugadores a través de las distintas técnicas mencionadas, resulta sumamente importante establecer criterios que permitan compararlos y, de esta manera, poder identificar cuál es el que ofrece mejores resultados.

En primera instancia, se evalúa la bondad de ajuste de los distintos modelos mediante medidas de error y procedimientos de validación basados en simulación. De manera complementaria, se realizan comparaciones a través de estrategias propuestas en artículos relevantes dentro de la literatura de RAPM, buscando evaluar la **consistencia** y la **validez** de los rankings generados.

Particularmente, en el ámbito del fútbol, Lars Magnus Hvattum, quien ha desarrollado una extensa línea de investigación sobre métricas *plus-minus* para la evaluación de jugadores, plantea distintas propuestas metodológicas para la comparación de modelos, las cuales no parecen haber sido implementadas en básquetbol hasta la fecha. En el artículo *Comparing bottom-up and top-down ratings for individual soccer players* (Hvattum & Gelade, 2021) y en videos de su canal de YouTube, Football Player Ratings, se definen dos criterios para medir los distintos sistemas de rankings. Esta metodología se replica para medir la consistencia de los modelos realizados, mientras que, para evaluar su validez, se recurre a criterios de validación externa, tomando como referencia la propuesta de Damoulaki et al. (2025) pero adaptándola a la información disponible

en la Liga Nacional de Básquet Argentina.

3.8.1 Bondad de ajuste

3.8.1.1 Raíz del error cuadrático medio (RMSE) Con el objetivo de evaluar el desempeño predictivo, se comparan los distintos modelos utilizando como criterio principal la raíz del error cuadrático medio (*Root Mean Squared Error*, RMSE). Aunque los modelos normal y multinomial presentan distintas especificaciones para la variable respuesta, ambos pueden obtener, para cada posesión, una predicción puntual expresada en la escala original de puntos, lo que permite compararlos mediante una misma medida de error.

El RMSE se define como

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{19}$$

donde y_i representa la cantidad de puntos observada en la posesión i y $\hat{y}_i$ el valor predicho por el modelo.

En el enfoque clásico basado en regresión normal, la cantidad de puntos por posesión se modela directamente mediante una distribución normal y la predicción viene dada por

$$\hat{y}_i = \hat{\mu}_i$$

.

En cambio, el modelo logístico multinomial considera a los puntos por posesión como variable categórica, permitiendo estimar las probabilidades $\hat{\pi}_{ic}$ para cada categoría de anotación. Para obtener una predicción puntual en la escala original de puntos, se utiliza una ponderación análoga a la definida en la Sección 3.2.1 para la construcción del EPTS, pero calculando las probabilidades sobre el conjunto de jugadores presentes en la posesión i:

$$\hat{y}_i = 0\hat{\pi}_{i0} + 1\hat{\pi}_{i1} + 2\hat{\pi}_{i2} + 3,0306\hat{\pi}_{i3}.$$

De esta manera, las predicciones obtenidas mediante ambos enfoques pueden compararse directamente a través del RMSE.

3.8.1.2 Simulación del modelo multinomial Se realiza una validación adicional basada en simulaciones del modelo multinomial. El objetivo de este procedimiento es verificar si el modelo reproduce adecuadamente la distribución empírica de puntos por posesión.

Para cada posesión i, el modelo estima un vector de probabilidades:

$$\boldsymbol{\pi}_i = (\pi_{i0}, \pi_{i1}, \pi_{i2}, \pi_{i3}),$$

que representa las probabilidades de anotar 0, 1, 2 o 3 o más puntos, respectivamente.

Posteriormente, para cada posesión se genera aleatoriamente un resultado según dichas probabilidades. Por ejemplo, si para una posesión determinada el modelo estima:

$$\hat{\boldsymbol{\pi}}_i = (0.58, 0.03, 0.27, 0.12),$$

entonces el valor simulado para dicha posesión será:

$$y_i^{sim} = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 0,58, \\ 1 & \text{con probabilidad } 0,03, \\ 2 & \text{con probabilidad } 0,27, \\ 3^+ & \text{con probabilidad } 0,12. \end{cases}$$

Este procedimiento se repite para todas las posesiones del conjunto de datos, obteniendo así un conjunto completo de posesiones simuladas. Luego, el proceso completo se replica múltiples

veces (en este caso, 1000 simulaciones independientes).

El objetivo de esta metodología es evaluar si el modelo multinomial es capaz de reproducir adecuadamente la distribución observada de puntos por posesión. Para ello, se comparan las frecuencias relativas simuladas y observadas de cada categoría de anotación.

3.8.2 Evaluación de la consistencia de los resultados

Siguiendo el criterio de consistencia presentado por Hvattum (Football Player Ratings, 2023), se espera que un buen modelo produzca valoraciones similares al ser estimado sobre distintas muestras de tamaños comparables. Para evaluar esta propiedad, las posesiones de cada partido se distribuyen aleatoriamente en dos particiones de tamaños aproximadamente iguales. Luego, se calculan las métricas de los jugadores para cada partición y se estima la correlación de Pearson entre ambos conjuntos de valoraciones. Este procedimiento se repite 20 veces, utilizando una nueva división aleatoria en cada repetición y se calcula el promedio de las correlaciones obtenidas. Cuanto mayor sea esta correlación promedio, mayor será la consistencia del modelo.




Figura 9: Procedimiento para evaluar la consistencia de los modelos RAPM. Fuente: Football Player Ratings (2023), *How to evaluate football player ratings?* [Video]. YouTube.

3.8.3 Criterios de validación externa

Con el objetivo de evaluar la validez de los rankings obtenidos mediante los distintos modelos, se definen criterios externos basados en la propuesta de Damoulaki et al. (2025), adaptados a la información disponible para la Liga Nacional de Básquetbol. Estos criterios no intervienen directamente en la estimación de los coeficientes de los modelos y permiten contrastar los rankings obtenidos con reconocimientos individuales, niveles de participación y estadísticas tradicionales de los jugadores, por lo que permiten evaluar la capacidad de las métricas para identificar a jugadores reconocidos por su buen desempeño.

El conjunto de criterios elegidos es el siguiente:

- *Criterio de jugadores galardonados*: A lo largo de la temporada la LNB premia a los integrantes del quinteto ideal de la semana (durante las 28 semanas de temporada regular), así como también a los mejores quintetos de las distintas instancias de post-temporada. Por otro lado, al finalizar la temporada regular, se otorgan los principales premios individuales de desempeño (Jugador Más Valioso, Mejor Jugador Nacional, Mejor Jugador Extranjero, Mejor Defensor, Jugador Revelación, Sexto Hombre y Jugador de Mayor Progresión), donde para cada uno de estos premios se selecciona previamente una terna de tres jugadores. Dentro de esta ceremonia se premia también al quinteto ideal de toda la temporada. En total, se identifican 81 jugadores que recibieron al menos un galardón o que integraron alguna terna durante la temporada en estudio. Para cada modelo se consideran conjuntamente las primeras 25 posiciones del ranking ofensivo y las primeras 25 del defensivo. Luego se calcula la proporción de estas 50 posiciones ocupada por jugadores que recibieron al menos un galardón durante la temporada.

- *Criterio de jugadores con poco tiempo de juego*: Se identifican los 50 jugadores con menor cantidad de minutos disputados entre aquellos incluidos en los modelos. Para cada modelo se calcula la proporción de las 50 posiciones superiores (25 ofensivas y 25 defensivas) ocupada por jugadores pertenecientes a este grupo. Dado que la escasa participación suele

generar estimaciones inestables, se espera que un modelo con mejor desempeño ubique a una menor cantidad de estos jugadores en las primeras posiciones de los rankings.

- *Criterio de jugadores titulares*: Se definien como titulares a los seis jugadores con mayor cantidad de minutos disputados de cada equipo. Para cada modelo se calcula la proporción de las 50 posiciones superiores (25 ofensivas y 25 defensivas) ocupada por jugadores pertenecientes a este grupo. Una mayor proporción indica una mayor presencia de jugadores con un elevado volumen de participación entre los mejor valorados. También se calcula, de manera complementaria, la proporción de posiciones correspondientes a los últimos puestos de cada ranking ocupadas por jugadores titulares, con el objetivo de evaluar su presencia entre los jugadores a los que los modelos asignan las valoraciones más bajas.

- *Criterio del box score*: Se identifican los 50 jugadores con mayores valores acumulados durante la temporada en distintas estadísticas tradicionales del *box score*. Para la evaluación ofensiva se consideran los puntos, las asistencias y los rebotes ofensivos, mientras que para la evaluación defensiva se utilizan los rebotes defensivos, las recuperaciones y los tapones. Estos conjuntos se utilizan como grupos externos de referencia de los jugadores con mayor producción en cada estadística. Para cada modelo se calcula la proporción de los 25 jugadores mejor posicionados en cada ranking (ofensivo y defensivo) que pertenece al grupo de mejores jugadores en cada estadística.

A diferencia de Damoulaki et al. (2025), donde se consideran las primeras 50 posiciones de cada ranking dentro de un universo de 485 jugadores, lo que representa aproximadamente el 10,3% del total. En este trabajo se seleccionan las primeras 25 posiciones entre los 229 jugadores incluidos en los modelos, equivalentes al 10,9%. Esta adaptación mantiene una selectividad relativa similar y permite que, incluso en los modelos estimado mediante Lasso donde se reduce una gran cantidad de coeficientes a cero, las posiciones superiores seleccionadas correspondan a coeficientes positivos.

4 Resultados

4.1 Análisis descriptivo

La temporada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquet contó con 20 equipos participantes, los cuales disputaron 38 partidos cada uno a lo largo de dicho año de competencia, a excepción de Zárate Basket (36 partidos), Instituto (37 partidos) y Riachuelo (37 partidos) que disputaron una menor cantidad debido a la suspensión de 2 partidos. Del total de partidos analizados en este período, se identifican 58.625 posesiones finalizadas, obteniendo un promedio de aproximadamente 155 posesiones por partido.

4.1.1 Puntos por posesión

Cada una de las posesiones analizadas presentó cierta cantidad de puntos al finalizar, dando como resultado un rango de variación de 0 a 7 puntos. Siendo los casos de 5,6 y 7 puntos, situaciones extremadamente atípicas (0,089% de los casos). El resultado más frecuente al finalizar una posesión fue la ausencia de puntos, obteniendose en 31.241 posesiones, lo cual representa un 53,2% del total de posesiones. Esto se resume en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Distribución de puntos por posesión

Puntos	Posesiones	%
0	31241	53,290
1	2385	4,068
2	16670	28,435
3	8134	13,875
4	143	0,244
5	45	0,077
6	6	0,010
7	1	0,002

4.1.2 Rendimiento de los equipos

Antes de analizar las métricas individuales, resulta conveniente presentar el desempeño general de los equipos durante la fase regular de la temporada 2024/2025. El Cuadro 6 muestra la tabla de posiciones final de la Liga Nacional, la cual sirve como referencia para interpretar los resultados obtenidos por las distintas métricas evaluadas en el trabajo.

Cuadro 6: Tabla de posiciones de la Liga Nacional 2024/2025

Equipo	Pts	PJ	PG	PP	PF	PC	+/-	
Boca Juniors	67	**38**	29	9	3097	2884	213	1°.
Oberá	64	**38**	26	12	3140	2960	180	2°.
Instituto	64	**38**	26	12	3073	2790	283	3°.
Quimsa	63	**38**	25	13	3320	2973	347	4°.
Obras	62	**38**	24	14	3134	3028	106	5°.
Riachuelo	60	**37**	22	15	3032	2894	138	6°.
Regatas	58	**38**	20	18	3018	3015	3	7°.
Ferro	58	**38**	20	18	3108	3131	-23	8°.
Gimnasia	58	**38**	20	18	3141	2985	156	9°.
San Martín	57	**38**	19	19	2824	2779	45	10°.
Unión	57	**38**	19	19	3116	3237	-121	11°.
Atenas	57	**38**	19	19	2997	3058	-61	12°.
Peñarol	55	**38**	18	20	3085	2990	95	13°.
Olímpico	55	**38**	17	21	3067	3168	-101	14°.
San Lorenzo	55	**38**	17	21	2945	3034	-89	15°.
Platense	53	**38**	15	23	3018	3125	-107	16°.
Independiente	52	**38**	14	24	3237	3348	-111	17°.
La Unión	51	**38**	13	25	3199	3286	-87	18°.
Zárate	48	**37**	10	27	2723	3097	-374	19°.
Argentino	44	**38**	6	32	2724	3216	-492	20°.

Pts: cantidad de puntos obtenidos por el equipo (dos puntos por partido ganado y uno por partido perdido), PJ: partidos jugados, PG: partidos ganados, PP: partidos perdidos, PF: puntos a favor, PC: puntos en contra y +/-: diferencial de puntos. El encuentro entre Zárate Basket e Instituto no se disputó, pero fue resuelto administrativamente por 20–0 a favor de Instituto y figura como jugado para ambos equipos.

4.1.3 Análisis de *plus-minus*

Como primera aproximación a la evaluación del rendimiento individual, se analiza la métrica *plus-minus* (+/-), la cual brinda un indicio de cuán eficiente resulta el jugador durante el tiempo que permanece en cancha, calculando la diferencia de puntos realizados por el equipo propio en comparación con los puntos del rival dentro de ese intervalo de tiempo.

El Cuadro 7 deja en evidencia que los jugadores con mayor +/- pertenecen, en su mayoría, a los equipos que mejores resultados obtuvieron durante la temporada regular, donde nueve de los once jugadores mejor ubicados integraron alguno de los cuatro primeros equipos de la clasificación (Boca Juniors, Oberá Tenis Club, Instituto y Quimsa). Las únicas excepciones son Marcos Chacón Tirado y Diego Rafael Figueredo, quienes registran valores elevados de *plus-minus* a pesar de formar parte de equipos ubicados en la mitad de la tabla de posiciones.

Cuadro 7: Jugadores con mayor plus-minus

Jugador	Equipo	+/-
Louis, Arnold Michael	Quimsa	**306**
Vildoza, Leandro	Instituto	**297**
Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	**284**
Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	**254**
Copello, Nicolas	Instituto	**245**
Vorhees, William Leonard-Deubler	Oberá	**224**
Lugarini, Bautista	Instituto	**211**
Vildoza, Jose Ignacio	Boca Juniors	**209**
Figueredo, Diego Rafael	Riachuelo	**205**
Brussino, Juan Ignacio	Quimsa	**201**
Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	**201**

En el extremo opuesto, el Cuadro 8 deja en evidencia un patrón aún más marcado. Durante la temporada, Zárate Basket y Argentino de Junín presentaron un rendimiento considerablemente inferior al resto de los equipos, situación que se tradujo en diferencias de puntos ampliamente negativas. Como consecuencia, los diez jugadores con menor +/- de la competencia pertenecieron

exclusivamente a esos equipos.

Cuadro 8: Jugadores con menor plus-minus

Jugador	Equipo	+/-
Gomez, Manuel Alejandro	Argentino	**-409**
Slider, Jonatan	Argentino	**-352**
Allende, Tomas Daniel	Argentino	**-295**
Frontera, Ramiro Jeremias	Argentino	**-264**
Piñero, Patricio	Zárate	**-252**
Podesta, Fernando Ariel	Argentino	**-251**
Hernandez, Manuel Alonso	Argentino	**-241**
Merchant, Edgar Henry	Zárate	**-194**
Diggs, Avery Gerell	Zárate	**-190**
Capponi, Febo Lorenzo	Zárate	**-187**

Estos resultados muestran que los rendimientos propios de cada uno de los equipos dictan, en gran medida, quiénes lideran o cierran los rankings de *plus-minus*, reafirmando la dificultad que presenta esta medida tradicional para aislar el verdadero impacto individual del jugador respecto del contexto en el que participa.

4.1.4 Análisis del *plus-minus* por cada 100 posesiones

Además de estar influenciado por el desempeño del equipo al que pertenece el jugador, el *plus-minus* es una medida acumulativa a lo largo de la temporada, por lo que su valor depende tanto del diferencial de puntos registrado mientras el jugador se encuentra en cancha como de la cantidad de posesiones en las que participa. En este sentido, en grandes equipos que generalmente registran diferenciales positivos en el marcador, un jugador con mayor participación puede acumular un *plus-minus* superior al de otro jugador con menos minutos, sin que esta diferencia refleje necesariamente una mayor contribución individual. Con el propósito de reducir inicialmente la influencia de este volumen de participación, se calcula el *plus-minus* por cada 100 posesiones:

$$(+/-)_k^{100} = \frac{(+/-)_k \cdot 100}{N_k},$$

donde $(+/-)_k$ representa el *plus-minus* acumulado del jugador k y N_k la cantidad de posesiones en las que participó.




Figura 10: Ranking de plus-minus ponderado por cantidad de posesiones

La relación entre el *plus-minus* por cada 100 posesiones y la cantidad de posesiones disputadas por cada jugador se presenta en la Figura 10. Como puede observarse, los valores más extremos de la distribución se concentran entre los jugadores con menor participación. En particular, los 15 valores más altos y los 39 más bajos corresponden a jugadores que participaron en menos de 500 posesiones durante la temporada. Esta concentración en ambos extremos sugiere que, cuando se presentan pocas observaciones, la métrica resulta especialmente sensible a unas pocas acciones favorables o desfavorables y, por lo tanto, presenta una mayor variabilidad.

Para abordar este problema, manteniendo consistencia con el criterio definido en la Sección 3.5 para el tratamiento de los jugadores con poca participación, se restringe el análisis a quienes

disputaron al menos 500 posesiones en la temporada.

En los Cuadros 9 y 10 se presentan, respectivamente, los diez valores más altos y los diez más bajos del *plus-minus* por cada 100 posesiones entre los jugadores que disputaron al menos 500 posesiones.

Cuadro 9: Jugadores con mayor plus-minus por cada 100 posesiones

Jugador	Equipo	Posesiones	+/-	+/- por 100 posesiones
Louis, Arnold Michael	Quimsa	3052	306	**10.0262**
Vildoza, Leandro	Instituto	3302	297	**8.9945**
Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	3243	284	**8.7573**
Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2326	201	**8.6414**
Vasirani, Eduardo Martin	Quimsa	2383	182	**7.6374**
Sansimoni, Bruno	Quimsa	2006	152	**7.5773**
Rivero, Carlos Ezequiel	Gimnasia	1629	123	**7.5506**
Copello, Nicolas	Instituto	3366	245	**7.2787**
Piñero, Facundo	Boca Juniors	2387	160	**6.703**
Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3850	254	**6.5974**

Luego de aplicar esta restricción, dos jugadores de Gimnasia de Comodoro se ubican entre los diez valores más altos. Evidenciando un impacto positivo de estos jugadores en el tiempo que estuvieron en cancha, destacando en un equipo de mitad de tabla.

Cuadro 10: Jugadores con menor plus-minus por cada 100 posesiones

Jugador	Equipo	Posesiones	+/-	+/- por 100 posesiones
Alonso, Gonzalo Nicolas	La Unión	541	-65	**-12.0148**
Gomez, Manuel Alejandro	Argentino	3702	-409	**-11.0481**
Roveres, Augusto Daniel	Ferro	511	-53	**-10.3718**
Thornton, Raynere Zynique	Argentino	1088	-108	**-9.9265**
Slider, Jonatan	Argentino	3685	-352	**-9.5522**
Maxwell, Du'vaughn Elisha	Olímpico	611	-54	**-8.838**
Allende, Tomas Daniel	Argentino	3344	-295	**-8.8218**
Capponi, Febo Lorenzo	Zárate	2179	-187	**-8.5819**
Podesta, Fernando Ariel	Argentino	3047	-251	**-8.2376**
Romero, Gonzalo Emmanuel	Argentino	587	-48	**-8.1772**

Mientras que en la parte inferior (Cuadro 10) la composición del ranking deja de concentrarse exclusivamente en jugadores de Argentino de Junín y Zárate Basket, e incorpora también jugadores de La Unión de Formosa, Ferro y Olímpico.

De igual manera, esta normalización de la métrica tradicional no elimina todas las limitaciones del *plus-minus*, dado que la métrica continúa sin considerar la calidad de los compañeros y rivales con los que cada jugador compartió cancha.

4.1.5 Análisis del *plus-minus* estandarizado por equipo

Como se menciona en la Sección 4.1.4, el cálculo de +/- por posesión resulta muy informativo, pero lo es más si se piensa dentro del contexto del equipo. Tal como se evidencia en la Figura 11, los valores presentados en dicha métrica dependen fuertemente del desempeño de cada equipo, donde equipos clasificados a *playoffs* presentan jugadores con valoración generalmente positiva y equipos ubicados en las últimas posiciones de la tabla presentan, en su mayoría, una valoración negativa.




Figura 11: Plus-minus cada 100 posesiones por equipo

Pensando en mitigar el efecto, tanto positivo como negativo, que genera pertenecer a cierto equipo, se evalúa el +/- por 100 posesiones en relación a los valores de dicha métrica presentados por los propios compañeros del equipo. De esta forma, se busca identificar a aquellos jugadores que, aun perteneciendo a un equipo con una diferencia de anotación desfavorable, presentan un desempeño relativo superior al de sus compañeros.

Para ello se utiliza una estandarización robusta, basada en la mediana y la desviación absoluta mediana (*median absolute deviation*, MAD), en lugar de la media y la desviación estándar. Para un jugador k perteneciente al equipo e, se define:

$$(+/-)_k^{est} = \frac{(+/-)_k^{100} - \widetilde{(+/-)^{100}}_e}{MAD_e((+/-)^{100})}$$

Valores positivos indican que el jugador registra un +/- por 100 posesiones superior a la mediana de sus compañeros, mientras que los valores negativos señalan un desempeño inferior en términos relativos dentro de su equipo.

Cuadro 11: Jugadores con mayor plus-minus estandarizado

Jugador	Equipo	Posesiones	+/-	+/- estandarizado
Sanders, Nakie Gerald	Atenas	1211	60	**5.5182**
Garello, Vicente	San Martín	1524	95	**3.6429**
Mainoldi, Leonardo Andres	Olímpico	595	41	**3.0983**
Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2326	201	**2.8492**
Harina Martini, Federico Gabriel	La Unión	2982	55	**2.3924**
Rivero, Carlos Ezequiel	Gimnasia	1629	123	**2.3861**
Capelli, Santiago	Argentino	554	-16	**2.2476**
Carabali Porozo, Bryan Jose	San Martín	790	33	**2.156**
Louis, Arnold Michael	Quimsa	3052	306	**2.0007**
Dato, Martiniano	Gimnasia	2653	173	**1.949**

Los tres primeros puestos del Cuadro 11 corresponden a jugadores con una cantidad moderada de posesiones disputadas, esto se debe a que no disputaron la temporada completa con sus respectivos equipos. Nakye Sanders y Vicente Garello se incorporaron como refuerzos a Atenas y San Martín, respectivamente, mientras que Leonardo Mainoldi dejó Olímpico luego de los primeros siete encuentros.

En los tres casos, su participación coincide con períodos de mejores resultados para sus equipos. Atenas registró un récord de 9-9 (lo que significa 9 victorias y 9 derrotas) con Sanders, frente a 9-11 en los partidos que disputó sin él, aunque no pareciera ser una diferencia tan relevante, la diferencia en el +/- acumulado del equipo fue de -62 puntos en los partidos que no disputó Sanders, mientras que aumentó a +2 puntos en los partidos que sí disputó. Por su parte, San Martín obtuvo un récord de 4-10 antes de la llegada de Garello y de 15-9 desde su incorporación. Finalmente, Olímpico inició la temporada con un registro de 5-2 mientras contó con Mainoldi, pero acumuló 12 triunfos y 19 derrotas tras su partida. Si bien estas diferencias no permiten atribuir causalmente los cambios en el rendimiento colectivo a un único jugador, aportan contexto coherente con las elevadas valoraciones relativas que presentan dentro de sus planteles.

Entre los puestos superiores también aparece Santiago Capelli, a pesar de registrar un +/-

negativo en términos absolutos. Su caso ilustra el propósito de la estandarización: aunque integró Argentino de Junín, el equipo con peor desempeño de la temporada, su diferencial fue considerablemente más favorable que el de sus compañeros.

Cuadro 12: Jugadores con peor plus-minus estandarizado

Jugador	Equipo	Posesiones	+/-	+/- estandarizado
Alonso, Gonzalo Nicolas	La Unión	541	-65	**-6.2205**
Payton Clottey, Emmanuel Travon	San Martín	966	-63	**-5.5804**
Digon, Alejo Adriel	Obras	691	-33	**-4.7101**
Roveres, Augusto Daniel	Ferro	511	-53	**-4.0184**
Ledesma, Ramiro	Atenas	1484	-75	**-3.6748**
Maxwell, Du'vaughn Elisha	Olímpico	611	-54	**-2.7516**
Mitchell Jr, Tony Rasean	Unión	690	-55	**-2.6258**
Krayem, Omar Nabil	Riachuelo	551	-35	**-2.5965**
Jara, Cesar Agustin	Independiente	3016	-175	**-2.4791**
Romano, Nicolas	Quimsa	2186	28	**-2.4588**

En el Cuadro 12 se observa que, de manera similar al caso de Capelli, entre los puestos inferiores del ranking aparece Nicolás Romano, presentando un +/- positivo en términos absolutos. Dicho jugador integró el equipo con mayor +/- a lo largo de la temporada, pero presentó un desempeño muy por debajo del de sus compañeros.

Esta medida complementa el análisis del +/- por 100 posesiones al identificar la posición relativa de cada jugador dentro de su plantel. Sin embargo, los valores deben interpretarse principalmente como una medida del desempeño de cada jugador respecto al de sus compañeros, y no como una medida directa de rendimiento individual aislada del contexto del equipo.

4.2 Métricas basadas en modelos estadísticos

Las métricas descriptivas analizadas en la sección anterior permiten cuantificar el rendimiento observado de los equipos durante las posesiones en las que participa cada jugador, pero no aislar su contribución individual del contexto en el que se produce. Para abordar esta limitación,

a continuación se presentan los resultados obtenidos mediante los modelos estadísticos desarrollados en el Capítulo 3: RAPM, EPTS y wEPTS.

4.2.1 RAPM

Como primera medida estándar a evaluar, se estima el RAPM mediante un modelo de regresión lineal múltiple normal presentado en la Sección 3.1.1. Se consideran $K = 229$ jugadores (66,1% del total) que superan el criterio mínimo de participación, por lo que se incluyen 458 indicadores de presencia, 229 ofensivos y 229 defensivos. Los coeficientes se estiman mediante Ridge, Lasso y Elastic Net para reducir la inestabilidad generada por la multicolinealidad y la escasa cantidad de observaciones de algunos jugadores.

Los hiperparámetros de cada técnica de regularización se seleccionan mediante el procedimiento de validación cruzada descrito en la Sección 3.7. Los valores seleccionados y los correspondientes errores cuadráticos medios de validación cruzada se presentan en el Cuadro 13.

Cuadro 13: Técnicas de regularización y valores de hiperparámetros.

Penalización	α	λ	CME CV	Coeficientes activos
Ridge	0	0,06258	1,405088	458
Lasso	1	0,00085	1,405401	98
Elastic Net	0,005	0,04261	1,405031	331

Las distintas regularizaciones presentan medidas de error muy similares, siendo Elastic Net la mejor entre las tres alternativas. También se observan valores absolutos bajos para los coeficientes de penalización, lo cual no debe confundirse con una baja penalización, ya que para el caso de Lasso se reduce el 78,60% de los coeficientes a cero. Mientras que en el caso de Elastic Net donde la penalización está aparentemente dominada por L_2 ($\alpha = 0{,}005$), también se anulan un 27,72% de los coeficientes.

Al analizar estos resultados a nivel de jugador, de los 229 jugadores que ingresan en el modelo, 144 presentan ambos coeficientes iguales a cero en el modelo Lasso, mientras que solo 22 cumplen esa condición con Elastic Net. En estos casos, la anulación de un coeficiente no

implica necesariamente que un jugador carezca de impacto, sino que, a partir de la información aportada por el resto de los predictores, su efecto ofensivo o defensivo no resulta suficientemente distinguible. Esta anulación puede estar asociada tanto con la cantidad de posesiones disputadas como con la elevada correlación existente entre jugadores que comparten frecuentemente sus minutos en cancha.

Por otro lado, el modelo Ridge no reduce los coeficientes exactamente hasta cero, pero sí los contrae hacia ese valor: 51 coeficientes presentan una magnitud inferior a 0,001 puntos por posesión, equivalente a un efecto inferior a 0,1 puntos cada 100 posesiones.

Una limitación de estos modelos es que suponen una distribución normal para los puntos anotados por posesión, pese a que la respuesta observada es discreta y presenta una elevada concentración en cero. Por este motivo, a continuación se analizan los resultados obtenidos mediante el modelo de regresión logística multinomial y las métricas EPTS derivadas de sus probabilidades estimadas.

4.2.2 EPTS

Se ajustan los modelos de regresión logística multinomial presentados en la Sección 3.1.2 para estimar la probabilidad de cada tipo de anotación, mediante las distintas técnicas de regularización consideradas para la estimación de sus coeficientes. La elección de los hiperparámetros se realiza a través del procedimiento de validación cruzada, utilizando la *deviance* como medida de error a minimizar. Los resultados de este proceso se presentan en el Cuadro 14.

Cuadro 14: Técnicas de regularización y valores de hiperparámetros.

Penalización	α	λ	*Deviance* CV	Predictores activos
Ridge	0	0,00946	2,195519	458
Lasso	1	0,00039	2,196606	199
Elastic Net	0,005	0.00920	2.195658	457

Al igual que en los modelos normales (Sección 4.2.1), las tres técnicas de regularización presentan valores de *deviance* de validación cruzada muy similares entre sí, por lo que estas diferencias

no permiten concluir que una penalización sea claramente superior a las demás en términos de bondad de ajuste. A pesar de que las diferencias son mínimas, en la grilla evaluada se observa un incremento en la *deviance* a medida que aumenta el valor de α, obteniéndose el menor valor para Ridge ($\alpha = 0$). Para Elastic Net, se conserva la configuración con menor deviance entre aquellas con $\alpha > 0$, correspondiente a $\alpha = 0,005$, con el objetivo de comparar el comportamiento de las tres técnicas de regularización.

Al analizar la reducción de coeficientes de los distintos modelos, se observa que el modelo Elastic Net seleccionado solo anula un predictor defensivo, debido al reducido peso asignado a la componente L_1. Mientras que el modelo Lasso reduce 259 coeficientes a cero, de los cuales se desprende que 82 jugadores presentan los dos coeficientes nulos, 49 solo anulan el coeficiente ofensivo y 46 solo el defensivo.

Debido al bajo valor de α seleccionado para Elastic Net (α = 0,005) se puede identificar una similitud muy marcada entre los resultados provistos por este modelo en comparación a los producidos por Ridge. Para evaluar específicamente la concordancia entre sus rankings, se calcula el coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose valores de 0,9988 para el componente ofensivo y 0,9987 para el defensivo. Estos resultados indican que ambos modelos producen ordenamientos prácticamente idénticos. Mientras que al analizar la técnica Lasso se observa que, al igual que sucede en los modelos normales, la distribución de las métricas presenta una gran cantidad de jugadores con coeficientes reducidos a cero, y por lo tanto valores de EPTS iguales a $EPTS_0$ (8), sin embargo también presenta una distribución con colas más pronunciadas comparada a las demas regularizaciones, presentando los valores más altos y más bajos de EPTS.

4.2.3 wEPTS

Una vez obtenidos los EPTS, se calcula su versión ponderada según la proporción de posesiones de su equipo en las que participa cada jugador. Esta ponderación contrae los EPTS hacia el valor correspondiente al grupo de referencia ($EPTS_0$), siendo la contracción proporcionalmente mayor cuanto menor es la participación del jugador. Si un jugador participara en todas las

posesiones de su equipo, su wEPTS coincidiría con el EPTS.

Para evidenciar el efecto de la ponderación, se comparan las distribuciones de EPTS y wEPTS obtenidas mediante Ridge. En cada componente se resaltan los cinco jugadores que presentaron la mayor variación absoluta entre ambas métricas. Los segmentos unen el EPTS original de cada jugador con su correspondiente wEPTS, mientras que la línea vertical punteada representa el valor $EPTS_0$ del grupo de referencia.




Figura 12: Distribuciones de EPTS y wEPTS: componente ofensivo

La Figura 12 muestra que las mayores reducciones absolutas no se concentran necesariamente entre quienes presentan muy baja participación durante la temporada. Cuatro de los cinco jugadores mejor ubicados en el ranking ofensivo de EPTS se encuentran entre los más afectados por la ponderación, a pesar de haber participado aproximadamente en el 40%–45% de las posesiones de sus equipos. Como consecuencia, registran caídas relevantes en el ranking:

- **Dominique Montel Morrison** pasa del 1.º puesto en el ranking de EPTS al 3.º en el de wEPTS.
- **Marcos Chacón Tirado** pasa del 3.º puesto al 15.º, recibiendo la mayor penalización entre las métricas ofensivas (una diferencia de -0,02118 puntos esperados).
- **Martiniano Dato** pasa del 4.º puesto al 9.º en el ranking wEPTS.
- **Charles Price Thomas III** pasa del 5.º puesto al 12.º.

Por otra parte, al analizar las métricas defensivas presentadas en la Figura 13 también se observa un comportamiento similar al mencionado.




Figura 13: Comparación de distribuciones: EPTS vs wEPTS

En esta comparación destaca **Nakye Gerald Sanders**, quien presenta la mayor variación absoluta entre EPTS y wEPTS entre todos los jugadores, con una diferencia de 0,02215 puntos

esperados por posesión. Como consecuencia, pasa del 9.º al 39.º puesto del ranking defensivo. Entre los cinco jugadores con mayor penalización en la métrica defensiva vuelve a aparecer **Marcos Chacón Tirado**, quien pasa del 7.º al 13.º puesto. Sumado a que presenta la mayor penalización en el componente ofensivo, este resultado lo identifica como uno de los jugadores cuya valoración se ve más afectada por la incorporación de la ponderación.

Estos resultados muestran que los mayores cambios absolutos no se presentan necesariamente a los jugadores con menor participación. Aunque una menor participación implica una mayor contracción proporcional hacia $EPTS_0$, la magnitud absoluta del cambio también depende de la distancia entre el EPTS original del jugador y dicho valor de referencia. En consecuencia, jugadores que originalmente presentan valores muy elevados de EPTS pueden verse muy pejudicados, modificando de manera sustancial las posiciones superiores del ranking.

4.3 Comparación de modelos

4.3.1 Bondad de ajuste

La capacidad predictiva de estos modelos se compara, al igual que en el artículo de referencia, mediante el RMSE. Las predicciones utilizadas para calcular esta medida se generan a partir de un nuevo ajuste de los modelos, para lo cual se divide la base de datos en diez particiones, se entrena el modelo con nueve de ellas y se predicen las posesiones pertenecientes a la partición restante. Este procedimiento se repite dejando sucesivamente cada una de las particiones fuera del entrenamiento, de manera de obtener predicciones *out-of-fold* para todas las posesiones de la base de datos. Luego, a partir de estas predicciones se calcula el RMSE de cada modelo.

Cuadro 15: RMSE out-of-fold para cada modelo

Modelo	RMSE
Normal Ridge	1.185367
Normal Lasso	1.185494
Normal Elastic Net	1.185344
Multinomial Ridge	1.185414
Multinomial Lasso	1.185505
Multinomial Elastic Net	1.185378

En base al Cuadro 15 se puede notar que ninguna combinación de distribución y regularización parece producir una mejora predictiva importante sobre las demás. Siendo la mejor métrica obtenida por el modelo de regresión múltiple penalizada con Elastic Net, con un RMSE igual a 1,185344; sin embargo, la diferencia respecto del modelo multinomial Lasso, que presentó el valor más elevado, es de apenas 0,000161.

Para complementar la evaluación realizada a través del RMSE, se lleva a cabo una evaluación adicional, aplicada exclusivamente a los modelos multinomiales, con el objetivo de determinar si estos reproducen adecuadamente la distribución empírica de los puntos por posesión. Siguiendo el procedimiento de simulación propuesto por Damoulaki et al. (2025), para cada técnica de regularización se generan 1.000 réplicas de la temporada. En cada una de ellas, se simula la cantidad de puntos obtenida en todas las posesiones a partir de las probabilidades estimadas por el modelo correspondiente. Luego, para cada réplica, se calcula la proporción de posesiones que finalizaron con 0, 1, 2 o 3 o más puntos. Estas proporciones simuladas se comparan con las observadas empíricamente.




Figura 14: Distribución de las proporciones de posesiones por categoría de anotación en 1.000 temporadas simuladas, según técnica de regularización

En la Figura 14 se observa que las distribuciones de las proporciones simuladas se concentran alrededor de las proporciones empíricas y son muy similares entre las tres técnicas de regularización. Esto indica que los modelos multinomiales reproducen adecuadamente, y de manera similar entre sí, la distribución marginal observada de los puntos por posesión.

4.3.2 Consistencia

Los resultados provistos en la Sección 4.3.1 mustran que las distintas combinaciones de distribución y técnica de regularización presentan una capacidad predictiva prácticamente equivalente. Sin embargo, una bondad de ajuste similar no implica necesariamente que los rankings estimados sean igualmente confiables. Un modelo puede reproducir adecuadamente los resultados observados y, al mismo tiempo, generar métricas muy sensibles a los partidos incluidos en el conjunto de datos.

Siguiendo el enfoque comentado en la Sección 3.8.2, se evalúa entonces la consistencia de los modelos, entendida como su capacidad para producir valoraciones similares al ser ajustados sobre muestras diferentes. Para ello, las posesiones de cada partido se distribuyen aleatoriamente y de manera equilibrada entre dos particiones. Posteriormente, cada modelo se reajusta de manera independiente y se calcula la correlación de Pearson entre los rankings obtenidos con cada partición.

El procedimiento completo se repite 20 veces, utilizando una nueva división aleatoria en cada repetición y las mismas particiones para todos los modelos. El análisis se realiza separadamente para cada métrica, técnica de regularización y componente ofensivo o defensivo. La Figura 15 presenta las correlaciones obtenidas en cada repetición y sus respectivos promedios.




Figura 15: Análisis de consistencia de los rankings

Las correlaciones promedio de Pearson resultan positivas en todas las combinaciones analizadas, aunque con magnitudes bajas, con valores comprendidos entre 0,091 y 0,293. Al comparar

las técnicas de regularización, Ridge y Elastic Net presentan resultados próximos entre sí y sistemáticamente superiores a los obtenidos mediante Lasso. Elastic Net alcanza las mayores correlaciones promedio para EPTS y wEPTS, tanto en el componente ofensivo como en el defensivo. Por su parte, Ridge presenta los mayores promedios para RAPM, con valores de 0,244 en ataque y 0,254 en defensa. Lasso registra correlaciones inferiores a las otras dos regularizaciones en cada una de las 20 repeticiones, para todas las métricas y componentes considerados.

Por otro lado, las valoraciones defensivas muestran, en general, una mayor consistencia que las ofensivas, con la excepción del RAPM estimado mediante Lasso. Los valores promedio más elevados de todo el análisis corresponden al wEPTS defensivo estimado mediante Elastic Net y Ridge, con correlaciones de 0,293 y 0,286, respectivamente. En el componente ofensivo, el mayor promedio corresponde al RAPM estimado mediante Ridge.

Si bien estos resultados evidencian cierta sensibilidad de las valoraciones a las posesiones utilizadas para su estimación, deben interpretarse con cautela, considerando que cada modelo es ajustado utilizando aproximadamente la mitad de una temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, lo que implica una cantidad relativamente baja de posesiones disponibles para las estimaciones. Además, es importante aclarar que este análisis evidencia qué procedimientos generan resultados más reproducibles frente a cambios en la muestra utilizada pero no constituye una medida directa de la estabilidad de los rankings definitivos, ya que estos se calculan utilizando la información de la temporada completa.

4.3.3 Validación externa

Las evaluaciones realizadas en las Secciones 4.3.1 y 4.3.2 permiten analizar la capacidad de ajuste de los modelos y la estabilidad de las valoraciones obtenidas ante cambios en la muestra utilizada. Sin embargo, resulta importante complementar estos criterios con validaciones externas que permitan determinar en qué medida los rankings representan adecuadamente el rendimiento de los jugadores, o la percepción del rendimiento que los especialistas tienen sobre los mismos. Por

este motivo, la evaluación se complementa mediante los criterios de validación externa definidos en la Sección 3.8.3.

Estos criterios comparan a los rankings obtenidos con distintas referencias vinculadas al desempeño de los jugadores, como los reconocimientos recibidos durante la temporada, su nivel de participación y las estadísticas tradicionales del *box score*. Si bien estas referencias no constituyen una medida definitiva del verdadero aporte individual, permiten evaluar la concordancia de las distintas métricas con otras referencias vinculadas al rendimiento de los jugadores.

Cuadro 16: Comparación de rankings según criterios de validación externa

Modelo	Criterio 1 (%)	Criterio 2 (%)	Criterio 3a (%)	Criterio 3b (%)
RAPM (normal) - Ridge	58.0	4.0	70.0	60.0
RAPM (normal) - Lasso	62.0	2.0	74.0	60.0
RAPM (normal) - Elastic Net	58.0	4.0	70.0	55.0
EPTS (multinomial) - Ridge	56.0	6.0	68.0	47.5
EPTS (multinomial) - Lasso	66.0	4.0	74.0	52.5
EPTS (multinomial) - Elastic Net	58.0	4.0	70.0	50.0
wEPTS (multinomial) - Ridge	**68.0**	**0.0**	**84.0**	**85.0**
wEPTS (multinomial) - Lasso	**68.0**	**0.0**	80.0	70.0
wEPTS (multinomial) - Elastic Net	**68.0**	**0.0**	**84.0**	82.5

Para los criterios de jugadores galardonados (1), jugadores con poco tiempo de juego (2) y titulares en las posiciones superiores (3a), los porcentajes se calculan sobre 50 posiciones: las primeras 25 de los rankings ofensivos y las primeras 25 de los defensivos. Para el criterio complementario de titulares en las posiciones inferiores (3b), el porcentaje se calcula sobre 40 posiciones: las últimas 20 de cada componente.

Los resultados del Cuadro 16 muestran un patrón favorable para las métricas derivadas del modelo logístico multinomial, especialmente para la versión ponderada. En todos los criterios analizados, los valores más favorables los alcanza wEPTS. En particular, en los tres rankings generados por wEPTS, el 68 % de las 50 posiciones superiores (34 posiciones) están ocupados por jugadores galardonados, mientras que ninguna de ellas corresponde a jugadores con poco

tiempo de juego. A su vez, las métricas wEPTS estimadas mediante Ridge y Elastic Net presentan la mayor presencia de titulares en las posiciones superiores, con 42 de las 50 posiciones consideradas.

Las diferencias favorables observadas en los criterios vinculados con la participación para las métricas de wEPTS resultan esperables, dado que esta métrica incorpora explícitamente la proporción de posesiones disputadas por cada jugador. Por lo cual, para esta medida, la comparación no constituye necesariamente una validación externa independiente, pero sirve para mostrar que la ponderación cumple efectivamente el objetivo de reducir la presencia de jugadores con escasa participación en las posiciones extremas del ranking.

Cuadro 17: Comparación de los rankings según estadísticas tradicionales del box score

	Estadísticas ofensivas			Estadísticas defensivas		
Modelo	PTS (%)	AST (%)	OREB (%)	DREB (%)	STL (%)	BLK (%)
RAPM (normal) - Ridge	52.0	**36.0**	32.0	28.0	40.0	28.0
RAPM (normal) - Lasso	60.0	**36.0**	36.0	32.0	44.0	28.0
RAPM (normal) - Elastic Net	52.0	32.0	32.0	28.0	40.0	28.0
EPTS (multinomial) - Ridge	56.0	28.0	36.0	24.0	44.0	**32.0**
EPTS (multinomial) - Lasso	60.0	32.0	36.0	28.0	40.0	24.0
EPTS (multinomial) - Elastic Net	60.0	32.0	36.0	28.0	44.0	28.0
wEPTS (multinomial) - Ridge	60.0	32.0	**40.0**	**36.0**	**52.0**	28.0
wEPTS (multinomial) - Lasso	**64.0**	32.0	36.0	32.0	48.0	20.0
wEPTS (multinomial) - Elastic Net	60.0	32.0	**40.0**	**36.0**	**52.0**	28.0

Cada celda indica el porcentaje de jugadores del top 25 del ranking estimado que también pertenece al top 50 de la correspondiente estadística del box score. Para PTS, AST y OREB se consideran los rankings ofensivos, mientras que para DREB, STL y BLK se consideran los defensivos.

El patrón observado en el Cuadro 16 se mantiene al comparar los rankings con las estadísticas tradicionales del *box score*. Mediante el Cuadro 17 puede observarse que, en cinco de las seis variables consideradas, el mayor porcentaje de coincidencia es alcanzado por al menos una de las métricas derivadas del modelo logístico multinomial. Entre las distintas técnicas

implementadas, se destacan particularmente los wEPTS estimados mediante Ridge y Elastic Net, los cuales presentan los mayores niveles de coincidencia en rebotes ofensivos, rebotes defensivos y recuperaciones.

En términos generales, la coincidencia promedio es mayor para las estadísticas ofensivas (42,2 %) que para las defensivas (34,1 %). Este patrón coincide con lo señalado por Damoulaki et al. (2025), donde se sostiene que el rendimiento ofensivo puede asociarse más con la habilidad individual de los jugadores, mientras que el éxito defensivo depende en mayor medida de la coordinación y cooperación colectiva. Sin embargo, se considera que el planteo realizado por Damoulaki resulta parcial o incompleto, debido a que la menor coincidencia observada no debe atribuirse exclusivamente a una limitación de los modelos, sino a una limitación propia de las medidas tradicionales defensivas como los rebotes defensivos, los recuperos y los tapones las cuales no cuantifican de manera adecuada el aporte defensivo del jugador y no capturan aspectos importantes como el posicionamiento, las rotaciones o la intensidad.

Como análisis complementario, se comparan los rankings estimados con las medidas descriptivas basadas en *plus-minus* presentadas en las Secciones 4.1.4 y 4.1.5. A diferencia de los criterios anteriores, esta comparación no constituye una validación externa en sentido estricto, dado que ambas medidas se construyen a partir del rendimiento del equipo en términos de puntos anotados y recibidos durante las posesiones. El objetivo de la comparación es evaluar en qué medida los modelos reproducen los ordenamientos que se obtendrían mediante medidas más simples que buscan explicar el mismo fenómeno.

Cuadro 18: Concordancia entre los rankings estimados y las medidas descriptivas basadas en plus-minus

	Puntos realizados		Puntos recibidos	
Modelo	Por posesión (%)	Estandarizados (%)	Por posesión (%)	Estandarizados (%)
RAPM (normal) - Ridge	**60**	**44**	56	48
RAPM (normal) - Lasso	52	36	56	48
RAPM (normal) - Elastic Net	**60**	40	**60**	**52**
EPTS (multinomial) - Ridge	52	**44**	**60**	48
EPTS (multinomial) - Lasso	56	40	48	**52**
EPTS (multinomial) - Elastic Net	52	**44**	56	48
wEPTS (multinomial) - Ridge	44	36	40	36
wEPTS (multinomial) - Lasso	52	40	40	40
wEPTS (multinomial) - Elastic Net	44	36	40	36

Cada celda indica el porcentaje de jugadores del top 25 del ranking estimado que también pertenece al top 25 de la correspondiente medida descriptiva.

En el cuadro 18 se evidencian diferencias en relación a lo observado en los demás criterios de validación externa. Los rankings RAPM derivados del modelo normal tienden a presentar una mayor concordancia con las medidas descriptivas basadas en *plus-minus*. Al menos una de sus variantes alcanza el máximo porcentaje de coincidencia en las cuatro comparaciones realizadas, aunque las métricas EPTS igualan estos valores en algunos casos. En cuanto a las técnicas de regularización, los modelos estimados mediante Ridge y Elastic Net presentan los mayores porcentajes de coincidencia en la mayoría de las comparaciones.

La mayor concordancia de los RAPM con estas métricas podría estar relacionada con una mayor proximidad entre sus formas de construcción. Tanto el *plus-minus* como el RAPM obtenido mediante el modelo normal se encuentran expresados en términos de los puntos anotados o recibidos durante las posesiones. Las métricas basadas en el modelo multinomial, en cambio, obtienen los puntos esperados a partir de las probabilidades estimadas para cada tipo de anotación.

Por otra parte, los menores porcentajes observados para wEPTS también resultan consistentes

con su construcción. A diferencia de EPTS, que evalúa el rendimiento esperado del jugador durante las posesiones en las que participa, wEPTS incorpora además su proporción de participación y contrae la valoración cuando esta es reducida, combinando el rendimiento durante el tiempo en cancha con el volumen de participación a lo largo de la temporada. Las medidas descriptivas por posesión analizadas, al igual que EPTS, evalúan el rendimiento relativo durante las posesiones disputadas. Por lo tanto, la menor concordancia de wEPTS no implica necesariamente un peor desempeño, sino que refleja la diferencia en la interpretación de dichas métricas.

4.4 Rankings de jugadores

Por último, se presentan los rankings de los jugadores mejor valorados según su aporte ofensivo, defensivo y total en la temporada 2024/2025 de la LNB. A partir de las comparaciones realizadas en la Sección 4.3, se identifican resultados más favorables para las métricas derivadas del modelo multinomial, especialmente para las medidas estimadas mediante Ridge y Elastic Net. Estas alternativas presentan resultados más consistentes y una mayor concordancia con los criterios externos considerados que Lasso. Dada la similitud de los resultados de Ridge y Elastic Net, en esta sección se presentan únicamente los rankings correspondientes a Elastic Net.

Por otra parte, como se señala en la Sección 4.3.3, EPTS y wEPTS ofrecen perspectivas complementarias del rendimiento individual, por lo que se presentan los rankings correspondientes a ambas métricas. En todos los cuadros se incluyen las valoraciones ofensiva, defensiva y total; esta última se calcula como la diferencia entre las dos primeras.

Los Cuadros 19 y 20 listan a los diez jugadores con mayor valoración ofensiva en la temporada en estudio, según las métricas EPTS y wEPTS respectivamente.

Cuadro 19: Diez jugadores mejor valorados según EPTS ofensivo, estimados mediante Elastic Net

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Morrison, Dominique Montel	Unión	2.637	1,0711	1,0585	0,0126
2	Vorhees, William Leonard-Deubler	Oberá	3.921	1,0676	1,0274	0,0401
3	Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2.326	1,0662	1,0039	0,0623
4	Dato, Martiniano	Gimnasia	2.653	1,0655	1,0145	0,0510
5	Thomas Iii, Charles Price	Regatas	2.613	1,0638	1,0322	0,0315
6	Torresi, Jonatan Fabian	Oberá	3.046	1,0637	1,0328	0,0308
7	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0633	0,9990	0,0643
8	Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3.850	1,0628	1,0138	0,0490
9	Brussino, Juan Ignacio	Quimsa	3.392	1,0606	1,0413	0,0193
10	Schattmann, Carlos Leonel	Obras	3.477	1,0604	1,0494	0,0110

Cuadro 20: Diez jugadores mejor valorados según wEPTS ofensivo, estimados mediante Elastic Net.

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Vorhees, William Leonard-Deubler	Oberá	3.921	1,0561	1,0295	0,0266
2	Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3.850	1,0531	1,0204	0,0327
3	Morrison, Dominique Montel	Unión	2.637	1,0503	1,0444	0,0059
4	Schattmann, Carlos Leonel	Obras	3.477	1,0495	1,0429	0,0066
5	Cabrera, Martin Andres	Independiente	3.852	1,0494	1,0430	0,0063
6	Brussino, Juan Ignacio	Quimsa	3.392	1,0491	1,0380	0,0111
7	Torresi, Jonatan Fabian	Oberá	3.046	1,0489	1,0331	0,0158
8	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0489	1,0156	0,0332
9	Dato, Martiniano	Gimnasia	2.653	1,0484	1,0246	0,0238
10	Miller, Tavario Earnest Ptristian	Quimsa	3.447	1,0481	1,0394	0,0088

Ambos listados comparten ocho jugadores, aunque presentan algunas diferencias en su ordenamiento. El primer puesto corresponde a Dominique Morrison según EPTS y a William Vorhees según wEPTS. En cada ranking, nueve de los diez jugadores recibieron al menos uno de los galardones otorgados en la temporada. La única excepción es Jonatan Torresi, de Oberá.

Cuadro 21: Diez jugadores mejor valorados según EPTS defensivo, estimados mediante Elastic Net.

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Vildoza, Leandro	Instituto	3.302	1,0423	0,9935	0,0488
2	Gargallo, Lucas Hernan	San Martín	4.480	1,0188	0,9974	0,0214
3	Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	3.243	1,0434	0,9984	0,0450
4	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0633	0,9990	0,0643
5	Garcia, Gaston Leonel	San Martín	3.147	1,0177	0,9996	0,0181
6	Basualdo, Ivan Nicolas	San Lorenzo	3.891	1,0255	1,0028	0,0226
7	Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2.326	1,0662	1,0039	0,0623
8	Lema, Leonardo	Atenas	3.549	1,0195	1,0053	0,0142
9	Sanders, Nakie Gerald	Atenas	1.211	1,0426	1,0073	0,0354
10	Hunt, Dario Nathan Henry	San Martín	1.989	1,0143	1,0073	0,0070

Cuadro 22: Diez jugadores mejor valorados según wEPTS defensivo, estimados mediante Elastic Net.

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Gargallo, Lucas Hernan	San Martín	4.480	1,0221	1,0056	0,0165
2	Vildoza, Leandro	Instituto	3.302	1,0385	1,0106	0,0279
3	Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	3.243	1,0391	1,0138	0,0253
4	Basualdo, Ivan Nicolas	San Lorenzo	3.891	1,0283	1,0139	0,0144
5	Garcia, Gaston Leonel	San Martín	3.147	1,0249	1,0151	0,0098
6	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0489	1,0156	0,0332
7	Lema, Leonardo	Atenas	3.549	1,0249	1,0162	0,0087
8	Figueredo, Diego Rafael	Riachuelo	3.151	1,0431	1,0204	0,0227
9	Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3.850	1,0531	1,0204	0,0327
10	Giletto, Salvador	Regatas	2.887	1,0309	1,0204	0,0105

Los Cuadros 21 y 22 presentan los jugadores mejor posicionados según EPTS y wEPTS defensivos. Las primeras posiciones de estos rankings se intercambian entre Leandro Vildoza

y Lucas Gargallo, identificándose como los mejores jugadores defensivos de la temporada. También se destaca la presencia de Gastón García e Iván Basualdo, quienes ocupan los puestos 5 y 6-4 respectivamente. Ambos jugadores integraron la terna al mejor defensor de la fase regular, reconocimiento que finalmente obtuvo García. Esta coincidencia aporta un ejemplo de concordancia entre las valoraciones defensivas estimadas y el criterio de los especialistas que participan de la elección.

Por otra parte, al analizar las cinco posiciones superiores del ranking, se ve que dos puestos son ocupados por jugadores de Instituto y otros dos por jugadores de San Martín, estos son los equipos con menor cantidad total de puntos recibidos durante la fase regular (Cuadro 6).

En ambos listados, nueve de los diez jugadores recibieron algún galardón o fueron ternados en la temporada en estudio. Las excepciones corresponden a Dario Hunt y Salvador Giletto, quienes ocupan el décimo puesto de los rankings EPTS y wEPTS, respectivamente.

Finalmente, los Cuadros 23 y 24 presentan los rankings generales obtenidos al integrar los componentes ofensivo y defensivo. Como la valoración total se calcula mediante la diferencia entre ambos, un mayor valor ofensivo y un menor valor defensivo contribuyen a mejorar la posición del jugador en estos rankings.

Cuadro 23: Diez jugadores mejor valorados según EPTS total, estimados mediante Elastic Net.

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0633	0,9990	0,0643
2	Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2.326	1,0662	1,0039	0,0623
3	Dato, Martiniano	Gimnasia	2.653	1,0655	1,0145	0,0510
4	Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3.850	1,0628	1,0138	0,0490
5	Vildoza, Leandro	Instituto	3.302	1,0423	0,9935	0,0488
6	Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	3.243	1,0434	0,9984	0,0450
7	Figueredo, Diego Rafael	Riachuelo	3.151	1,0509	1,0096	0,0413
8	Vorhees, William Leonard-Deubler	Oberá	3.921	1,0676	1,0274	0,0401
9	Garello, Vicente	San Martín	1.524	1,0545	1,0172	0,0373
10	Sanders, Nakie Gerald	Atenas	1.211	1,0426	1,0073	0,0354

Cuadro 24: Diez jugadores mejor valorados según wEPTS total, estimados mediante Elastic Net.

Posición	Jugador	Equipo	Posesiones	Ofensivo	Defensivo	Total
1	Louis, Arnold Michael	Quimsa	3.052	1,0489	1,0156	0,0332
2	Cuello, Martin Nicolas	Boca Juniors	3.850	1,0531	1,0204	0,0327
3	Vildoza, Leandro	Instituto	3.302	1,0385	1,0106	0,0279
4	Vorhees, William Leonard-Deubler	Oberá	3.921	1,0561	1,0295	0,0266
5	Chacon Tirado, Marcos	Gimnasia	2.326	1,0467	1,0213	0,0254
6	Pomoli Larraburu, Nicola	Instituto	3.243	1,0391	1,0138	0,0253
7	Dato, Martiniano	Gimnasia	2.653	1,0484	1,0246	0,0238
8	Figueredo, Diego Rafael	Riachuelo	3.151	1,0431	1,0204	0,0227
9	Bombino Parada, Pedro Antonio	Unión	3.095	1,0453	1,0284	0,0169
10	Laterza, Juan Ignacio	Oberá	2.937	1,0396	1,0229	0,0168

Arnold Michael Louis, de Quimsa, ocupa el primer puesto del ranking general tanto para EPTS como para wEPTS. Este resultado coincide con lo observado en el análisis descriptivo donde dicho jugador registra el mayor +/- acumulado de la base analizada, con 306 puntos, y el mayor

+/- por cada 100 posesiones entre quienes disputan al menos 500 posesiones, con 10,0262. A su vez, Quimsa presentó el mayor diferencial de puntos en la fase regular, con 347, a pesar de finalizar cuarto en la tabla de posiciones. Estas coincidencias muestran una correspondencia entre su valoración general y las medidas descriptivas analizadas.

En cuanto a los reconocimientos, nueve de los diez jugadores del ranking general de EPTS y los diez del ranking general de wEPTS cuentan con al menos uno de los considerados en la validación externa. La única excepción es Vicente Garello, quien ocupa el noveno puesto según EPTS.

Por otro lado, un resultado que merece señalarse es que José Ignacio Vildoza, elegido MVP de la fase regular, no aparece entre las primeras diez posiciones de ninguno de los rankings presentados. Por lo cual, aun cuando se observan coincidencias con otros jugadores distinguidos, las métricas propuestas deben interpretarse como herramientas complementarias para la evaluación del rendimiento individual, sin atribuirles un peso definitivo.

5 Discusión

5.1 Interpretación y discusión de los resultados

La comparación de los modelos propuestos permite identificar diferencias importantes en el comportamiento de las distintas alternativas metodológicas, aunque estas no se manifiestan de igual manera en todos los criterios de evaluación considerados.

En términos generales, los resultados de las evaluaciones de consistencia y validación externa muestran un desempeño menos favorable de Lasso, lo cual difiere de lo obtenido por Damoulaki et al. (2025), quienes encontraron mejores resultados mediante esta técnica y propusieron finalmente al wEPTS construido a partir de esta penalización como la alternativa preferida. Una posible explicación se encuentra en las diferencias entre las bases analizadas: la menor cantidad de información disponible en este trabajo, junto con la elevada correlación existente entre las variables indicadoras de jugadores que comparten gran parte de sus minutos, podría incrementar la inestabilidad asociada a la selección realizada por Lasso.

Otra interpretación de interés surge de la comparación entre EPTS y wEPTS, donde la variación en los puestos altos del ranking de estas medidas deja entrever una diferencia muy interesante en su interpretación. El EPTS describe principalmente el rendimiento esperado del jugador durante las posesiones en las que participa, sin incorporar directamente cuánto intervino a lo largo de la temporada. El wEPTS, en cambio, penaliza esta valoración en función de su participación durante la temporada, pudiendo interpretarse como una medida de contribución total del rendimiento de los jugadores sobre toda la temporada.

En este sentido, EPTS y wEPTS pueden entenderse como medidas que responden a distintos objetivos y que, por lo tanto, pueden ser utilizadas de manera complementaria. Mientras que el EPTS puede resultar útil cuando el interés se encuentra en evaluar el rendimiento del jugador durante los minutos que disputó y ser utilizado, por ejemplo, para el *scouting* de los equipos, el wEPTS puede utilizarse para evaluar qué jugador realiza el mayor aporte a lo largo de la temporada en su conjunto y ser utilizado para la elección de premios.

5.2 Aportes del trabajo

Más allá de los rankings, uno de los principales aportes del trabajo se encuentra en la construcción de los datos necesarios para realizar este tipo de análisis. Debido a que la información del *play-by-play* y del *box score* de la Liga Nacional no se encuentra disponible como bases estructuradas y descargables para su análisis, se desarrollan procedimientos para su extracción, procesamiento y depuración. A partir de estas fuentes se construye, además, la base *poss-by-poss* utilizada para la estimación de los modelos, que resume las posesiones disputadas e identifica los jugadores presentes en ataque y defensa. La disponibilidad pública tanto de estas bases como de los procedimientos utilizados para generarlas permite que los resultados puedan ser reproducidos en futuras temporadas.

La incorporación de Elastic Net dentro de la comparación de técnicas de regularización constituye otro aporte del trabajo, dado que se trata de una alternativa poco explorada en la literatura de métricas RAPM aplicada al básquetbol. Su inclusión permite ampliar el análisis más allá de Ridge y Lasso y evaluar el comportamiento de una penalización que combina características de ambas técnicas.

Otro aspecto metodológico a destacar es la estrategia utilizada para la selección de hiperparámetros mediante validación cruzada. En particular, se asignan partidos completos a cada partición, evitando que las posesiones de un mismo encuentro formen parte simultáneamente de los conjuntos de entrenamiento y validación. Esta decisión permite reducir el riesgo de obtener estimaciones demasiado optimistas del error de predicción durante la selección de hiperparámetros, debido a la posible dependencia entre posesiones de un mismo partido.

La utilización de distintos criterios para evaluar los rankings obtenidos constituye también un aspecto relevante del trabajo. La capacidad predictiva se complementa con un análisis de consistencia frente a modificaciones en los partidos utilizados para estimar las métricas y con criterios de validación externa basados en información independiente de los modelos. Esta combinación resulta especialmente relevante dado que una buena capacidad de ajuste o

predicción no garantiza que las valoraciones individuales obtenidas sean estables o representen adecuadamente el desempeño de los jugadores. Evaluar distintos criterios toma importancia, ya que, como señala Hvattum (2019), no existe un criterio universalmente aceptado para determinar la calidad de las distintas métricas RAPM.

Por último, se considera como aporte de valor el haber realizado una primera aplicación sistemática de este tipo de modelos en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina. En un contexto donde la disponibilidad pública de datos y de métricas avanzadas es considerablemente menor que en competencias como la NBA, la adaptación de estas metodologías al básquetbol argentino permite establecer una base sobre la cual puedan desarrollarse análisis posteriores y nuevas aplicaciones orientadas al estudio del rendimiento individual.

5.3 Limitaciones del trabajo

La principal limitación del estudio se encuentra asociada a la calidad de los datos disponibles. El *play-by-play* utilizado se construye a partir de registros que presentan errores e inconsistencias. Si bien durante el procesamiento se implementan numerosos controles y correcciones con el objetivo de reducir estos problemas, no puede garantizarse la detección de la totalidad de los errores. En consecuencia, la base de datos utilizada puede contener una incorrecta cantidad de posesiones registradas o errores en la cantidad de puntos realizados en las mismas, introduciendo ruido adicional en la información utilizada para estimar los modelos.

Una segunda limitación está relacionada con la propia construcción de la base a nivel de posesión. El registro original se encuentra estructurado como una sucesión de acciones y no identifica explícitamente el inicio y el final de cada posesión, por lo que se define un conjunto de reglas que permiten realizar esta transformación. Las decisiones se adoptan luego de evaluar distintas alternativas y buscan minimizar las inconsistencias detectadas, pero no necesariamente constituyen una identificación perfecta de todas las posesiones. Esto podría explicar por qué en buena parte de la literatura tradicional de RAPM se utiliza como unidad de análisis a los segmentos sin sustituciones, lo cual puede obtenerse de manera mucho más directa.

Una última limitación importante corresponde a la cantidad de información disponible en la base de datos utilizada. El análisis se realiza utilizando únicamente una temporada de la Liga Nacional, con una cantidad de posesiones considerablemente inferior a la disponible en estudios realizados sobre la NBA. Artículos sobre esta área de estudio enfatizan en la importancia de la incorporación de varias temporadas.

5.4 Propuestas de extensión del trabajo

Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen una primera aproximación a la construcción de métricas RAPM ajustadas para la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina y sientan un precedente para un amplio conjunto de posibles investigaciones futuras. A continuación, se proponen algunas extensiones que podrían contribuir a mejorar la metodología desarrollada:

- Los modelos utilizados estiman efectos individuales de los jugadores. Sin embargo, el rendimiento de un jugador puede depender de los compañeros con los que comparte cancha. La incorporación de efectos de interacción entre jugadores permitiría representar posibles sinergias entre jugadores, tal como se propone en Grassetti et al. (2021).

- Los modelos RAPM utilizados en este trabajo consideran cada posesión como una observación independiente. Sin embargo, las posesiones pertenecientes a un mismo partido podrían presentar dependencia asociada a factores como el ritmo de juego, los ajustes tácticos, la fatiga o el contexto competitivo. Una posible extensión consistiría en desarrollar modelos que incorporen explícitamente esta correlación intrapartido.

- Podría considerarse la incorporación de otras covariables en el modelo que ayuden a mejorar la predicción del resultado final de cada posesión. Como podría ser la condición de localía del equipo que ataca, el tiempo restante en el cuarto, la diferencia en el marcador o la importancia del momento del partido.

- El punto de corte utilizado para identificar a los LTPs responde a una decisión metodológica, aunque conserva cierto grado de arbitrariedad. Podrían analizarse escenarios con distintos puntos de corte y evaluar los resultados de cada modelo.

- Podría evaluarse la utilización de ponderaciones diferentes en cada posesión según la relevancia del momento del partido, asignando mayor peso a situaciones decisivas (*clutch time*) y menor peso a posesiones disputadas cuando el resultado se encuentra prácticamente definido (*garbage time*), siguiendo una estrategia similar a la utilizada por Rosenbaum (2004).

- Algunas posesiones presentan cantidades inusualmente elevadas de puntos, las cuales podrían corresponder a múltiples posesiones agrupadas incorrectamente debido a errores u omisiones en el registro de las acciones. Por lo que se podría, siempre que la información disponible lo permita, revisar las posesiones afectadas, realizar las correcciones correspondientes y evaluar la sensibilidad de las estimaciones y los rankings obtenidos frente a estas correcciones.

- La incorporación de información correspondiente a nuevas temporadas permitiría aumentar la cantidad de observaciones disponibles y podría contribuir a obtener estimaciones más estables. Para conservar una mayor representatividad del rendimiento reciente, podría asignarse un peso mayor a las temporadas más actuales, siguiendo estrategias utilizadas previamente en la literatura.

6 Conclusiones

El presente trabajo permite desarrollar una metodología para la construcción de rankings de desempeño ofensivo y defensivo de los jugadores que participaron de la temporada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquetbol, mediante modelos estadísticos en los que se utiliza la posesión como unidad de análisis. Para ello, se construye una base de datos *poss-by-poss* a partir de los registros de las acciones de los partidos de la temporada, obtenidos y procesados mediante procedimientos desarrollados específicamente para este trabajo.

Además, se implementan distintas estrategias para abordar problemas habituales en los modelos RAPM, particularmente la multicolinealidad y la presencia de coeficientes extremos asociados a jugadores con escasa participación. Para ello, se emplean métodos de regularización, se establece un criterio de exclusión de jugadores con pocas posesiones disputadas y se propone la métrica wEPTS, que incorpora una ponderación en función de la participación relativa de cada jugador.

La comparación de los modelos muestra, en primer lugar, que las diferencias en la capacidad predictiva son prácticamente inexistentes. Los valores de RMSE obtenidos mediante predicciones *out-of-fold* se ubican entre 1,185344 y 1,185505, por lo que ninguna combinación de modelo y técnica de regularización presenta una ventaja relevante bajo este criterio. Sin embargo, puede destacarse que, a pesar de que las diferencias son mínimas, Lasso registra el mayor error tanto en el modelo normal como en el multinomial. Por otro lado, el análisis de consistencia permite identificar diferencias más claras entre las técnicas de regularización. Los rankings estimados mediante Ridge y Elastic Net presentan, en términos generales, una mayor consistencia frente a cambios en las posesiones utilizadas para ajustar los modelos, mientras que Lasso registra sistemáticamente los menores niveles de correlación entre particiones.

Las diferencias entre los enfoques resultan más visibles al incorporar criterios de validación externa. En términos generales, los rankings derivados del modelo multinomial, mediante wEPTS, presentan una mayor concordancia con los criterios externos considerados que los RAPM obtenidos a partir del modelo normal, lo que aporta evidencia favorable para la

utilización de estas nuevas métricas en la evaluación del desempeño de los jugadores. Dentro de estas, los rankings wEPTS estimados mediante Ridge y Elastic Net muestran los resultados más favorables entre todas las alternativas, destacando particularmente en los criterios vinculados con la participación de los jugadores y con las estadísticas del *box score*.

Como conclusión general, si bien no es posible establecer la superioridad absoluta de un modelo bajo todos los criterios, los resultados obtenidos llevan a priorizar las métricas EPTS y wEPTS estimadas mediante Ridge o Elastic Net. Ambas técnicas producen ordenamientos prácticamente idénticos (las correlaciones de Spearman entre sus rankings superan 0,998 tanto en ataque como en defensa) y son las que muestran los resultados más favorables en gran parte de los criterios considerados. Dado que el valor de α seleccionado para Elastic Net es de apenas 0,005, su comportamiento resulta muy próximo al de Ridge. En consecuencia, más que identificar una diferencia sustantiva entre ambas técnicas, los resultados respaldan la utilización de cualquiera de ellas frente a Lasso para los datos disponibles en esta aplicación.

Finalmente, este trabajo constituye una primera aproximación sistemática a la aplicación de métricas basadas en el enfoque RAPM en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina. La metodología desarrollada y los resultados obtenidos permiten complementar las estadísticas tradicionales en la evaluación del rendimiento individual de los jugadores y establecen una base para futuras investigaciones en el ámbito de la analítica deportiva aplicada al básquetbol argentino.

7 Bibliografía

Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis* (3rd ed.). Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley, New York.

Confederación Argentina de Básquetbol (2025). *La Confederación Argentina de Básquet y Sports Data Campus firman un acuerdo de colaboración*. https://www.argentina.basketball/ver/noticia/la-confederacion-argentina-de-basquet-y-sports-data-campus-firman-un-acuerdo-de-colaboracion.

Damoulaki, A., Ntzoufras, I. & Pelechrinis, K. (2025). *Lasso multinomial performance indicators for in-play basketball data.* Comput Stat 40, 2157–2181.

Dunn, P. K., & Smyth, G. K. (2018). *Generalized linear models with examples in R.* Springer.

Football Player Ratings. (2023). *How to evaluate football player ratings?* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=I22mtwJf-Gw

Gong, H., & Chen, S. (2024). *Estimating positional plus-minus in the NBA*. Journal of Quantitative Analysis in Sports.

Grassetti, L., Bellio, R., Di Gaspero, L., Fonseca, G., & Vidoni, P. (2021). *An extended regularized adjusted plus-minus analysis for lineup management in basketball using play-by-play data.* IMA Journal of Management Mathematics, 32(4), 385–409.

Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). *Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems*. Technometrics, 12(1), 55–67.

Hvattum, L. M. (2019). *A comprehensive review of plus–minus ratings for evaluating individual players in team sports.* International Journal of Computer Science in Sport, 18, 1–23.

Hvattum, L. M., & Gelade, G. A. (2021). *Comparing bottom-up and top-down ratings for individual soccer players.* International Journal of Computer Science in Sport, 20(1), 23–42.

Ilardi, S. (2007). *Adjusted Plus-Minus: An idea whose time has come.* Blog: 82games. http://www.82games.com/ilardi1.htm

Ilardi, S., & Barzilai, A. (2008). *Adjusted Plus-Minus ratings: New and improved for 2007–2008.* Blog: 82games. http://www.82games.com/ilardi2.htm

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R* (ISLR2).

Kubatko, J., Oliver, D., Pelton, K., & Rosenbaum, D. (2007). *A starting point for analyzing basketball statistics.* Journal of Quantitative Analysis in Sports, 3, Article 1.

Rosenbaum, D. (2004). *Measuring how NBA players help their teams win.* Blog: 82games. http://www.82games.com/comm30.htm

Sill, J. (2010). *Improved NBA adjusted +/– using regularization and out-of-sample testing.* Proceedings of the 2010 MIT Sloan Sports Analytics Conference.

Tibshirani, R. (1996). *Regression shrinkage and selection via the Lasso.* Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 58(1), 267–288.

Yuan, M., & Lin, Y. (2006). *Model selection and estimation in regression with grouped variables.* Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 68(1), 49–67.

Zou, H., & Hastie, T. (2005). *Regularization and Variable Selection via the Elastic Net.* Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 67(2), 301–320.

8 Anexo

8.1 Controles de consistencia y corrección de errores en la base de datos

Durante el proceso de generación y preprocesamiento de la base de datos se implementan distintos controles de consistencia con el objetivo de detectar posibles errores en la información obtenida mediante *web scraping*. Debido a que los registros del *play-by-play* son cargados manualmente por las mesas de control durante el desarrollo de los partidos, la fuente original puede presentar inconsistencias que requieren ser identificadas y, cuando resulte posible, corregidas antes de su utilización.

Para detectar posibles errores en la conformación de los quintetos en cancha, se construye una variable que contabiliza la cantidad de jugadores presentes en cada quinteto para cada una de las acciones del partido. Dicha variable debería contabilizar un valor menor o igual a cinco para ambos equipos en todas las acciones registradas.

De esta manera se detectó un caso puntual en el partido de Zárate Basket vs Atenas (C), donde el quinteto local registraba seis jugadores en cancha. Esta inconsistencia se observó desde el inicio del segundo cuarto, con 10:00 minutos restantes, hasta el minuto 4:42 del mismo período.

Para subsanar este inconveniente, se realizó una revisión manual del *play-by-play* original disponible en la página web y se pudo identificar que al comienzo del segundo cuarto se había registrado incorrectamente el ingreso de seis jugadores en lugar de cinco, lo cual constituye un error atribuible a la mesa de control. Una vez identificada esta problemática, se revisó el contexto de las siguientes jugadas y pudo determinarse que el jugador Edgar Henry Merchant no se encontraba realmente en cancha durante ese tramo del partido.

En consecuencia, se procedió a corregir el error eliminando al jugador mencionado de la variable correspondiente al quinteto local en las acciones afectadas, así como ajustando el conteo de jugadores en cancha. De esta manera, se restauró la consistencia lógica de los quintetos y se

garantizó la validez de la información utilizada en las etapas posteriores del análisis.

8.2 Detección de errores en el marcador parcial: caso *QUIMSA vs BOCA (019/10/2024 11:30)*

Al revisar uno de los partidos con presencia de puntos incompatibles, se detectó que en el minuto 02:27 del tercer cuarto, el marcador parcial reflejaba correctamente el resultado del partido (64 - 42 a favor de Quimsa). Sin embargo, la acción de anotación siguiente, el TIRO LIBRE ANOTADO del jugador de Boca Juniors, Facundo Piñero, en el minuto 02:21 del tercer cuarto, registraba un marcador parcial erróneo, de 67 - 43. Se observa entonces que el marcador parcial aumentó en tres puntos para el equipo local (Quimsa) entre una acción y la siguiente, sin que existiera ninguna anotación registrada en el *play-by-play* que justificara dicha variación (Figura 16).



Figura 16: Comienzo de secuencia de acciones con errores en la carga del marcador

Estos errores siguieron presentándose en las siguientes acciones de anotación hasta el minuto 00:40, donde, con el TRIPLE del jugador de Boca Juniors, Martín Nicolás Cuello, el marcador parcial se reestableció a su valor real en ese momento (70 - 50), esta secuencia queda reflejada en la Figura 17.



Figura 17: Fin de secuencia de acciones con errores en la carga del marcador

Al presentarse errores en el marcador parcial de cada uno de los equipos, los puntos por posesión calculados como la diferencia del marcador de cada equipo con respecto al marcador parcial de la posesión anterior también eran erróneos.