

卷II (2020)

1. (1) 正则曲线的曲率的几何意义? 空间正则曲线是平面曲线的充要条件

答: $k(s) = \frac{ds}{ds}$ 为切线象的弧长元素与曲线的弧长元素之比

正则曲线是平面曲线 $\Leftrightarrow (r'(t), r''(t), r'''(t)) = 0$

(2) 4个内蕴几何量

答: 长度, 面积, Gauss 曲率, 测地曲率, 测地线, 协变微分

(3) Gauss 曲率定义及计算公式, 及其几何意义

答: 设 k_1, k_2 为曲面在点 p 的主曲率, 则 $G = k_1 k_2$

公式: $k = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$

几何意义 $K(p) = \lim_{D \rightarrow p} \frac{A(g(D))}{A(D)}$ 其中 $A(g(D)), A(D)$ 代表 $g(D)$ 与 D 的面积

(4) 判断柱面, 单位球面, 锥面, 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} = z$, 切线面
哪些可展, 给出可展曲面的3个充要条件

答: 3个条件: 1° 局部上是柱面, 锥面, 切线面

2° 单参数曲面族的包络

3° 直线面方程: $r = a(u) + v l(u)$, 则可展 $\Leftrightarrow (a'(u), l(u), l'(u)) = 0$

可展: 柱面, 锥面, 切线面

不可展: 单位球面, 椭圆抛物面 (由 Gauss 曲率 $\neq 0$ 知)

(5) W 映射在自然标架下的表示, 给出其与主曲率, 主方向的联系

答: 切空间 $T_p S$ 的基 $\{\bar{r}_u, \bar{r}_v\}$

$$\begin{cases} W(\bar{r}_u) = -\bar{n}_u \\ W(\bar{r}_v) = -\bar{n}_v \end{cases} \Rightarrow W(\lambda \bar{r}_u + \mu \bar{r}_v) = -\lambda \bar{n}_u - \mu \bar{n}_v$$

矩阵形式: $W(\bar{r}_u, \bar{r}_v) = (\bar{r}_u, \bar{r}_v) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$

W 映射的两个特征值为两个主曲率; 两个特征方向为两个主方向

(6) 法曲率? 与 k_n, k_g 的关系?

答: I, II 分别为曲面的第一, 二标准形式

则 $k_n = \frac{II}{I}$ 称为曲面 S 在 (u, v) 处沿切方向 (du, dv) 的法曲率

$k^2 = k_n^2 + k_g^2$, k_n 为曲率向量在法向量上的正交投影

2. $r(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ 的曲率, 挠率, Frenet 标架

解: $r'(t) = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2)$ $|r'(t)| = 3\sqrt{2}(t^2 + 1)$

$r''(t) = (-6t, 6, 6t)$ $r'(t) \times r''(t) = (18t^2 - 18, -36t, 18t^2 + 18)$

$r'''(t) = (-6, 0, 6)$ $|r'(t) \times r''(t)| = 18\sqrt{2}(t^2 + 1)$

$(r'(t), r''(t), r'''(t)) = \begin{vmatrix} 3-3t^2 & 6t & 3+3t^2 \\ -6t & 6 & 6t \\ -6 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 36(3-3t^2) + 36(3+3t^2) = 216$

曲率 $K(t) = \frac{|r'(t) \times r''(t)|}{|r'(t)|^3} = \frac{18\sqrt{2}(t^2+1)}{27 \cdot 2\sqrt{2}(t^2+1)^3} = \frac{1}{3(t^2+1)^2}$

挠率 $\tau(t) = \frac{(r'(t), r''(t), r'''(t))}{|r'(t) \times r''(t)|^2} = \frac{216}{3 \cdot 216(t^2+1)^2} = \frac{1}{3(t^2+1)^2}$

Frenet 标架: $\alpha(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{2}(t^2+1)}(1-t^2, 2t, 1+t^2)$

$\gamma(t) = \frac{r'(t) \times r''(t)}{|r'(t) \times r''(t)|} = \frac{1}{\sqrt{2}(t^2+1)}(t^2-1, -2t, t^2+1)$

$\beta(t) = \gamma(t) \times \alpha(t) = \frac{1}{(t^2+1)^2}(2t^3+2t, t^4-1, 0)$

$\{r(t); \alpha(t), \beta(t), \gamma(t)\}$

3. 曲面 $S: r = (u \cos v, u \sin v, 2 \ln u)$, 求 I, II, K, H , 渐近曲线

解: $r_u = (\cos v, \sin v, \frac{2}{u})$

$r_v = (-u \sin v, u \cos v, 0)$

$r_u \times r_v = (-2 \cos v, 2 \sin v, u)$ $n = \frac{1}{\sqrt{4+u^2}}(-2 \cos v, 2 \sin v, u)$

$r_{uu} = (0, 0, -\frac{2}{u^2})$ $r_{uv} = (-\sin v, \cos v, 0)$ $r_{vv} = (-u \cos v, -u \sin v, 0)$

$E = (r_u)^2 = 1 + \frac{4}{u^2}$ $F = r_u \cdot r_v = 0$ $G = (r_v)^2 = u^2$

$L = r_{uu} \cdot n = -\frac{2}{u\sqrt{4+u^2}}$ $M = r_{uv} \cdot n = 0$ $N = \frac{2u}{\sqrt{4+u^2}}$

$I = (1 + \frac{4}{u^2})(du)^2 + u^2(dv)^2$ $II = -\frac{2}{u\sqrt{4+u^2}}(du)^2 + \frac{2u}{\sqrt{4+u^2}}(dv)^2$

$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{-\frac{4}{4+u^2}}{u^2+4} = -\frac{4}{(u^2+4)^2}$ $H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)} = \frac{4}{u(u^2+4)^{3/2}}$

法曲率 $k_n = \frac{II}{I} = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{du}{dv}\right)^2 = u^2$

故渐近方向 $(du, dv) = \frac{1}{\sqrt{u^2+1}}(u, 1)$ 或 $\frac{1}{\sqrt{u^2+1}}(-u, 1)$

将 (u, v) 看作定点, 渐近线为 $\frac{du}{dv} = u$ 和 $\frac{du}{dv} = -u$

4. 证明: 若曲面 S 上的渐近曲线网的夹角是常数, 则曲面 S 的 K 与 H^2 成比例

证明:

取 (u, v) 是正交参数网

θ_1 为渐近方向与 u -曲线的夹角

则两渐近方向夹角为 $\theta = 2\theta_1$, 故 θ_1 也为常数

再由 Euler 公式得 $K_n(\theta) = K_1 \cos^2 \theta_1 + K_2 \sin^2 \theta_1$

由渐近方向, 故 $K_n(\theta) = 0 \rightarrow \frac{K_1}{K_2} = \frac{\sin^2 \theta_1}{\cos^2 \theta_1} = \tan^2 \theta_1$

故 $\frac{K}{H^2} = \frac{K_1 K_2}{\left(\frac{K_1 + K_2}{2}\right)^2} = 4 \frac{K_2}{K_1} + 8 + 4 \frac{K_1}{K_2}$ 为常数

5. 1) 测地线? 判定条件

2) 曲率线? 判定条件

3) S 上一曲线既是测地线, 又是曲率线, 则它必是平面曲线

解: 1) 测地曲率为零的曲线

判定条件: 曲线为直线 或其主法向量处处是曲面 S 的法向量

2) C 上每一点的切向量都是曲面 S 在该点的主方向

判定条件 1° 曲面 $S: r = r(u, v)$, 曲线 $C: u(t), v(t)$, $n(u(t), v(t))$ 为曲面

的法向量, 则 C 为测地线 $\Leftrightarrow \frac{dr(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{dn(u(t), v(t))}{dt}$

2° 曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面

3) 设曲线 $C: r = r(u(s), v(s))$, s 为弧长参数, 由 1) 知: 测地线知

$\vec{r}''(s) \parallel \vec{n}(s)$, $\vec{n}(s)$ 为法向量. 由其为曲率线知 $\frac{dr(s)}{ds} \parallel \frac{dn(s)}{ds}$

1° C 为直线 \checkmark

2° C 不为直线, Frenet 标架 $\{\vec{r}(s), \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$

于是 $\vec{\beta}(s) = \vec{n}(s)$ $\frac{dn}{ds} = \frac{d\beta}{ds} = -k(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s) \parallel \alpha(s) \Rightarrow \tau(s) = 0$

故 C 为平面曲线

14) 若 S 上所有测地线都是平面曲线, 则 S 必是全脐点曲面

设 $C: r=r(s)$ 为 S 的测地线, 由其为平面曲线, 知 $k_g = k_n = 0$

故 S 上的测地线均为直线

由证 S 全脐点, 即证 S 为平面或球面

1° S 为平面 \checkmark

2° S 不为平面,

6. 设两柱面 $S_1: r(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ 和 $S_2: r(\tilde{u}, \tilde{v}) = (\sqrt{2}\cos\tilde{u}, \tilde{v}, \sqrt{2}\sin\tilde{u})$

设 S_1, S_2 交线为 C , 易知 $P(0, 1, \sqrt{2})$ 在曲线 C 上切方向为 $(1, 0, 0)$


(1) 求 C 在 P 处曲率

(2) 求 S_1 在 P 处主方向 K_n , 并证明 S_1 在 P 点处沿两个互相正交的切方向的法曲率之和为一个常数

解: (1)

$$r_u = (-\sin u, \cos u, 0) \quad r_{\tilde{u}} = (-\sqrt{2}\sin\tilde{u}, 0, \sqrt{2}\cos\tilde{u})$$

$$r_v = (0, 0, 1) \quad r_{\tilde{v}} = (0, 1, 0)$$



(2)

$$E = (r_u)^2 = 1 \quad F = 0 \quad G = 1$$

$$r_{uu} = (-\cos u, -\sin u, 0) \quad r_{uv} = r_{vu} = (0, 0, 0)$$

$$r_u \times r_v = (\cos u, \sin u, 0)$$

$$L = r_{uu} \cdot n = -1 \quad M = N = 0$$

$$\text{于是 } K_n = \frac{II}{I} = \frac{-(du)^2}{(du)^2 + (dv)^2}$$

取 $K_1 = -1$ 的主方向为 $(1, 0)$ $K_2 = 0$ 的主方向为 $(0, 1)$

任取切方向 $\frac{du}{dv} = \lambda$, 取 $\xi_1 = (\lambda, 1)$, 则 $\xi_2 = (-1, \lambda)$ 与其正交

$$K_{n1} = \frac{-\lambda^2}{\lambda^2 + 1} \quad K_{n2} = \frac{-1}{\lambda^2 + 1} \quad \text{而 } K_{n1} + K_{n2} = -1 \text{ 为常数}$$

