

 内蒙古大学数学科学学院

泛函分析

Functional Analysis

主 讲 孙 炯 教 授

电话: 0471-4992491 (H) , 13947103671
Emai: masun@imu.edu.cn

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、Bessel 不等式

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、 Bessel 不等式

一般来说 $\{x_a\}_{a \in I}$ 可能是不可数集.

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、Bessel 不等式

一般来说 $\{x_a\}_{a \in I}$ 可能是不可数集.

下面仅讨论由可数多个元素组成的正交系, 即可数正交列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、Bessel 不等式

一般来说 $\{x_a\}_{a \in I}$ 可能是不可数集.

下面仅讨论由可数多个元素组成的正交系, 即可数正交列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 设 $\{e_n\}$ 是内积空间 X 中的**标准正交列**, 则对于任意的 $x \in X$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (3.4.1)$$

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、Bessel 不等式

一般来说 $\{x_a\}_{a \in I}$ 可能是不可数集.

下面仅讨论由可数多个元素组成的正交系, 即可数正交列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 设 $\{e_n\}$ 是内积空间 X 中的**标准正交列**, 则对于任意的 $x \in X$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (3.4.1)$$

分析: 根据内积和范数的关系, 以及正交列的定义即可证明.

§ 4 Bessel 不等式和正交列的完备性

一、Bessel 不等式

一般来说 $\{x_a\}_{a \in I}$ **可能是不可数集**.

下面仅讨论由可数多个元素组成的正交系, 即可数正交列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 设 $\{e_n\}$ 是内积空间 X 中的**标准正交列**, 则对于任意的 $x \in X$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (3.4.1)$$

分析: 根据内积和范数的关系, 以及正交列的定义即可证明.

证明 由于对于任意的 n

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 &= \left(x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k, x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right) \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \geq 0, \end{aligned}$$

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2.$

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier

系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier

系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier

系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{\omega} 0$).

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier

系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{\omega} 0$).

推论 3.4.2 (*Riemann-Lebesgue 引理*)

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. 注 1: 与正交列相对应的 Fourier

系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{w} 0$).

推论 3.4.2 (*Riemann-Lebesgue 引理*)

设 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0 \quad (3.4.2)$$

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{\omega} 0$).

推论 3.4.2 (*Riemann-Lebesgue* 引理)

设 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0 \quad (3.4.2)$$

证明 在第三节中, 我们知道 $\{\sin nt\}$, $\{\cos nt\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的正交列,

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{\omega} 0$).

推论 3.4.2 (*Riemann-Lebesgue* 引理)

设 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0 \quad (3.4.2)$$

证明 在第三节中, 我们知道 $\{\sin nt\}$, $\{\cos nt\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的正交列, 从 Bessel 不等式可知 $x(t)$ 的 Fourier 系数趋近于零, 从而得证.

于是 $\sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$.

令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. **注 1:** 与正交列相对应的 Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

注 2: 由 (3.4.1) 式知, 对于任意的 $x \in X$ $(x, e_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

以后将看到, 若 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 X 中的正交列, 则 e_n 弱收敛到 0 ($e_n \xrightarrow{\omega} 0$).

推论 3.4.2 (*Riemann-Lebesgue* 引理)

设 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0 \quad (3.4.2)$$

证明 在第三节中, 我们知道 $\{\sin nt\}$, $\{\cos nt\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的正交列, 从 Bessel 不等式可知 $x(t)$ 的 Fourier 系数趋近于零, 从而得证.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

由 Bessel 不等式, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

由 Bessel 不等式, 有:

推论 3.4.3 设 $\{e_\alpha\}(\alpha \in I)$ 是内积空间 X 中的 **标准正交系**, 则对于每个 $x \in X$, x 关于这个标准正交系的 **Fourier 系数** $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in I\}$ **最多有可数个不为零**.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

由 Bessel 不等式, 有:

推论 3.4.3 设 $\{e_\alpha\}(\alpha \in I)$ 是内积空间 X 中的 **标准正交系**, 则对于每个 $x \in X$, x 关于这个标准正交系的 **Fourier 系数** $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in I\}$ **最多有可数个不为零**.

证明留给读者.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

由 Bessel 不等式, 有:

推论 3.4.3 设 $\{e_\alpha\}(\alpha \in I)$ 是内积空间 X 中的 **标准正交系**, 则对于每个 $x \in X$, x 关于这个标准正交系的 **Fourier 系数** $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in I\}$ **最多有可数个不为零**.

证明留给读者.

定理 3.4.4 设 H 是一个 **Hilbert 空间**, $\{e_n\}$ 是 H 中的**标准正交列**, $\{\alpha_n\}$ 是一个数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin ntdt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos ntdt = 0$$

注 当 $x(t)$ 是连续函数时, 这就是数学分析中 Fourier 级数部分的 Riemann 引理.

由 Bessel 不等式, 有:

推论 3.4.3 设 $\{e_\alpha\}(\alpha \in I)$ 是内积空间 X 中的 **标准正交系**, 则对于每个 $x \in X$, x 关于这个标准正交系的 **Fourier 系数** $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in I\}$ **最多有可数个不为零**.

证明留给读者.

定理 3.4.4 设 H 是一个 **Hilbert 空间**, $\{e_n\}$ 是 H 中的**标准正交列**, $\{\alpha_n\}$ 是一个数列, 则

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ **收敛的充要条件** 为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$. 并且在上述条件下,

$$\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2.$$

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$.

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$.

(2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

- (1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$.
- (2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.
- (3) 结合 Bessel 不等式来证明.

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$.

(2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.

(3) 结合 Bessel 不等式来证明.

证明 “ \Rightarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛, 记

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n.$$

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$.

(2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.

(3) 结合 Bessel 不等式来证明.

证明 “ \Rightarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛, 记

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n.$$

则对任意 $m \in \mathbb{N}$, 注意到内积的连续性, 有:

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ **收敛, 注意到:**

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$

(2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.

(3) 结合 Bessel 不等式来证明.

证明 “ \Rightarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛, 记

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n.$$

则对任意 $m \in \mathbb{N}$, 注意到内积的连续性, 有:

$$(x, e_m) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n, e_m) = (\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m) = \alpha_m.$$

(因为 k 最终要大于 m .)

分析: 必要性: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n = x$ 收敛, 注意到:

(1) $\{e_n\}$ 是正交列. $(e_n, e_m) = 0, n \neq m, (e_i, e_i) = 1, i = 1, 2, \dots$

(2) α_m 与 x 的 Fourier 系数 (x, e_m) 之间应建立联系.

(3) 结合 Bessel 不等式来证明.

证明 “ \Rightarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛, 记

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n.$$

则对任意 $m \in \mathbb{N}$, 注意到内积的连续性, 有:

$$(x, e_m) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n, e_m) = (\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_n e_n, e_m) = \alpha_m.$$

(因为 k 最终要大于 m .)

由 Bessel 不等式, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 \leq \|x\|^2 < \infty.$$

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$ 收敛.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的Cauchy 列即可.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$,

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$,

对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}, k > j$, 由于 $\{e_n\}$ 是正交列,

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$,

对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}, k > j$, 由于 $\{e_n\}$ 是正交列,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \left\| \sum_{n=j+1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=j+1}^k |\alpha_n|^2.$$

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$.

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$,

对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}, k > j$, 由于 $\{e_n\}$ 是正交列,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \left\| \sum_{n=j+1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=j+1}^k |\alpha_n|^2.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ 收敛, 上式说明 $\{x_k\}$ 是 H 中的 Cauchy 列, 因此收敛.

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty).$

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty.$

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n,$

对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}, k > j$, 由于 $\{e_n\}$ 是正交列,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \left\| \sum_{n=j+1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=j+1}^k |\alpha_n|^2.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ 收敛, 上式说明 $\{x_k\}$ 是 H 中的 Cauchy 列, 因此收敛.

进一步地由范数的连续性, 我们有

分析:充分性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty \Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛.

(1) 要证无穷级数收敛, 只要证明前 n 项和序列收敛.

(2) 要证此序列收敛, 注意到这里 H 是 Hilbert 空间, 若能证明它们是 H 中的 Cauchy 列即可.

(3) 为此要证明: $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty).$

证明 “ \Leftarrow ” 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty.$

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n,$

对于任意的 $j, k \in \mathbb{N}, k > j$, 由于 $\{e_n\}$ 是正交列,

$$\|x_k - x_j\|^2 = \left\| \sum_{n=j+1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=j+1}^k |\alpha_n|^2.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ 收敛, 上式说明 $\{x_k\}$ 是 H 中的 Cauchy 列, 因此收敛.

进一步地由范数的连续性, 我们有

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right\|^2 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n \right\|^2 \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k |\alpha_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2. \end{aligned}$$

上述定理可表示为:

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

推论 3.4.6 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 都收敛.

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

推论 3.4.6 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 都收敛.

收敛的原因: 由定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 知, Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

推论 3.4.6 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 都收敛.

收敛的原因: 由定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 知, Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

这就回答了上一节最后面提出的关于 Fourier 级数是否收敛的问题.

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

推论 3.4.6 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 都收敛.

收敛的原因: 由定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 知, Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

这就回答了上一节最后面提出的关于 Fourier 级数是否收敛的问题.

注 这里的收敛是在 Hilbert 空间中按范数收敛,

上述定理可表示为:

推论 3.4.5 在 Hilbert 空间 H 中, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ 收敛的充要条件为数列 $\{\alpha_n\} \in l^2$.

推论 3.4.6 设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 中的正交列, 则对于任意的 $x \in H$, x 的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 都收敛.

收敛的原因: 由定理 3.4.1 (Bessel 不等式) 知, Fourier 系数是平方可和的, 并且其和小于或等于 $\|x\|^2$.

这就回答了上一节最后面提出的关于 Fourier 级数是否收敛的问题.

注 这里的收敛是在 Hilbert 空间中按范数收敛, 不是数学分析中的逐点收敛.

二、 正交列的完备性

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的.

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的.

例 3.4.7 在 \mathbb{R}^3 中, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ 是 \mathbb{R}^3 中的正交列, $x = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$, 但是

$$(x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 \neq x.$$

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的.

例 3.4.7 在 \mathbb{R}^3 中, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ 是 \mathbb{R}^3 中的正交列,
 $x = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$, 但是

$$(x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 \neq x.$$

例 3.4.8 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交列, 令 $S = \{e_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, S 是 H 中的由无穷多个元素组成的标准正交列,

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的。

例 3.4.7 在 \mathbb{R}^3 中, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ 是 \mathbb{R}^3 中的正交列,
 $x = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$, 但是

$$(x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 \neq x.$$

例 3.4.8 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交列, 令 $S = \{e_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, S 是 H 中的由无穷多个元素组成的标准正交列,

但是对于 $x = e_1$, 无论如何选择 α_{2n} ,

$$x \neq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}.$$

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的。

例 3.4.7 在 \mathbb{R}^3 中, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ 是 \mathbb{R}^3 中的正交列,
 $x = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$, 但是

$$(x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 \neq x.$$

例 3.4.8 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交列, 令 $S = \{e_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, S 是 H 中的由无穷多个元素组成的标准正交列,

但是对于 $x = e_1$, 无论如何选择 α_{2n} ,

$$x \neq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}.$$

这是因为: 若

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n},$$

二、正交列的完备性

问题：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ 是否收敛到 x ？

答案：一般来说是否定的。

例 3.4.7 在 \mathbb{R}^3 中, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ 是 \mathbb{R}^3 中的正交列,
 $x = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$, 但是

$$(x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 \neq x.$$

例 3.4.8 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交列, 令 $S = \{e_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, S 是 H 中的由无穷多个元素组成的标准正交列,

但是对于 $x = e_1$, 无论如何选择 α_{2n} ,

$$x \neq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}.$$

这是因为: 若

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n},$$

可证明对任何 m , 有 $\alpha_{2m} = 0$, 从而 $x = 0$.

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 **3.4.6**, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 **3.4.6**, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

原因是这个正交列不完备.

先给出正交列完备的定义

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 **3.4.6**, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

原因是这个正交列不完备.

先给出正交列完备的定义

定义 3.4.9 设 X 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 X 中的标准正交列, $x \in X$. 若

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 3.4.6, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

原因是这个正交列不完备.

先给出正交列完备的定义

定义 3.4.9 设 X 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 X 中的标准正交列, $x \in X$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = \|x\|^2, \tag{3.4.3}$$

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 3.4.6, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

原因是这个正交列不完备.

先给出正交列完备的定义

定义 3.4.9 设 X 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 X 中的标准正交列, $x \in X$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = \|x\|^2, \tag{3.4.3}$$

称 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

事实上, 因对所有的 m ,

$$\begin{aligned}
 0 &= (e_1, e_{2m}) = (\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} (\sum_{n=1}^k \alpha_{2n} e_{2n}, e_{2m}) = \alpha_{2m},
 \end{aligned}$$

因此 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} e_{2n} = 0$, 矛盾.

这说明: 即使无穷多个元素组成的标准正交列, 根据推论 3.4.6, x 关于这个正交系的 Fourier 级数收敛. 但它可能不收敛到 x ,

原因是这个正交列不完备.

先给出正交列完备的定义

定义 3.4.9 设 X 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 X 中的标准正交列, $x \in X$. 若

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = \|x\|^2, \tag{3.4.3}$$

称 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

如果对于任意的 $x \in H$, Parseval 等式成立, 则称 $\{e_n\}$ 是 **完备的**.

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

$$(1) \{e_n\}^\perp = \{0\}$$

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

$$(1) \{e_n\}^\perp = \{0\}$$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

(1) $\{e_n\}^\perp = \{0\}$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

(2) 对所有的 $x \in H$,
$$x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$$

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

(1) $\{e_n\}^\perp = \{0\}$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

(2) 对所有的 $x \in H$,
$$x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$$

(即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

$$(1) \{e_n\}^\perp = \{0\}$$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

$$(2) \text{ 对所有的 } x \in H, x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$$

(即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

$$(3) \overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

(1) $\{e_n\}^\perp = \{0\}$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

(2) 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$

(即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

(3) $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$,

(即 $\{e_n\}$ 是 H 中的一个标准正交基);

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

$$(1) \{e_n\}^\perp = \{0\}$$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

$$(2) \text{ 对所有的 } x \in H, x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$$

(即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

$$(3) \overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

(即 $\{e_n\}$ 是 H 中的一个标准正交基);

$$(4) \text{ 对所有的 } x \in H, \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2,$$

注1 在三维欧式空间中, Parseval 等式就是勾股定理.

注2 以下证明在 Hilbert 空间中, x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数收敛到 x , 当且仅当 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

定理 3.4.10 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交列. 则下列叙述是等价的:

(1) $\{e_n\}^\perp = \{0\}$

(即 $\{e_n\}$ 在 H 中稠密, 或者说 $\{e_n\}$ 是完全的);

(2) 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$

(即 x 的 Fourier 级数收敛到 x);

(3) $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$,

(即 $\{e_n\}$ 是 H 中的一个标准正交基);

(4) 对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$,

即 $\{e_n\}$ 是完备的, 即对于任意的 $x \in H$, Parseval 等式成立.

证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

已知: $\{e_n\}^{\perp} = \{0\}$,

证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

已知: $\{e_n\}^{\perp} = \{0\}$,

要证: $y = 0$.

证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

已知: $\{e_n\}^{\perp} = \{0\}$,

要证: $y = 0$.

对任何 $m \in \mathbb{N}$, 根据内积的连续性,

证明 $(1) \Rightarrow (2)$ 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

已知: $\{e_n\}^{\perp} = \{0\}$,

要证: $y = 0$.

对任何 $m \in \mathbb{N}$, 根据内积的连续性,

$$\begin{aligned}
 (y, e_m) &= (x, e_m) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n, e_m \right) \\
 &= (x, e_m) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n, e_m \right) \\
 &= (x, e_m) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) (e_n, e_m) \right) \\
 &= (x, e_m) - (x, e_m) = 0
 \end{aligned}$$

证明 (1) \Rightarrow (2) 设 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

已知: $\{e_n\}^{\perp} = \{0\}$,

要证: $y = 0$.

对任何 $m \in \mathbb{N}$, 根据内积的连续性,

$$\begin{aligned}
 (y, e_m) &= (x, e_m) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n, e_m \right) \\
 &= (x, e_m) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n, e_m \right) \\
 &= (x, e_m) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) (e_n, e_m) \right) \\
 &= (x, e_m) - (x, e_m) = 0
 \end{aligned}$$

由于 $\{e_n\}^\perp = \{0\}$, \therefore 有 $y = 0$, 即 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$.

(2) \Rightarrow (3), **根据正交基的定义, 只需证明: 由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 可推出**

$$\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

(2) \Rightarrow (3), 根据正交基的定义, 只需证明: 由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 可推出

$$\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

于是对任何 $x \in H$, 要证明 $x \in \overline{\text{Span}\{e_n\}}$.

(2) \Rightarrow (3), 根据正交基的定义, 只需证明: 由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 可推出

$$\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

于是对任何 $x \in H$, 要证明 $x \in \overline{\text{Span}\{e_n\}}$.

因为对于任何的 $x \in H$, 由条件 (2)

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n \right),$$

(2) \Rightarrow (3), 根据正交基的定义, 只需证明: 由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 可推出

$$\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

于是对任何 $x \in H$, 要证明 $x \in \overline{\text{Span}\{e_n\}}$.

因为对于任何的 $x \in H$, 由条件 (2)

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n \right),$$

而

$$\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n \in \text{Span}\{e_n\},$$

(2) \Rightarrow (3), 根据正交基的定义, 只需证明: 由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 可推出

$$\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H,$$

于是对任何 $x \in H$, 要证明 $x \in \overline{\text{Span}\{e_n\}}$.

因为对于任何的 $x \in H$, 由条件 (2)

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n \right),$$

而

$$\sum_{n=1}^k (x, e_n) e_n \in \text{Span}\{e_n\},$$

所以 $x \in \overline{\text{Span}\{e_n\}}$, 即 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, 有 $y = 0$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

$\{y\}^\perp$ **是一个闭子空间.**

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, 有 $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

$\{y\}^\perp$ 是一个闭子空间.

(iii) 于是 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} \subset \{y\}^\perp$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

$\{y\}^\perp$ **是一个闭子空间.**

(iii) 于是 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} \subset \{y\}^\perp$.

(iv) 由条件 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$, **即** $\{y\}^\perp = H$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

$\{y\}^\perp$ **是一个闭子空间.**

(iii) 于是 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} \subset \{y\}^\perp$.

(iv) 由条件 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$, **即** $\{y\}^\perp = H$.

于是 $(y, y) = 0$, 所以 $y = 0$.

(3) \Rightarrow (1), 即 “ $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$ ” .

只要证明对任何 $y \in \{e_n\}^\perp$, **有** $y = 0$.

事实上, (i) 若 $y \in \{e_n\}^\perp$, 则

$$(y, e_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即 $e_n \in \{y\}^\perp \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

(ii) 根据内积空间中一集合的正交补是一闭子空间. 知

$\{y\}^\perp$ **是一个闭子空间.**

(iii) 于是 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} \subset \{y\}^\perp$.

(iv) 由条件 $\overline{\text{Span}\{e_n\}} = H$, **即** $\{y\}^\perp = H$.

于是 $(y, y) = 0$, 所以 $y = 0$.

以上的证明说明命题(1)到(3)是等价的.

$$(2) \Rightarrow (4). \text{ 对所有的 } x \in H, x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2.$$

(2) \Rightarrow (4). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$.

已知了 x , 要求 $\|x\|$ =? 要用到内积诱导的范数;

(2) \Rightarrow (4). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$.

已知了 x , 要求 $\|x\|$ =? 要用到内积诱导的范数;

由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 再运用 内积的性质和范数的连续性来证明.

(2) \Rightarrow (4). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$.

已知了 x , 要求 $\|x\|$ =? 要用到内积诱导的范数;

由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 再运用 内积的性质和范数的连续性来证明.

因为对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 于是

(2) \Rightarrow (4). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$.

已知了 x , 要求 $\|x\|$ =? 要用到内积诱导的范数;

由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 再运用 内积的性质和范数的连续性来证明.

因为对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 于是

$$\begin{aligned}
 \|x\|^2 &= \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2.
 \end{aligned}$$

(这里用到的是**范数的连续性**.)

(2) \Rightarrow (4). 对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2$.

已知了 x , 要求 $\|x\|$ =? 要用到内积诱导的范数;

由条件 $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 再运用 内积的性质和范数的连续性来证明.

因为对所有的 $x \in H$, $x = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k$, 于是

$$\begin{aligned}
 \|x\|^2 &= \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2 \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |(x, e_k)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2.
 \end{aligned}$$

(这里用到的是**范数的连续性**.)

因此 $\{e_n\}$ 是完备的.

$(4) \Rightarrow (1)$, ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = 0,$$

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = 0,$$

$\therefore (x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$, **于是 $x = 0$.**

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = 0,$$

$\therefore (x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$, 于是 $x = 0$.

注1 我们看到,当 $\{e_n\}$ 是正交基时, Bessel 不等式中的“小于等于号”成为等号, 即成为 Parseval 等式.

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = 0,$$

$\therefore (x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$, 于是 $x = 0$.

注1 我们看到,当 $\{e_n\}$ 是正交基时, Bessel 不等式中的“小于等于号”成为等号, 即成为 Parseval 等式.

如果 $\{e_n\}$ 不是正交基, 则 Bessel 不等式是**严格的不等式**.

(4) \Rightarrow (1), ”对所有的 $x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \Rightarrow \{e_n\}^\perp = \{0\}$,” 即**完备推出完全**.

只要证明下面事实: 若 $x \in H$, 都有

$$(x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则推出 $x = 0$.

事实上, **由已知的 Parseval 等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = 0,$$

$\because (x, e_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$, 于是 $x = 0$.

注1 我们看到,当 $\{e_n\}$ 是正交基时, Bessel 不等式中的“小于等于号”成为等号, 即成为 Parseval 等式.

如果 $\{e_n\}$ 不是正交基, 则 Bessel 不等式是**严格的不等式**.

注2 在无穷维空间, 确定一组元素是否正交相对较为容易, 但是要**确定一组正交系是否是空间的正交基**相对较为困难.

三、 例

三、 例

定理 3.4.11 三角函数系：

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \cdots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

三、 例

定理 3.4.11 **三角函数系**:

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \cdots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组**标准正交基**.

证明分析: 前面已在命题3.3.8 中证明了 $\{e_n\}$ **是标准正交系**. 根据定理3.4.10, **只要证明 $\text{Span}\{e_n\}$ 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密即可**.

三、 例

定理 3.4.11 三角函数系：

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \cdots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

证明分析：前面已在命题3.3.8 中证明了 $\{e_n\}$ 是标准正交系. 根据定理3.4.10, 只要证明 $\text{Span}\{e_n\}$ 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密即可.

证明

(1) 由定理 2.2.7 及定理后的注可知：连续函数在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密. 即：

三、 例

定理 3.4.11 三角函数系:

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \dots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

证明分析: 前面已在命题3.3.8 中证明了 $\{e_n\}$ 是标准正交系. 根据定理3.4.10, 只要证明 $\text{Span}\{e_n\}$ 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密即可.

证明

(1) 由定理 2.2.7 及定理后的注可知: 连续函数在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密. 即:
对于任意的 $x \in L^2[-\pi, \pi]$ 及 $\varepsilon > 0$, 都存在周期为 2π 的连续函数 $y(t)$, 使得

三、 例

定理 3.4.11 三角函数系:

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \cdots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

证明分析: 前面已在命题3.3.8 中证明了 $\{e_n\}$ 是标准正交系. 根据定理3.4.10, 只要证明 $\text{Span}\{e_n\}$ 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密即可.

证明

(1) 由定理 2.2.7 及定理后的注可知: 连续函数在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密. 即: 对于任意的 $x \in L^2[-\pi, \pi]$ 及 $\varepsilon > 0$, 都存在周期为 2π 的连续函数 $y(t)$, 使得

$$\|x(t) - y(t)\|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2},$$

三、 例

定理 3.4.11 三角函数系:

$$e_n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kt, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kt \right\}, (k = 1, 2, \dots) \quad (3.4.4)$$

是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

证明分析: 前面已在命题3.3.8 中证明了 $\{e_n\}$ 是标准正交系. 根据定理3.4.10, 只要证明 $\text{Span}\{e_n\}$ 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密即可.

证明

(1) 由定理 2.2.7 及定理后的注可知: 连续函数在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密. 即: 对于任意的 $x \in L^2[-\pi, \pi]$ 及 $\varepsilon > 0$, 都存在周期为 2π 的连续函数 $y(t)$, 使得

$$\|x(t) - y(t)\|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2},$$

(2) 对于这个连续函数 $y(t)$ 和 $\varepsilon > 0$, 根据 Weierstrass 第二逼近定理, 存在三角多项式在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛到 $y(t)$,

即存在

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式（ $\text{Span}\{e_n\}$ ）在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式 ($\text{Span}\{e_n\}$) 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即 $\{e_n\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式 ($\text{Span}\{e_n\}$) 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即 $\{e_n\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

注1 这样对于函数 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 都有

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式 ($\text{Span}\{e_n\}$) 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即 $\{e_n\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

注1 这样对于函数 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 都有

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kt + b_k \sin kt, \quad (3.4.5)$$

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\| y(t) - T(t) \|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\| x(t) - T(t) \|_{L^2} \leq \| x - y \| + \| y - T \| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式 ($\text{Span}\{e_n\}$) 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即 $\{e_n\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

注1 这样对于函数 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 都有

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kt + b_k \sin kt, \quad (3.4.5)$$

但这里的相等, 是在 L^2 空间中“积分意义下的平方平均”收敛, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时,

即存在

$$T(t) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k \cos kt + \beta_k \sin kt,$$

使得

$$\|y(t) - T(t)\|_{L^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(3) 于是

$$\|x(t) - T(t)\|_{L^2} \leq \|x - y\| + \|y - T\| < \varepsilon.$$

即全体三角多项式 ($\text{Span}\{e_n\}$) 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密.

即 $\{e_n\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的一组标准正交基.

注1 这样对于函数 $x(t) \in L^2[-\pi, \pi]$, 都有

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kt + b_k \sin kt, \quad (3.4.5)$$

但这里的相等, 是在 L^2 空间中“积分意义下的平方平均”收敛, 即当

$n \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0.$$

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

这与数分中经典的 Fourier 级数的**收敛意义不同**,**数学分析中** Fourier 级数的**收敛是指逐点收敛**. 这里的收敛是在 **L^2 空间中按范数收敛**.

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

这与数分中经典的 Fourier 级数的**收敛意义不同**,**数学分析中 Fourier 级数的收敛是指逐点收敛**. 这里的收敛是在 **L^2 空间中按范数收敛**.

注2 1913年, 鲁津猜测函数 $x(t) \in L^2$ 的 Fourier 级数几乎处处收敛到 $x(t)$, 直到1966年, L.Carleson 才证明了鲁津的猜测是正确的, 即: 对于 $\forall x(t) \in L^2$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt) = x(t) \quad (3.4.6)$$

几乎处处成立.

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

这与数分中经典的 Fourier 级数的**收敛意义不同**,**数学分析中 Fourier 级数的收敛是指逐点收敛**. 这里的收敛是在 **L^2 空间中按范数收敛**.

注2 1913年, 鲁津猜测函数 $x(t) \in L^2$ 的 Fourier 级数几乎处处收敛到 $x(t)$, 直到1966年, L.Carleson 才证明了鲁津的猜测是正确的, 即: 对于 $\forall x(t) \in L^2$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt) = x(t) \quad (3.4.6)$$

几乎处处成立.

注3 Hilbert 空间中的正交系不仅仅可以由例**3.4.11**给出的“三角函数系”构成, 我们当然**希望正交系由一些更容易处理的函数系组成, 比如说多项式**.

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

这与数分中经典的 Fourier 级数的**收敛意义不同**,**数学分析中 Fourier 级数的收敛是指逐点收敛**. 这里的收敛是在 **L^2 空间中按范数收敛**.

注2 1913年, 鲁津猜测函数 $x(t) \in L^2$ 的 Fourier 级数几乎处处收敛到 $x(t)$, 直到1966年, L.Carleson 才证明了鲁津的猜测是正确的, 即: 对于 $\forall x(t) \in L^2$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt) = x(t) \quad (3.4.6)$$

几乎处处成立.

注3 Hilbert 空间中的正交系不仅仅可以由例**3.4.11**给出的“三角函数系”构成, 我们当然**希望正交系由一些更容易处理的函数系组成, 比如说多项式**. 在下一节中我们给出的 Legendre 多项式就是有多项式构成的正交列.

$$\int_0^{2\pi} |x(t) - (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt)|^2 dt \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

这与数分中经典的 Fourier 级数的**收敛意义不同**,**数学分析中 Fourier 级数的收敛是指逐点收敛**. 这里的收敛是在 **L^2 空间中按范数收敛**.

注2 1913年, 鲁津猜测函数 $x(t) \in L^2$ 的 Fourier 级数几乎处处收敛到 $x(t)$, 直到1966年, L.Carleson 才证明了鲁津的猜测是正确的, 即: 对于 $\forall x(t) \in L^2$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt) = x(t) \quad (3.4.6)$$

几乎处处成立.

注3 Hilbert 空间中的正交系不仅仅可以由例**3.4.11**给出的“三角函数系”构成, 我们当然**希望正交系由一些更容易处理的函数系组成, 比如说多项式**.

在下一节中我们给出的 Legendre 多项式就是有多项式构成的正交列.

注4 在一个 Hilbert 空间中可以有无穷多组正交基, 适当的选择正交基是十分重要的, 不同的问题要选择不同的正交基.