

ក្រឹត្តិបត្រផ្សព្វផ្សាយកសិក្ស AGRICULTURAL EXTENSION BULLETIN

ឆ្នាំទី ០១ លេខ ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ចេញផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម A Purucation of the Department of Agricultural Extension

व्यक्तिकार्के के के किन्द्रिक किन्द्

លោក **២១ ខ្វែរ** ជាកសិករផលិតកូនត្រីពូជ នៅស្រុក មេសាង ខេត្តព្រៃវែង ប្រភេទត្រី ដែលគាត់ចិញ្ចឹម និងផលិតគឺជា ប្រភេទត្រីឆ្អិន កាបសាមញ្ញ កាបឥណ្ឌា កាបស និងត្រីទីឡាព្យា។ ខំមាននៃការទិញ្ជីមគ្រី:

១. ការរៀបបំស្រះមុនពេលដាក់ត្រីបិញ្ចឹម

- 🕶 បូមទឹកពង្រីងស្រះ
- 🕶 សម្អាតស្មៅលើភ្លឺស្រះ
- 🕶 ស្ដារភក់បាតស្រះ ១០-១៥ សម
- 🕶 បាចកំបោស ៥-៧ គ.ក្រ/១០០ ម^២ ស្រះ
- 🕶 ហាលថ្ងៃ ២-៣ ថ្ងៃ
- 🚥 បញ្ចូលទឹកចូលស្រះដំបូងជម្រៅ ៣០ ស.ម
- 🔤 ដាក់ជីលាមកគោ ៥០-៨០ គ.ក្រ/១០០ ម^២ ក្នុងស្រះ
- 🕶 ស្លឹកទន្ទ្រាងខេត្រ ៣-៤ បាច់ /១០០ ម^២ ស្រះ
- 🕶 បញ្ចូលទឹកបង្គ្រប់ជម្រៅ ១-១.៥ម រហូតដល់ទឹកមាន ពណ៌ថៃតងទើបអាចលែងកូនត្រីចូលស្រះចិញ្ចឹមបាន ។

២. របៀបលែងកូនត្រីចូលស្រះក្រោយពេលដឹកជញ្ជូន


🔤 ត្រាំថង់កូនត្រីក្នុងស្រះរយៈពេលពី១០-២០ នាទីមុន ពេលលែងកូនត្រីចូលស្រះចិញ្ចឹម

📧 លែងកូនត្រីចេញពីថង់ចូលស្រះដោយសន្សឹមៗ នូវកម្រិតដង់ស៊ីតេ ១-៤ ក្បាល/ម២ស្រះ

១. ត្រាំថង់ក្នុងស្រះ

៣. លែងកូនត្រីចូលស្រះ








៣. ការដឹកជញ្ជូន

😗 បង្វឹកកូនត្រីមុនដឹកជញ្ជូន ១ថ្ងៃ

🖲 វិចខ្ចប់កូនត្រី

😗 រៀបចំដឹកជញ្ជូន








៤. ការចិញ្ចឹមតាមបែបលក្ខណៈចម្រុះ សមាសភាពត្រីដាក់ចិញ្ចឹមៈ

- 📂 ឆ្កិន ៤០%
- 📂 ទីឡាព្យា ៣០%
- 📂 កាបស ២០%
- ा កាបសាមញ្ញ/ឥណ្ឌា ១០%



៥. ការគ្រប់គ្រងស្រះក្រោយពេលជាក់គ្រីកិញ្ចឹម

- 🖾 បិទរន្ធក្អាម កង្កែប នៅតាមមាត់ស្រៈ
- 🖬 ផ្តល់ចំណីបន្ថែមឱ្យបានទៀងទាត់
- 🖬 បង្ហូរទឹកជីចូលក្នុងស្រៈ
- 🖾 បញ្ចប់ បង្ហូរទឹកជីចូលក្នុងស្រះ 🖾 កាកសំណល់ជីត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មីនូវរៀង រាល់២០-៣០ថ្ងៃម្ដង។
- 🔤 ដើមទន្ទ្រាងខែត្រ ២បាច់
- 🖬 លាមកគោ៥០-៨០គ.ក្រ
- 🖼 បញ្ចូលទឹកឱ្យពេញរណ្ដៅ



ភានេលិតតួលត្រីពួប

១. ការគ្រប់គ្រងត្រីមេពូជ

- 🕶 ប្រភពត្រីមេពូជ ជ្រើសរើសមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នា
- 🕶 អាយុត្រីមេពុជ ១ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- ទម្ងន់ត្រីមេពូជ (ឆ្កិន ២៥០-៥០០ក្រាម កាបស ៧០០ -១៥០០ក្រាម កាបសាមញ្ញ ៥០០ក្រាម កាបឥណ្ឌា ៤០០-១៥០០ក្រាម ទីឡាព្យា ១៥០-៣០០ក្រាម)។
- 🕶 ស្រះបំប៉នត្រីមេពូជ ២០០ម^២ ឡើងទៅ
- 🚥 រយៈពេលបំប៉នត្រីមេពុជ ខែតុលា ដល់ ខែកុម្ភៈ
- 🕶 ដង់ស៊ីតេត្រីដាក់បំប៉ន ១-២ក្បាល /ម^២ស្រះ
- បរិមាណចំណី ៣% ធៀបទម្ងន់ដងខ្លួន (ផ្ដល់ឱ្យត្រីស៊ី ២ដង/ថ្ងៃ)
- សមាសធាតុចំណីបំប៉នត្រីមេពូជ រួមមានកន្ទក់ម៉ដ្ឋ ចុង អង្ករ សណ្ដែកសៀង ម្សៅត្រី កាកសំណល់បន្លៃ និង ចំណីគ្រាប់។



២. ការប្រើប្រាស់រវរម៉ូន

	ប្រឆេទត្រី	ញិ៍ (មីលីលីត្រ/គ.ក្រត្រី)	ឈ្មោល (មីលីលីត្រ/គ.ក្រ ត្រី)
ន្ត្រ		0.9-0.M	0-0.0៥
កាបសាមញ		0.9-0.M	0-0.0៥
កាបស		o.m-o.៥	០.១៥-០.២៥
កាបឥណ្ឌា		o.m-o.៥	០.១៥-០.២៥
ទីឡាព្យា		0	0





ត្រីកាបស កាបសាមញ្ញ កាបឥណ្ឌា (អាចចិញ្ចឹមជាមួយគ្នាបានប្រសើរ)

៣. ប្រព័ន្ធអាងបង្កាត់ ភ្ញាស់ត្រី







៤. ការរៀបចំស្រះបំប៉នកូនត្រី

- 📂 ទំហំស្រះ ២០០ម៉ា
- 🚾 ជម្រៅស្រះ ០,៥ ម
- 📧 បូមទឹកពង្រីងស្រះ
- 🖿 បាចកំបោរសពី ៥-៧ គ.ក្រ/១០០ម២
- 🚾 ហាលស្រះ ២-៣ថ្ងៃ
- 🚾 បញ្ចូលទឹកចូលស្រះដំណាក់កាលដំបូង ៣០ស.ម
- 🕝 ដាក់លាមកគោ៥០-៨០គ.ក្រ/១០០ម២ ឬ លាមក មាន់ ១០-១៥ គ.ក្រ/១០០ម២
- r បញ្ចូលទឹកចូលស្រះបង្គ្រប់ ១០០% ក្នុងរយៈពេល ៣-៤ថ្ងៃ រួចលែងកូនត្រីចូលស្រះបំប៉ន
- 酷 បង្ហូរទឹកចូលស្រះដោយមានតម្រងច្រោះ ។

៥. ការផ្តល់ចំណីកូនត្រីពូដ

- 🚾 ចំណីចំនួន១គ.ក្រសម្រាប់កូនត្រី ៥០០០០០ ក្បាល ក្នុងនោះ ៖
- 🖿 សណ្ដែកសៀង ០,៣ គ.ក្រ
- ᄙ កន្ទក់ម៉ដ្ឋចំនួន ០,៥ គ.ក្រ
- ा ម្សៅត្រីចំនួន ០,១ គ.ក្រ និង
- 🚾 ប្រហុកចំនួន ០,១ គ.ក្រ
- 产 ផ្តល់ឱ្យកូនត្រីស៊ីពី ៣-៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
- 🚾 ឧស្សាហ៍ប្តូរទឹកថ្មីចូលក្នុងស្រះបំប៉ន ចំនួន ១/៣ នូវរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង៕





សម្រាច់ព័ត៌មានលន្ទឹងសុមនំនាត់នំនួចមក៖

≜ នាយកជ្ជានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម តាមអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ២០០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ : (០២៣) ២១៥ ៨១៩/០១២ ៨៣ ៧៩ ៤៥

ទូរសារលេខ : (៨៥៥)២៣ ២១០ ៩៤៤

Facebook : នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម / Department of Agricultural Extension

គេហទំព័រ : http://www.maff.gov.kh អ៊ីម៉ែល : info@maff.gov.kh

± លោក **យន ស៊ៅ** កសិករជ័យលាភី លើការចិញ្ចឹម និងផលិតកូនត្រីពូជ តាមអាសយដ្ឋាន ភូមិច្រេស ឃុំច្រេះ ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង