

盲人摸象

意象理论讲义

王进一

jin12003@163.com

QQ 2917905525

2023 年夏至今

此版本编译时间: 2025 年 9 月 26 日

这是一本正在施工的讲义. 目前我迫切需要读者的意见!

Je vous souhaite le meilleur succès. Ce serait magnifique que vous puissiez étudier la théorie des topos de Grothendieck et travailler dans ce domaine. Travaillez beaucoup, soyez patient, ayez bon courage et vos efforts seront récompensés.

Laurent Lafforgue¹

Once you see at least one example and you do it yourself and you experience the kind of enlightenment it brings, you will be convinced forever.

Olivia Caramello²

¹这是 Lafforgue 教授在一次讲座之后写给作者的话。“祝愿你获得最大的成功。你能够学习 Grothendieck 意象理论并在这个领域工作，是一件美妙的事情。努力学习，保持耐心，勇往直前，你的努力将会得到回报。”Lafforgue 教授是 Caramello 教授多年的合作者。

²这是 Caramello 教授在与作者的采访中关于 topos 理论的评论。Caramello 教授是意象理论和逻辑学专家。

目录

0 前言	7
1 意象的范畴论性质	11
1.1 范畴论基本概念	12
1.2 意象	27
1.3 更多范畴论结构	29
2 位象：无点拓扑学	53
2.1 基本概念	54
2.2 位象的几何性质	60
2.3 位象与逻辑	73
3 意象与空间的概念	81
3.1 拓扑空间上的层与平展空间	83
3.2 位象上的层与平展空间	92
3.3 范畴上的预层	102
3.4 景	109
3.5 层化与 Grothendieck + 构造	118
3.6 Grothendieck 意象	122
3.7 Lawvere–Tierney 拓扑, 内蕴层化与局部化	129
3.8 意象之间的态射	135
3.9 景之间的态射	148
3.10 意象的几何性质	159
3.11 Giraud 定理	162
3.12 等变层与拓扑群胚	164
3.13 意象的余极限	167

4	意象的内语言	169
4.1	Mitchell–Bénabou 语言	170
4.2	Kripke–Joyal 语义	176
4.3	不同意象的内语言的联系	180
5	语法景与分类意象	187
5.1	语法范畴: 语法–语义对偶	187
5.2	分类意象	193
6	意象理论的应用	205
6.1	非标准分析	205
6.2	可计算性理论与有效意象	207
6.3	代数几何的函子观点	209
6.4	综合微分几何与光滑无穷小分析	212
6.5	量子理论与 Bohr 意象	219
6.6	连续统假设的独立性	225
6.7	凝聚态数学	231
A	范畴论基础	233
A.1	2-范畴	234
A.2	伴随	240
A.3	自反子范畴与局部化	248
A.4	预层范畴与米田嵌入	259
A.5	(余) 滤范畴和 (余) 滤 (余) 极限	264
A.6	可表现范畴	270
A.7	Kan 扩张	278
A.8	单子论	281
A.9	万有代数	289
A.10	纤维范畴与索引范畴	298
A.11	下降	306
B	形式逻辑和范畴逻辑基础	311
B.1	一阶逻辑	311
B.2	一阶逻辑的范畴语义	324
B.3	高阶逻辑	331
B.4	类型论	334
B.5	模态逻辑	338

术语和符号表	342
参考文献	345

第 0 章 前言

[A] “set theory” for geometry should apply not only to abstract sets divorced from time, space, ring of definition, etc., but also to more general sets which do in fact develop along such parameters. For such sets, usually logic is “intuitionistic” (in its formal properties) usually the axiom of choice is false, and usually a set is not determined by its points defined over 1 only.

William Lawvere, *Quantifiers and Sheaves*

每一个意象 (topos) 都是一个数学宇宙. 集合范畴 \mathbf{Set} 是最简单和最重要的意象, 对应着 “通常数学” 的宇宙. 一般的意象从外部看有远比集合范畴丰富的结构, 其范畴论性质却与 \mathbf{Set} 几乎相同. 逻辑学上, 每个意象都提供了一种语言以完全在范畴 “内部” 进行推理, 仿佛所处理的对象是普通集合一样. 对于熟悉的数学对象, 意象也可给我们新的视角; 一些关系在特定意象的语言中很简洁, 而在通常数学语言中则不然. 拓扑空间 X 上的层构成一个意象 $\mathbf{Sh}(X)$; 由此, 意象可视为空间的概念的推广.

意象的概念主要经过了两批数学家的发展. 时间上较早的是以 Alexander Grothendieck, Jean-Louis Verdier 为首的代数几何的学派; 他们在 1960 年代著名的 “代数几何学研讨班” (Séminaire de Géométrie Algébrique, SGA) 中发展了现在称为 “Grothendieck 意象” 的概念, 作为一种广义的空间, 用来研究代数几何中涌现的各种上同调理论. 而在 1970 年左右, 以 William Lawvere, Myles Tierney 为代表的一众范畴逻辑学家, 在研究范畴论作为数学基础的过程中, 发展了现在称为意象的概念, 揭示了其与逻辑的关系. 1980-2000 年之间出现了一些在不同方面谈论意象理论的著作, 如 Ieke Moerdijk 与 Gonzalo Reyes 的 *Models for Smooth Infinitesimal Analysis* [25], Saunders MacLane 与 Ieke Moerdijk 的 *Sheaves in Geometry and Logic* [20], Francis Borceux 的三卷 *Handbook of Categorical Algebra* [5],[6],[7], 进一步展现出这个概念在数学诸多分支的重要地位. 人们意识到, 意象的概念正如一头大

象, 无论从几何, 逻辑中的哪个侧面去了解它, 只能得到片面的观点; 它的覆盖面如此之广, 以至于迄今为止只有 Peter Johnstone 一千多页的 *Sketches of an Elephant* [17] 曾试图呈现意象理论的全貌.

本书对数学没有原创性的贡献, 其中几乎所有结果在 20 世纪已经为该领域的专家所熟知. 但是大部分内容找不到成体系的中文资料 (除了李文威老师的代数学方法 [30]), 这是我编写本书的动机之一. 内容的编排原则大致是使初学者最易接受, 并且提供启发性的观点, 从而使人能更快入门去看更多的资料. 本书收录的论证都是十分简单而直观的; 阅读本书虽不能让人成为本领域的专家, 但能让人发现一些事情并非想象的那样困难, 在将玄妙的概念祛魅的过程中产生信心和乐趣. 书中许多内容的含入仅仅是由于个人的品味, 例子的选取受到了本人的微分几何与代数拓扑背景的影响. 一些证明出自本人的思考, 因此错漏是难免的. 限于水平, 书中许多细节无法深究, 包括有关集合论的“小”性的问题, 以及其它涉及到数学基础的问题. 许多术语没有通行的中文版本, 姑且使用了本人的翻译, 书后附有一个简短的术语表.

致谢

在编写本书的过程中, 我得到了 Olivia Caramello 教授, Laurent Lafforgue 教授, 以及杨家同, 陈潇扬等友人的帮助和鼓励. 向他们表达诚挚的感谢.

第 1 章 意象的范畴论性质

The theory of abelian categories served as the “right” generalization for the category of abelian groups. So topoi serve for—no less—the category of sets.

Peter Freyd, *Aspects of Topoi*

1.1 范畴论基本概念	12
极限与余极限	12
指数对象与积闭范畴	13
子对象分类子	16
幂对象	21
俯范畴与局部积闭性	22
1.2 意象	27
1.3 更多范畴论结构	29
0 和 1	29
单射与满射	30
正则单射与满射, 等价关系	31
像	33
满-单分解	35
子终对象	36
子对象的格与 Heyting 代数	38
自然数对象	45
无交和	45
Boole 意象与选择公理	48

范畴是一个广泛应用的概念, 然而它的结构比较单薄, 在一般的范畴中能做的事情十分有限. 为了让范畴更有用, 我们就要要求合适的性质. Lawvere 在范畴论的层面研究了这样一个问题: 集合范畴 \mathbf{Set} 具有什么样的性质, 使得它能作为数学的基础. 他将这些性质提炼成为意象 (topos) 的概念.

本章的目的是展现集合范畴中的许多构造实际上具有范畴论上的一般性, 也为形式上统一这些构造的“意象的内语言”埋下伏笔.

1.1 范畴论基本概念

极限与余极限

范畴中常见的极限如下.¹

- 乘积 (product) 是离散图 (若干个无关的对象) 的极限;
- 等化子 (equalizer) 是形如 $\bullet \rightrightarrows \bullet$ 的图的极限;
- 拉回 (pullback) 是形如
$$\begin{array}{ccc} & \bullet & \\ & \downarrow & \\ \bullet & \rightarrow & \bullet \end{array}$$
 的图的极限;
- 终对象是空图的极限. 终对象也可视为 0 个对象的积, 因此我们将终对象记作 1.

我们关注的一类极限是有限图 (有限个对象和有限个态射组成的图) 的极限, 称为有限极限. (空图的极限也是一种有限极限.)

范畴中常见的余极限如下.

- 二元和是形如 $\bullet \quad \bullet$ 的图的余极限;
- 余等化子 (coequalizer) 是形如 $\bullet \rightrightarrows \bullet$ 的图的余极限;
- 推出 (pushout) 是形如
$$\begin{array}{ccc} \bullet & \rightarrow & \bullet \\ \downarrow & & \\ \bullet & & \end{array}$$
 的图的余极限;
- 始对象是空图的余极限. 始对象也可视为 0 个对象的和, 因此我们将始对象记作 0.

使用上面的某些 (余) 极限就可以表达出所有的有限 (余) 极限.

¹我们假设读者对这些概念有一定的了解, 因此这里仅作一列举.

命题 1.1.1

对于范畴 \mathcal{C} , 如下条件等价:

- (1) 存在有限极限²;
- (2) 存在有限积与等化子;
- (3) 存在终对象与拉回.

对于范畴 \mathcal{C} , 如下条件等价:

- (1) 存在有限余极限;
- (2) 存在有限余积与余等化子;
- (3) 存在始对象与推出.

证明. 由对偶性, 我们只需证明左边的命题. 由定义, (1) 蕴含 (2) 和 (3).

(2) \Rightarrow (1) 的证明. 设 $F: I \rightarrow \mathcal{C}, i \mapsto F_i$ 是任意有限图, 考虑有限积

$$P = \prod_i F_i, \quad Q = \prod_{i \rightarrow j} F_j$$

(其中下标 $i \rightarrow j$ 取遍指标范畴 I 的所有态射) 以及两个态射 $P \rightarrow Q$, 一个是 $(x_i)_i \mapsto (F_{i \rightarrow j}(x_i))_{i \rightarrow j}$, 另一个是 $(x_i)_i \mapsto (x_j)_{i \rightarrow j}$. 两个态射的等化子即是极限 $\lim_i F_i$. 注意态射 P, Q 的定义仿佛使用了“集合”的语言, 这可以视为一种形式的记号; 无论如何, 它很容易翻译为范畴语言.

(3) \Rightarrow (2) 的证明. 到终对象的拉回给出了有限积, 而对于两个态射 $f, g: X \rightarrow Y$, 如下拉回给出了等化子:

$$\begin{array}{ccc} \text{eq}(f, g) & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \Delta \\ X & \xrightarrow{(f, g)} & Y \times Y, \end{array}$$

其中 $\Delta = (\text{id}_Y, \text{id}_Y): Y \rightarrow Y \times Y$ 是对角线. □

指数对象与积闭范畴

集合范畴中, 两个集合间的态射仍构成一个集合, 称为映射集合. 在某些范畴 \mathcal{C} 中, 两个对象之间有一个 \mathcal{C} 的对象充当了“映射集合”的角色, 称为指数对象 (exponential object).

定义 1.1.2 (指数对象, 积闭范畴)

设范畴 \mathcal{C} 具有有限积. 对固定的对象 X , 若存在函子 $(-)^X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 构成 $(-) \times X$ 的右伴随³, 即有自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y^X) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z \times X, Y), \quad (1.1)$$

²“存在有限极限”是“存在所有的有限极限”的简便说法.

则称 X 可作指数 (exponentiable), 称 Y^X 为指数对象 (exponential object), 或称内蕴态射对象 (internal hom-object).

若 \mathcal{C} 的所有对象均可作指数, 则称 \mathcal{C} 为积闭范畴 (cartesian closed category), 其中“积”指有限积, “闭”即指数对象的存在性.

指数对象在数学中随处可见.

例 1.1.3 (紧开拓扑)

在拓扑空间范畴 \mathbf{Top} 中, 一般的对象不一定可作指数, 但局部紧 Hausdorff 空间都是可作指数的. 若 X 是局部紧空间, Y 是任意拓扑空间, 指数对象 Y^X 上的拓扑称为紧开拓扑 (compact-open topology), 这个名字是因为它可由如下开集生成: 对紧集 $K \subset X$ 与开集 $O \subset Y$, 取 X 到 Y 所有满足 $f(K) \subset O$ 的映射构成的集合.

拓扑学中, 人们常说“我们在一个方便的拓扑空间范畴中工作”⁴, 即要求所考虑的范畴包含我们感兴趣的空间 (如 CW 复形), 且具有良好的范畴论性质. 一个比较方便的范畴是紧生成弱 Hausdorff 空间范畴 \mathbf{CGWH} , 它是积闭范畴, 但还不是意象. Johnstone [16] 构造了一个方便的“拓扑空间范畴”, 且它是意象. 注 6.7.5 讨论了 Johnstone 的构造.

例 1.1.4 (函子范畴)

两个范畴 \mathcal{C}, \mathcal{D} 之间的函子构成一个范畴 $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, 这是范畴的范畴 \mathbf{Cat} 中的指数对象.

命题 1.1.5

对于积闭范畴, 指数对象实际上构成一个双函子 (也即乘积范畴出发的函子) $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}, (X, Y) \mapsto Y^X$.

在集合范畴中, 给定一个映射 $f: X \rightarrow Y$ 与一个元素 $x \in X$, 我们可对 f 在 x 处取值得到 Y 的元素 $f(x)$; 类似地, 在一个积闭范畴中我们有 $Y^X \times X$ 到 Y 的一个“取值”映射.

³指数对象可对一般的幺半范畴 (monoidal category) 定义, 这里我们只考虑所谓积幺半范畴 (cartesian monoidal category), 即以乘积定义的幺半范畴.

⁴<https://ncatlab.org/nlab/show/convenient+category+of+topological+spaces>

定义 1.1.6 (取值映射)

在 (1.1) 中取 $Z = Y^X$, 那么 $\text{id}_{Y^X} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y^X, Y^X)$ 在另一边对应的态射称作取值映射 (evaluation map) $\text{ev}: Y^X \times X \rightarrow Y$. 换言之, 取值映射 $\text{ev}: Y^X \times X \rightarrow Y$ 是伴随 $(-) \times X \dashv (-)^X$ 的余单位.

例 1.1.7 (复合)

正如集合映射的复合, 指数对象之间有“复合”运算

$$(- \circ -): Z^Y \times Y^X \rightarrow Z^X.$$

它来自如下的复合:

$$Z^Y \times Y^X \times X \xrightarrow{\text{ev}} Z^Y \times Y \xrightarrow{\text{ev}} Z.$$

指数对象有与数的乘方类似的规律.

命题 1.1.8 (指数律)

在积闭范畴中, 对任意对象 X, Y, Z 有

$$(Z^Y)^X \simeq Z^{Y \times X}.$$

证明. 由指数对象的性质, 有自然同构

$$\begin{aligned} \text{Hom}(W, (Z^Y)^X) &\simeq \text{Hom}(W \times X, Z^Y) \\ &\simeq \text{Hom}(W \times X \times Y, Z) \simeq \text{Hom}(W, Z^{Y \times X}). \end{aligned}$$

由米田引理, 结论得证. □

命题 1.1.9 (分配律)

在有二元和的积闭范畴中,

$$Z \times (X + Y) \simeq Z \times X + Z \times Y.$$

证明. 这是因为 $Z \times (-)$ 作为 $(-)^Z$ 的左伴随保持余极限 (命题 A.2.5). 此外也可给出一个

具体的证明.

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}(Z \times (X + Y), W) &\simeq \mathrm{Hom}(X + Y, W^Z) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(X, W^Z) \times \mathrm{Hom}(Y, W^Z) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(Z \times X, W) \times \mathrm{Hom}(Z \times Y, W) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(Z \times X + Z \times Y, W).
 \end{aligned}$$

□

命题 1.1.10

在有二元和的积闭范畴中,

$$Z^{X+Y} \simeq Z^X \times Z^Y.$$

证明.

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}(W, Z^{X+Y}) &\simeq \mathrm{Hom}(W \times (X + Y), Z) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(W \times X + W \times Y, Z) && \text{(分配律)} \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(W \times X, Z) \times \mathrm{Hom}(W \times Y, Z) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(W, Z^X) \times \mathrm{Hom}(W, Z^Y) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}(W, Z^X \times Z^Y).
 \end{aligned}$$

□

命题 1.1.11

在积闭范畴中,

$$(Z \times Y)^X \simeq Z^X \times Y^X.$$

证明. 这是因为 $(-)^X$ 作为 $(-) \times X$ 的右伴随保持极限 (命题 A.2.5).

□

子对象分类子

对于集合 X 的子集 $U \subset X$, 定义其特征函数 (characteristic function) $\chi_U: X \rightarrow \{0, 1\}$,

$$\chi_U(x) = \begin{cases} 1, & x \in U, \\ 0, & x \notin U. \end{cases}$$

(我们可将特征函数 $\chi_U(x)$ 视为“含一个变量 x 的命题”, 当且仅当 $x \in U$ 时命题为真.) 如此, X 的子集一一对应于 X 到 $\{0, 1\}$ 的映射. 这就是说, 集合 $\{0, 1\}$ “分类” (classify) 了集合的子集.

定义 1.1.12 (子对象)

在一般的范畴中, 我们称指向 X 的单态射 $U \rightarrow X$ 的同构类为 X 的子对象 (subobject), 其中单态射的同构是指形如 $\begin{array}{ccc} U & \searrow & X \\ \simeq \downarrow & & \nearrow \\ \tilde{U} & \searrow & X \end{array}$ 的交换图.

范畴 \mathcal{C} 中对象 X 的子对象构成一偏序集 $\text{Sub}_{\mathcal{C}}(X)$, 其序关系为“包含”关系. 若子对象 $U \hookrightarrow X$ 作为嵌入映射可分解为 $U \hookrightarrow V \hookrightarrow X$, 则称 U 包含于 V .

在范畴 \mathcal{C} 具有拉回时, 子对象集合有函子性.

定义 1.1.13 (子对象函子)

假设范畴 \mathcal{C} 具有拉回. 定义子对象函子

$$\text{Sub}_{\mathcal{C}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set},$$

将对象 X 对应到其子对象的集合, 态射对应到子对象的拉回.

上述定义的合法性来自如下命题.

命题 1.1.14

在任何范畴中拉回保持子对象; 即对任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 以及子对象 $i: V \rightarrow Y$, 只要存在拉回 $U = X \times_Y V$, 就有 $j = f^*i: U \rightarrow X$ 是 X 的子对象.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{p} & V \\ j \downarrow & & \downarrow i \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

证明. 设 j 余等化 $\alpha, \beta: Z \rightarrow U$. 那么 $fj = ip$ 也余等化 α, β . 由 i 为单态射, 知 p 余等化 α, β . 由拉回的性质, 知 $\alpha = \beta$. 这说明 j 为单射. \square

定义 1.1.15 (子对象分类子)

设范畴 \mathcal{C} 存在拉回. 若子对象函子 $\text{Sub}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ 可表, 即存在对象 Ω 使得有自然同构

$$\text{Sub}_{\mathcal{C}}(X) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \Omega),$$

则称 Ω 为 \mathcal{C} 的子对象分类子 (subobject classifier).

子对象分类子还有如下的等价定义.

定义 1.1.16 (子对象分类子, 等价定义)

设范畴 \mathcal{C} 存在拉回以及终对象 1 . 若存在满足如下条件的对象 Ω 以及单射 $\top: 1 \rightarrow \Omega$, 则称其为 \mathcal{C} 的子对象分类子 (subobject classifier): 对任意单射 (子对象) $U \rightarrow X$ 存在唯一的特征函数 (characteristic map) $\chi_U: X \rightarrow \Omega$ 使得下图为拉回.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{\chi_U} & \Omega \end{array}$$

我们也称 $\top: 1 \rightarrow \Omega$ 为万有子对象 (universal subobject).

有了子对象分类子, 子对象等同于到 Ω 的态射, 从而子对象的拉回不过是到 Ω 的态射的复合.

$$\begin{array}{ccccc} f^*V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

注 1.1.17

“万有子对象”中的“万有”与拓扑学中“万有 G -主丛”中“万有”的含义相同.

上述定义中“ 1 是终对象”的要求可不用提, 因为它蕴含于后面的泛性质中: 对任何

对象 X 考虑子对象 $\text{id}: X \rightarrow X$, 在拉回图 $\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\alpha} & \tilde{1} \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{\chi} & \Omega \end{array}$ 中, 由 χ 的唯一性以及 \top 是

单射可得到 α 的唯一性, 这说明 $\tilde{1}$ 就是终对象 1 .

符号 \top (L^AT_EX 代码: `\top`) 读作“真”, 后面也将用到另一个元素 $\perp: 1 \rightarrow \Omega$ (`\bot`), 读作“假”. 一般地, 态射 $1 \rightarrow \Omega$ 称为真值 (truth value).

现在证明子对象分类子两种定义的等价性. 假设第一种定义 (1.1.15) 中的对象 Ω 存在, 我们需要给出第二种定义 (1.1.16) 所要求的单射 $\top: 1 \rightarrow \Omega$.

考虑 Ω 到自身的恒等映射 $\text{id}: \Omega \rightarrow \Omega$, 它在同构 $\text{Sub}(\Omega) \simeq \text{Hom}(\Omega, \Omega)$ 下对应一个子对象 $\tilde{1}: \tilde{1} \rightarrow \Omega$.

对任意子对象 $U \rightarrow X$, 由交换图

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{1} & \in & \text{Sub}(\Omega) & \xleftarrow{\simeq} & \text{Hom}(\Omega, \Omega) & \ni & \text{id}_\Omega \\ \downarrow \text{沿 } \chi_U \text{ 拉回} & & & & \downarrow \text{复合 } \chi_U & & \\ U & \in & \text{Sub}(X) & \xleftarrow{\simeq} & \text{Hom}(X, \Omega) & \ni & \chi_U \end{array}$$

我们得到 $\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & \tilde{1} \\ \downarrow & & \downarrow \tilde{\tau} \\ X & \xrightarrow{\chi_U} & \Omega \end{array}$ 是一个拉回. 这说明 $\tilde{\tau}$ 就是 τ .

下面介绍一些子对象的例子.

例 1.1.18 (自身)

每个对象 X 都是自身的子对象; 严格地说, $\text{id}_X: X \rightarrow X$ 是一个子对象. 它的特征函数是 $\tau_X: X \rightarrow 1 \xrightarrow{\tau} \Omega$. 读者可验证下图确实是一个拉回:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & 1 \\ \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \tau \\ X & \xrightarrow{\tau_X} & \Omega. \end{array}$$

例 1.1.19 (整体元素)

在一个范畴 \mathcal{C} 中, 终对象 1 到另一对象 X 的态射称为 X 的整体元素 (global element)^a. 任何整体元素 $1 \rightarrow X$ 都构成子对象.

^a这一称呼来自层的整体截面.

例 1.1.20 (对角线)

假设二元积存在, 那么对任意对象 X , 对角线映射 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 是一个子对象 (因为它复合任意一个投影映射得到 id_X).

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & 1 \\ \Delta \downarrow & & \downarrow \tau \\ X \times X & \xrightarrow{\chi_\Delta} & \Omega \end{array}$$

我们将它的特征函数 χ_Δ 记为 “Kronecker δ 函数” $\delta_X: X \times X \rightarrow \Omega$, 表示 X 上的相等关系.

例 1.1.21 (单元集)

“Kronecker δ 函数” $\delta_X: X \times X \rightarrow \Omega$ 对应的态射 $\{-\}_X: X \rightarrow \Omega^X$ 称为单元集映射 (singleton map), 在集合范畴中它将 X 的元素变为 X 的单元子集.

由下面的命题, $\{-\}_X$ 为单射, 从而它给出了 PX 的一个子对象, 即 “ X 的单元子集的集合”. 其特征函数

$$\sigma_X := \chi_{\{-\}_X}: PX \rightarrow \Omega$$

在直观上表示 X 的一个子集是否是单元集.

命题 1.1.22 (单元集映射是单射)

对任意对象 X , 单元集映射 $\{-\}_X: X \rightarrow \Omega^X$ 是单射.

证明. 对任意两个态射 $x, x': U \rightarrow X$, 假设 $\{-\}_X \circ x = \{-\}_X \circ x': U \rightarrow \Omega^X$, 那么由 δ_X 的定义有

$$\delta_X(x \times 1) = \delta_X(x' \times 1): U \times X \rightarrow \Omega.$$

考虑下图,

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{x} & X & \longrightarrow & 1 \\ (1,x) \downarrow & & \downarrow \Delta & & \downarrow \\ U \times X & \xrightarrow{x \times 1} & X \times X & \xrightarrow{\delta_x} & \Omega \end{array}$$

两个小方形均为拉回, 从而长方形为拉回. 因此左边的竖直箭头 $(1, x): U \rightarrow U \times X$ 是一个子对象 (函数 x 的“图像”), 其特征函数为 $\delta_X(x \times 1)$. 对于 x' 有同样的拉回图, 故 $(1, x)$ 与 $(1, x')$ 是相同的子对象. 由子对象相同的定义, 存在自同构 $h: U \rightarrow U$ 使得 $(1, x) \circ h = (1, x')$, 即 $h = 1, xh = x'$, 这说明 $x = x'$. \square

例 1.1.23 (等化子)

假设二元积存在, 那么等化子可表示为一个子对象: 态射 $f, g: X \rightarrow Y$ 的等化子是态射

$$X \xrightarrow{(f,g)} Y \times Y \xrightarrow{\chi_\Delta} \Omega$$

对应的子对象. 对比命题 1.1.1 (3) \Rightarrow (2) 的证明.

例 1.1.24 (成员关系)

取值映射 (见定义 1.1.6) $\Omega^X \times X \rightarrow \Omega$ 对应的子对象是成员关系 (membership relation) $\in_X \hookrightarrow \Omega^X \times X = P(X) \times X$.

注 1.1.25 (子对象, 谓词与广义元素)

集合的函数 $X \rightarrow \{\top, \perp\}$ 可视为定义在 X (的元素) 上的一个谓词, 也即输入 X 的元素 x , 输出 x 是否满足某个命题. X 自身作为子对象, 对应谓词 \top (恒真); 对角线 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 对应谓词 “ $x = y$ ”; 等化子 $\text{eq}(f, g): X \rightarrow \Omega$ 对应谓词 “ $f(x) = g(x)$ ”. 态射 $A \rightarrow X$ 可视为 X 的广义元素, 广义元素是整体元素 (例 1.1.19) 的推广. 设 $X \rightarrow \Omega$ 是谓词, 那么复合 $A \rightarrow X \rightarrow \Omega$ 可视为 Ω 的广义元素, 表示 “广义元素

$A \rightarrow X$ 满足谓词 $X \rightarrow \Omega$ ”.

幂对象

集合 X 的幂集 (power set) $P(X)$ 是 X 所有子集的集合. 由于 X 的子集一一对应于 X 到 $\{\perp, \top\}$ 的映射, 我们有自然同构 $P(X) \simeq \{\perp, \top\}^X$.

定义 1.1.26 (幂对象函子)

设范畴 \mathcal{C} 中存在子对象分类子和指数对象, 定义幂对象 (power object)

$$P(X) := \Omega^X.$$

幂对象给出了函子 $P: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

在上述定义中取 $X = 1$, 我们得到子对象分类子等于终对象的幂对象: $\Omega = P(1)$. 此时有同构

$$\text{Hom}(1, P(X)) \simeq \text{Hom}(X, \Omega) \simeq \text{Sub}(X),$$

也即 $P(X)$ 的整体元素一一对应于 X 的子对象.

幂对象还有一种独立于子对象分类子的定义. 注意到 (形式上) 有

$$\{X \times Y \text{ 的子对象}\} \simeq \text{Hom}(X \times Y, \Omega) \simeq \text{Hom}(Y, \Omega^X) \simeq \text{Hom}(Y, P(X)),$$

这启发了如下定义.

定义 1.1.27 (幂对象, 另一种定义)

设范畴 \mathcal{C} 具有有限极限. 对象 X 的幂对象是一个对象 $P(X)$ 以及一个单射 $\in \hookrightarrow X \times P(X)$, 满足对任意对象 Y, Z 与单态射 $Z \rightarrow X \times Y$, 存在唯一的 $\chi_Z: Y \rightarrow P(X)$ 使得下图为拉回.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & \in \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times Y & \xrightarrow{\text{id}_X \times \chi_Z} & X \times P(X) \end{array}$$

另一个有趣的事实是, 由幂对象和子对象分类子, 我们可构造所有指数对象; 其思路是将函数表示为图像. 下面我们仅给出构造与直观, 证明细节见 [20] IV.2 节.

集合映射 $f: X \rightarrow Y$ 可视为 $X \times Y$ 的子集 $\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$, 称为映射的图像 (graph). $X \times Y$ 的子集 Γ 是某个函数 $X \rightarrow Y$ 的图像的充要条件是, 对任意 $x \in X$, 存在唯一的 y 使得 $(x, y) \in \Gamma$. 在意象中我们完全可以模仿这个构造.

- 考虑例 1.1.21 定义的函数 $\sigma_Y: PY \rightarrow \Omega$. 对于 $p \in PY$, $\sigma_Y(p)$ 直观上表示 “ p 为单元集”.
- 由成员关系 (例 1.1.24) $\in_{X \times Y}: X \times Y \times P(X \times Y) \rightarrow \Omega$ 可构造映射 $v: X \times P(X \times Y) \rightarrow PY$; 对于 $x \in X$ 与 $p \in P(X \times Y)$, $v(x, p)$ 直观上表示 “ $\{y \mid p(x, y)\} \in PY$ ”.
- 考虑复合映射 $\sigma_Y v: X \times P(X \times Y) \rightarrow \Omega$, 对于 $x \in X$ 与谓词 $p \in P(X, Y)$, $\sigma_Y v(p, x)$ 直观上表示 “存在唯一的 y 满足命题 $p(x, y)$ ”.
- 进一步定义 $u: P(X \times Y) \rightarrow PX$ 为 $\sigma_Y v$ 对应的映射, 对于谓词 p , $u(p)$ 直观上表示 “ $\{x \mid \text{存在唯一的 } y \text{ 满足命题 } p(x, y)\}$ ”.

定义 Y^X 为如下拉回, 这便完成了指数对象的构造. 在后面介绍的内语言中, 这表示 “函数 $X \rightarrow Y$ 等同于 $X \times Y$ 的满足特定条件的子集”, 见例 4.1.17.

$$\begin{array}{ccc} Y^X & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow \lrcorner & & \downarrow \top_X \\ P(X \times Y) & \xrightarrow{u} & PX \end{array}$$

俯范畴与局部积闭性

定义 1.1.28 (俯范畴)

范畴 \mathcal{C} 在对象 X 上的俯范畴 (over category, 又称切片范畴, slice category) \mathcal{C}/X 的对象是 \mathcal{C} 中指向 X 的态射, 两个对象 $Y \rightarrow X, Z \rightarrow X$ 之间的态射是如下的交换图.

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

与俯范畴对偶的概念是仰范畴 (under category) $X \backslash \mathcal{C}$, 即由对象 X 出发的态射构成的范畴. 另一种记号是将俯范畴与仰范畴分别记作 $\mathcal{C}_{/X}, \mathcal{C}_{X/}$.

俯范畴中极限, 余极限, 子对象等结构与原来的范畴密切相关. 容易验证如下事实.

命题 1.1.29 (俯范畴中的极限)

设 X 是范畴 \mathcal{C} 的对象, 那么俯范畴 \mathcal{C}/X 中一个图的极限等同于 \mathcal{C} 中对应的图加上指向 X 的态射后的极限. 例如,

- (二元积) \mathcal{C}/X 的两个对象 $Y \rightarrow X, Z \rightarrow X$ 的乘积是 \mathcal{C} 中的拉回 $Y \times_X Z$;
- (等化子) \mathcal{C}/X 中的两个态射 $f, g: Y \rightarrow Z$ 的等化子是 \mathcal{C} 中的等化子;

- (终对象) \mathcal{C}/X 的终对象是 $\text{id}_X: X \rightarrow X$.
- (拉回) \mathcal{C}/X 中的拉回是 \mathcal{C} 中的拉回.

“这里“等同”的意思是, 前者存在当且仅当后者存在, 且当两者存在时, 两者同构.

余极限的情况则更简单.

命题 1.1.30 (俯范畴中的余极限)

设 X 是范畴 \mathcal{C} 的对象, 那么俯范畴 \mathcal{C}/X 中一个图的余极限等同于 \mathcal{C} 中对应的图的余极限 (配备其到 X 的典范态射).

命题 1.1.31 (俯范畴中的子对象)

对任何范畴 \mathcal{C} , 俯范畴 \mathcal{C}/X 中 $Y \rightarrow X$ 的子对象

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

等同于 \mathcal{C} 中 Y 的子对象 $W \hookrightarrow Y$. 当 \mathcal{C} 有子对象分类子 Ω 且存在乘积时,

$$\text{Sub}_{\mathcal{C}/X}(Y \rightarrow X) \simeq \text{Sub}_{\mathcal{C}}(Y) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \Omega) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}/X}(Y, \Omega \times X \rightarrow X),$$

即 \mathcal{C}/X 有子对象分类子 $\Omega \times X \rightarrow X$.

俯范畴的性质中, 非常重要的是各俯范畴以及原来的范畴 \mathcal{C} 之间的关系, 也即换基 (change of base).

很明显, 俯范畴 \mathcal{C}/X 到原来的范畴 \mathcal{C} 有一个“遗忘”⁵ 函子: 对于态射 $Y \rightarrow X$, 只保留对象 Y 而忘掉那个态射. 而 \mathcal{C} 等价于俯范畴 $\mathcal{C}/1$ (假设 \mathcal{C} 有终对象 1), 故上述函子的相对版本如下.

定义 1.1.32 (Σ -函子)

设 \mathcal{C} 是范畴. 对态射 $f: X \rightarrow Y$, 定义函子 $\Sigma_f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$, 将 \mathcal{C}/X 的对象 $Z \rightarrow X$ 对应到复合 $Z \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$.

当 $Y = 1$ 是 \mathcal{C} 的终对象时, $\mathcal{C}/1 \simeq \mathcal{C}$, 记上述函子为 $\Sigma_X: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$.

稍加观察即可得到如下命题.

⁵但严格来说这不是遗忘函子, 它一般没有对应的自由函子 (自由是遗忘的左伴随), 因为它一般不保持极限, 见命题 A.2.5.

命题 1.1.33

设范畴 \mathcal{C} 存在拉回, 那么对态射 $f: X \rightarrow Y$, 有伴随

$$\mathcal{C}/X \xrightleftharpoons[f^*]{\Sigma_f} \mathcal{C}/Y.$$

证明. 由拉回的泛性质, 如下两个交换图的信息是相同的:

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & f^*Z \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

这正说明 Σ_f 是 f^* 的左伴随. □

注 1.1.34 (记号 Σ_f 的来由)

集合范畴中, 一个指向 X 的态射可视为 X 上的一个集合族, 也即 X 的每一点上有一个集合. 具体地, 我们有范畴等价

$$\mathbf{Set}/X \simeq \mathbf{Set}^X.$$

其中右边的 X 视为离散范畴. (\mathbf{Set} 是集合丛的“分类空间”, X 到 \mathbf{Set} 的函子等同于 X 上的集合丛.)

对集合映射 $f: X \rightarrow Y$, 拉回函子 $f^*: \mathbf{Set}/Y \rightarrow \mathbf{Set}/X$ 在另一边表现为“重新标号”函子 $f^*: \mathbf{Set}^Y \rightarrow \mathbf{Set}^X$,

$$\{A_y \mid y \in Y\} \mapsto \{A_{f(x)} \mid x \in X\},$$

其左伴随 $\Sigma_f: \mathbf{Set}^X \rightarrow \mathbf{Set}^Y$ 可写为

$$\{A_x \mid x \in X\} \mapsto \left\{ \sum_{f(x)=y} A_x \mid y \in Y \right\},$$

即对 $f: X \rightarrow Y$ 的每个纤维上的集合求和. 特别地, $\Sigma_X: \mathbf{Set}^X \rightarrow \mathbf{Set}$ 可写为 $\{A_x \mid x \in X\} \mapsto \sum_{x \in X} A_x$, 即对 X 上一族集合求和. 更多细节可参考 [20] 1.9 节.

例 1.1.35

在命题 1.1.33 中令 $Y = 1$, 以 X 表示唯一的态射 $X \rightarrow 1$, 得到伴随

$$\mathcal{C}/X \xrightleftharpoons[X^*]{\Sigma_X} \mathcal{C}.$$

到 1 的态射的拉回为二元乘积, 故函子 $X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/X$ 将对象 Z 对应到投影 $\text{pr}_2: Z \times X \rightarrow X$ (直观: X 的每个点上都有一个 Z). 那么这对伴随的余单位为 $(-) \times X$.

前面讨论了 f^* 的左伴随. 令人惊讶的是, f^* 还有一个潜在的右伴随. 首先看绝对 (即 $Y = 1$) 的情形; 我们发现它和指数对象有关.

命题-定义 1.1.36 (Π -函子, 绝对情形)

设范畴 \mathcal{C} 存在有限极限. 那么 $(-) \times X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 有右伴随 $(-)^X$ 当且仅当 $X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/X$ 有右伴随 $\Pi_X: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$.

证明. 假设 $X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/X$ 有右伴随 $\Pi_X: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$. 定义 $(-)^X = \Pi_X \circ X^*$, 那么有自然同构

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z^X) &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \Pi_X \circ X^* Z) && \text{(定义)} \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}/X}(X^* Y, X^* Z) && (\Pi_X \text{ 是 } X^* \text{ 的右伴随}) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\Sigma_X \circ X^* Y, Z) && (\Sigma_X \text{ 是 } X^* \text{ 的左伴随}) \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y \times X, Z). \end{aligned}$$

另一方面, 假设 $(-) \times X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 有右伴随 $(-)^X$. 对于 $f: Z \rightarrow X$, 定义 $\Pi_X(f)$ 为如下的拉回,

$$\begin{array}{ccc} \Pi_X(f) & \longrightarrow & Z^X \\ \downarrow & & \downarrow f^X \\ 1 & \xrightarrow{\text{id}_X} & X^X \end{array}$$

其中 $\text{id}_X: 1 \rightarrow X^X$ 是 $\text{id}_X: X \rightarrow X$ 在指数伴随下对应的 X^X 的元素, 并且由拉回的性质容易得到构造的函子性. 这个拉回的直观是 “ $f: Z \rightarrow X$ 的截面的集合” (因为 f 的截面就是 X 到 Z 的态射, 使得它复合 f 后等于 id_X).

对 \mathcal{C} 的对象 W , 有自然同构

$$\begin{aligned} &\text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, \Pi_X(f)) \\ &\simeq \{h: W \rightarrow Z^X \mid f^X \circ h = \text{id}_X \circ W\} \\ &\simeq \{h: W \times X \rightarrow Z \mid f \circ h = \text{pr}_2: W \times X \rightarrow X\} \\ &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}/X}(X^* W, f). \end{aligned}$$

这证明了 Π_X 是 X^* 的伴随. □

注 1.1.37

正如 $\Sigma_X: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$ 可理解为对 X 上一族对象求和, $\Pi_X: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$ 可理解为对 X 上一族对象求积. 而 $X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/X$ 是将对象 Y “复制 X 那么多份”, 所以 $\Pi_X \circ X^*(Y)$ 就是将 X 那么多个 Y 相乘, 也就是 Y^X .

相对的情形引出了局部积闭范畴的概念.

定义 1.1.38 (局部积闭范畴)

称范畴 \mathcal{C} 为局部积闭范畴 (locally cartesian closed category, LCCC) 是指 \mathcal{C} 在任何对象 X 上的俯范畴 \mathcal{C}/X 为积闭范畴.

注 1.1.39

通常人们还会假定局部积闭范畴 \mathcal{C} 有终对象 1 , 从而 \mathcal{C} 是积闭范畴, 因为 $\mathcal{C}/1 \simeq \mathcal{C}$. 积闭范畴的定义要求有限积, 故局部积闭范畴中存在拉回, 从而存在有限极限.

命题-定义 1.1.40 (Π -函子)

设范畴 \mathcal{C} 有一切有限极限. 那么 \mathcal{C} 是局部积闭范畴当且仅当对任何态射 $f: X \rightarrow Y$, 拉回 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 有右伴随 Π_f .

证明. 注意到

$$(\mathcal{C}/Y)/f \simeq \mathcal{C}/X,$$

这个命题化为绝对情形 (命题 1.1.36). □

总结起来,

命题 1.1.41 (俯范畴之间的三元伴随)

对于存在有限极限的局部积闭范畴, 对每个态射 $f: X \rightarrow Y$ 有三元伴随

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\Sigma_f} & \\ \mathcal{C}/X & \xleftarrow[f^*]{\perp} & \mathcal{C}/Y \\ & \xrightarrow{\Pi_f} & \end{array}$$

由于 f^* 同时有左右伴随, 我们得到 f^* 同时保持极限和余极限. 拉回也保持子对象分类子, 即 $\Omega \times Y \rightarrow Y$ 的拉回是 $\Omega \times X \rightarrow X$ (命题 1.1.31). 下面我们证明拉回保持指数对象.

注 1.1.42

我们称“拉回保持余极限”的范畴具有万有余极限 (universal colimits), 这个条件是 Giraud 公理 (3.11.1) 的一部分.

命题 1.1.43

对于存在有限极限的局部积闭范畴, 拉回 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 保持指数对象; 即对 \mathcal{C}/Y 的对象 $g: Z \rightarrow Y, h: W \rightarrow Y$,

$$f^*((Z \xrightarrow{g} Y)^{(W \xrightarrow{h} Y)}) \simeq (f^*(Z \rightarrow Y))^{f^*(W \rightarrow Y)}.$$

证明. 这是 Frobenius 互反律的性质 (命题 A.2.18, A.2.19) 的直接推论. □

1.2 意象

意象可由极少的几条性质来定义, 但需注意过短的定义可能会掩盖它的全貌.

定义 1.2.1 (意象)

意象是存在有限极限和子对象分类子的积闭范畴.

如上简洁的定义可以导出两个惊人的事实.

命题 1.2.2

意象中存在有限余极限.

命题 1.2.3 (“意象理论基本定理”)

对意象 \mathcal{C} 的任何对象 X , 俯范畴 \mathcal{C}/X 是意象.

这两个命题的证明都比较复杂, 感兴趣的读者可阅读 [20] IV.5, IV.7 节. 下面我们将承认这两个命题, 或将其加入意象的定义, 这对后面的理论无伤大雅.

例 1.2.4 (集合范畴)

集合范畴 \mathbf{Set} 是最基础的意象.

例 1.2.5 (退化意象)

在意象 \mathcal{C} 中, 若 $0 \simeq 1$, 则对任何对象 X 有 $X \rightarrow 1$ 为同构 (命题 1.3.2), 可知 \mathcal{C} 只有一个对象 1 和一个态射 id_1 ; 称之为退化意象 (degenerate topos).

- 在非退化意象中, 不存在态射 $1 \rightarrow 0$.
- 对任何意象 \mathcal{C} , 有 $\mathcal{C}/0$ 为退化意象.

 例 1.2.6 ($\text{Set} \times \text{Set}$)

范畴 $\mathcal{C} = \text{Set} \times \text{Set} \simeq \text{Set}^{\{1,2\}}$ 是一个意象, 其对象为一对集合 (X_1, X_2) , 态射为一对映射 $(f_1: X_1 \rightarrow Y_1, f_2: X_2 \rightarrow Y_2)$, 终对象为 $(1, 1)$. 对象 (X_1, X_2) 的子对象是一对子集 $(U_1 \subset X_1, U_2 \subset X_2)$, 对应一对特征函数 $(\chi_1: X_1 \rightarrow \{\perp, \top\}, \chi_2: X_2 \rightarrow \{\perp, \top\})$. 我们看到, 这个范畴的子对象分类子为

$$(\top: 1 \rightarrow \{\perp, \top\}, \top: 1 \rightarrow \{\perp, \top\}).$$

 例 1.2.7 (变集范畴 $\text{Fun}(2, \text{Set})$)

考虑“箭头范畴” $2 = \{\bullet \longrightarrow \bullet\}$ 到 Set 的函子范畴 $\text{Fun}(2, \text{Set})$, 其对象为集合映射 $X_0 \rightarrow X_1$, 称之为变集 (varying set), 态射为左下图, 终对象为 $1 \rightarrow 1$, 子对象分类子为右下图.

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longrightarrow & Y_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & 1 \\ \top \downarrow & & \downarrow \top \\ \{\perp, \star, \top\} & \longrightarrow & \{\perp, \top\} \quad (\star \mapsto \top) \end{array}$$

变集 $f: X_0 \rightarrow X_1$ 的子对象 $U_0 \rightarrow U_1$ 的特征函数 χ 为

$$\chi(x \in X_0) = \begin{cases} \perp & x \notin U_0, f(x) \notin U_1 \\ \star & x \notin U_0, f(x) \in U_1 \\ \top & x \in U_0, f(x) \in U_1 \end{cases}, \quad \chi(x \in X_1) = \begin{cases} \perp & x \notin U_1 \\ \top & x \in U_1 \end{cases}.$$

这个意象中有三个真值 $\perp, \star, \top: 1 \rightarrow \Omega$; 符号 \star 可理解为“将要成真”: $\chi(x) = \star$ 表示 x 不属于这个子集, 但将要属于这个子集 (即 $f(x)$ 属于这个子集).

例 1.2.8 (有限集范畴)

有限集范畴 \mathbf{Fin} 是一个意象; 这表示意象中不天然具有“无限”的概念. 更一般地, 设基数 π 满足对任意基数 $\lambda < \pi$ 有 $2^\lambda < \pi$ (这样的基数称为强极限基数), 那么基数小于 π 的集合的范畴 $\mathbf{Set}_{<\pi}$ 是一个意象.

在第 3 章, 我们将介绍一类重要的 (也是最早被研究的) 意象, 即 Grothendieck 意象.

1.3 更多范畴论结构

0 和 1

本节记录意象的始对象 0 与终对象 1 的若干性质.

命题 1.3.1 (0 和 1 参与的运算)

对意象中任何对象 X , 有 $X + 0 \simeq X$, $X \times 0 \simeq 0$, $X \times 1 \simeq X$, $X^0 \simeq 1$, $X^1 \simeq X$, $1^X \simeq 1$.

证明. 我们使用米田引理. 对任何对象 Y , 有自然同构

- $\mathrm{Hom}(X + 0, Y) \simeq \mathrm{Hom}(X, Y) \times \mathrm{Hom}(0, Y) \simeq \mathrm{Hom}(X, Y)$, 故 $X + 0 \simeq X$;
- $\mathrm{Hom}(X \times 0, Y) \simeq \mathrm{Hom}(0, Y^X) \simeq 1$, 故 $X \times 0 \simeq 0$;
- $\mathrm{Hom}(Y, X \times 1) \simeq \mathrm{Hom}(Y, X) \times \mathrm{Hom}(Y, 1) \simeq \mathrm{Hom}(Y, X)$, 故 $X \times 1 \simeq X$;
- $\mathrm{Hom}(Y, X^0) \simeq \mathrm{Hom}(Y \times 0, X) \simeq \mathrm{Hom}(0, X) \simeq 1$, 故 $X^0 \simeq 1$;
- $\mathrm{Hom}(Y, X^1) \simeq \mathrm{Hom}(Y \times 1, X) \simeq \mathrm{Hom}(Y, X)$, 故 $X^1 \simeq X$;
- $\mathrm{Hom}(Y, 1^X) \simeq \mathrm{Hom}(X \times Y, 1) \simeq 1$, 故 $1^X \simeq 1$.

□

注意上面没有列出 0^X , 我们仅能得到两个特例 $0^0 \simeq 1, 0^1 \simeq 0$. 后面将会讲到, 当 X 代表真值时, 0^X 代表“非 X ” (定义 1.3.35).

命题 1.3.2 (意象具有严格始对象)

在意象中任何态射 $X \rightarrow 0$ 都是同构; 在范畴论中我们称这样的始对象为严格始对象 (strict initial object).

证明. 假设有态射 $f: X \rightarrow 0$. 因为 $(f, \text{id}_X): X \rightarrow 0 \times X$ 是单射, 而 $0 \times X \simeq 0$, 故 X 可作为 0 的子对象. 而 0 只有一个子对象 0 (因为 0 到 Ω 有唯一的态射), 故 $X \simeq 0$, f 是 X 到 0 唯一的同构. \square

命题 1.3.3

在意象中, 态射 $0 \rightarrow X$ 总是单射, 且是对象 X 的最小子对象.

证明. 假设 $0 \rightarrow X$ 余等化 $f_1, f_2: Y \rightarrow 0$, 则由命题 1.3.2, f_1, f_2 均为同构, f_1^{-1}, f_2^{-1} 均为 (唯一的) 态射 $0 \rightarrow Y$, 故 $f_1 = f_2$. 这证明了 $0 \rightarrow X$ 为单射. 因为 0 为始对象, $0 \rightarrow X$ 当然是 X 的最小子对象. \square

单射与满射

下面是一个常用的引理, 它表明在任何范畴中我们都可以用拉回与推出刻画单射与满射.

命题 1.3.4 (单射与满射的等价刻画)

在任何范畴中, 态射 $f: X \rightarrow Y$ 是单射当且仅当左下图是拉回, f 是满射当且仅当右下图是推出.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\text{id}} & X \\ \text{id} \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ f \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{id} \\ Y & \xrightarrow{\text{id}} & Y \end{array}$$

由此及“伴随保持极限”(命题 A.2.5), 我们就得到

命题 1.3.5

左伴随保持满射, 右伴随保持单射.

例如, 对意象 \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$, $\Pi_f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ 是 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 的右伴随 (命题 1.1.41), 从而保持单射; 因此有如下结论.

命题 1.3.6 (子对象拉回的右伴随)

对意象 \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$, $\Pi_f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ 限制为一个函子 $\forall_f: \text{Sub}(X) \rightarrow \text{Sub}(Y)$ (关于函子 \forall_f 的名称见注 1.3.22), 且为 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 的右伴随.

命题 1.3.7

在意象中拉回保持满射；即对任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 以及满射 $e: Z \rightarrow Y$ ，就有 $f^*e: X \times_Y Z \rightarrow X$ 是满射。

正则单射与满射，等价关系

集合的单射与满射的概念在一般的范畴中不止有一种推广。

定义 1.3.8 (正则单射与满射)

定义范畴中可作为等化子的态射为正则单射 (regular monomorphism)，可作为余等化子的态射为正则满射 (regular epimorphism)。

例 1.3.9

拓扑空间范畴 **Top** 中的正则单射是嵌入，也即带有子空间拓扑的子集。**Top** 中一般的单射未必是正则单射，例如一个集合上离散拓扑到平凡拓扑的映射。

例 1.3.10

环范畴 **Ring** 中的正则满射正是在底层集合上为满射的环同态。**Ring** 中一般的满射未必是正则满射，例如整数到有理数的嵌入 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 。

定义 1.3.11 (核偶与余核偶)

设范畴 \mathcal{C} 存在所需的拉回或推出。定义

- 态射 $f: X \rightarrow Y$ 的核偶 (kernel pair) 为左下方拉回图中的态射偶 (p_1, p_2) ，也即被 f 余等化的万有态射偶 $\bullet \rightrightarrows X$ ；
- 态射 $f: X \rightarrow Y$ 的余核偶 (cokernel pair) (g, h) 为右下方推出图中的态射偶 (i_1, i_2) ，也即被 f 等化的万有态射偶 $Y \rightrightarrows \bullet$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 X \times_Y X & \xrightarrow{p_1} & X \\
 p_2 \downarrow & & \downarrow f \\
 X & \xrightarrow{f} & Y
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y \\
 f \downarrow & & \downarrow i_2 \\
 Y & \xrightarrow{i_1} & Y \sqcup_X Y
 \end{array}$$

对于集合的映射 $f: X \rightarrow Y$ ，其核偶为 $X \times X$ 的子集

$$X \times_Y X = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_1) = f(x_2)\}.$$

$X \times X$ 的子集可视为集合 X 上的一个 (二元) 关系.

定义 1.3.12 (等价关系)

在一般的范畴中, 称 $X \times X$ 的一个子对象 R 为 X 上的一个关系. 等价关系是满足如下条件的关系.

- (自反性) $\Delta \leq R$, 其中 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 是对角线 (例 1.1.20);
- (对称性) $R \leq \sigma R$, 其中 $\sigma: X \times X \rightarrow X \times X$ 为交换两个分量;
- (传递性) 作为 $X \times X \times X$ 的子对象有 $p_{12}^* R \wedge p_{23}^* R \leq p_{13}^* R$, 其中 p_{ij} 是到第 i, j 分量的投影, \wedge 是子对象的交, 也即拉回.

等价关系 $R \hookrightarrow X \times X$ 确定的商即为两个投影映射 $R \rightarrow X$ 的余等化子. 态射 $f: X \rightarrow Y$ 可以确定一种等价关系 $x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$. 它是态射 $f: X \rightarrow Y$ 的核偶. 称这种等价关系为有效等价关系 (effective equivalence relation).

注意到当 $f: X \rightarrow Y$ 为集合的满射时, 核偶 $X \times_Y X \rightrightarrows X$ 的余等化子恰为 $f: X \rightarrow Y$, 即 Y 恰为 X 关于 f 诱导的等价关系的商. 我们将这种映射的性质抽象为有效满射. 与之对偶的概念称为有效单射.

定义 1.3.13 (有效单射与满射)

在具有拉回与推出的范畴中, 若一个态射是其余核偶的等化子, 则称之为有效单射 (effective monomorphism); 若一个态射是其核偶的余等化子, 则称之为有效满射 (effective epimorphism).

在具有拉回与推出的范畴中, 正则单射 (满射) 的概念与有效单射 (满射) 的概念等价.

命题 1.3.14

设某范畴中 $f: X \rightarrow Y$ 有核偶, 那么 f 是正则满射当且仅当 f 是有效满射.
对偶地, 设 f 有余核偶, 那么 f 是正则单射当且仅当 f 是有效单射.

证明. 由定义, 若 f 是有效满射, 则 f 是正则满射. 反之, 设 f 是两个态射 $g, h: Z \rightarrow X$ 的

余等化子. 那么有如下交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
 Z & & & & \\
 \downarrow (g,h) & \searrow h & & & \\
 X \times_Y X & \xrightarrow{p_2} & X & & \\
 \downarrow p_1 & & \downarrow f & & \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & &
 \end{array}$$

(Note: The diagram shows a curved arrow from Z to X labeled g, and a curved arrow from Z to X labeled h. The central square is a pullback of X over Y.)

此时若态射 $X \rightarrow W$ 余等化 p_1, p_2 , 那么它也余等化 g, h , 从而 (由 f 的性质) 穿过 Y . 这说明了 f 是其核偶的余等化子. \square

命题 1.3.15

在意象中单射都是正则单射.

证明. 由子对象分类子的定义 1.1.16, 单射 $U \hookrightarrow X$ 是 $\chi_U: X \rightarrow \Omega$ 与 $X \rightarrow 1 \xrightarrow{\top} \Omega$ 的等化子. \square

命题 1.3.16

在意象中, 既单又满的态射是同构.

证明. 设 $f: X \rightarrow Y$ 既单又满, 由命题 1.3.15, f 为等化子 $\text{eq}(g, h: Y \rightrightarrows Z)$. 而 f 满说明 $g = h$, 从而 f 为同构. \square

命题 1.3.17

在意象中满射都是正则满射.

证明. 由命题 1.3.24 后的另证, 满射 $f: X \rightarrow Y$ 可分解为 $X \xrightarrow{q} Q \xrightarrow{i} Y$, 且 q 为某个余等化子, i 为单射. 但 f 为满射推出 i 为满射, 从而由命题 1.3.16, i 为同构. \square

像

定义 1.3.18 (像)

对于范畴 \mathcal{C} 中的态射 $f: W \rightarrow X$, 若存在 f 穿过的最小子对象 $U \hookrightarrow X$, 则称其为 f 的像 (image), 记作 $\text{im } f$.

注 1.3.19 (像作为函子)

对固定的对象 X , 假设到 X 态射都有像, 则有一个函子 $\text{im}: \mathcal{C}/X \rightarrow \text{Sub}_{\mathcal{C}}(X)$, 它是嵌入函子⁶ $\text{Sub}_{\mathcal{C}}(X) \rightarrow \mathcal{C}/X$ 的左伴随; 对任意态射 $f: W \rightarrow X$ 与子对象 $U \hookrightarrow X$,

$$\text{im}(f: W \rightarrow X) \leq U \iff f: W \rightarrow X \text{ 穿过 } U.$$

命题-定义 1.3.20 (像与存在)


假设范畴 \mathcal{C} 存在拉回, 那么如下条件等价:

- (1) \mathcal{C} 的所有态射都有像.
- (2) 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 拉回 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 有左伴随 \exists_f .

证明. (1) \Rightarrow (2) 的证明. 假设所有函子 im 存在. 定义 \exists_f 为如下的复合,

$$\exists_f: \text{Sub}(X) \longrightarrow \mathcal{C}/X \xrightarrow{\Sigma_f} \mathcal{C}/Y \xrightarrow{\text{im}} \text{Sub}(Y).$$

(函子 Σ_f 的定义见 1.1.32.) 对于 X 的子对象 $\iota: U \hookrightarrow X$, 由定义 1.3.18, $\exists_f U \hookrightarrow Y$ 是 $f \circ \iota: U \rightarrow Y$ 穿过的最小子对象. 由拉回的泛性质, $f \circ \iota: U \rightarrow Y$ 穿过子对象 $V \hookrightarrow Y$ 对应于下图中唯一的态射 $U \rightarrow f^*(V)$.



(2) \Rightarrow (1) 的证明. 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 将函子 $\exists_f: \text{Sub}(X) \rightarrow \text{Sub}(Y)$ 作用于 id_X 就得到 f 的像. □

注 1.3.21 (集合范畴的情形)

在集合范畴中, $\exists_f(U)$ 可写为 $f(U)$, 也即 $\text{im}(f|_U: U \rightarrow Y)$. 所谓 \exists_f 为 f^* 的左伴随, 即对任意 $U \subset X$ 与 $V \subset Y$,

$$f(U) \subset V \iff U \subset f^*(V).$$

⁶注意 $\text{Sub}_{\mathcal{C}}(X)$ 的对象是单态射的等价类, 但这里为了构造函子, 可任取每个等价类中的一个代表元. 对于子对象 $U \rightarrow X$ 与 $V \rightarrow X$, 即使视为 \mathcal{C}/X 的对象, 两者之间也至多只有一个态射; 故 $\text{Sub}_{\mathcal{C}}(X)$ 可视为 \mathcal{C}/X 的全子范畴.

注 1.3.22 (为什么拉回的左伴随叫做“存在”)

考虑集合范畴中的一个特例. 取 $X = Y \times Z$, $f: Y \times Z \rightarrow Y$ 为投影. 将 $Y \times Z$ 的子集视为关于 y, z 的谓词 $P(y, z)$, 那么“存在”函子 \exists_f 将这个谓词变为关于 y 的谓词 $\exists z P(y, z)$ (其中只有 y 一个自由变量), 对应 Y 的子集 $\{y \mid \exists z P(y, z)\}$. 类似地, 拉回 f^* 的右伴随是“任意” \forall_f , 将谓词 $P(y, z)$ 变为关于 y 的谓词 $\forall z P(y, z)$, 对应 Y 的子集 $\{y \mid \forall z P(y, z)\}$.

注 1.3.23 (满射的像)

在一般的范畴中, 满射 $f: X \rightarrow Y$ 的像未必是 Y , 例如 1.3.10 提到的 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, 其像为 \mathbb{Z} . 若态射 $f: X \rightarrow Y$ 的像为 Y , 即 f 不能穿过 Y 的任何真子对象, 则称 f 为覆盖 (cover) (注意“覆盖”在本书中有多种含义). 容易证明正则满射都是覆盖, 且当拉回存在时, 覆盖都是满射.

满-单分解

集合的映射可分解为一个满射后接一个单射, 这称为映射的满-单分解 (epi-mono factorization).

命题 1.3.24 (满-单分解)

在意象中, 任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 的余核偶的等化子等于它的像 $\text{im}(f) \rightarrow Y$. 进而 f 可分解为一个满射 e 与一个单射 m :

$$X \xrightarrow{e} \text{im}(f) \xrightarrow{m} Y.$$

证明. 设 $f: X \rightarrow Y$ 的余核偶的等化子为 $M \hookrightarrow Y$, 给出分解 $X \xrightarrow{e} M \xrightarrow{m} Y$.

我们先证明 M 是 f 的像. 对任意子对象 $N \hookrightarrow Y$, 由命题 1.3.15 可设 N 是等化子 $\text{eq}(s, t: Y \rightarrow Z)$; 若 f 穿过 N , 则 f 也等化 s, t , 于是存在唯一的 $u: Y \sqcup_X Y \rightarrow Z$ 使下图交换,

$$\begin{array}{ccccc}
 & & Y & & \\
 & \nearrow & \downarrow t & \searrow & \\
 M & \xrightarrow{\exists!} & N & & Z \\
 & \searrow & \uparrow & \nearrow & \\
 & & Y & & \\
 & & \uparrow s & & \\
 & & Y \sqcup_X Y & & \\
 & \nearrow & \downarrow \exists! u & \searrow &
 \end{array}$$

这说明 $M \hookrightarrow Y$ 也等化 s, t , 由 N 的泛性质得 $M \leq N$. 这证明了 M 是 f 的像.

下面证明 $X \xrightarrow{e} M$ 为满射. 首先注意到, 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 若 $\text{im}(f) \rightarrow Y$ 是同构, 则 f 的余核偶是两个相同的态射, 因而 f 是满射. 现在考虑 $e: X \rightarrow M$ 的像, 得到分解

$$X \rightarrow M' \xrightarrow{m'} M \xrightarrow{m} Y,$$

则 f 穿过 Y 的子对象 M' , 但 M 是被 f 穿过的最小子对象, 故 $M' \xrightarrow{m'} M$ 为同构, e 为满射. \square

满-单分解还有一种证法, 从核偶的余等化子开始, 但与上面的证明并非完全对偶.

证明. (满-单分解另证) 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 设 $a, b: R \rightrightarrows X$ 是 f 的核偶, 而 $(q: X \rightarrow Q) = \text{coeq}(a, b)$, 这给出分解 $X \xrightarrow{q} Q \xrightarrow{i} Y$. 我们需要证明 $Q \xrightarrow{i} Y$ 为单射. 假设 i 余等化 $c, d: T \rightarrow Q$, 作如下拉回,

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{e} & T \\ (g,h) \downarrow & & \downarrow (c,d) \\ X \times X & \xrightarrow{q \times q} & Q \times Q \end{array}$$

那么 f 余等化 g, h . 根据核偶的定义, 这说明 $(g, h): S \rightarrow X \times X$ 穿过 $(a, b): R \rightarrow X \times X$, 那么由 q 的定义, q 余等化 g, h . 观察上图, 这说明 e 等化 c, d . 而 e 为满射 $q \times q$ 的拉回, 从而为满射 (命题 1.3.7), 故 $c = d$. \square

命题 1.3.25 (满-单分解的唯一性)

意象中任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 的满-单分解唯一 (在唯一同构的意义下).

证明. 设 f 有两个满-单分解 $f = me = ng$, 其中 m, n 为单射, e, g 为满射. 由单射是正则单射 (命题 1.3.15), 可将 m 写成等化子 $\text{eq}(p, q)$. 因为 f 等化 p, q 而 g 为满射, 所以 n 等化 p, q . 由等化子的泛性质, n 唯一地穿过 m . 结论得证. \square

子终对象

在数学上, “唯一” 和 “存在且唯一” 是不同的: 说一样东西唯一, 并不是说恰好有一个这种东西, 而是至多有一个这种东西; 等价的说法是, 若有两个这种东西, 那么两者相等 (此时这种东西完全有可能不存在). 在意象中, 如果某种东西的全体构成一个对象 X , 那么 “这种东西存在且唯一” 说的是 X 为终对象, 而 “这种东西唯一” 的意思是 X 为子终对象.

定义 1.3.26 (子终对象)

对范畴 \mathcal{C} 与对象 X , 若 \mathcal{C} 的任何对象到 X 有至多一个态射, 称 X 为子终对象 (subterminal object).

命题 1.3.27 (子终对象的等价定义)

- 当 \mathcal{C} 存在二元积时, X 是子终对象等价于对角线映射 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 为同构;
- 当 \mathcal{C} 存在终对象 1 时, X 是子终对象当且仅当唯一的映射 $X \rightarrow 1$ 是单射. (这解释了子终对象的名称.)

证明.

- 假设 \mathcal{C} 存在二元积. 注意到 $\text{pr}_i \circ \Delta = \text{id}_X$ ($i = 1, 2$). 若 X 为子终对象, 则 $X \times X$ 到 X 仅有一个态射, 故 $\text{pr}_1 = \text{pr}_2: X \times X \rightarrow X$, $\Delta \circ \text{pr}_1 = (\text{pr}_1, \text{pr}_1) = (\text{pr}_1, \text{pr}_2) = \text{id}_{X \times X}$. 这证明了 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 为同构. 另一方面, 设 Δ 为同构, 则 $(\text{pr}_1, \text{pr}_2) = \text{id}_{X \times X} = \Delta \circ \Delta^{-1} = (\Delta^{-1}, \Delta^{-1})$, 从而 $\text{pr}_1 = \Delta^{-1} = \text{pr}_2$, 从而对任意 $f, g: Y \rightarrow X$, $f = \text{pr}_1 \circ (f, g) = \text{pr}_2 \circ (f, g) = g$, 即 X 为子终对象.
- 假设 \mathcal{C} 中存在终对象 1 . 若 X 为子终对象, 则对任意 $f, g: Y \rightarrow X$, $f = g$, 这表明 $X \rightarrow 1$ 为单射. 另一方面, 设 $X \rightarrow 1$ 是单射, 则对任意 $f, g: Y \rightarrow X$, $X \circ f = X \circ g: Y \rightarrow 1$, 故 $f = g$.

□

在意象中, 子终对象一一对应于态射 $1 \rightarrow \Omega$, 也即真值.

例 1.3.28

$\text{Set} \times \text{Set}$ 的终对象为 $(1, 1)$, 有 4 个子终对象 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$, 即 4 个真值 $(\perp, \perp), (\perp, \top), (\top, \perp), (\top, \top)$.

例 1.2.7 介绍的意象 $\text{Fun}(2, \text{Set})$ 的终对象为 $1 \rightarrow 1$, 有 3 个子终对象 $0 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 1$, 即 3 个真值 \perp, \star, \top ; 我们提到过 \star 可理解为“将要成真”.

例 1.3.29 (俯范畴的子终对象)

俯范畴 \mathcal{C}/X 的终对象是 $\text{id}_X: X \rightarrow X$, 因此 \mathcal{C}/X 的子终对象是 X 的子对象 (见命题 1.1.31).

下面的命题表明子终对象能够控制意象如何分解为“连通分支”.

命题-定义 1.3.30 (意象的分解)

设 $(U_i)_{i \in I}$ 为意象 \mathcal{C} 的子终对象, 则如下条件等价:

- 典范的映射 $\coprod_i U_i \rightarrow 1$ 为同构;
- 函子 $\mathcal{C} \rightarrow \prod_i \mathcal{C}/U_i, X \mapsto (X \times U_i)_{i \in I}$ 为等价.

此时, 我们称 (U_i) 为意象 \mathcal{C} 的一个分解.

注 1.3.31

熟悉代数的读者可以看出, 子终对象类似于环论中的中心幂等元. 后面我们将看到子终对象与空间的“开子空间”概念有关.

子对象的格与 Heyting 代数

集合的子集可以取交和并, 这使得一个集合的所有子集构成一个格; 在意象中, 类似的操作可表达为子对象分类子 Ω 上的操作.

命题-定义 1.3.32 (子对象的交)

在具有拉回的范畴中, 定义子对象 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 的交是子对象 $U \times_X V \rightarrow X$.

$$\begin{array}{ccc} U \times_X V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

由拉回的定义, 它是同时包含于 X 和 Y 的最大子对象, 也即两个子对象的交.

命题-定义 1.3.33 (子对象的并)

在意象中, 定义子对象 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 的并为两者唯一确定的态射 $U + V \rightarrow X$ 的像 (定义 1.3.18). 由像的定义, 它是同时包含 X 和 Y 的最小子对象. 类似地可定义子对象的有限并.

由此, 意象中一个对象的子对象集合 $\text{Sub}(X)$ 构成一个格.

命题 1.3.34

在意象中, 沿态射 $f: X \rightarrow Y$ 的拉回 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 是格的同态.

证明. 这是因为 f^* 保持极限和余极限. □

定义 1.3.35 (Heyting 代数)

若一个偏序集作为范畴具有有限积和有限余积, 且为积闭范畴, 则称之为 *Heyting 代数*. 换言之, Heyting 代数 H 中有有限交 \wedge 与有限并 \vee (包括最大元 \top 和最小元 \perp), 且有一种运算 $\Rightarrow: H \times H \rightarrow H$, 满足

$$z \leq (x \Rightarrow y) \quad \text{当且仅当} \quad (z \wedge x) \leq y.$$

这里 $x \Rightarrow y$ 就是指数对象 y^x 换了一个记号, 而上述等价正是定义 1.1.2 中的自然同构. 此外, 定义 Heyting 代数 H 上的“非”运算 $\neg: H \rightarrow H$,

$$\neg x = (x \Rightarrow \perp).$$

Heyting 代数的同态是保持有限积, 有限余积和指数对象的函子, 也即保持上述所有结构 $\wedge, \vee, \top, \perp, \Rightarrow, \neg$ 的偏序集映射.

定义 1.3.35 中的运算符号提示我们, Heyting 代数的元素可视为某种命题.

注 1.3.36

$x \Rightarrow y$ 的万有性质可叙述如下: 它是使得 $(z \wedge x) \leq y$ 的 z 的最大值, “由命题 x 想要推出 y 还需要的最弱命题” (当 $z \leq w$ 时, 我们认为 z 强于 w).

注 1.3.37 (内部和外部的蕴涵)

在 Heyting 代数中, $x \Rightarrow y$ 和 $x \leq y$ 均表示“ x 蕴涵 y ”, 但前者是“内部”的命题 (即 Heyting 代数中的一个元素), 后者是“外部”的命题. 由定义 1.3.35 (令 $z = \top$), 可知 $(x \Rightarrow y) = \top$ 当且仅当 $x \leq y$.

例 1.3.38 (拓扑空间的开集代数)

拓扑空间 X 的开集构成的偏序集 $\text{Open}(X)$ 是 Heyting 代数; 其中 \wedge 与 \vee 是开集的交与并, $\top = X$, $\perp = \emptyset$, 运算 \Rightarrow 为

$$(U \Rightarrow V) = \bigcup \{O \in \text{Open}(X) \mid O \cap U \subset V\},$$

特别地, $\neg U = \bigcup \{O \in \text{Open}(X) \mid O \cap U = \emptyset\}$ 是 U 的补集的内部. 这个 Heyting 代数是后面介绍的位象的例子.

命题 1.3.39

Heyting 代数是分配格, 即满足分配律 $z \wedge (x \vee y) = (z \wedge x) \vee (z \wedge y)$ 的格.

证明. 这是积闭范畴中的分配律 (命题 1.1.9). □

命题 1.3.40 (Heyting 代数中关于 \Rightarrow 的恒等式)

在 Heyting 代数中,

- (1) $(x \Rightarrow (y \Rightarrow z)) = ((x \wedge y) \Rightarrow z)$;
- (2) $((x \vee y) \Rightarrow z) = ((x \Rightarrow z) \wedge (y \Rightarrow z))$, 特别地, $\neg(x \vee y) = (\neg x) \wedge (\neg y)$;
- (3) $(x \Rightarrow (y \wedge z)) = (x \Rightarrow y) \wedge (x \Rightarrow z)$.

证明. 这是指数对象的性质 (命题 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11). □

注 1.3.41

Heyting 代数可以作为直觉主义命题演算 (intuitionistic propositional calculus) 的模型. 在例 1.3.38 中, $U \vee \neg U$ 和 $(\neg \neg U) \Rightarrow U$ 都不一定等于 \top . 这体现了直觉主义逻辑中没有排中律或双重否定律.

命题 1.3.42

在意象中, 子对象的格 $\text{Sub}(X)$ 是 Heyting 代数. 进一步, 沿态射 $f: X \rightarrow Y$ 的拉回 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 是 Heyting 代数的同态.

证明. 由于 $\text{Sub}_C(X) \simeq \text{Sub}_{C/X}(1)$ (例 1.3.29), 我们只需对 $X = 1$ 的情形证明结论.

对于子终对象 U, V , 对任意对象 X , $\text{Hom}(X, V^U) \simeq \text{Hom}(X \times U, V)$ 至多有一个元素, 故 V^U 也是子终对象. 这说明 $\text{Sub}(1)$ (作为范畴) 有指数对象, 从而是 Heyting 代数.

由命题 1.1.43, 拉回保持俯范畴中的指数对象, 从而保持子对象 Heyting 代数中的 “ \Rightarrow ” 运算. 结合命题 1.3.34, 知 f^* 为 Heyting 代数同态. □

值得一提的是, 命题 1.3.42 对更一般的 Heyting 范畴 (Heyting 范畴是指子对象的拉回 f^* 有右伴随 \forall_f , 见定义 B.2.8) 都成立. 对于子对象 $i: U \hookrightarrow X$ 与 $V \hookrightarrow X$, 可定义 $U \Rightarrow V$ 为 $\forall_i(U \cap V) \in \text{Sub}(X)$.

注 1.3.43 (Ω 是内蕴 Heyting 代数)

由命题 1.3.42 以及子对象分类子的性质, 我们知道 $\text{Sub}(X) \simeq \text{Hom}(X, \Omega)$ 上有自然的 Heyting 代数结构; 自然性意味着我们可以开动米田机器, 得到

Ω 是意象中的内蕴 Heyting 代数.

例如 $\text{Hom}(X, \Omega)$ 上的 “ \vee ” 运算 $\vee: \text{Hom}(X, \Omega) \times \text{Hom}(X, \Omega) \rightarrow \text{Hom}(X, \Omega)$ (作为自然变换) 等同于 $\vee: \text{Hom}(X, \Omega \times \Omega) \rightarrow \text{Hom}(X, \Omega)$, 等同于一个态射 $\vee: \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega$. 类似地, 可证明对意象中的任意对象 X , 幂对象 PX 为内蕴 Heyting 代数.

下面具体写出内蕴 Heyting 代数 Ω 的结构态射.

定义 1.3.44 (假)

假 (false) $\perp: 1 \rightarrow \Omega$ 是子对象 $0 \rightarrow 1$ 的特征函数, 即下图是子对象的拉回.

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \top \\ 1 & \xrightarrow{\perp} & \Omega \end{array}$$

命题 1.3.45 (最小子对象与假)

对象 X 的最小子对象 $0 \rightarrow X$ (命题 1.3.3) 的特征函数是

$$\perp_X: X \rightarrow 1 \xrightarrow{\perp} \Omega.$$

证明. 在下图中, 两个小方块均为拉回, 从而长方形为拉回.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \longrightarrow & 1 & \xrightarrow{\perp} & \Omega \end{array}$$

□

定义 1.3.46 (非)

非 (not) $\neg: \Omega \rightarrow \Omega$ 是假 $\perp: 1 \rightarrow \Omega$ 的特征函数, 即下图是子对象的拉回.

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & 1 \\ \perp \downarrow & & \downarrow \top \\ \Omega & \xrightarrow{\neg} & \Omega \end{array}$$

命题 1.3.47

作为 Ω 的子对象有 $(\perp: 1 \rightarrow \Omega) = \neg(\top: 1 \rightarrow \Omega)$.

证明. 对任何子对象 $f: X \rightarrow \Omega$, 若 $X \wedge (\top: 1 \rightarrow \Omega) = 0$, 即下图为拉回, 由命题 1.3.45 有分解 $f = X \rightarrow 1 \xrightarrow{\perp} \Omega$, 也即 $X \leq (\perp: 1 \rightarrow \Omega)$. 这证明了 $(\perp: 1 \rightarrow \Omega) = \neg(\top: 1 \rightarrow \Omega)$.

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

□

命题 1.3.48 (子对象的“非”与 Ω 上的“非”)

设子对象 $U \hookrightarrow X$ 的特征函数是 $\chi: X \rightarrow \Omega$, 则 $\neg U$ 的特征函数是 $X \xrightarrow{\chi} \Omega \xrightarrow{\neg} \Omega$.

证明. 拉回 $\chi^*: \text{Sub}(\Omega) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 保持 “ \Rightarrow ” 运算 (命题 1.3.42), 也保持 0 (最小子对象), 从而保持 “ \neg ” 运算. 由命题 1.3.47, $\chi^*\perp = \chi^*(\neg\top) = \neg\chi^*\top = \neg U$, 即下图中左边的方块为拉回. 这说明长方形为拉回, 即 $\neg U$ 的特征函数是 $X \xrightarrow{\chi} \Omega \xrightarrow{\neg} \Omega$.

$$\begin{array}{ccccc} \neg U & \longrightarrow & 1 & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \perp & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{\chi} & \Omega & \xrightarrow{\neg} & \Omega \end{array}$$

□

定义 1.3.49 (且)

且 (and, 又叫合取, conjunction) $\wedge: \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega$ 是 $(\top, \top): 1 \rightarrow \Omega \times \Omega$ 的特征函数, 即下图是子对象的拉回.

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & 1 \\ (\top, \top) \downarrow & & \downarrow \top \\ \Omega \times \Omega & \xrightarrow{\wedge} & \Omega \end{array}$$

命题 1.3.50 (子对象的交与 Ω 上的“且”)

设子对象 $U \hookrightarrow X$, $V \hookrightarrow X$ 的特征函数分别是 $\chi_U, \chi_V: X \rightarrow \Omega$, 则 $U \wedge V$ 的特征函数是 $X \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} \Omega \times \Omega \xrightarrow{\wedge} \Omega$.

证明. 首先注意到下图为拉回,

$$\begin{array}{ccc} 1 \times 1 & \xrightarrow{\top \times \text{id}_1} & \Omega \times 1 \\ \text{id}_1 \times \top \downarrow & & \downarrow \text{id}_\Omega \times \top \\ 1 \times \Omega & \xrightarrow{\top \times \text{id}_\Omega} & \Omega \times \Omega \end{array}$$

(这张图实际上是万有的“两个子对象的交”, 即任何“两个子对象的交”都可以通过这张图的拉回得到) 并且在下图中, 由右边方块及长方形为拉回可得左边方块为拉回.

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & 1 \times \Omega & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \top \times \text{id}_\Omega & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} & \Omega \times \Omega & \xrightarrow{\pi_1} & \Omega \end{array}$$

由拉回 $(\chi_U, \chi_V)^*: \text{Sub}(\Omega \times \Omega) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 保持“ \wedge ”运算 (命题 1.3.42), 知 $U \wedge V = (\chi_U, \chi_V)^*((\top, \top): 1 \rightarrow \Omega \times \Omega)$. \square

定义 1.3.51 (偏序)

在一般的范畴中, 若 $X \times X$ 的子对象 (即 X 上的关系) R 满足以下条件, 则称之为 X 上的一个偏序.

- (自反性) $\Delta \leq R$;
- (传递性) $p_{12}^* R \wedge p_{23}^* R \leq p_{13}^* R$;
- (反对称性) $\text{eq}(R, \sigma R) = \Delta$.

其中 Δ, σ, p_{12} 等符号的含义见定义 1.3.12.

命题-定义 1.3.52 (Ω 上的偏序)

等化子 $\text{eq}(\wedge, \pi_1) \rightarrow \Omega \times \Omega$ 是 Ω 上的偏序, 记之为 \leq .

证明.

- 由 \wedge 的定义易得 $\wedge \Delta = \text{id}_\Omega = \pi_1 \Delta$, 所以 $\Delta \leq \text{eq}(\wedge, \pi_1)$, 即自反性;
- 对任意 $U \hookrightarrow \Omega^3$, $U \leq p_{12}^* \text{eq}(\wedge, \pi_1)$ 当且仅当 $p_1 U \wedge p_2 U = p_1 U$, 即 $p_1 U \leq p_2 U$. 这证明了传递性.
- 注意到 $\sigma \leq = \text{eq}(\wedge, \pi_2)$, 故对任意 $V \hookrightarrow \Omega^2$, $V \leq \text{eq}(\leq, \sigma \leq)$ 当且仅当 $p_1 V = p_2 V$, 即 $V \leq \Delta$. 此即反对称性.

□

定义 1.3.53 (蕴涵)

蕴涵 $\Rightarrow: \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega$ 是偏序 \leq 的特征函数.

命题 1.3.54 (子对象的“ \Rightarrow ”与 Ω 上的“ \Rightarrow ”)

设子对象 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 的特征函数分别是 $\chi_U, \chi_V: X \rightarrow \Omega$, 则 $U \Rightarrow V$ 的特征函数是 $X \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} \Omega \times \Omega \xrightarrow{\Rightarrow} \Omega$.

证明. 对任意子对象 $W \rightarrow X$,

$$\begin{aligned}
 W \leq (U \Rightarrow V) &\Leftrightarrow (W \wedge U) \leq V \\
 &\Leftrightarrow (W \wedge U) = (W \wedge U \wedge V) \\
 &\Leftrightarrow (W \wedge U) = (W \wedge U) \wedge (W \wedge V) \\
 &\Leftrightarrow W \rightarrow X \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} \Omega \times \Omega \text{ 等化 } \wedge, \pi_1 \quad (*) \\
 &\Leftrightarrow \text{有交换图} \quad \begin{array}{ccccc} W & \xrightarrow{\quad} & \text{eq}(\wedge, \pi_1) & \xrightarrow{\quad} & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \tau \\ X & \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} & \Omega \times \Omega & \xrightarrow{\Rightarrow} & \Omega \end{array}
 \end{aligned}$$

这证明了 $U \Rightarrow V$ 的特征函数是 $X \xrightarrow{(\chi_U, \chi_V)} \Omega \times \Omega \xrightarrow{\Rightarrow} \Omega$. 其中 $(*)$ 使用了如下事实: $W \wedge U$ 作为 W 的子对象, 其特征函数为 $W \rightarrow X \xrightarrow{\chi_U} \Omega$. □

关于子对象的并还有如下实用的结论.

命题 1.3.55

在意象 \mathcal{C} 中, 设 $i: U \rightarrow X, j: V \rightarrow X$ 为不相交的子对象 (即 $U \wedge V = 0$). 那么两者的并为 $(i, j): U + V \rightarrow X$.

证明. 考虑沿 $i: U \rightarrow X$ 的拉回 $i^*\mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/U$, 有 $i^*(U) = U, i^*(V) = 0$. 由拉回保持和, 知 $i^*(U + V) = U$, 即下图为拉回.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\iota_1} & U + V \\ \text{id}_U \downarrow & & \downarrow (i, j) \\ U & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

此图亦可理解为, 对于沿 $(i, j): U + V \rightarrow X$ 的拉回 $(i, j)^*: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/(U + V)$, 有 $(i, j)^*(U) = U$. 同理, $(i, j)^*(V) = V$. 由拉回保持和, 知 $(i, j)^*(U + V) = U + V$. 而这说明 $U + V \rightarrow X$ 为子对象 (命题 1.3.4), 从而为两个子对象 U, V 的并. □

自然数对象

将一个意象看作一个集合宇宙, 我们有时关心是否存在无穷集合. 最基本的无穷集合是自然数的集合, 它是由一个泛性质定义的. 自然数集合的存在性又叫 *Peano 公理*.

定义 1.3.56 (自然数对象)

意象 \mathcal{C} 中的自然数对象 (natural numbers object) 是一个对象 N , 以及态射 $0: 1 \rightarrow N$ (零), $s: N \rightarrow N$ (后继), 满足如下的泛性质: 对 \mathcal{C} 的任意对象 X , 任意态射 $\tilde{0}: 1 \rightarrow X$, $\tilde{s}: X \rightarrow X$, 存在唯一的态射 $f: N \rightarrow X$ 使得下图交换.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \xrightarrow{0} & N & \xrightarrow{s} & N \\ \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow f \\ 1 & \xrightarrow{\tilde{0}} & X & \xrightarrow{\tilde{s}} & X \end{array}$$

换言之, 如下“递推方程”的解 f 存在且唯一:

$$\begin{cases} f(0) = \tilde{0}, \\ f(sn) = \tilde{s}(f(n)). \end{cases}$$

命题 1.3.57

在一个意象中, $0: 1 \rightarrow N$ 与 $s: N \rightarrow N$ 构成自然数对象的充要条件是 $(0, s): 1 + N \rightarrow N$ 为同构且 $1, s$ 的余等化子为 $N \rightarrow 1$.

注 1.3.58 (始代数)

自然数对象 N 的泛性质亦可叙述为, N 是函子 $X \mapsto 1 + X$ 的始代数 (initial algebra). 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 的代数是指一个对象 X 配备一个态射 $FX \rightarrow X$, 而始代数是代数的范畴中的始对象. 结论 1.3.57 的一部分可由 Lambek 定理得出, 这个定理说对于函子 F 的始代数, $FX \rightarrow X$ 必然是同构.

例 1.3.59 (自然数对象不一定存在)

有限集范畴 \mathbf{Fin} 中不存在自然数对象, 因为对有限集合 S , $1 + S$ 与 S 不可能同构.

无交和

在意象中一个重要而不平凡的性质是“和无交”.

命题 1.3.60

在意象中, 设下图为推出, 且 f 为单射,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Z \\ f \downarrow & & \downarrow i \\ Y & \xrightarrow{j} & W \end{array}$$

那么 i 亦为单射, 且该图同时为拉回.

证明. 由 f 为单射, 知 $(f, g): X \rightarrow Y \times Z$ 为单射, 设其对应映射 $h: Y \rightarrow PZ$. 我们首先说明

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Z \\ f \downarrow & & \downarrow \{-\}_Z \\ Y & \xrightarrow{h} & PZ \end{array}$$

为拉回. 其中 $\{-\}_Z$ 是“单元集”映射 (定义 1.1.21). 这是因为自然同构 $\text{Hom}(-, PZ) \simeq \text{Sub}(- \times Z)$ 以及有如下的子对象的拉回 (斜向箭头为子对象).

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{g} & Z & & \\ \text{id}_X \downarrow & \searrow (\text{id}_X, g) & & \searrow \Delta_Z & \\ X & & X \times Z & \xrightarrow{g \times \text{id}_Z} & Z \times Z \\ & \searrow (f, g) & \downarrow f \times \text{id}_Z & & \\ & & Y \times Z & & \end{array}$$

然后考虑下图. 由 $\{-\}_Z$ 为单射, 知 i 为单射. 由外圈为拉回知原图亦为拉回.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{g} & Z & & \\ f \downarrow & & \downarrow i & & \searrow \{-\}_Z \\ Y & \xrightarrow{j} & W & & \\ & & & \searrow & \\ & & & & PZ \end{array}$$

h (从 Y 到 PZ 的曲线箭头)

□

考虑意象中的单射 $0 \rightarrow X$, 我们得到如下推论.

命题 1.3.61 (和无交)

对于意象中任意两个对象 X, Y , 推出图

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X + Y \end{array}$$

同时为拉回, 且图中态射均为单射. 换言之, X, Y 作为 $X + Y$ 的子对象不相交.

命题 1.3.62 (意象为广延范畴)

对于意象 \mathcal{C} 中任意两个对象 X, Y , 典范的函子

$$+ : \mathcal{C}/X \times \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/(X + Y), \quad \left(\begin{array}{cc} Z_1 & Z_2 \\ \downarrow f_1 & \downarrow f_2 \\ X & Y \end{array} \right) \mapsto \begin{array}{c} Z_1 + Z_2 \\ \downarrow f_1 + f_2 \\ X + Y \end{array}$$

为等价. 人们称满足该性质的范畴为广延范畴 (extensive category).

证明. 记 $i_1: X \rightarrow X + Y, i_2: Y \rightarrow X + Y$ 为嵌入, 我们断言两个拉回函子的乘积

$$(i_1^*, i_2^*): \mathcal{C}/(X + Y) \rightarrow \mathcal{C}/X \times \mathcal{C}/Y$$

是 $+$ 的逆.

一方面, 对任意态射 $\begin{array}{c} Z \\ \downarrow f \\ X + Y \end{array}$, 考虑如下两个拉回,

$$\begin{array}{ccccc} Z_1 & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & Z_2 \\ \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{i_1} & X + Y & \xleftarrow{i_2} & Y \end{array}$$

此图亦可视为沿 f 的拉回. 由于拉回保持和, 有 $Z = Z_1 + Z_2$.

另一方面, 对任意两个态射 $\begin{array}{cc} Z_1 & Z_2 \\ \downarrow f_1 & \downarrow f_2 \\ X & Y \end{array}$, 由于以下两图为拉回 (其中右图为拉回是由于

命题 1.3.61), 以及拉回保持和, 知 $i_1^*(Z_1 + Z_2) = Z_1$.

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{\text{id}_{Z_1}} & Z_1 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow i_1 f_1 \\ X & \xrightarrow{i_1} & X + Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & Z_2 \\ \downarrow & & \downarrow i_2 f_2 \\ X & \xrightarrow{i_1} & X + Y \end{array}$$

□

Boole 意象与选择公理

意象是类似于集合范畴的范畴, 而 Boole 意象由于排中律的存在而比一般的意象 更像是 (经典逻辑意义下的) 集合范畴.⁷

定义 1.3.63 (Boole 代数)

满足排中律 $\neg\neg x = x$ (或等价地 $x \vee \neg x = \top$) 的 Heyting 代数称为 *Boole 代数*. Boole 代数的同态即为对应的 Heyting 代数的同态.

命题-定义 1.3.64 (Boole 意象)

对于意象 \mathcal{C} , 如下条件等价.

- (1) 子对象分类子 Ω 是 \mathcal{C} 的内蕴 Boole 代数, 即非运算 $\neg: \Omega \rightarrow \Omega$ 满足 $\neg\neg = \text{id}_\Omega$, $\vee \circ (\text{id}_\Omega, \neg) = \top_\Omega$;
- (2) (“排中律”) 对任意对象 X , $\text{Sub}(X)$ 为 Boole 代数, 即对任意子对象 $U \rightarrow X$, 有 $\neg\neg U = U$, $U \vee \neg U = X$;
- (3) 态射 $(\top, \perp): 1 + 1 \rightarrow \Omega$ 为同构.

称满足上述条件的意象为 *Boole 意象* (Boolean topos).

证明. 由米田引理, (1) 等价于 (2).

- (2) \Rightarrow (3). 由于 $\top, \perp: 1 \rightarrow \Omega$ 是两个不相交的子对象, 两者的并为 $(\top, \perp): 1 + 1 \rightarrow \Omega$ (命题 1.3.55). 假设排中律 (2) 成立, 那么子对象 $\top, \perp: 1 \rightarrow \Omega$ 的并等于 Ω .
- (3) \Rightarrow (1). 条件 (3) 说的正是 $1 + 1$ 为子对象分类子, 而 $\top: 1 \rightarrow 1 + 1$ 为万有子对象. 此时, 非运算 $\neg: 1 + 1$ 不过是交换两个分量.

□

例 1.3.65

$\text{Set} \times \text{Set}$ 是 Boole 意象.

注 1.3.66 (Boole 与二值性无关)

注意 Boole 意象中尽管有“排中律”, 但不一定只有两个真值 (后者称为意象的二值性). 例如 $\text{Set} \times \text{Set}$ 是 Boole 的, 但有 4 个真值. 反过来, 只有两个真值的意象也不

⁷我尊敬的一位同学 Trebor 提醒大家注意 Boole 不是 Bool. 后者只是一个常见缩写.

一定是 Boole 意象.

为了陈述选择公理, 我们需要投射对象的概念. 它与同调代数中投射模的概念类似.

定义 1.3.67 (投射对象)

设 \mathcal{C} 为范畴, 称对象 X 为投射对象是指 $\text{Hom}(X, -): \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 保持满射.

命题-定义 1.3.68 (选择公理)

设 \mathcal{C} 为范畴, 那么以下条件等价,

- \mathcal{C} 的每个对象都是投射对象.
- \mathcal{C} 中的每个满射都存在截面, 即对任意满射 $p: X \rightarrow I$ (类比于“以 I 为指标的集合族”), 存在 $s: I \rightarrow X$ 使得 $ps = \text{id}_I$ (“在集合族的每个成员中选择一个元素”).

称上述条件为选择公理.

证明. 假设 \mathcal{C} 的每个对象都是投射的. 对于满射 $p: X \rightarrow I$, 由于 I 是投射的, 有

$$p_*: \text{Hom}(I, X) \rightarrow \text{Hom}(I, I)$$

为满射, 故存在 $s \in \text{Hom}(I, X)$ 使得 $ps = \text{id}_I$.

假设 \mathcal{C} 中的每个满射都存在截面. 有截面的映射在任何函子作用下仍是满射, 故任何函子 $\text{Hom}(Y, -)$ 都保持满射. \square

命题-定义 1.3.69 (内蕴选择公理)

设 \mathcal{C} 为意象. 称 \mathcal{C} 满足内蕴选择公理是指对任何对象 Y , 函子 $(-)^Y: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 保持满射 (此时称 Y 是内蕴投射的).

容易证明选择公理可以推出内蕴选择公理, 但反之不然.

例 1.3.70 (不满足选择公理的例子)

为了说明选择公理不是理所当然的性质, 我们举两个最简单的意象中满射没有截面的例子. 第一个例子是变集范畴 (例 1.2.7), 如下态射是满射, 但没有截面.

$$\begin{array}{ccc}
 \{0, 1\} & \xrightarrow{\text{id}} & \{0, 1\} \\
 \text{id} \downarrow & & \downarrow \\
 \{0, 1\} & \longrightarrow & \{*\}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \boxed{\circ} \quad \boxed{\circ} \quad \rightleftarrows \quad \boxed{\circ \circ}
 \end{array}$$

直观上, $\{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ 是两个分开的点, $\{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ 是两个粘在一起的点, 上述态射没有截面就是说两个粘在一起的点无法分开 (右上图).

第二个例子是 $\text{Fun}(B\mathbb{N}, \text{Set})$, 其中 $B\mathbb{N}$ 是将半群 \mathbb{N} 视为单对象范畴. 这个范畴的对象是集合 X 配备一个映射 $f: X \rightarrow X$. 态射

$$\begin{array}{ccc}
 \{0, 1\} & \longrightarrow & \{*\} \\
 \begin{smallmatrix} 0 \mapsto 1 \\ 1 \mapsto 0 \end{smallmatrix} \downarrow & & \downarrow \\
 \{0, 1\} & \longrightarrow & \{*\}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{一个自交的圈} \quad \rightleftarrows \quad \text{一个椭圆}
 \end{array}$$

是满射, 但没有截面. 一个类似的例子是 $\text{Sh}(S^1)$ 中 S^1 的非平凡二重覆叠没有截面 (右图).

命题 1.3.71

假设意象 \mathcal{C} 满足内蕴选择公理, 那么对其中任意满射 $f: Z \rightarrow X$, 都有 $\Pi_X(f) \rightarrow 1$ 是满射. 进一步, 记 $S = \Pi_X(f)$, 则 $S^*Z \rightarrow S^*X$ (作为意象 \mathcal{C}/S 中的映射, 定义见例 1.1.35) 有截面.

证明. 回忆 $\Pi_X(f)$ 是 $f^X: Z^X \rightarrow X^X$ 沿 $\text{id}_X: 1 \rightarrow X^X$ 的拉回 (命题 1.1.36 的证明), 而拉回保持满射 (命题 1.3.7), 故 $\Pi_X(f) \rightarrow 1$ 是满射. 映射 $S^*Z \rightarrow S^*X$ 的截面由取值映射 $S \times X \hookrightarrow Z^X \times X \xrightarrow{\text{ev}} Z$ 给出. \square

$\Pi_X(f)$ 是 “ f 的截面的集合”, 所以内蕴选择公理是说满射在某种内蕴的意义上有截面.

命题 1.3.72 (Diaconescu)

满足内蕴选择公理的意象一定是 Boole 的.

证明. 考虑任意子对象 $U \hookrightarrow X$. 由于单射是余核偶的等化子 (命题 1.3.15), 有 $U = \text{eq}(X \rightrightarrows X \sqcup_U X)$. 我们的思路是考虑满射 $(X \sqcup X) \rightarrow (X \sqcup_U X)$ 的 “截面”, 从而得到 $U \vee \neg U$. 假设它有截面 $s: (X \sqcup_U X) \rightarrow (X \sqcup X)$, 如左图,

$$\begin{array}{ccc}
 V \xrightarrow{f} X & \xrightarrow[\text{\scriptsize } si_2]{\text{\scriptsize } si_1} & X \sqcup X \xrightarrow{t} 1 + 1 \\
 & \searrow \text{\scriptsize } i_1 \quad \nearrow \text{\scriptsize } s & \\
 & X \sqcup_U X & \\
 & \nwarrow \text{\scriptsize } i_2 & \\
 & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow[\text{\scriptsize } si_2 f]{\text{\scriptsize } si_1 f} & X \sqcup X \xrightarrow{t} 1 + 1 \\
 & \searrow f & \downarrow \\
 & & X
 \end{array}$$

那么 s 为单射, 故对任何映射 $f: V \rightarrow X$, f 等化 i_1, i_2 当且仅当 f 等化 si_1, si_2 . 而 $X \sqcup X \simeq X \times (1 + 1)$, 如右图, 故 f 等化 si_1, si_2 等价于 f 等化 tsi_1, tsi_2 . 这说明 $(U \hookrightarrow X) = \text{eq}(tsi_1, tsi_2: X \rightrightarrows 1 + 1)$.

我们说明若子对象 $U \rightarrow X$ 是两个映射 $f, g: X \rightarrow 1 + 1$ 的等化子, 则 $U \vee \neg U = X$. 考虑下图, 其中 $1_\top, 1_\perp$ 均代表终对象 1 ,

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & 1_\top + 1_\perp & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \Delta & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{(f,g)} & (1_\top + 1_\perp) \times (1_\top + 1_\perp) & \xrightarrow{\delta} & 1_\top + 1_\perp \end{array}$$

U 为等化子等价于左边方块为拉回. 而由于和无交 (1.3.61), 图中的 Δ 作为 $(1_\top + 1_\perp) \times (1_\top + 1_\perp)$ 的子对象满足排中律, 也即右边方块为拉回. 这意味着大长方形为拉回, 故 U 满足 $U \vee \neg U = X$.

上述讨论证明的是满射 $(X \sqcup X) \rightarrow (X \sqcup_U X)$ 有截面的情形, 现在证明一般情形. 由命题 1.3.71, 存在满射 $S \twoheadrightarrow 1$ 使得 $S^*(X \sqcup X) \rightarrow S^*(X \sqcup_U X)$ 有截面, 而拉回是子对象 Heyting 代数的同态 (命题 1.3.42), 套用前面证明的情形, 得 $S^*(U \vee \neg U) = S^*(X)$. 注意到由于 $S \rightarrow 1$ 是满射, 故 $S \times X \rightarrow X$ 是满射. 对任意态射 $V \rightarrow X$, 若 $S^*(V) \rightarrow S^*(X)$ 满, 则下图说明 $V \rightarrow X$ 是满射.

$$\begin{array}{ccc} S^*(V) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ S^*(X) & \twoheadrightarrow & X \end{array}$$

由此得 $U \vee \neg U = X$. □

另外, Bauer 的文章 (讲座) [3] 给出了 (外蕴) 选择公理推出排中律的一种证明.

第 2 章 位象：无点拓扑学

It is in some sense coincidental that $\operatorname{Spec} A$ is described by a topological space. What arises more canonically is the lattice of open subsets of $\operatorname{Spec} A$, which is generated by basic open sets of the form U_f . This lattice naturally forms a *locale*¹ ...

Jacob Lurie,
Derived Algebraic Geometry V: Structured Spaces

2.1 基本概念	54
2.2 位象的几何性质	60
子位象	60
Boole 位象	66
位象的满射	68
开映射	70
局部位象	71
局部连通位象	72
2.3 位象与逻辑	73
经典命题逻辑与 Boole 代数	73
几何逻辑与位格	77

常常拓扑空间的重点不在于点, 而在于开集, 以及开集之间的关系. 将开集的性质提炼出来, 使其不再依赖于点, 就成为位象 (locales) 的概念. 它是介于拓扑空间和景之间的一

¹ 见例 2.1.12.

个推广.² 位象理论又称为无点拓扑学 (pointless topology³). 位象与逻辑的联系表明, 忘掉“点”并不是一个过分的抽象. 在 n -意象的观点中, 位象又可视作 0-意象. 正如意象是一种“集合宇宙”一样, 0-意象是一种“真值宇宙”. 因此位象理论某种意义上是意象的前置 (参见 André Joyal 的讲座 [18]).

2.1 基本概念

定义 2.1.1 (位格)

位格 (frame, 又称 local lattice)⁴是满足如下条件的偏序集:

- 存在有限交 \wedge 与任意并 \bigvee , 其中一族元素的交 (meet) 是指同时小于等于这些元素的最大元, 并 (join) 是指同时大于等于这些元素的最小元;
- 有结合律

$$a \wedge \bigvee_{i \in I} b_i = \bigvee_{i \in I} (a \wedge b_i),$$

其中 I 是任意集合.

位格的态射是偏序集之间保持有限交与任意并的态射. 位格的范畴记为 \mathbf{Frm} .

注 2.1.2

由于任意交可由任意并表示,

$$\bigwedge A = \bigvee \{b: b \leq a \ \forall a \in A\},$$

可以证明位格中任意交也存在, 即位格是完备格 (complete lattice). 但由定义, 位格的态射不一定保持任意交. 位格的结合律说明 $a \wedge (-)$ 保持任意并; 由偏序集的伴随函子定理 (命题 A.6.28), $a \wedge (-)$ 有右伴随 $a \Rightarrow (-)$, 因此我们得到位格是 *Heyting* 代数 (定义 1.3.35), 从而是完备 *Heyting* 代数. 但注意位格的同态不一定是 *Heyting* 代数的同态, 即不一定保持 \Rightarrow 运算. 保持 \Rightarrow 运算的位格同态对应位象的开映射 (命题 2.2.29).

²说位象是拓扑空间的“推广”不甚准确, 因为一般拓扑空间到位象的对应不是全忠实的 (有的空间开集太少). 但是“好”的空间范畴如 Hausdorff 空间范畴确实嵌入位象的范畴.

³双关笑话: 无点拓扑学不是 pointless (无用的).

⁴Frame 一词似乎没有通行的中文翻译. 这里试译为位格, 因为它是一种与拓扑相关的格 (lattice).

定义 2.1.3 (位象)

位象 (locale) 是位格的形式对偶, 即我们定义位象的范畴 \mathbf{Loc} 是位格范畴 \mathbf{Frm} 的对偶范畴. 对于位象 X , 我们记对应的位格为 $\mathcal{O}(X)$, 称其中的元素为 X 的开子集或开子空间; 对于位象的态射 $f: X \rightarrow Y$, 记对应的位格的态射为 $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$.

由于偏序集可视为范畴, 位象可构成一个 2-范畴 \mathcal{Loc} (定义 A.1.1): 对于 $f, g: X \rightarrow Y$, 若 $f^*(U) \leq g^*(U) (\forall U \in \mathcal{O}(Y))$, 则有唯一的 2-态射 $f \rightarrow g$.

注 2.1.4

位格与位象的对偶类似于环与仿射概形的对偶, 是代数-几何对偶的一例.

命题 2.1.5 (位象态射的等价定义)

位象的态射 $f: X \rightarrow Y$ 等同于一对伴随

$$\mathcal{O}(X) \begin{array}{c} \xleftarrow{f^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{f_*} \end{array} \mathcal{O}(Y),$$

满足 f^* 保持有限交. (注意, f_* 不一定是位格的同态, 即不一定保持任意并.)

证明. 首先, 若有上述伴随 $f^* \dashv f_*$, 则 f^* 保持任意并 (左伴随保持余极限, 命题 A.2.5).

另一方面, 若有映射 $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 保持任意并, 定义

$$f_*(U) := \bigvee \{V \in \mathcal{O}(Y) \mid f^*(V) \leq U\}.$$

那么

$$f^* f_*(U) = \bigvee \{f^*(V) \mid f^*(V) \leq U\} \leq U.$$

(这是伴随的余单位.) 由此可得 $V \leq f_*(U) \Leftrightarrow f^*(V) \leq U$, 即 $f^* \dashv f_*$. 这个结论是“伴随函子定理” (注 A.6.28) 的特例. \square

位象的态射作为伴随函子, 具有如下的重要性质.

命题 2.1.6

对位象的态射 $f: X \rightarrow Y$, 有

$$f^* f_* V \leq V \quad (V \in \mathcal{O}(X)), \quad U \leq f_* f^* U \quad (U \in \mathcal{O}(Y)),$$

$$f^* f_* f^* = f^*, \quad f_* f^* f_* = f_*.$$

证明. 前两式是伴随 $f^* \dashv f_*$ 的余单位和单位, 而后两式由前两式易得. 后两式也可由伴随函子的定义直接得到, 见定义 A.2.1. \square

例 2.1.7 (拓扑空间作为位象)

拓扑空间 X 的开集范畴 $\text{Open}(X)$ 构成一个位格. 对于连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 有伴随

$$\text{Open}(X) \xrightleftharpoons[f_*]{f^*} \text{Open}(Y),$$

其中 f^* 将 $U \in \text{Open}(Y)$ 映射到 $f^{-1}(U) \in \text{Open}(X)$, 保持有限交与任意并; 而 f_* 的表达式为

$$f_*(V) = \bigcup \{Y \text{ 的开集 } U \mid f^{-1}(U) \subset V\}.$$

由拓扑空间到位象的构造给出函子 $\text{Open}: \text{Top} \rightarrow \text{Loc}$.

例 2.1.8 (空位象)

空空间 \emptyset 作为位象, 对应的位格是一个元素的全序集 $\{\perp\}$. 它是 Loc 的始对象, Frm 的终对象.

例 2.1.9 (点作为位象)

单点空间 pt 对应的位象记作 $1 = \text{Open}(\text{pt})$. 它对应的位格是两个元素的全序集 $\{\top, \perp\}$ ($\perp < \top$). 位象 1 也称为终位象 (terminal locale), 因为它是 Loc 的终对象, Frm 的始对象.

例 2.1.10 (Sierpiński 空间)

定义 *Sierpiński* 空间 S 是以 $\{\top, \perp\}$ 为底层集合的拓扑空间, 有三个开集 $\emptyset, \{\top\}, \{\top, \perp\}$. 那么 $\mathcal{O}(S)$ 是三个元素的全序集. 位象 X 到 S 的态射一一对应于 X 的开子空间, 因为位格态射 $\mathcal{O}(S) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 由 $\{\top\}$ 的像唯一决定.

定义 2.1.11 (位象的点)

定义位象 X 的点为位象的态射 $p: 1 \rightarrow X$. 记位象 X 的点的集合为 $\text{Pt}(X)$.

位象 X 的一个点 $p: 1 \rightarrow X$ 对应位格态射 $p^*: \mathcal{O}(X) \rightarrow \{\perp, \top\}$. 由于它保持有限交与任意并, p^* 的核 (\top 的原像) 是 $\mathcal{O}(X)$ 的完全素滤子 (completely prime filter). (偏序集中的滤子是关于交封闭的向上封闭子集, 称 F 为完全素滤子是指当 $\bigvee_i U_i \in F$ 时, 至少有一个 U_i 属于 F .)

例 2.1.12 (环的谱作为位象)

在代数几何中, (交换) 环的谱 $\text{Spec } A$ 是由 A 的素理想的集合赋予 Zariski 拓扑定义的. 然而, 我们也可以直接刻画谱的“基础开集” U_f 生成的位格, 从而不需要使用环的素理想⁵. 定义 $\mathcal{O}(\text{Spec } A)$ 为如下生成元和关系表现的位格⁶.

$$\mathcal{O}(\text{Spec } A) := \langle U_f : f \in A \mid U_0 = \perp, U_1 = \top, U_{f+g} \leq U_f \vee U_g, U_{fg} = U_f \wedge U_g \rangle.$$

- 由关系 $U_{fg} = U_f \wedge U_g$, 有限个基础开集的交仍是基础开集, 从而 $\mathcal{O}(\text{Spec } A)$ 的任何元素都可写成 $\bigvee_i U_{f_i}$ ($f_i \in A$) 的形式; 即 U_f 构成 $\text{Spec } A$ 的一组开集基.
- 直观上, U_f 是空间 $\text{Spec } A$ 上的函数 f “非零”的地方, 而 $f+g$ 非零的地方包含于 f 与 g 各自非零的地方的并, fg 非零的地方恰为两者的交.
- $\text{Spec } A$ 的点 $p: 1 \rightarrow \text{Spec } A$ 一一对应于位格态射 $p^*: \mathcal{O}(\text{Spec } A) \rightarrow \{\top, \perp\}$, 给定这个态射 p^* 相当于对每个生成元 U_f ($f \in A$) 指定 $p^*(U_f) \in \{\top, \perp\}$ (直观上 $p^*(U_f)$ 表示函数 f 在 p 点是否可逆), 满足 $p^*(U_0) = \perp, p^*(U_1) = \top, p^*(U_{fg}) = p^*(U_f) \wedge p^*(U_g), p^*(U_{f+g}) \leq p^*(U_f) \vee p^*(U_g)$. 此时 $\{f \in A \mid p^*(U_f) = \perp\}$ 正是点 p 对应的素理想.
- 位格 $\mathcal{O}(\text{Spec } A)$ 有一个更显式的定义是 A 的根理想的集合. (理想 I 的根的定义为 $\sqrt{I} = \{a \mid \exists n \in \mathbb{N} a^n \in I\}$; 称理想 I 为根理想是指 $I = \sqrt{I}$.) $\text{Spec } A$ 的开子空间 $\bigvee_i U_{f_i}$ 对应于 A 的根理想 $\sqrt{(\{f_i\})}$.
- 对于 A 的一族元素 $\{f_i\}$, 所有开子空间 U_{f_i} 覆盖 $\text{Spec } A$ (即 $\bigvee_i U_{f_i} = \top$) 当且仅当 $(\{f_i\}) = (1)$, 即存在一族至多有限个非零的元素 a_i 使得 $\sum_i a_i f_i = 1$. 这给出了 Zariski 景的定义 (3.4.25).
- 基础开集 U_f 对应的开子位象同构于局部化的谱 $\text{Spec } A_f$, 并且也有生成元和关系的表现, 见例 2.2.10.

定义 2.1.13 (位象的点构成拓扑空间)

设 X 为位象, 我们定义 $\text{Pt}(X)$ 上的一个拓扑, 对每个元素 $U \in \mathcal{O}(X)$, 规定 $\text{Pt}(X)$ 的子集 $\{p \in \text{Pt}(X) \mid p^*(U) = \top\}$ 为开集. 于是有函子

$$\text{Pt}: \text{Loc} \rightarrow \text{Top}.$$

⁵值得一提的是, 构造主义数学青睐这种位象的观点, 因为环的素理想的存在性依赖选择公理. 关于构造主义数学与位象, 我们推荐读者阅读 Andrej Bauer 的文章 [3].

⁶位格就像群, 环等代数结构一样, 可使用生成元和关系刻画, 并且可由给定生成元的“自由代数”的商得到, 见注 2.3.16.

命题 2.1.14

拓扑空间与位象之间有伴随

$$\mathbf{Top} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{Open}} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{Pt}} \end{array} \mathbf{Loc}.$$

证明. 对于拓扑空间 S 与位象 X , 连续映射 $f: S \rightarrow \text{Pt}(X)$ 对应位格的态射

$$\mathcal{O}(X) \rightarrow \text{Open}(S), \quad U \mapsto \{p \in S \mid (f(p))^*(U) = \top\}.$$

反过来, 态射 $\varphi: \mathcal{O}(X) \rightarrow \text{Open}(S)$ 对应连续映射

$$S \rightarrow \text{Pt}(X), \quad p \mapsto \left(U \mapsto \begin{cases} \top & p \in \varphi(U) \\ \perp & p \notin \varphi(U) \end{cases} \right).$$

容易验证这给出了自然同构

$$\text{Hom}_{\mathbf{Top}}(S, \text{Pt}(X)) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Frm}}(\mathcal{O}(X), \text{Open}(S)) = \text{Hom}_{\mathbf{Loc}}(\text{Open}(S), X).$$

□

上述伴随远远不是范畴等价; 首先, 从拓扑空间对应的位象中不一定能重构出原来的拓扑空间, 例如所有平凡拓扑对应的位象都是终位象 1 .

然而, 对于分离性较好的空间, 其对应的位象确实能重构出这个空间:

定义 2.1.15 (清晰空间)

设 X 为拓扑空间. 若命题 2.1.14 中伴随的单位 $X \rightarrow \text{Pt Open}(X)$ 是同胚, 则称 X 为清晰空间 (sober space⁷). 换言之, 清晰空间的范畴是上述伴随给出的等价的全子范畴 (命题 A.2.8).

命题 2.1.16

Hausdorff (T_2) 空间都是清晰空间, 清晰空间都是 T_0 空间; 而清晰与 T_1 互不蕴涵, 例如 Sierpiński 空间清晰而不 T_1 , 无限集上的余有限拓扑 T_1 而不清晰.

另一方面, 从一个位象的所有点的信息也无法重构出这个位象: 下面的例子表明一个位象甚至可能没有点!

⁷Sober 的原义是清醒, 未喝醉. 直观上一个 sober 空间中的点没有过于“糊在一起”, 清晰可辨.

例 2.1.17 (没有点的位象的例子: 完备无原子 Boole 代数)

完备 Boole 代数是指存在任意交和任意并的 Boole 代数. 由定义, 完备 Boole 代数是位格. 称偏序集中的一个元素为原子, 是指除 \perp 以外没有比它更小的元素. 对任何完备 Boole 代数 B , 设 P 是 B 的完全素滤子, 则 $\bigwedge P$ 是 B 的原子. 这是因为, 假设 $x < \bigwedge P$, 则 $x \notin P$, 从而由 $\top = x \vee \neg x \in P$, 得 $\neg x \in P$. 这说明 $x < \neg x$, 故 $x = \perp$. 因此, 完备无原子 Boole 代数对应没有点的位象. 下面是两个完备无原子 Boole 代数的例子.

- 设 (X, \mathcal{A}, μ) 为 σ -有限测度空间, $N \subset \mathcal{A}$ 为零测集的理想, 那么商代数 \mathcal{A}/N 是完备 Boole 代数; 并且当 μ 无原子 (没有正测度的点) 时, \mathcal{A}/N 无原子.
- 设 X 为拓扑空间. 对于开集 $U \subset X$, 定义 $\neg U$ 是 U 的补集的内部. 考虑偏序集

$$\text{RO}(X) = \{U \in \text{Open}(X) \mid U = \neg\neg U\},$$

称为 X 的正则开集代数 (regular open algebra). 可以证明 $\text{RO}(X)$ 也是一个完备 Boole 代数. 其中的任意并由下式给出:

$$\bigvee_{i \in I} U_i = \neg\neg\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right).$$

若取空间 X 为欧氏空间, 则 $\text{RO}(X)$ 没有原子 (任何正则开集内都有一个更小的正则开集). 这是双重否定子位象 (2.2.23) 的特例.

例 2.1.18 (没有点的位象的例子: \mathbb{N} 到 \mathbb{R} 的满射的位象)

我们定义“ \mathbb{N} 到 \mathbb{R} 的满射的位象”. 考虑由元素 $U_{n,x}$ ($n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$) 生成的位格 $(U_{n,x})$ 的直观是这个位象中“满足 $f(n) = x$ 的元素构成的子集”), 商掉如下关系:

- (“每个 n 都有像”) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 有关系

$$\bigvee_{x \in \mathbb{R}} U_{n,x} = \top;$$

- (“每个 x 都有原像”) 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 有关系

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} U_{n,x} = \top;$$

- (“每个 n 有唯一的像”) 对每个 $n \in \mathbb{N}, x, y \in \mathbb{R} (x \neq y)$, 有关系

$$U_{n,x} \wedge U_{n,y} = \perp.$$

这个位象的一个点就是一个满射 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 所以它没有点.

2.2 位象的几何性质

子位象

正如许多“空间”的概念 (拓扑空间, 向量空间, 概形...) 一样, 位象有一种自然的“子空间”的概念; 当然, 子位象不是通过点集, 而是通过开集的代数定义的. 注意区分底层集合的单 (满) 射与范畴论意义上的单 (满) 态射. 拓扑空间的子空间不等于范畴论意义上的单态射; 类似地, 子位象的定义不是 \mathbf{Loc} 中的单态射, 而是其中的正则单射 (定义 1.3.8), 即 \mathbf{Frm} 中的正则满射.

命题-定义 2.2.1 (子位象)

对于位象的态射 $f: Y \rightarrow X$, 以下条件等价:

- (1) $f^*: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(Y)$ 为集合的满射;
- (2) $f_*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 为集合的单射;
- (3) $f^*f_* = \text{id}_{\mathcal{O}(Y)}$;

称满足上述条件的 f 为子位象, 又称位象的嵌入.

证明. (3) \Rightarrow (1), (3) \Rightarrow (2) 是显然的.

- (1) \Rightarrow (3). 假设 f^* 为满射. 因为 $(f^*f_*)f^* = f^*$ (命题 2.1.6), 所以 $f^*f_* = \text{id}_{\mathcal{O}(X)}$.
- (2) \Rightarrow (3). 假设 f_* 为单射. 因为 $f_*(f^*f_*) = f_*$ (命题 2.1.6), 所以 $f^*f_* = \text{id}_{\mathcal{O}(X)}$.


□

上面的条件 (3) 是自反子范畴的性质 (A.2.10) 的特例.

注 2.2.2

对于子位象 $i: Y \rightarrow X$, $\mathcal{O}(Y)$ 既可通过满射 i^* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的商, 又可通过单射 i_* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集.

请注意 $\mathcal{O}(Y)$ 通过 i_* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集时, 其中元素的直观不是包含于 Y 的开子空间, 而是“包含 Y 以外所有部分”的开子空间. 一种理解方式是 i_* 作为拉回的右伴随代表某种“依值乘积”, 而零元乘积是终对象 1, 故 Y 以外的所有部分都被填补了终对象 1.



上图显示了 i_*i^* 的直观, 即补上 Y 以外的所有部分.

命题 2.2.3 (X 的子位象作为 $\mathcal{O}(X)$ 上的等价关系)

对于 \mathbf{Frm} 中的态射 $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 若 f^* 为集合的满射, 则 f^* 为正则满射, 即存在子位格 $(\equiv_X) \hookrightarrow \mathcal{O}(Y) \times \mathcal{O}(Y)$,

$$\mathcal{O}(X) = \mathcal{O}(Y) / \equiv_X.$$

当然, 这也等价于 f 为 \mathbf{Loc} 中的正则单射.

证明. 令 (\equiv_Y) 为 f^* (底层集合意义下) 的核偶 (定义 1.3.11). 容易验证它关于有限交与任意并封闭, 即是 $\mathcal{O}(X) \times \mathcal{O}(X)$ 的子位格. \square

注 2.2.4 (子位象等同于商位格)

由命题 2.2.3, 子位象 $Y \rightarrow X$ 一一对应于 $\mathcal{O}(X)$ 上关于有限交与任意并封闭的等价关系 \equiv_Y , 即 “商位格”. 直观上, 若 $U, V \in \mathcal{O}(X)$ 满足 $U \equiv_Y V$, 则 U, V 与子空间 Y 的 “交” 相同.

命题 2.2.5

对于子位象 $i: Y \rightarrow X$,

- (1) i_* 保持任意交 (位格中任意交存在, 见注 2.1.2);
- (2) i_* 保持 “ \Rightarrow ” 运算;
- (3) 若将 $\mathcal{O}(Y)$ 通过 i_* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集, 则对任意 $U \in \mathcal{O}(X)$ 与 $W \in \mathcal{O}(Y)$, 有 $(U \Rightarrow W) \in \mathcal{O}(Y)$.

证明.

- (1) i_* 作为右伴随保持极限 (命题 A.2.5).

(2) 对任意 $W \in \mathcal{O}(X)$ 与 $U \in \mathcal{O}(Y)$,

$$i^*(W \wedge i_* U) = i^* W \wedge i^* i_* U = i^* W \wedge U,$$

故伴随 $i^* \dashv i_*$ 满足 Frobenius 互反律 (定义 A.2.17), 这说明 i_* 保持指数对象 (命题 A.2.19).

(3) 注意到 i^* 保持有限交. 由命题 A.3.19, $\mathcal{O}(Y)$ 是 $\mathcal{O}(X)$ 的指数理想.

□

子位象之间的包含关系有多种相互等价的表述.

命题-定义 2.2.6 (子位象之间的包含关系)

对于位象 X 的子位象 $i: Y \rightarrow X, j: Z \rightarrow X$, 如下条件等价.

- (1) 作为范畴 \mathbf{Loc} 中的子对象有 $Y \leq Z$, 即 i 穿过 j ;
- (2) i^* 穿过 j^* , 即 (作为 $\mathcal{O}(X) \times \mathcal{O}(X)$ 的子集) $\equiv_Z \subset \equiv_Y$;
- (3) i_* 穿过 j_* , 即 (作为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集) $\mathcal{O}(Y) \subset \mathcal{O}(Z)$.

当上述条件之一成立时, 称 Y 包含于 Z , 记为 $Y \leq Z$.

证明. 这是自反子范畴之间的包含关系的特例, 见命题 A.3.5.

□

例 2.2.7 (随机元素的子位象)

与测度空间类似, 某些位象上可以引入测度. Alex Simpson 的文章 [29] 指出可测位象中“随机元素的子位象”反映了随机性. 粗略地说, 位象 X 上的一个测度是一个满足若干条件的映射 $\mu: \mathcal{O}(X) \rightarrow [0, +\infty]$. 对于位象 X 上的概率测度 μ (即满足 $\mu(X) = 1$ 的测度), 存在一个最小的测度为 1 的子位象 $\text{Ran}_\mu(X) \hookrightarrow X$, 其对应的等价关系为

$$U \equiv_{\text{Ran}_\mu(X)} V \quad \text{当且仅当} \quad \mu(U \cap V) = \mu(U \cup V).$$

称 $\text{Ran}_\mu(X)$ 为 X 的随机元素的子位象.

例如, 考虑 Cantor 空间 $X = \{0, 1\}^\mathbb{N}$, 其元素为 0, 1 组成的无穷序列, 则 $\text{Ran}_\mu(X)$ 是“随机 0-1 序列的位象”. 对任何确定的序列 $x \in X$, 由于 $X \setminus \{x\} \hookrightarrow X$ 是一个测度为 1 的子位象, 由 $\text{Ran}_\mu(X)$ 的最小性有 $\text{Ran}_\mu(X) \leq X \setminus \{x\}$, 即 x 不属于 $\text{Ran}_\mu(X)$, 因为“一个确定的序列永远不是随机序列”. 用形象的话讲, 一个随机序列是包含于 X 的所有测度为 1 的子位象的序列.

位象上的测度还可解决“分球悖论”: 分球悖论是指球面上不可能给所有子集定义一个旋转不变的测度, 因为一个球可以分成若干不相交的部分, 然后拼成两个同样大的

球. 以位象的观点, 这些部分实际上是相交的, 从而不会造成矛盾.

开子位象与闭子位象

对于位象 X , $\mathcal{O}(X)$ 的元素可视为其开子空间.

命题-定义 2.2.8 (开子位象)

设 X 为位象, $W \in \mathcal{O}(X)$. X 的开子位象 W 有如下 4 种等价的定义.

- 定义开子位象的嵌入 $i: W \rightarrow X$ 为一对伴随

$$\mathcal{O}(W) \begin{array}{c} \xleftarrow{i^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{i_*} \end{array} \mathcal{O}(X),$$

有两种定义方式,

(1) $\mathcal{O}(W)_1 = \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U \leq W\}$, $i^*(U) = (W \wedge U)$, $i_*(U) = (W \Rightarrow U)$. 关于 “ \Rightarrow ” 运算的定义见 1.3.35.

(2) $\mathcal{O}(W)_2 = \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U = (W \Rightarrow U)\}$, $i^*(U) = (W \Rightarrow U)$, $i_*(U) = U$.

- 定义等价关系 \equiv_W , 有两种定义方式,

(3) $U \equiv_W V$ 当且仅当 $(W \wedge U) = (W \wedge V)$.

(4) $U \equiv_W V$ 当且仅当 $(W \Rightarrow U) = (W \Rightarrow V)$.

证明. 很明显, 定义 (1), (3) 等价, 定义 (2), (4) 等价.

- 定义 (1), (2) 等价是因为如下的同构.

$$\{U_1 \in \mathcal{O}(X) \mid U_1 \leq W\} \begin{array}{c} \xleftarrow{U_2 \mapsto (W \wedge U_2)} \\ \simeq \\ \xrightarrow{U_1 \mapsto (W \Rightarrow U_1)} \end{array} \{U_2 \in \mathcal{O}(X) \mid U_2 = (W \Rightarrow U_2)\}$$

- 定义 (3), (4) 等价是因为 $(W \Rightarrow U) = (W \Rightarrow (W \wedge U))$, $(W \wedge U) = (W \wedge (W \Rightarrow U))$.

□

注 2.2.9

对于开子位象 $W \hookrightarrow X$, $\mathcal{O}(W)$ 以两种不同方式嵌入 $\mathcal{O}(X)$, 即定义 2.2.8 中的 (1) 和 (2). 其中 (2) 是子位象默认的观点, 即 $\mathcal{O}(W)$ 等同于 $\mathcal{O}(X)$ 中 “包含 W 以外所有部分” 的开子空间的全体, 例如闭子位象的定义 2.2.11 就可用这种直观. 而 (1) 是开子

位象特有的, 其原因是开映射 (定义 2.2.28) $f: W \rightarrow X$ 带有额外的左伴随 $f_!$, 从而 $\mathcal{O}(W)$ 可以另一种方式嵌入 $\mathcal{O}(X)$.

例 2.2.10 (环谱的开子位象)

继续例 2.1.12, $\text{Spec } A$ 的基础开集 U_f 对应的开子位象正是 $\text{Spec } A_f$,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(\text{Spec } A_f) &\simeq \{U \in \mathcal{O}(\text{Spec } A) \mid U \leq U_f\} \\ &\simeq \langle U_{fg} : g \in A \mid U_0 = \perp, U_f = \top, U_{f(g+h)} \leq U_{fg} \vee U_{fh}, U_{fgh} = U_{fg} \wedge U_{fh} \rangle. \end{aligned}$$

$\text{Spec } A_f$ 的点一一对应于位格态射 $\mathcal{O}(\text{Spec } A_f) \rightarrow \{\perp, \top\}$, 也即对每个生成元 U_{fg} 指定一个元素 $p(fg) \in \{\top, \perp\}$, 满足 $p(0) = \perp, p(f) = \top, p(f(g+h)) \leq p(fg) \vee p(fh), p(fgh) = p(fg) \wedge p(fh)$. 令 $\mathfrak{p} = \{g \in A \mid p(fg) = \perp\}$, 则 \mathfrak{p} 是 A 中不含 f 的素理想, 这与 $\text{Spec } A_f$ 的传统定义相符.

定义 2.2.11 (闭子位象)

设 X 为位象, $W \in \mathcal{O}(X)$. X 的闭子位象 $X \setminus W$ 有如下两种等价的定义.

- 定义闭子位象的嵌入 $i: (X \setminus W) \rightarrow X$ 为一对伴随

$$\mathcal{O}(X \setminus W) \begin{array}{c} \xleftarrow{i^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{i_*} \end{array} \mathcal{O}(X),$$

$$\mathcal{O}(X \setminus W) := \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U \geq W\}, \quad i^*(U) = U \vee W, \quad i_*(U) = U.$$

- 定义等价关系 $\equiv_{X \setminus W}, U \equiv_{X \setminus W} V$ 当且仅当 $U \vee W = V \vee W$.

子位象与内核

下面引入内核 (nucleus) 的概念. 它是意象中 Lawvere–Tierney 拓扑 (定义 3.7.1) 和层化在位象中的类比.

定义 2.2.12 (内核)

定义位象 X 的一个内核 (nucleus) 为满足如下条件的映射 $j: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(X)$,

- j 保持有限交, $j(U \wedge V) = j(U) \wedge j(V)$;
- $U \leq j(U)$;
- $j j = j$.

其中后两个条件就是说 j 为 $\mathcal{O}(X)$ 上的单子 (定义 A.8.1).

对于位象态射 $f: X \rightarrow Y$, 记 $j = f_*f^*$, 由命题 2.1.6 有 $U \leq j(U)$, 且 $jj = j$. 这实际上是“伴随产生单子” (命题 A.8.3) 的特例. 称 f_*f^* 为 f 诱导的 Y 的内核.

定义 2.2.13 (内核对应的子位象)

设 j 为 X 的一个内核. 定义子位象 X_j ,

- 定义伴随

$$\mathcal{O}(X_j) \xrightleftharpoons[i_*]{i^*} \mathcal{O}(X),$$

$\mathcal{O}(X_j) := \{U \in \mathcal{O}(X) \mid j(U) = U\}$. (由于 $jj = j$, $\mathcal{O}(X_j)$ 也等于 $\text{im}(j)$.)
 $i^*(U) = j(U)$, $i_*(U) = U$.

- 等价关系 \equiv_{X_j} 为 $U \equiv_{X_j} V$ 当且仅当 $j(U) = j(V)$.

例 2.2.14 (内核对应的子位象的例子)

按照定义 2.2.13,

- 内核 $j(U) = U \vee W$ 给出闭子位象 $X \setminus W$.
- 内核 $j(U) = (W \Rightarrow U)$ 给出开子位象 W .

命题 2.2.15 (内核与子位象的对应)

位象 X 的内核一一对应于 X 的子位象. 进一步, 对于子位象 Y, Y' , 设对应的内核分别为 j, j' , 则 $Y \leq Y'$ 当且仅当 $jj' = j$, 当且仅当 $j' \leq j$ (注意序关系反向了).

证明. 由定义 2.2.13, 内核 j 对应的子位象 $i: X_j \rightarrow X$ 对应的内核为 $i_*i^* = j$.

另一方面, 设 $i: W \rightarrow X$ 为子位象, $j = i_*i^*$. 我们证明子位象 X_j 同构于 W . 因为 i_* 为单射, i^* 为满射 (定义 2.2.1), 所以作为 $\mathcal{O}(X)$ 的子位格有 $\text{im}(i_*) = \text{im}(j) = \mathcal{O}(X_j)$. 故 X_j, W 作为 X 的子位象同构.

假设子位象 Y, Y' 满足 $Y \leq Y'$, 如图.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow k & \nearrow i' \\ & Y' & \end{array}$$

那么 $jj' = i_*i^*(i')_*(i')^* = i_*k^*(i')^*(i')_*(i')^* = i_*k^*(i')^* = i_*i^* = j$. (此处用到 $(i')^*(i')_* = \text{id}_{\mathcal{O}(Y')}$.) 另一方面, 假设 $jj' = j$, 那么对任意 $V \in \mathcal{O}(Y)$ (通过 i_* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的元素), 有

$V = j(V) = jj'(V) \geq j'(V) \geq V$, 从而 $V = j'(V)$, 这说明 $V \in \mathcal{O}(Y')$, 故 $Y \leq Y'$.

最后证明 $jj' = j$ 等价于 $j' \leq j$. 假设 $jj' = j$, 那么 $j' \leq jj' = j$. 假设 $j' \leq j$, 那么 $j = jj \geq jj' \geq j$, 故 $j = jj'$. \square

命题-定义 2.2.16 (闭包, 稠密子位象)

对于子位象 $i: Y \hookrightarrow X$, 存在包含 Y 的最小闭子位象 \bar{Y} , 称为 Y 的闭包, 满足

$$\bar{Y} \simeq X \setminus U, \quad U = \bigvee \{V \in \mathcal{O}(X) \mid i^*(V) = \perp\}.$$

若 $\bar{Y} = X$, 则称 Y 为稠密子位象. 设 $j: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 为子位象 Y 对应的内核, 则 Y 为稠密子位象当且仅当 $j(\perp) = \perp$, 也即 $\perp \in \mathcal{O}(Y)$.

Boole 位象

定义 2.2.17 (Boole 位象)

称一个位象为 *Boole 位象* (Boolean locale) 是指其对应的位格为 Boole 代数 (由位格的定义, 它必然是完备 Boole 代数).

有趣的是, 一个位象的所有 Boole 子位象具有非常简单的刻画.

命题 2.2.18

在任何 Heyting 代数 H 中有

$$\left(((x \Rightarrow y) \Rightarrow y) \Rightarrow y \right) = (x \Rightarrow y).$$

特别地, 有 $\neg\neg\neg = \neg$.

证明. 这是因为如下的伴随.

$$H^{\text{op}} \begin{array}{c} \xleftarrow{(-) \Rightarrow y} \\ \xrightarrow[\perp]{} \\ \xrightarrow{(-) \Rightarrow y} \end{array} H$$

(对比命题 2.1.6 的证明.) 具体的证明如下: 首先注意到对任意 $z \in H$, 有

$$z \leq ((z \Rightarrow y) \Rightarrow y). \quad (\star)$$

- 在 (\star) 中令 $z = (x \Rightarrow y)$, 得 $(x \Rightarrow y) \leq (((x \Rightarrow y) \Rightarrow y) \Rightarrow y)$.
- 在 (\star) 中令 $z = x$, 得 $x \leq ((x \Rightarrow y) \Rightarrow y)$, 从而 $((x \Rightarrow y) \Rightarrow y) \leq (x \Rightarrow y)$.

\square

命题-定义 2.2.19

设 X 为位象, $W \in \mathcal{O}(X)$. 定义 $B(W)$ 为内核 $j = ((- \Rightarrow W) \Rightarrow W)$ 对应的子位象. 那么 $B(W)$ 为 Boole 位象, 且 X 的所有 Boole 子位象均可表示为这种形式.

证明. 由命题 2.2.18 的证明知 $j = ((- \Rightarrow W) \Rightarrow W)$ 为内核, 且由该命题的结论知

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(B(W)) &= \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U = ((U \Rightarrow W) \Rightarrow W)\} \\ &= \{V \Rightarrow W \mid V \in \mathcal{O}(X)\}\end{aligned}$$


特别地, $\mathcal{O}(B(W))$ 的最小元为 W . 对任意 $U \in \mathcal{O}(B(W))$, 我们证明 $U \Rightarrow W$ 是 U 在 $\mathcal{O}(B(W))$ 中的补, 从而 $\mathcal{O}(B(W))$ 为 Boole 代数. 首先, $U \wedge (U \Rightarrow W) = W$. 其次, 对任意 $(V \Rightarrow W) \in \mathcal{O}(B(W))$, 假设 $U \leq (V \Rightarrow W)$ 且 $(U \Rightarrow W) \leq (V \Rightarrow W)$. 那么 $V \leq (U \Rightarrow W) \leq (V \Rightarrow W)$, 从而 $V \leq W$, $(V \Rightarrow W) = \top$. 这说明 $U \vee (U \Rightarrow W) = \top$. 于是我们证明了 $B(W)$ 为 Boole 位象.

对任意 Boole 子位象 $i: Y \rightarrow X$, 将 $\mathcal{O}(Y)$ 通过 i_* 视为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集, 设 $\mathcal{O}(Y)$ 的最小元为 W . 对任意 $U, V \in \mathcal{O}(Y)$,

$$U \wedge V \leq W \quad \Leftrightarrow \quad U \leq (V \Rightarrow W),$$

因此 V 与 $V \Rightarrow W$ 是 Boole 代数 $\mathcal{O}(Y)$ 中的互补元素, 这证明了 $\mathcal{O}(Y) \subset \mathcal{O}(B(W))$. 而命题 2.2.20 表明 $\mathcal{O}(B(W)) \subset \mathcal{O}(Y)$, 故有 $Y = B(W)$. \square

由于 $\mathcal{O}(B(W))$ 的最小元为 W , 可知 $B(W)$ 包含于闭子位象 $X \setminus W$.

**命题 2.2.20**

设 X 为位象. 对任何子位象 $i: Y \rightarrow X$ 以及 $W \in \mathcal{O}(Y)$, 有 $\mathcal{O}(B(W)) \subset \mathcal{O}(Y)$ (视为 $\mathcal{O}(X)$ 的子集).

证明. 由命题 2.2.5, 对任意 $V \in \mathcal{O}(X)$, 有 $(V \Rightarrow W) \in \mathcal{O}(Y)$. 因此 $\mathcal{O}(B(W)) \subset \mathcal{O}(Y)$. \square

命题 2.2.21

在任何 Heyting 代数 H 中有

$$\neg\neg(x \wedge y) = (\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y).$$

证明. 首先, 由于 $(x \wedge y) \leq x$, 有 $\neg\neg(x \wedge y) \leq \neg\neg x$, 同理可得 $\neg\neg(x \wedge y) \leq (\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y)$. 下面要证明

$$(\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y) \leq \neg\neg(x \wedge y),$$

只需证明

$$(\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y) \wedge (\neg(x \wedge y)) \leq \perp.$$

这是因为

$$\begin{aligned} (\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y) \wedge (\neg(x \wedge y)) &= (\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y) \wedge (x \Rightarrow \neg y) \\ &\leq (\neg\neg\neg y) \wedge (\neg\neg y) \\ &\leq \perp. \end{aligned}$$

□

由 Heyting 代数的性质 2.2.18 2.2.21 得如下结论.

命题 2.2.22 (双重否定内核)

对任意位象 X , 双重否定 $\neg\neg: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 是内核.

例 2.2.23 (双重否定子位象)

在定义 2.2.19 中取 $W = \perp$ 就得到双重否定子位象, 即内核 $\neg\neg$ 对应的子位象, 记之为 $X_{\neg\neg} \hookrightarrow X$. 称 $\mathcal{O}(X_{\neg\neg}) = \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U = \neg\neg U\}$ 的元素为 $\mathcal{O}(X)$ 的正则元素 (见例 2.1.17). 此外, 由 $B(B)(W)$ 的定义可知 $B(W) \simeq (X \setminus W)_{\neg\neg}$.

在意象的层面, 双重否定作为 Lawvere–Tierney 拓扑给出一个 Boole 子意象, 在力迫法中有重要的应用 (见 6.6 节).

命题 2.2.24

双重否定子位象 $X_{\neg\neg}$ 是 X 的最小稠密子位象. (关于子位象的包含关系见定义 2.2.6.)

证明. 设 $i: Y \hookrightarrow X$ 是 X 的稠密子位象. 由定义 2.2.16, $i_* i^* \perp = \perp$. 由命题 2.2.20, $\mathcal{O}(X_{\neg\neg}) \subset \mathcal{O}(Y)$. □

位象的满射

前面研究了位象的正则单射. 位象的满射与之并非完全对偶. 不同之处在于 \mathbf{Frm} 中的单态射等同于底层集合上的单射. 这是因为遗忘函子 $\mathbf{Frm} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持极限.

命题-定义 2.2.25 (位象的满射)

对于位象的态射 $f: X \rightarrow Y$, 以下条件等价:

- (1) $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 为集合的单射;
- (2) $f_*: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(Y)$ 为集合的满射;
- (3) $f_*f^* = \text{id}_{\mathcal{O}(Y)}$.

称满足上述条件的 f 为位象的满射.

证明. (3) \Rightarrow (1), (3) \Rightarrow (2) 是显然的.

- (1) \Rightarrow (3). 假设 f^* 为单射. 因为 $f^*(f_*f^*) = f^*$ (命题 2.1.6), 所以 $f_*f^* = \text{id}_{\mathcal{O}(Y)}$.
- (2) \Rightarrow (3). 假设 f_* 为满射. 因为 $(f_*f^*)f_* = f_*$ (命题 2.1.6), 所以 $f_*f^* = \text{id}_{\mathcal{O}(Y)}$.

□

命题 2.2.26 (位象的满-单分解, 存在性)

设 $f: X \rightarrow Y$ 为位象态射. 存在 Y 上的内核 j 使得 f 分解为满射 $X \rightarrow Y_j$ 与嵌入 $Y_j \hookrightarrow Y$ 的复合.

证明. 令 $j = f_*f^*$ 为 f 诱导的内核, 则有 $f^* = f^*f_*f^* = f^*j$. 定义 $p: X \rightarrow Y_j$, $p^* = f^*|_{\mathcal{O}(Y_j)}$ (回忆 $\mathcal{O}(Y_j) = \{U \in \mathcal{O}(Y) \mid j(U) = U\}$), 则 $f^* = p^*j$, f 分解为 $X \xrightarrow{p} Y_j \hookrightarrow Y$. 对任意 $U, V \in \mathcal{O}(Y_j)$, 若 $p^*(U) = p^*(V)$, 则 $U = j(U) = j(V) = V$, 这说明 p^* 单, 即 p 为满射.

□

命题 2.2.27 (位象的满-单分解, 唯一性)

设 $f: X \rightarrow Y$ 为位象态射, f 有两个分解 $f = X \xrightarrow{p} A \xrightarrow{u} Y = X \xrightarrow{q} B \xrightarrow{v} Y$. 假设 v 为嵌入, p 为满射, 那么存在唯一的态射 $g: A \rightarrow B$ 使下图交换;

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & & \\
 & \nearrow p & & \searrow u & \\
 X & & & & Y \\
 & \searrow q & & \nearrow v & \\
 & & B & &
 \end{array}
 \quad \begin{array}{c} \exists! g \\ \downarrow \end{array}$$

进一步假设 u 为嵌入, q 为满射, 则 g 为同构.

证明. 对 v 使用命题 2.2.26, 得分解 $v = B \xrightarrow{r} Y_j \xrightarrow{i} Y$, 那么 r 既单又满, 故为同构. 不妨设 $B = Y_j$, $v^* = j$.

注意到对于位象态射 $f: X \rightarrow Y$, f 穿过 Y_j 当且仅当 f^* 穿过 j , 当且仅当 $f^*j = f^*$. 代入 $f = up$ 得 $p^*u^*j = p^*u^*$. 由 p^* 为单射得 $u^*j = u^*$, 故 u 穿过 Y_j . 由于 $Y_j \rightarrow Y$ 为单射, 态射 $g: A \rightarrow B$ 当然是唯一的. 因为 $vgp = up = vq$, v 为嵌入, 所以 $gp = q$.

进一步假设 u 为嵌入, q 为满射, 则 $u = vg$ 推出 g 单, $q = gp$ 推出 g 满, 从而 g 为同构. \square

开映射

拓扑空间的开映射 $f: X \rightarrow Y$ 是指将开集映为开集的映射. 对开集 $U \in \text{Open}(X)$, 存在开集 $f_!(U) \in \text{Open}(Y)$ 构成开集 U 在 Y 中的像, 即逆像包含 U 的最小开集, 这个性质可表述为 $f_!$ 是 f^* 的左伴随:

$$f_!(U) \subset V \Leftrightarrow U \subset f^*(V).$$

此外还有如下的 *Frobenius* 恒等式,

$$f_!(U \cap f^*(V)) = f_!(U) \cap V.$$

定义 2.2.28

对于位象的态射 $f: X \rightarrow Y$, 若 $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 有左伴随 $f_!$, 且满足 *Frobenius* 恒等式 $f_!(U \wedge f^*(V)) = f_!(U) \wedge V$, 则称 f 为开映射.

命题 2.2.29

位象的态射 $f: X \rightarrow Y$ 为开映射当且仅当 f^* 为完备 *Heyting* 代数的同态, 即 f^* 保持任意交, 且保持 \Rightarrow 运算.

证明. f^* 保持任意交当且仅当 f^* 有左伴随 (命题 A.6.28), 而 f^* 保持 \Rightarrow 运算是 *Frobenius* 互反律的等价条件 (命题 A.2.19). \square

命题 2.2.30

子位象 $i: Y \rightarrow X$ 是开子位象当且仅当 i 是开映射.

证明. 设 $i: Y \rightarrow X$ 是开子位象, $Y \in \mathcal{O}(X)$, $\mathcal{O}(Y) = \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U \leq Y\}$. 那么 $i_!(U) = U$, $i^*(U) = U \wedge Y$ 满足 *Frobenius* 恒等式.

另一方面, 设子位象的嵌入 $i: Y \rightarrow X$ 是开映射. 因为 i^* 为满射而 $i_! \dashv i^*$ (这导致 $i^*i_!i^* = i^*$), 所以 $i_!$ 为单射. 令 $W = i_!(\top)$ (\top 是 $\mathcal{O}(Y)$ 的最大元), 那么 *Frobenius* 恒等式给出 $i_!i^*(V) = W \wedge V$ ($V \in \mathcal{O}(X)$). 进而有

$$\{V \in \mathcal{O}(X) \mid V \leq W\} = \{V \in \mathcal{O}(X) \mid V = i_!i^*(V)\} = \text{im } i_!.$$

这说明 Y 是由 W 确定的开子位象. □

例 2.2.31 (到点的映射)

对于位象 X , 映射 $X \rightarrow 1$ 是开映射.⁸ 这是因为 $X^*: \mathcal{O}(1) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 有左伴随

$$X_! : U \mapsto \begin{cases} \top & U \neq \perp \\ \perp & U = \perp \end{cases},$$

而 Frobenius 恒等式 $X_!(U \wedge X^*(V)) = X_!(U) \wedge V$ 对 $V = \top, V = \perp$ 均成立.

命题 2.2.32 (离散空间)

位象 X 是离散空间, 即 $\mathcal{O}(X)$ 作为位格同构于某个集合的幂集, 当且仅当 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 是开映射.

证明. 定义集合

$$X_0 = \{\text{开子空间 } A \hookrightarrow X \mid A \times A \subset \Delta \subset X \times X, X_!A = \top\}.$$

其中条件 $X_!A = \top$ 等价于⁹ $A \neq \perp$. 那么映射

$$\phi: \mathcal{O}(X) \rightarrow P(X_0), U \mapsto \{A \in X_0 \mid A \leq U\}$$

为同构. □

局部位象

定义 2.2.33 (局部位象)

称位象 X 为局部位象是指 X 的任何开覆盖都包含 X 自身; 即对任意一族元素 $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{O}(X)$, 若 $\bigvee_i U_i = \top$, 则存在 i 使得 $U_i = \top$.

例 2.2.34 (局部拓扑空间)

设 X 为清晰空间 (定义 2.1.15), 例如 Hausdorff 空间. 那么 X 为局部位象当且仅当 X 中存在一点 x , 其唯一的邻域是 X 本身.

⁸注意这个命题依赖于排中律: 左伴随 $X_!$ 的构造使用了排中律, $\mathcal{O}(1) = \{\top, \perp\}$ 的事实也需要排中律. 在没有排中律时, 也可以证明映射 $X \rightarrow 1$ 是开映射当且仅当 $X^*: \mathcal{O}(1) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 有左伴随. 称满足该条件的位象 X 为开位象.

⁹至少在经典逻辑中如此.

例 2.2.35 (局部环的谱是局部位象)

在经典逻辑中, 局部环是指仅有一个极大理想的环. 一般地, 称环 R 为局部环是指对任意 $x, y \in R$, 若 $x + y$ 可逆, 则 x 可逆或 y 可逆. 局部环 R 的谱 $\text{spec } R$ 是局部位象, 事实上, 考虑 R 的极大理想对应的 $\text{spec } R$ 的点, 其唯一的邻域是 $\text{spec } R$ 本身.

命题 2.2.36

位象 X 是局部位象当且仅当 $X_*: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(1)$ 有右伴随.

证明. X_* 有右伴随当且仅当 X_* 保持任意并, 而 $X_*(U) = \begin{cases} \top & U = \top \\ \perp & U < \top \end{cases}$, 故 X_* 保持任意并当且仅当 $(\bigvee_{U < \top} U) < \top$, 即 X 为局部位象. \square

局部连通位象

定义 2.2.37 (连通位象)

称位象 X 连通, 是指对任意两两不交的一族元素 $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{O}(X)$ ($i \neq j \Rightarrow U_i \wedge U_j = \perp$), 若 $\bigvee_i U_i = \top$, 则存在 i 使得 $U_i = \top$.

定义 2.2.38 (局部连通位象)

称位象 X 局部连通 (locally connected), 是指其任何开子位象都可写成若干个连通的开子位象的并.

由定义, 可知“局部连通”是一种局部性质, 即当 X 有开覆盖 $X = \bigvee_i U_i$ 时, X 局部连通当且仅当每个 U_i 局部连通.

命题-定义 2.2.39 (连通分支)

局部连通位象 X 可唯一地分解为连通开子位象的不交并 $X = \bigvee_i X_i$, 称每个 X_i 为 X 的连通分支 (component).

证明. 由定义, X 是若干个连通开子位象 U_j 的并. 在这些开子位象之间, “相交非空”的关系生成一个等价关系 \sim , 取 X_i 为每个等价类中所有成员的并即可. \square

在 3.10 节, 我们将用层范畴的性质来刻画位象的 (局部) 连通性等几何性质, 并由此类比得到意象的几何性质的定义.

2.3 位象与逻辑

[A locale is a] propositional geometric theory pretending to be a space.

Steven Vickers

空间 ----- 代数 ----- 理论

点 ----- 素理想 ----- 模型

开集 ----- 元素 ----- 命题

建议在阅读本节之前阅读附录 B.1 节.

经典命题逻辑与 Boole 代数

Lindenbaum 代数是使用代数方法研究逻辑的工具. 粗略地说, 它是一个理论中的“命题的代数”; 在经典逻辑的情形, 它就是 *Boole* 代数 (定义 1.3.63). 根据 Stone 表示定理, Boole 代数在代数-几何对偶中对应 *Stone* 空间.

设 Σ 是由若干命题符号 p, q, r, \dots 组成的符号表¹⁰. 定义 Sen_Σ 为 Σ 上由 $\vee, \wedge, \neg, \Rightarrow, \top, \perp$ 组成的公式¹¹的集合, 包括 $(p \wedge q) \Rightarrow r, p \vee \neg p, p \Rightarrow \perp$ 等等.

定义 2.3.1

在经典逻辑中, 对于符号表 Σ 上的命题理论 \mathbb{T} (即一些公理的集合), 定义 \mathbb{T} 的 *Lindenbaum* 代数 $\mathcal{LA}_\mathbb{T}$ 为 Σ 上公式的 \mathbb{T} -可证等价类构成的 Boole 代数:

$$\mathcal{LA}_\mathbb{T} := \text{Sen}_\Sigma / \equiv_\mathbb{T}, \quad \text{其中 } \phi \equiv_\mathbb{T} \psi \text{ 当且仅当 } \mathbb{T} \text{ 可证 } \phi \Leftrightarrow \psi.$$

¹⁰在定义 B.1.5 的框架中, 我们可以说 Σ 包括 0 个类型, 0 个函数符号 (固然, 因为 Σ 中没有类型), 以及若干个 0 元关系符号 p, q, r, \dots . 这样的理论也称为零阶理论 (zeroth-order theory).

¹¹这里的公式也可以放在定义 B.1.12 的框架中. 注意, 在这个框架中没有等式 $p = q$, 因为 p, q 不是某个类型的项 (Σ 中没有类型), 而是 0 元关系符号.

定义 2.3.2 (命题理论之间的态射)

对于两个命题理论 (Σ, \mathbb{T}) , (Σ', \mathbb{T}') , 定义态射 $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}'$ 为映射 $f: \Sigma \rightarrow \text{Sen}_{\Sigma'}$, 它自然诱导映射 $\text{Sen}_{\Sigma} \rightarrow \text{Sen}_{\Sigma'}$, 使得 f 保持公理, 即 $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}'$. 等价地, f 为 Boole 代数同态 $\mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}} \rightarrow \mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}'}$.

注 2.3.3

命题理论的态射可类比于环同态: 对于两个环 $R = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/I$ 与 $R' = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_m]/J$, 环同态 $f: R \rightarrow R'$ 为映射 $\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow R'$ (它自然诱导映射 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_m]$), 使得 $f(I) \subset J$.

定义 2.3.4 (命题理论的模型)

一个命题理论 (Σ, \mathbb{T}) 的标准模型¹²(standard model, 又称解释, interpretation) 是一个函数 $f: \Sigma \rightarrow \{\top, \perp\}$, 它自然诱导一个映射 $\bar{f}: \text{Sen}_{\Sigma} \rightarrow \{\top, \perp\}$, 使得 $\bar{f}(\mathbb{T}) \subset \{\top\}$. 记 \mathbb{T} 的经典模型的集合为 $\text{Mod}(\mathbb{T})$.

一般地, 对任意 Boole 代数 A , (Σ, \mathbb{T}) 的 A -模型是一个映射 $f: \Sigma \rightarrow A$, 它自然诱导一个映射 $\bar{f}: \text{Sen}_{\Sigma} \rightarrow A$, 使得 $\bar{f}(\mathbb{T}) \subset \{\top\}$. 记 \mathbb{T} 的 A -模型的集合为 $\text{Mod}_A(\mathbb{T})$. 恒等映射 $\text{id}_{\mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}}}$ 是 \mathbb{T} 的万有模型 (generic model), 意指任何模型都可由万有模型通过一个 Boole 代数同态得到.

命题 2.3.5

对任意 Boole 代数 A , 命题理论 (Σ, \mathbb{T}) 的 A -模型一一对应于 Boole 代数同态 $\mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}} \rightarrow A$.

证明. 设 $f: \Sigma \rightarrow A$ 为 \mathbb{T} 的 A -模型. 我们需要证明 $\bar{f}: \text{Sen}_{\Sigma} \rightarrow A$ 将 \mathbb{T} -等价的公式对应到相同的元素. 若 $\phi \equiv_{\mathbb{T}} \psi$, 设 \mathbb{T} 对 $\phi \Leftrightarrow \psi$ 的证明用到了公理 t_1, \dots, t_n , 那么由经典逻辑的性质可知

$$(\bar{f}(t_1) \wedge \dots \wedge \bar{f}(t_n)) \leq (\bar{f}(\phi) \Leftrightarrow \bar{f}(\psi)),$$

但由 f 是 \mathbb{T} 的 A -模型, $\bar{f}(t_1) = \dots = \bar{f}(t_n) = \top \in A$, 这说明 $\bar{f}(\phi) = \bar{f}(\psi)$. □

注 2.3.6

上述命题可类比于环同态的如下性质: 对于多项式 $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 以及

¹²此处“标准模型”并不是“唯一的模型”的意思, 而是在标准意义下的模型.

任何环 A , 集合

$$\{(a_1, \dots, a_n) \in A^n \mid f_i(a_1, \dots, a_n) = 0 \ (i = 1, 2, \dots, m)\}$$

一一对应于环同态 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m) \rightarrow A$.

注 2.3.7

由上述命题, \mathbb{T} 的经典模型一一对应于 Boole 代数同态 $\mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}} \rightarrow \{\top, \perp\}$, 即 $\mathcal{L}\mathcal{A}_{\mathbb{T}}$ 的超滤. 回忆位象 X 的点是位格同态 $\mathcal{O}(X) \rightarrow \{\top, \perp\}$, 即 $\mathcal{O}(X)$ 的完全素滤子. 两种情形的区别在于逻辑规则: Boole 代数中没有任意并, 而有排中律; 位格中有任意并, 没有排中律.

命题 2.3.8

命题理论的态射 $f: (\Sigma, \mathbb{T}) \rightarrow (\Sigma', \mathbb{T}')$ 诱导模型的映射 $\text{Mod}_A(\mathbb{T}') \rightarrow \text{Mod}_A(\mathbb{T})$.

对于一个命题理论, 其 (经典) 模型的集合可赋予一个拓扑, 就像代数几何中一个环的素理想的集合可赋予拓扑一样.

定义 2.3.9 (Boole 代数的谱)

对 Boole 代数 B , 定义拓扑空间 $\text{Spec}(B)$ 如下, 其点集为 $\text{Hom}_{\text{BooleAlg}}(B, \{\top, \perp\})$ (注意同态 $f: B \rightarrow \{\top, \perp\}$ 一一对应于 B 的素滤子 $f^{-1}(\top)$), 其拓扑基为

$$\{f \mid f(b) = \top\} (b \in B).$$

换言之, $\text{Spec}(B)$ 上的拓扑是使得所有取值映射 $\text{ev}_b: \text{Spec}(B) \rightarrow \{\top, \perp\}$ 都连续的最粗拓扑.

命题-定义 2.3.10 (Stone 空间)

对于拓扑空间 X , 以下条件等价:

- X 是紧 Hausdorff 空间, 且完全不连通 (仅有的连通分支为单点集);
- X 紧, 且完全分离 (任何两个不同的点都能被一个既开又闭子集分开);
- X 是投射有限空间, 即有限离散空间在 Top 中的余滤极限 (定义 A.5.13).

称满足上述条件的空间为 *Stone 空间*.

命题 2.3.11

设 B 是 Boole 代数, 那么 $\text{Spec}(B)$ 是 Stone 空间.

证明. 首先证明 $\text{Hom}_{\text{BooleAlg}}(B, \{\top, \perp\})$ 是紧空间. 这是因为, 它是积空间 $\{\top, \perp\}^B$ 的闭子集, 而由 Tychonoff 定理, 紧空间的任意乘积是紧空间.

然后证明 $\text{Hom}_{\text{BooleAlg}}(B, \{\top, \perp\})$ 是完全分离空间. 对其中任意不同的两点 p, q , 不妨设存在 $b \in B$ 使得 $p(b) = \top, q(b) = \perp$. 那么 $p(\neg b) = \perp$ 而 $q(\neg b) = \top$. 因此, $\text{Spec}(B)$ 的既开又闭子集 $\{f \mid f(b) = \top\}, \{f \mid f(\neg b) = \top\}$ 将 p, q 分离. \square

例 2.3.12 (Tarski 代数与 Cantor 空间)

Tarski 证明了可数无原子 Boole 代数在同构意义下唯一, 不妨称之为 *Tarski* 代数. (原子的定义见例 2.1.17.) 其一种构造是可数个变量生成的自由 Boole 代数, 也即可数个命题符号上的空理论 (即没有公理的理论) 的 Lindenbaum 代数.

著名的 Cantor 空间 $\{\sum_{n \geq 1} a_n 3^{-n} \mid a_n \in \{0, 2\}\} \subset \mathbb{R}$ 作为拓扑空间同胚于 $\{\top, \perp\}^{\mathbb{N}}$. 容易证明 Cantor 空间是 Stone 空间, 也是 Tarski 代数的谱.

命题 2.3.13 (Stone 对偶)

Boole 代数与 Stone 空间之间有如下 (反变的) 范畴等价

$$\text{BooleAlg}^{\text{op}} \begin{array}{c} \xleftarrow{\text{Hom}_{\text{StoneSp}}(-, \{\top, \perp\})} \\ \xrightarrow{\text{Spec}} \end{array} \text{StoneSp}.$$

证明. 设 B 为 Boole 代数. 定义 $\alpha: B \rightarrow \text{Hom}(\text{Spec}(B), \{\top, \perp\})$, $x \mapsto (f \mapsto f(x))$. 很明显 α 是 Boole 代数同态.

- α 是单射: 对不同的元素 $x, y \in B$, 取素滤子 F 包含 $x \wedge (\neg y)$, 那么它对应的同态 $f: B \rightarrow \{\top, \perp\} \in \text{Spec}(B)$ 满足 $f(x) = \top, f(y) = \perp$.
- α 是满射: 对任意连续映射 $\varphi: \text{Spec}(B) \rightarrow \{\top, \perp\}$, 既开又闭子集 $\varphi^{-1}(\top)$ 可写为开集基中有限个元素的并 (这是由于紧性), 那么 $\varphi^{-1}(\top) = \bigcup_i \{f \mid f(b_i) = \top\} = \{f \mid f(\bigvee_i b_i) = \top\}$, $\varphi = \alpha(\bigvee_i b_i)$. 由此我们还得到结论: 对任意 Boole 代数 B , $\text{Spec}(B)$ 的既开又闭子集必然形如 $\{f \mid f(b) = \top\}$ ($b \in B$).

设 S 为 Stone 空间. 定义 $\beta: S \rightarrow \text{Spec}(\text{Hom}(S, \{\top, \perp\}))$, $p \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(p))$.

- β 是单射: 对不同的两点 $p, q \in S$, 由 Stone 空间的定义存在既开又闭子集 U , 包含 p 但不包含 q . 这给出了 $\varphi \in \text{Hom}(S, \{\top, \perp\})$, 使得 $\varphi(p) \neq \varphi(q)$, 那么 $\beta(p) \neq \beta(q)$.

- β 是满射: 对任意 $f: \text{Hom}(S, \{\top, \perp\}) \rightarrow \{\top, \perp\}$, 将 $\text{Hom}(S, \{\top, \perp\})$ 视为 S 的既开又闭子集构成的 Boole 代数, 那么 $f(\emptyset) = \perp$, 所以 $f^{-1}(\top)$ 中任意有限个成员都相交. 由 S 的紧性, 这说明 $f^{-1}(\top)$ 中所有成员相交于某个点 $p \in S$. 因此 $f^{-1}(\top)$ 是所有包含 p 的既开又闭子集, 即 $f = \beta(p)$.
- β 连续: 任取 $\varphi \in \text{Hom}(S, \{\top, \perp\})$. $\text{Spec}(\text{Hom}(S, \{\top, \perp\}))$ 的既开又闭子集 $\{f \mid f(\varphi) = \top\}$ 的原像为 $\{p \in S \mid \varphi(p) = \top\}$, 也是 S 的既开又闭子集. 这实际上已经证明 β 为同胚.

□

注 2.3.14

在 Stone 对偶中, 一个 Boole 代数 (的底层集合) 是有限集, 当且仅当对应的 Stone 空间是有限空间. 因此 Stone 对偶也给出有限 Boole 代数与有限集之间的等价 $\text{FinBooleAlg}^{\text{op}} \simeq \text{Fin}$.

几何逻辑与位格

仍设 Σ 是由若干命题符号组成的符号表. 回忆几何公式由命题符号, 真 \top , 有限合取 \wedge 以及无穷析取 \bigvee 构成, 由此还包含假 $\perp = \bigvee \emptyset$, 参见定义 B.1.14. 一个几何命题理论 (geometric propositional theory) 由若干相继式 $\phi \vdash \psi$ 组成, 其中 ϕ, ψ 为几何公式. 几何逻辑允许使用如下推理规则,

- 有限合取规则,

$$\phi \vdash \top, \quad \phi \wedge \psi \vdash \phi, \quad \phi \wedge \psi \vdash \psi, \quad \frac{\phi \vdash \psi \quad \phi \vdash \chi}{\phi \vdash (\psi \wedge \chi)}.$$

- 无限析取规则,

$$\phi \vdash \bigvee S (\phi \in S), \quad \frac{\text{对所有 } \phi \in S, \phi \vdash \psi}{\bigvee S \vdash \psi}.$$

- 无限分配公理

$$\phi \wedge (\bigvee S) \vdash \bigvee \{\phi \wedge \psi \mid \psi \in S\}.$$

参见定义 B.1.25.

定义 2.3.15

设 \mathbb{T} 为 Σ 上的几何理论. 定义 \mathbb{T} 的 Lindenbaum 代数 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}}$ 为 Σ 上几何公式的 \mathbb{T} -可证等价类构成的位格. 当然, 其上的序关系 \leq 是 \vdash .

注 2.3.16 (生成元与关系定义的位格)

上面的推理规则保证公式的可证等价类构成位格; 它可视为由 Σ 中的命题符号作为生成元, \mathbb{T} 中的公理作为关系生成的位格. 这里的关系可以是不等式 $p \leq q$, 也可以是等式 $p = q$ (两者可以互相转化, $p \leq q$ 等价于 $p \wedge q = p$, $p = q$ 等价于 $p \leq q, q \leq p$). 向一个理论 \mathbb{T} 添加公理, 相当于添加位格生成元之间的关系, 因此对应于取 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}}$ 的子位象 (定义 2.2.1).

与 Lawvere 理论不同, 位格的结构包含了任意集合大小的运算, 一般而言这可能导致所有公式的“集合”过大而不构成集合. 但位格的特殊性在于, 任何公式都 (在 \mathbb{T} -可证的意义下) 等同于 Σ 中的符号先取有限交再任意并的形式, 正如点集拓扑学中由子基 (subbasis) 生成拓扑一样. 因此全体公式的 \mathbb{T} -可证等价类确实构成一个集合.

定义 2.3.17 (几何理论的模型)

对位格 A , 定义 \mathbb{T} 的 A -模型为函数 $f: \Sigma \rightarrow A$, 它自然诱导几何公式 (的等价类) 到 A 的映射 \bar{f} , 满足 \mathbb{T} 的每条公理 (\bar{f} 满足公理 $\phi \vdash \psi$ 的意思是 $\bar{f}(\phi) \leq \bar{f}(\psi)$). 标准模型是指取值于位格 $\{\top, \perp\}$ 的模型.

与命题 2.3.5 完全类似, 有如下的事实.

命题 2.3.18

几何理论 \mathbb{T} 的 A -模型一一对应于位格同态 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}} \rightarrow A$. 特别地, \mathbb{T} 的标准模型一一对应于位象 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}}$ 的点.

注 2.3.19 (直观: 分类空间)

$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}}$ 对应的位象可想象为“ \mathbb{T} 的模型的空间”, 它是一种“分类空间”; 上述命题印证了这一直观: “ \mathbb{T} 的模型的空间”中的点正是 \mathbb{T} 的模型. 但是一个空间不能由它的点完全决定, 因此一个理论不能由它的 (标准) 模型完全决定. 一些理论没有标准模型 (见例 2.1.18), 但它并不是不相容的 (即由该理论的公理不能导出矛盾), 原因就在于此.

例 2.3.20 (一些简单的几何命题理论)

- 记 \mathbb{T}_{\perp} 为零个命题符号与一条公理 $\top \vdash \perp$ 构成的理论, 这是一个不相容 (inconsistent) 的理论,

$$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_{\perp}} = \{\perp\},$$

它对应空位象 \emptyset (例 2.1.8). 对任何非平凡位格 A , 理论 \mathbb{T}_{-1} 没有 A -模型.

- 记 \mathbb{T}_0 为零个命题符号与零条公理构成的理论, 则

$$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_0} = \{\perp \rightarrow \top\},$$

它对应终位象 1 (例 2.1.9). 对任何位格 A , 理论 \mathbb{T}_0 有且仅有一个 A -模型.

- 记 \mathbb{T}_1 为一个命题符号 p 与零条公理构成的理论, 则

$$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_1} = \{\perp \rightarrow p \rightarrow \top\}.$$

它是一个元素生成的自由位格, 对应 Sierpiński 空间 S (例 2.1.10). S 有两个点 \top, \perp , 分别对应 \mathbb{T}_1 的两个标准模型.

- 记 \mathbb{T}_2 为两个命题符号 p, q 与零条公理构成的理论, 则

$$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_2} = \left\{ \begin{array}{c} \perp \rightarrow p \wedge q \quad \begin{array}{ccc} & \nearrow p & \searrow \\ & & p \vee q \rightarrow \top \\ & \searrow q & \nearrow \end{array} \end{array} \right\}.$$

它是两个元素生成的自由位格, 对应位象 $S \times S$. $S \times S$ 有四个点 $(\top, \top), (\top, \perp), (\perp, \top), (\perp, \perp)$, 分别对应 \mathbb{T}_2 的四个标准模型.

- 记 \mathbb{T}_3 为两个命题符号 p, q 与一条公理 $p \vdash q$ 构成的理论, 则

$$\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_3} = \{\perp \rightarrow p \rightarrow q \rightarrow \top\}.$$

它是 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}_2}$ 在等价关系 $p \wedge q \equiv p, q \equiv p \vee q$ 下的商, 对应 $S \times S$ 的一个子位象, 其中有三个点 $(\top, \top), (\perp, \top), (\perp, \perp)$, 分别对应 \mathbb{T}_3 的三个标准模型.

命题 2.3.21

对任意位象 X , 都存在一个几何理论 \mathbb{T}_X 以 $\mathcal{O}(X)$ 为 Lindenbaum 代数.

证明. 定义理论 \mathbb{T}_X 包含命题符号 $P_U (U \in \mathcal{O}(X))$, 且有如下公理.

- $\vdash P_\top$;
- 对 $\mathcal{O}(X)$ 中每两个满足 $U \leq V$ 的元素, 有一条公理 $P_U \vdash P_V$;
- 对 $\mathcal{O}(X)$ 中每两个元素 U, V , 有一条公理 $P_U \wedge P_V \vdash P_{U \wedge V}$;
- 对 $\mathcal{O}(X)$ 中每一族元素 $\{U_i\}$, 有一条公理 $P_{\bigvee_i U_i} \vdash \bigvee_i P_{U_i}$.

容易看到, 几何公式的 \mathbb{T}_X -可证等价类一一对应于 $\mathcal{O}(X)$ 的元素, 且逻辑连接词 \wedge, \vee 与位格中的结构吻合. \square

注 2.3.22

理论 \mathbb{T}_X 可视为位象 X 的内语言, 其在意象理论中的类比即是 4.1 节介绍的 Mitchell–Bénabou 语言.

例 2.3.23 (实数位象)

实数位象可由如下几何理论 $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ 给出: 其中包含命题符号 $P_{a,b} (a, b \in \mathbb{Q})$, 直观为 “某实数属于开区间 (a, b) ”, 且有如下的公理.

- 对每组 $a, a', b, b' \in \mathbb{Q}$, 有两条公理


$$P_{a,b} \wedge P_{a',b'} \Vdash \bigvee \{P_{c,d} \mid \max(a, a') < c < d < \min(b, b')\},$$

($\phi \Vdash \psi$ 表示 $\phi \vdash \psi$ 与 $\psi \vdash \phi$)

- 对每个 $\varepsilon > 0, \varepsilon \in \mathbb{Q}$, 有一条公理

$$\top \vdash \bigvee \{P_{q-\varepsilon, q+\varepsilon} \mid q \in \mathbb{Q}\}.$$

理论 $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ 的一个标准模型为一个实数 (由 Dedekind 分割定义).



第 3 章 意象与空间的概念

Le point de vue et le langage des faisceaux introduit par Leray nous a amené à regarder les “espaces” et “variétés” en tous genres dans une lumière nouvelle. Ils ne touchaient pas, pourtant, à la notion même d’espace, se contentant de nous faire appréhender plus finement, avec des yeux nouveaux, ces traditionnels “espaces”, déjà familiers à tous.

[C]e qui compte vraiment dans un espace topologique, ce ne sont nullement ses “points” ou ses sous-ensembles de points, et les relations de proximité etc entre ceux-ci, mais que ce sont les faisceaux sur cet espace, et la catégorie qu’ils forment.

Grothendieck, Récoltes et Semailles¹

3.1 拓扑空间上的层与平展空间	83
拓扑空间上层的直像与逆像	88
3.2 位象上的层与平展空间	92
位格取值的集合	92
3.3 范畴上的预层	102

¹这两段评注出自 Grothendieck 的自传“收获与播种”。

Leray 引入的层的观点和语言使我们以新的视角看待各种“空间”和“流形”。然而，它们并未触及空间的概念本身，只是用新的眼光更加精细地理解那些传统的，人们早已熟知的空间。

拓扑空间中真正重要的不是它的“点”或点集的子集，以及点之间的邻近关系等等，而是这个空间上的层，以及它们构成的范畴。

预层范畴中的极限与余极限	103
预层范畴中的指数对象	104
预层范畴中的子对象分类子	105
3.4 景	109
从覆盖到 Grothendieck 拓扑	109
常见的景	115
典范与次典范拓扑	117
3.5 层化与 Grothendieck + 构造	118
3.6 Grothendieck 意象	122
层范畴中的极限与余极限	122
层范畴中的子对象分类子	123
层范畴中的指数对象	126
Grothendieck 意象	126
位象型意象	127
3.7 Lawvere–Tierney 拓扑, 内蕴层化与局部化	129
Lawvere–Tierney 拓扑	129
子对象的闭包	130
层范畴的性质	132
层化与局部化	135
3.8 意象之间的态射	135
几何态射	135
逻辑态射	137
嵌入与满射	138
满–单分解	140
群作用与张量–同态伴随	142
3.9 景之间的态射	148
有限极限景的态射	149
预层意象的点	151
层意象的点	153
指向预层意象的几何态射	153
指向层意象的几何态射	154
景之间的态射	156
比较原理	157
景之间的余态射	158
3.10 意象的几何性质	159
平展性	159
连通性	159
开几何态射	160

本质几何态射	161
紧合几何态射	162
3.11 Giraud 定理	162
3.12 等变层与拓扑群胚	164
3.13 意象的余极限	167

意象的概念最早由 Grothendieck 提出. 他将其命名为 topos^2 , 意在表达这个概念是能够承载拓扑与几何直观的最广泛的概念.

拓扑空间 X 上的层构成一个意象 $\text{Sh}(X)$, 称为层意象 (sheaf topos). 这个意象很大程度上反映了空间 X 的信息. Grothendieck 将层的概念由拓扑空间推广到了最一般的语境, 由此得到一种极为广泛的空间概念; 他将其命名为景 (site). 景上的层构成的范畴即是所谓 *Grothendieck* 意象.

Grothendieck 的想法是, 一个意象不一定来自普通的拓扑空间, 但由于它与 (拓扑空间上的) 层范畴极为相似的性质, 我们可以设想它是一个假想的空间上的层范畴, 即其中的对象是这个假想的空间之上的层. 这个想法也可视为代数-几何对偶的一例: 正如 Gelfand 考虑 Hausdorff 空间上的复值连续函数, Grothendieck 考虑的是空间上的“集合值连续函数”.

3.1 拓扑空间上的层与平展空间

[S]heaf theory is a part of geometry ... concerned with *the passage from local properties to global properties*.

John W. Gray, *Fragments of the History of Sheaf Theory*

设 X 为拓扑空间, 记 $\text{Open}(X)$ 为 X 的开集在包含关系下构成的范畴.

定义 3.1.1 (拓扑空间上的预层)

拓扑空间 X 上的预层 (presheaf) 是函子 $\text{Open}(X)^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$. 记 X 上的预层范畴为 $\text{Presh}(X)$.

²希腊文, “位置”

注 3.1.2

需要注意的一点是, 拓扑空间 X 到范畴 $\text{Open}(X)$ 的对应是反变的, 也即对连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 我们有反方向的函子 $f^{-1}: \text{Open}(Y) \rightarrow \text{Open}(X)$, 将开子集 $U \subset Y$ 对应到 $f^{-1}(U) \subset X$. 这也是一种代数-几何对偶.

定义 3.1.3 (拓扑空间上的层)

拓扑空间 X 上的层 (sheaf) 是满足如下条件的预层 F : 对任意开集 $U \subset X$, 任意覆盖 $U = \bigcup_i U_i$, 以及任意一组相容的元素 $(s_i \in F(U_i))_{i \in I}$, 存在唯一的 $s \in F(U)$ 满足 $s|_{U_i} = s_i \forall i \in I$. 其中相容是指

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \quad (\forall i, j \in I), \quad (3.1)$$

固定拓扑空间 X . 称俯范畴 (定义 1.1.28) Top/X 的对象, 即映射 $p: Y \rightarrow X$, 为 X 上的空间或 X 上的丛³.

定义 3.1.4 (丛的截面)

对于 X 上的空间 $p: Y \rightarrow X$, 定义其在开集 $U \subset X$ 上的截面的集合为

$$\Gamma_p(U) = \{s: U \rightarrow Y \mid ps = i: U \rightarrow X\}.$$

对于子开集 $V \subset U$, 有限制映射 $\text{res}: \Gamma_p(U) \rightarrow \Gamma_p(V)$, 这使得 Γ_p 成为 X 上的预层.

命题-定义 3.1.5 (截面层)

对于 X 上的空间 $p: Y \rightarrow X$, 上面定义的 Γ_p 构成 X 上的一个层, 称为丛 p 的截面层.

截面层给出了函子

$$\Gamma: \text{Top}/X \rightarrow \text{Presh}(X).$$

我们将证明每个层都是某个丛的截面层, 其中要用到芽 (germ). 芽的概念来自函数芽: 两个函数在一点处有相同的芽, 是指它们在这点的某个邻域上取值相等. 这个概念可自然地定义在一般的预层上.

³这里的丛不一定是所谓纤维丛.

定义 3.1.6 (芽, 茎)

设 F 是拓扑空间 X 上的预层. 考虑在一点 $x \in X$ 附近的局部截面 (也即 x 的邻域上的截面) 的如下等价关系 \sim : 对于 $s \in F(U), t \in F(V)$, 若 $s|_{U \cap V} = t|_{U \cap V}$, 则 $s \sim t$. 称这个关系下的一个等价类为 F 在 x 处的一个芽, 记截面 s 所属的等价类为 s_x .

称 F 在 x 处芽的集合为茎 (stalk) F_x . 使用范畴语言, 茎是如下的余极限:

$$F_x = \operatorname{colim}_{x \in U} F(U).$$

由预层出发可构造一个丛, 即所谓平展空间.

定义 3.1.7 (平展映射)

对于拓扑空间的映射 $f: Y \rightarrow X$, 若对任意 $y \in Y$ 都存在 y 的邻域 V 与 $f(y)$ 的邻域 U 使得 $f|_V: V \rightarrow U$ 为同胚, 则称 f 为平展 (法 étale) 映射, 又称局部同胚. 到空间 X 的平展态射构成的 \mathbf{Top}/X 的全子范畴记为 $\mathbf{Et}(X)$.

命题-定义 3.1.8 (平展空间)

设 F 是拓扑空间 X 上的预层. 定义预层 F 的平展空间 (法 espace étalé) $p: \Lambda_F \rightarrow X$ 如下.

- 底层集合. 空间 Λ_F 作为集合是无交并

$$\Lambda_F = \coprod_{x \in X} F_x,$$

映射 $p: \Lambda_F \rightarrow X$ 为投影, 将 F_x 的元素映射到 x .

- 拓扑. 对任意截面 $s \in F(U)$, 定义函数 $\dot{s}: U \rightarrow \Lambda_F, x \mapsto s_x$; 即 \dot{s} 是取 s 每个点处的截面芽得到的函数. 定义 Λ_F 上的拓扑为所有形如 $\dot{s}(U)$ 的集合生成的拓扑.

那么平展空间是平展态射, 且定义了函子

$$\Lambda: \mathbf{Presh}(X) \rightarrow \mathbf{Top}/X.$$

平展空间的一个重要性质是

命题 3.1.9 (平展空间–截面伴随)

对于拓扑空间 X , $\text{Presh}(X)$ 与 Top/X 之间存在伴随

$$\text{Presh}(X) \begin{array}{c} \xrightarrow{\Lambda} \\ \xleftarrow[\Gamma]{\perp} \end{array} \text{Top}/X.$$

证明. 我们构造单位与余单位

$$\eta: \text{id}_{\text{Presh}(X)} \rightarrow \Gamma\Lambda, \quad \epsilon: \Lambda\Gamma \rightarrow \text{id}_{\text{Top}/X}.$$

- 单位. 对于 X 上的预层 F , 在 Λ_F 的定义中已经给出一个映射

$$\eta_F(U): F(U) \rightarrow \Gamma\Lambda_F(U), \quad s \mapsto \dot{s}.$$

这构成一个预层态射 $\eta_F: F \rightarrow \Gamma\Lambda_F$.

- 余单位. 对 X 上的空间 $p: Y \rightarrow X$, 回忆 $\Lambda\Gamma_p$ 的一个元素可表示为一个芽 s_x , 其中 $s \in \Gamma_p(U)$, U 为 x 的邻域. 我们别无他选, 只能定义映射

$$\epsilon_p: \Lambda\Gamma_p \rightarrow Y, \quad s_x \mapsto s(x).$$

这构成了平展空间的态射.

下面考虑两个复合

$$\Gamma \xrightarrow{\eta\Gamma} \Gamma\Lambda\Gamma \xrightarrow{\Gamma\epsilon} \Gamma, \quad \Lambda \xrightarrow{\Lambda\eta} \Lambda\Gamma\Lambda \xrightarrow{\epsilon\Lambda} \Lambda.$$

- 第一个复合. 对任意平展映射 $p: Y \rightarrow X$ 与截面 $s \in \Gamma_p(U)$, 由 η 的定义有 $(\eta\Gamma)_p(U)(s) = \dot{s} \in \Gamma\Lambda\Gamma_p(U)$, 而由 ϵ 的定义, $(\Gamma\epsilon)_p(U)(\dot{s}) = s$. 因此第一个复合是恒等.
- 第二个复合. 对 X 上的任一预层 F 与芽 $s_x \in \Lambda_F$, $(\Lambda\eta)_F(s_x) = (\dot{s})_x \in \Lambda\Gamma\Lambda_F$, 而 $(\epsilon\Lambda)_F((\dot{s})_x) = (\dot{s})(x) = s_x$. 因此第二个复合是恒等.

综上, 我们完成了这一对伴随的证明. □

注 3.1.10

命题 3.1.9 也可理解为预层的几何实现. 注意到 X 的开集 $U \hookrightarrow X$ 本身是 X 上的空间 (甚至是平展空间), 即有范畴的嵌入 $i: \text{Open}(X) \hookrightarrow \text{Top}/X$. 事实上, $\text{Presh}(X)$

与 \mathbf{Top}/X 之间的上述伴随来自 i 的米田扩张 (命题 A.4.11)

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Open}(X) & \xrightarrow{\mathcal{I}} & \mathbf{Presh}(X) \\ & \searrow i & \downarrow \Lambda \\ & & \mathbf{Top}/X. \end{array}$$

预层是可表函子的余极限 (命题 A.4.7), 而预层对应的平展空间则是依这种余极限的模式, 将 X 的开集 (作为 X 上的空间) 粘在一起, 得到的空间:

$$\Lambda_F = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}(U) \rightarrow F} (U \rightarrow X).$$

命题 3.1.11

命题 3.1.9 中的伴随限制为全子范畴的等价

$$\mathbf{Sh}(X) \simeq \mathbf{Et}(X).$$

证明. 注意到,

- X 上的预层 F 是层当且仅当 $\eta_F: F \rightarrow \Gamma \Lambda_F$ 是同构.
- X 上的空间 $p: Y \rightarrow X$ 是平展空间当且仅当 $\epsilon_p: \Lambda \Gamma_p \rightarrow Y$ 是同构.

于是, 这个命题化为纯粹范畴论的问题. 见命题 A.2.8. □

命题-定义 3.1.12 (拓扑空间上的层化)

对于拓扑空间 X 定义层化 (sheafification) $a = \Gamma \circ \Lambda: \mathbf{Presh}(X) \rightarrow \mathbf{Sh}(X)$, 则 a 是嵌入 $i: \mathbf{Sh}(X) \hookrightarrow \mathbf{Presh}(X)$ 的左伴随, 即层范畴是预层范畴的自反子范畴 (定义 A.3.1).

证明. 设 P 为预层, F 为层, 那么

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}_{\mathbf{Presh}(X)}(P, F) &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{Presh}(X)}(P, \Gamma \Lambda_F) \\ &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{Top}/X}(\Lambda_P, \Lambda_F) \\ &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{Top}/X}(\Lambda \Gamma \Lambda_P, \Lambda_F) \\ &\simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{Presh}(X)}(\Gamma \Lambda_P, \Gamma \Lambda_F) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathbf{Presh}(X)}(\Gamma \Lambda_P, F). \end{aligned}$$

□


命题 3.1.13 (层范畴的俯范畴对应平展空间)

对于拓扑空间 X , $\text{Sh}(X)$ 在层 F 上的俯范畴 $\text{Sh}(X)/F$ 等价于平展空间 ΛF 上的层范畴 $\text{Sh}(\Lambda F)$.

证明. 这是因为平展空间上的平展空间是平展空间, $\text{Et}(X)/\Lambda F \simeq \text{Et}(\Lambda F)$. □

注 3.1.14

意象是拓扑空间的推广; 一个意象 C 是一个假想的空间上的层范畴, 其对象 F 是这个假想空间上的“层”. 俯范畴 C/F 作为意象正是 F 对应的“平展空间”上的层. 在这个意义上, 我们有如下类比.



拓扑空间上层的直像与逆像

拓扑空间的连续映射诱导层意象之间的一对伴随函子, 平展空间提供了逆像的直观.

定义 3.1.15 (拓扑空间上的预层的直像)

拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导开集范畴之间的函子 $f^{-1}: \text{Open}(Y) \rightarrow \text{Open}(X)$, 从而有预层范畴之间的函子

$$f_*: \text{Presh}(X) \rightarrow \text{Presh}(Y).$$

称之为直像 (direct image). 具体地, 对于 X 上的预层 F , 直像 f_*F 是 Y 上的预层, 满足 $f_*F(U) = F(f^{-1}(U))$.

直接验证定义可得如下命题.

命题 3.1.16 (层的直像是层)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间的连续映射, F 是 X 上的层, 那么直像 f_*F 是 Y 上的层; 也即直像函子限制为层范畴之间的函子

$$f_*: \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sh}(Y).$$

层的逆像用平展空间定义更方便.

命题 3.1.17 (拉回保持平展空间)

对于拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 与平展空间 $p: E \rightarrow Y$, 拉回 $f^*E \rightarrow X$ 是平展空间.

$$\begin{array}{ccc} f^*E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

证明. 对 f^*E 的任意点 (x, e) , 取 $e \in E$ 的邻域 U 与 $f(x) = p(e) \in Y$ 的邻域 V 使得 $p|_U: U \rightarrow V$ 为同胚. 考虑“拉回立方体”

$$\begin{array}{ccccc} f^*U & \longrightarrow & U & & \\ & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & f^*E & \longrightarrow & E & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow p \\ f^*V & \longrightarrow & V & & \\ & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & X & \xrightarrow{f} & Y, & \end{array}$$

其上下左右前后 6 个面均为拉回. 这给出了 $(x, e) \in f^*E$ 的邻域 f^*U 和 x 的邻域 f^*V 使得 $f^*U \rightarrow f^*V$ 为同胚 (同胚的拉回还是同胚). \square

由此可得如下推论.

命题 3.1.18

$\mathbf{Et}(X)$ 关于 \mathbf{Top}/X 中的有限极限封闭.

证明. 首先, $\mathbf{Et}(X)$ 的终对象是 \mathbf{Top}/X 的终对象 id_X . 下面考虑拉回. 设 $U \rightarrow W, V \rightarrow W$ 是 $\mathbf{Et}(X)$ 中的两个态射, 那么俯范畴 \mathbf{Top}/X 中的拉回 $U \times_W V$ 等同于 \mathbf{Top} 中的拉回, 配上到 X 明显的映射 (见命题 1.1.29). $U \times_W V \rightarrow U$ 是局部同胚 $V \rightarrow W$ 的拉回, 从而是局部同胚. 因此, 复合映射 $U \times_W V \rightarrow U \rightarrow X$ 是局部同胚. 这说明 $\mathbf{Et}(X)$ 关于 \mathbf{Top}/X 中的拉回封闭, 结论得证. \square

定义 3.1.19 (拓扑空间上的层的逆像)

对于拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 如下定义逆像函子 $f^*: \mathbf{Sh}(Y) \rightarrow \mathbf{Sh}(X)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Sh}(X) & \xleftarrow{f^*} & \mathbf{Sh}(Y) \\ \uparrow r & & \downarrow \Lambda \\ \mathbf{Et}(X) & \xleftarrow{f^*} & \mathbf{Et}(Y) \end{array}$$

上面的定义说明层的逆像的几何直观是从的拉回.

命题 3.1.20 (拉回保持有限极限)

对于拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 拉回 $f^*: \mathbf{Et}(Y) \rightarrow \mathbf{Et}(X)$ 保持有限极限.

证明. 注意到 $f^*: \mathbf{Top}/Y \rightarrow \mathbf{Top}/X$ 有左伴随 Σ_f (命题 1.1.33), 故 $f^*: \mathbf{Top}/Y \rightarrow \mathbf{Top}/X$ 保持任意极限. 而 $\mathbf{Et}(Y)$ 作为 \mathbf{Top}/Y 的全子范畴关于有限极限封闭 (命题 3.1.18), 故 $f^*: \mathbf{Et}(Y) \rightarrow \mathbf{Et}(X)$ 保持有限极限. \square

另外, 层的逆像也可由预层的逆像层化得到. 下面我们说明这一点.

定义 3.1.21 (拓扑空间上预层的逆像)

对于拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 预层的逆像函子 $f^{\text{预}}: \mathbf{Presh}(Y) \rightarrow \mathbf{Presh}(X)$ 是沿 $f^{-1}: \mathbf{Open}(Y) \rightarrow \mathbf{Open}(X)$ 的左 Kan 扩张 (例 A.7.7), 其具体表达式为

$$f^{\text{预}}F(U) = \text{colim}_{f(U) \subset V} F(V).$$

由例 A.7.7, $f^{\text{预}}$ 是 $f_*: \mathbf{Presh}(X) \rightarrow \mathbf{Presh}(Y)$ 的左伴随.

命题 3.1.22 (拓扑空间上的层的逆像, 等价定义)

对于拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 逆像 $f^*: \mathbf{Sh}(Y) \rightarrow \mathbf{Sh}(X)$ 同构于层化 a 与 $f^{\text{预}}$ 的复合.

证明. 在下图中, 我们证明中间的方块交换.

$$\begin{array}{ccccc}
 & \mathbf{Presh}(X) & \xleftarrow{f^{\text{预}}} & \mathbf{Presh}(Y) & \\
 a \swarrow & \downarrow \Lambda & & \downarrow \Lambda & \swarrow i \\
 \mathbf{Sh}(X) & & & & \mathbf{Sh}(Y) \\
 \Gamma \swarrow & & & & \swarrow \Lambda \\
 & \mathbf{Et}(X) & \xleftarrow{f^*} & \mathbf{Et}(Y) &
 \end{array}$$

对于 Y 上的预层 F , 定义预层态射 $f^{\text{预}}F \rightarrow \Gamma f^* \Lambda_F$, 将 $f^{\text{预}}F(U)$ 的元素 $s \in F(V)$ ($f(U) \subset V$) 对应到 $f^* \Lambda_F$ 在 U 上的截面 $x \mapsto (f(x), \dot{s}(x))$. 容易验证该态射在所有茎上诱导双射, 从而诱导了平展空间的同构 $\Lambda f^{\text{预}}F \simeq f^* \Lambda_F$. \square

命题 3.1.23 (拓扑空间上的层的逆像–直像伴随)

拓扑空间之间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 产生了层范畴之间的一对伴随函子

$$\mathrm{Sh}(X) \begin{matrix} \xleftarrow{f^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{f_*} \end{matrix} \mathrm{Sh}(Y),$$

证明. 对 X 上的层 F 与 Y 上的层 G , 有自然同构

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(Y)}(G, f_* F) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Presh}(Y)}(G, f_* F) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Presh}(Y)}(f^{\mathrm{pre}} G, F) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(Y)}(a(f^{\mathrm{pre}} G), F) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(Y)}(f^* G, F). \end{aligned}$$

□

例 3.1.24 (到点的映射, 常值层–整体截面伴随)

拓扑空间 X 到单点空间 pt 有唯一的映射 p . 其直像

$$p_*: \mathrm{Sh}(X) \rightarrow \mathrm{Sh}(\mathrm{pt}) = \mathbf{Set}$$

将 X 上的层 F 对应到其整体截面 (global sections) 的集合 $F(X)$. 逆像

$$p^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathrm{Sh}(X)$$

将集合 A 对应到所谓常值层 \underline{A} . 常值层的茎 \underline{A}_x 同构于 A .

例 3.1.25 (点的嵌入, 茎–摩天大楼伴随)

取定一点 $x \in X$, 其嵌入映射 $i: \mathrm{pt} \rightarrow X$ 的直像

$$i_*: \mathbf{Set} = \mathrm{Sh}(\mathrm{pt}) \rightarrow \mathrm{Sh}(X)$$

将集合 A 对应到 x 处的摩天大楼层 (skyscraper sheaf) $i_*(A)$, 具体地,

$$i_*(A)(U) = \begin{cases} A & x \in U \\ 1 & x \notin U. \end{cases}$$

另一方面, 逆像

$$i^*: \mathrm{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Set}$$

将层 F 对应到其 x 处的茎 F_x .

3.2 位象上的层与平展空间

层与平展空间的关系还可通过位象理论“无点”地处理. 位象上的层与平展空间的定义与拓扑空间的情形无异.

定义 3.2.1 (位象上的层)

设 X 为位象 (定义 2.1.3). 定义 X 上的预层为函子 $\mathcal{O}(X)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 若 X 上的预层 F 满足如下条件, 则称之为层: 对任意 $U \in \mathcal{O}(X)$, 任意覆盖 $U = \bigvee_i U_i$, 以及任意一组相容的元素 $(s_i \in F(U_i))_{i \in I}$, 存在唯一的 $s \in F(U)$ 满足 $s|_{U_i} = s_i \forall i \in I$. 其中相容是指

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \quad (\forall i, j \in I). \quad (3.2)$$

记 $\text{Sh}(X)$ 为 X 上的层在预层范畴中构成的全子范畴.

定义 3.2.2 (位象的局部同胚)

设 $f: E \rightarrow X$ 为位象态射. 若存在 E 的开覆盖 $E = \bigvee_i U_i$ 使得 $f|_{U_i}$ 为 U_i 到 X 的某个开子位象的同构, 则称 f 为局部同胚, 也称 f 为 X 上的平展空间. 记 $\text{Et}(X)$ 为 X 上的平展空间在 Loc/X 中构成的全子范畴.

与拓扑空间的情形类似, 平展空间的截面层给出了函子 $\Gamma: \text{Et}(X) \rightarrow \text{Sh}(X)$. 然而, 为了从层得到平展空间, 我们不能再使用茎的构造, 因为位象中的点不足以控制其上的层. 故下面我们花一些篇幅介绍一个全新的概念, $\mathcal{O}(X)$ -值集合.

位格取值的集合

定义 3.2.3 ($\mathcal{O}(X)$ -值集合)

设 $\mathcal{O}(X)$ 为位格, 定义一个 $\mathcal{O}(X)$ -值集合为一个集合 A 配备一个函数 $A \times A \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 记作 $(a_1, a_2) \mapsto \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket$ (中间的等号是纯粹形式的, 不具有实际的含义), 满足

- (对称性) $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket = \llbracket a_2 = a_1 \rrbracket$;
- (传递性) $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket a_2 = a_3 \rrbracket \leq \llbracket a_1 = a_3 \rrbracket$.

注意我们不要求“自反性” $\llbracket a = a \rrbracket = \top$; 称 $\llbracket a = a \rrbracket$ 为 a 的范围 (extent). 范围为 \top 的元素又称整体元素 (global element). 另外在传递性中令 $a_3 = a_1$, 可知 $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket a_1 = a_1 \rrbracket$, 即“等式”成立的范围不超过等式任何一边的范围.

对于 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A, B , 定义态射 $\phi: A \rightarrow B$ 为映射 $\phi: A \times B \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 满足如下条件:

- $\phi(a, b) \leq \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = b \rrbracket$;
- (关系的性质) $\phi(a_1, b_1) \wedge \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket b_1 = b_2 \rrbracket \leq \phi(a_2, b_2)$;
- (像的唯一性) $\phi(a, b_1) \wedge \phi(a, b_2) \leq \llbracket b_1 = b_2 \rrbracket$;
- (像的存在性) $\llbracket a = a \rrbracket = \bigvee \{\phi(a, b) \mid b \in B\}$.

$\mathcal{O}(X)$ -值集合 A 到自身的恒等态射由 $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket$ 给出. 对于两个态射 $\phi: A \rightarrow B, \psi: B \rightarrow C$, 定义其复合 $\psi\phi: A \rightarrow C$ 为

$$\psi\phi(a, c) = \bigvee \{\phi(a, b) \wedge \psi(b, c) \mid b \in B\}.$$

记 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的范畴为 $\text{Set}(\mathcal{O}(X))$.

命题 3.2.4 ($\text{Set}(\mathcal{O}(X))$ 的范畴论结构)

$\text{Set}(\mathcal{O}(X))$ 是一个意象 (后面将证明它等价于 $\text{Sh}(X)$). 我们不加证明地给出如下范畴论结构的构造.

- $\text{Set}(\mathcal{O}(X))$ 的终对象是 $1 = \{*\}$, $\llbracket * = * \rrbracket = \top$.
- 对于一族 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A_i , 其乘积为 $\prod_i A_i$, $\llbracket (a_i) = (a'_i) \rrbracket = \bigwedge_i \llbracket a_i = a'_i \rrbracket$.
- 对于两个态射 $\phi, \psi: A \rightarrow B$, 其等化子为 A 的底层集合配备一个新的函数 $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket' = \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \bigvee_{b \in B} \phi(a_1, b) \wedge \psi(a_1, b)$.
- 对于 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A , 其子对象等同于函数 $\sigma: A \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 满足 $\sigma(a) \wedge \llbracket a = a' \rrbracket \leq \sigma(a')$, 且 $\sigma(a) \leq \llbracket a = a \rrbracket$.
- $\text{Set}(\mathcal{O}(X))$ 的子对象分类子是 $\mathcal{O}(X)$ 配备函数 $\llbracket U = V \rrbracket = U \Leftrightarrow V := (U \Rightarrow V) \wedge (V \Rightarrow U)$.
- 对于 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A , 其幂对象为 A 的子对象的集合, 配备函数 $\llbracket \sigma = \tau \rrbracket = \bigwedge_{a \in A} \sigma(a) \Leftrightarrow \tau(a)$.

$\mathcal{O}(X)$ -值集合态射 $A \rightarrow B$ 也可由集合的映射 $A \rightarrow B$ 表示.

命题-定义 3.2.5 ($\mathcal{O}(X)$ -值集合态射的表示)

称映射 $f: A \rightarrow B$ 表示了 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的态射 $\phi: A \rightarrow B$ 是指对任意 $a \in A, b \in B$,

$$\phi(a, b) = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a) \rrbracket.$$

对于集合映射 $f: A \rightarrow B$, 它表示某个 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射, 当且仅当对任意 $a_1, a_2 \in A$,

$$\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket.$$

对于两个集合映射 $f, g: A \rightarrow B$, 若它们都表示某个 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射, 那么它们表示的态射相等, 当且仅当对任意 $a \in A$,

$$\llbracket a = a \rrbracket \leq \llbracket f(a) = g(a) \rrbracket.$$

证明.

- 假设存在 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射 $\phi: A \rightarrow B$ 使得 $\phi(a, b) = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a) \rrbracket$. 由 ϕ 的性质有

$$\begin{aligned} \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a_1) \rrbracket &\leq \llbracket b = f(a_2) \rrbracket, \\ \llbracket a = a \rrbracket &\leq \bigvee_{b \in B} \llbracket b = f(a) \rrbracket. \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned} \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket &\leq \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket a_1 = a_1 \rrbracket \\ &\leq \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \left(\bigvee_{b_1 \in B} \llbracket b_1 = f(a_1) \rrbracket \right) \\ &= \bigvee_{b_1 \in B} \left(\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket b_1 = f(a_1) \rrbracket \right) \\ &\leq \bigvee_{b_1 \in B} \left(\llbracket b_1 = f(a_1) \rrbracket \wedge \llbracket b_1 = f(a_2) \rrbracket \right) \\ &\leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket. \end{aligned}$$

- 假设 $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket$, 容易验证 $\phi(a, b) = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a) \rrbracket$ 定义了一个 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射 $\phi: A \rightarrow B$.
- 假设 $f, g: A \rightarrow B$ 表示同一个 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射, 即对任意 $a \in A, b \in B$, $\llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a) \rrbracket = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = g(a) \rrbracket$. 令 $b = f(a)$ 即得 $\llbracket a = a \rrbracket \leq \llbracket f(a) = g(a) \rrbracket$. 反之, 由 $\llbracket a = a \rrbracket \leq \llbracket f(a) = g(a) \rrbracket$ 也可得到 $\llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = f(a) \rrbracket = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = g(a) \rrbracket$.

□

注 3.2.6

在 2.3 节我们说明了位格可视为几何逻辑下的命题理论, 其中的元素是命题 (或真值). 最简单的命题理论是 $\{\top, \perp\}$. 一个 $\{\top, \perp\}$ -值集合即一个集合 A 带有一个等价关系 \sim ; 它同构于商集 A/\sim (商集 A/\sim 作为 $\{\top, \perp\}$ -值带有最小的等价关系). $\mathcal{O}(X)$ -值集合是这个概念的推广, 带有一种“取值于 $\mathcal{O}(X)$ 的等价关系”. 直观上, $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket$ 是 a_1, a_2 相等的范围, 它是 X 的一个开子空间. 态射 $A \rightarrow B$ 则是取值于 $\mathcal{O}(X)$ 的关系 $\phi(a, b)$; 直观上 $\phi(a, b)$ 是 b 可以作为 a 在这个函数下的像的范围. $\mathcal{O}(X)$ -值集合是直觉主义集合论 (intuitionistic set theory) 的模型. 需要注意的是两个同构的 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的底层集合未必同构.

由上面的注, 容易想到将预层视为 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的方法: 预层 F 的“元素”即 F 的截面, 而 $\llbracket s = t \rrbracket$ 是两个截面 s, t 相等的最大开集.

定义 3.2.7 (函子 Θ)

定义函子 $\Theta: \text{Presh}(X) \rightarrow \text{Set}(\mathcal{O}(X))$,

$$\Theta(F) = \coprod_{U \in \mathcal{O}(X)} F(U), \quad \llbracket s = t \rrbracket = \bigvee \{W \mid s|_W = t|_W\}.$$

注意 $\Theta(F)$ 的整体元素正是 F 的整体截面.

对于预层的态射 $\xi: F \rightarrow G$, 有 $\llbracket s = t \rrbracket \leq \llbracket \xi(s) = \xi(t) \rrbracket$, 因此它表示了 $\mathcal{O}(X)$ -集合的态射 $\Theta(\xi): \Theta(F) \rightarrow \Theta(G)$.

定义 3.2.8 ($\mathcal{O}(X)$ -值集合的单元子集)

设 A 为 $\mathcal{O}(X)$ -值集合, 定义 A 的单元子集 (singleton)⁴ 为映射 $\sigma: A \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 满足

- (子集的性质) $\sigma(a) \wedge \llbracket a = b \rrbracket \leq \sigma(b)$;
- (单元集的性质) $\sigma(a) \wedge \sigma(b) \leq \llbracket a = b \rrbracket$.

注意到对于 $a \in A$, 映射 $b \mapsto \llbracket a = b \rrbracket$ 满足上述条件. 记这个单元子集为 \tilde{a} .

命题-定义 3.2.9 ($\mathcal{O}(X)$ -值集合上的关系 \sqsubseteq)

设 A 为 $\mathcal{O}(X)$ -值集合, 定义集合 A 上的一个关系 \sqsubseteq (TeX 代码: `\sqsubseteq`),

$$a \sqsubseteq b \quad \text{当且仅当} \quad \llbracket a = b \rrbracket = \llbracket a = a \rrbracket.$$

⁴单元子集这个名字可能有些不妥, 因为“空集” (即取值 \perp 的常值映射) 也满足这个条件.

那么 $a \sqsubseteq b$ 当且仅当 $\tilde{a} \leq \tilde{b}: A \rightarrow \mathcal{O}(X)$, 也即对任意 $c \in A$, $\llbracket a = c \rrbracket \leq \llbracket b = c \rrbracket$.

证明. 设 $a \sqsubseteq b$, 那么对任意 $c \in A$, $\llbracket a = c \rrbracket = \llbracket a = c \rrbracket \wedge \llbracket a = a \rrbracket = \llbracket a = c \rrbracket \wedge \llbracket a = b \rrbracket \leq \llbracket b = c \rrbracket$. 另一方面, 假设对任意 $c \in A$, $\llbracket a = c \rrbracket \leq \llbracket b = c \rrbracket$. 令 $c = a$ 即得 $\llbracket a = a \rrbracket \leq \llbracket a = b \rrbracket \leq \llbracket a = a \rrbracket$. \square

定义 3.2.10 (完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合)

设 A 为 $\mathcal{O}(X)$ -值集合, 若以下条件成立, 则称 A 为完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合:

- \sqsubseteq 为偏序关系 (即若 $a \sqsubseteq b, b \sqsubseteq a$, 则 $a = b$);
- 对任意 $a \in A$ 以及 $U \leq \llbracket a = a \rrbracket$, 都存在 $a' \sqsubseteq a$ 满足 $\llbracket a' = a' \rrbracket = U$. (此时我们记 $a' = a|_U$).
- 任意一族两两相容的元素 $\{a_i\}$ 在偏序 \sqsubseteq 下有上确界 $s = \bigvee_i a_i$. 其中两个元素 $a, b \in A$ 相容是指 $\llbracket a = b \rrbracket = \llbracket a = a \rrbracket \wedge \llbracket b = b \rrbracket$, 即 a 与 b “在两者共同存在时相等”.

记完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合在 $\text{Set}(\mathcal{O}(X))$ 中构成的全子范畴为 $\text{CSet}(\mathcal{O}(X))$.

命题 3.2.11 (完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的性质)

设 A 为完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合, 那么

- (1) 任意两个元素 $a, b \in A$ 有下确界 $a|_{\llbracket a=b \rrbracket} = b|_{\llbracket a=b \rrbracket} = a \wedge b$.
- (2) 任意一族两两相容的元素 $\{a_i\}$ 的上确界 s 的范围等于所有 a_i 的范围的并.

证明.

- (1) 因为 $\llbracket a = b \rrbracket \leq \llbracket a = a|_{\llbracket a=b \rrbracket} \rrbracket$, $\llbracket a = b \rrbracket \leq \llbracket b = b|_{\llbracket a=b \rrbracket} \rrbracket$, 所以 $\llbracket a = b \rrbracket \leq \llbracket a|_{\llbracket a=b \rrbracket} = b|_{\llbracket a=b \rrbracket} \rrbracket$, 进而可知 $a|_{\llbracket a=b \rrbracket} = b|_{\llbracket a=b \rrbracket}$. 对任意 $c \in A$, 若 $c \sqsubseteq a, c \sqsubseteq b$, 则 $\llbracket c = c \rrbracket = \llbracket c = b \rrbracket \leq \llbracket a = b \rrbracket$, 进而 $\llbracket c = c \rrbracket \leq \llbracket c = a \rrbracket \wedge \llbracket a = a|_{\llbracket a=b \rrbracket} \rrbracket \leq \llbracket c = a|_{\llbracket a=b \rrbracket} \rrbracket$, 即 $c \sqsubseteq a|_{\llbracket a=b \rrbracket}$. 这说明 $a|_{\llbracket a=b \rrbracket}$ 是 a, b 的下确界.
- (2) 记 U 为所有 a_i 的范围的并, 则对 a_i 的任意上界 $s, s|_U$ 也是 a_i 的上界. 由 s 的最小性知 s 的范围为 U .

\square

命题 3.2.12 (完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的等价定义)

$\mathcal{O}(X)$ -值集合 A 完备当且仅当 A 的单元子集均形如 \tilde{a} , 其中 $a \in A$ 唯一确定.

证明.

- 假设 A 完备. 设 σ 为单元子集, 令

$$s = \bigvee_{a \in A} a|_{\sigma(a)},$$

我们断言 $\sigma = \tilde{s}$. 一方面, 因为 $a|_{\sigma(a)} \subseteq s$, 所以

$$\sigma(a) = \llbracket a|_{\sigma(a)} = a|_{\sigma(a)} \rrbracket = \llbracket s = a|_{\sigma(a)} \rrbracket \leq \llbracket s = a \rrbracket = \tilde{s}(a).$$

另一方面, $\sigma(s)$ 是所有 $\sigma(a)$ 中最大者, 而 s 的范围等于所有 $\sigma(a)$ 的并, 故 s 的范围等于 $\sigma(s)$; 这表明

$$\tilde{s}(a) \leq \sigma(s) \wedge \llbracket s = a \rrbracket \leq \sigma(a).$$

断言得证.

- 假设 A 的单元子集均形如 \tilde{a} , 且 a 唯一确定. 我们证明 A 完备.

- 若 $a \subseteq b$ 且 $b \subseteq a$, 则 $\tilde{a} = \tilde{b}$, $a = b$.
- 对任意 $a \in A$ 以及 $U \leq \llbracket a = a \rrbracket$, 考虑

$$\sigma: b \mapsto \llbracket a = b \rrbracket \wedge U,$$

那么存在 $a|_U$ 使得 $\sigma = \widetilde{a|_U}$; 此时有 $a|_U \subseteq a$ 且 $\llbracket a|_U = a|_U \rrbracket = U$.

- 对任意一族两两相容的元素 $\{a_i\}$, 考虑

$$\sigma: b \mapsto \bigvee_i \llbracket b = a_i \rrbracket,$$

那么存在 s 使得 $\sigma = \tilde{s}$; 我们说明 s 是 $\{a_i\}$ 的上确界. 首先, $\tilde{s}(a_i) \geq \llbracket a_i = a_i \rrbracket$, 故 $a_i \subseteq s$. 其次, 对 a_i 的任意上界 s' , 有 $\tilde{s}(s') = \bigvee_i \llbracket s' = a_i \rrbracket = \bigvee_i \llbracket s = a_i \rrbracket = \tilde{s}(s)$, 即 $s \subseteq s'$.

□

上面的命题暗示了完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合与 X 上的层有密切的关系.

命题 3.2.13 (层与完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合)

设 F 是位象 X 上的预层, 则 F 是层当且仅当 $\Theta(F)$ 是完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合. 进一步, 所有的完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合都形如 $\Theta(F)$.

证明. 对于 $\Theta(F)$ 的元素 $a \in F(U), b \in F(V)$, $a \sqsubseteq b$ 当且仅当 $U \leq V$ 且 $b|_U = a$. 完备性的定义中前两条自动成立; 第三条 “任意一族两两相容的元素有上确界” 即是层条件, 因此 F 是层当且仅当 $\Theta(F)$ 是完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合.

设 A 为完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合, 令

$$F(U) = \{a \in A \mid \llbracket a = a \rrbracket = U\},$$

那么 F 为层, 并且 $A = \Theta(F)$. □

下面的命题指出完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合间的态射总是可由一个普通的集合映射表示.

命题 3.2.14 (完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合间态射的刻画)

设 $\phi: A \rightarrow B$ 是 $\mathcal{O}(X)$ -值集合的态射. 若 B 完备, 则存在唯一的 (底层集合之间的) 映射 $f: A \rightarrow B$ 使得 $\phi(a, b) = \llbracket f(a) = b \rrbracket$. 进一步有

- $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket$;
- $\llbracket a = a \rrbracket = \llbracket f(a) = f(a) \rrbracket$;
- f 保持偏序关系 \sqsubseteq .

证明. 对每个 $a \in A$ 考虑 B 的单元子集 $b \mapsto \phi(a, b)$, 由完备性, 它可表示为 $\widetilde{f(a)}$ 的形式, 也即 $\phi(a, b) = \llbracket f(a) = b \rrbracket$. 这确定了一个映射 $f: A \rightarrow B$. 注意到

- $\llbracket a = a \rrbracket = \bigvee_{b \in B} \phi(a, b) = \bigvee_{b \in B} \llbracket f(a) = b \rrbracket = \llbracket f(a) = f(a) \rrbracket$;
- $\llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket a_1 = a_1 \rrbracket = \llbracket f(a_1) = f(a_1) \rrbracket = \phi(a_1, f(a_1))$;
- $\phi(a_1, f(a_1)) \wedge \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \phi(a_2, f(a_2)) \leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket$;
- 若 $a_1 \sqsubseteq a_2$, 则 $\llbracket f(a_1) = f(a_1) \rrbracket = \llbracket a_1 = a_1 \rrbracket = \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \leq \llbracket f(a_1) = f(a_2) \rrbracket$.

这证明了所需的结论. □

由命题 3.2.13, 3.2.14 得如下的推论.

命题 3.2.15

函子 Θ 诱导了范畴等价 $\Theta: \text{Sh}(X) \rightarrow \text{CSet}(\mathcal{O}(X))$.

命题-定义 3.2.16 ($\mathcal{O}(X)$ -值集合的完备化)

任何 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A 都同构于某个完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 \tilde{A} , 称为 A 的完备化. 因此有范畴等价 $\mathbf{Set}(\mathcal{O}(X)) \simeq \mathbf{CSet}(\mathcal{O}(X))$.

证明. 定义 \tilde{A} 为 A 的单元子集 (定义 3.2.10) $\sigma: A \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 的集合,

$$\llbracket \sigma = \tau \rrbracket := \bigvee_{a \in A} (\sigma(a) \wedge \tau(a)).$$

我们说明 \tilde{A} 是完备的.

- 对于 $\sigma, \tau \in \tilde{A}$, 假设 $\sigma \sqsubseteq \tau$, 由定义, $\bigvee_{a \in A} (\sigma(a) \wedge \tau(a)) = \bigvee_{a \in A} \sigma(a)$. 那么对任意 $a' \in A$,

$$\begin{aligned} \sigma(a') &\leq \sigma(a') \wedge \bigvee_{a \in A} \sigma(a) \\ &= \sigma(a') \wedge \bigvee_{a \in A} (\sigma(a) \wedge \tau(a)) \\ &= \bigvee_{a \in A} (\sigma(a') \wedge \sigma(a) \wedge \tau(a)) \\ &\leq \bigvee_{a \in A} (\llbracket a' = a \rrbracket \wedge \tau(a)) \leq \tau(a'). \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\sigma \sqsubseteq \tau$ 当且仅当 $\sigma(a) \leq \tau(a) (\forall a \in A)$. 因此 \sqsubseteq 是一个偏序关系.

- 对任意 $\sigma \in \tilde{A}$ 以及 $U \leq \llbracket \sigma = \sigma \rrbracket = \bigvee_{a \in A} \sigma(a)$, 定义

$$\sigma|_U(a) := \sigma(a) \wedge U,$$

那么 $\sigma|_U \sqsubseteq \sigma$, 且 $\llbracket \sigma|_U = \sigma|_U \rrbracket = U$.

- 对于 $\sigma, \tau \in \tilde{A}$, 两者相容的条件为

$$\bigvee_{a \in A} (\sigma(a) \wedge \tau(a)) = \left(\bigvee_{a \in A} \sigma(a) \right) \wedge \left(\bigvee_{a \in A} \tau(a) \right) = \bigvee_{a, a' \in A} (\sigma(a) \wedge \tau(a')).$$

对任意一族两两相容的元素 $\{\sigma_i\}$, 定义函数 $\sigma: A \rightarrow \mathcal{O}(X)$,

$$\sigma(a) := \bigvee_i \sigma_i(a),$$

那么 $\sigma(a) \wedge \llbracket a = a' \rrbracket \leq \sigma(a')$, 且

$$\begin{aligned}
 \sigma(a) \wedge \sigma(a') &= \bigvee_{i,j} \sigma_i(a) \wedge \sigma_j(a') \\
 &= \bigvee_{i,j} \bigvee_{a'',a''' \in A} (\sigma_i(a) \wedge \sigma_i(a'') \wedge \sigma_j(a') \wedge \sigma_j(a''')) \\
 &= \bigvee_{i,j} \bigvee_{a'' \in A} (\sigma_i(a) \wedge \sigma_i(a'') \wedge \sigma_j(a') \wedge \sigma_j(a'')) \\
 &\leq \bigvee_{i,j} \bigvee_{a'' \in A} (\llbracket a = a'' \rrbracket \wedge \llbracket a'' = a' \rrbracket) \leq \llbracket a = a' \rrbracket.
 \end{aligned}$$

这说明 $\sigma \in \tilde{A}$. 由偏序关系 \sqsubseteq 的刻画, 知 σ 是 σ_i 的上确界.

考虑映射 $\phi: A \times \tilde{A} \rightarrow \mathcal{O}(X)$, $\phi(a, \sigma) = \sigma(a)$. 它既可视作 A 到 \tilde{A} 的态射, 又可视作 \tilde{A} 到 A 的态射. 由下列事实, 这两个态射互逆, 因此 $A \simeq \tilde{A}$.

- $\sigma_1(a_1) \wedge \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket \wedge \llbracket \sigma_1 = \sigma_2 \rrbracket \leq \sigma_1(a_2) \wedge \llbracket \sigma_1 = \sigma_2 \rrbracket \leq \sigma_2(a_2)$.
- $\sigma(a_1) \wedge \sigma(a_2) \leq \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket$.
- $\sigma_1(a) \wedge \sigma_2(a) \leq \llbracket \sigma_1 = \sigma_2 \rrbracket$.
- $\bigvee_{\sigma \in \tilde{A}} \sigma(a_1) \wedge \sigma(a_2) = \llbracket a_1 = a_2 \rrbracket$.
- $\bigvee_{a \in A} \sigma_1(a) \wedge \sigma_2(a) = \llbracket \sigma_1 = \sigma_2 \rrbracket$.

□

接下来我们将完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合转化为 X 上的平展空间.

命题-定义 3.2.17 (函子 Δ)

定义函子 $\Delta: \mathbf{CSet}(\mathcal{O}(X)) \rightarrow \mathbf{Et}(X)$,

$$\Delta(A) = \text{colim}_{a \in A} (\llbracket a = a \rrbracket \rightarrow X) \in \mathbf{Loc}/X.$$

其中余极限是 \mathbf{Loc}/X 中的余极限, 指标范畴由定义 3.2.10 中的偏序 \sqsubseteq 给出.

证明. 首先证明 $\Delta(A)$ 是 X 上的平展空间. \mathbf{Loc}/X 中的余极限即 \mathbf{Loc} 中的余极限 (命题 1.1.30), 即 \mathbf{Frm} 中的极限

$$\begin{aligned}
 \mathcal{O}(\Delta(A)) &= \lim_{a \in A}^{\mathbf{Frm}} \mathcal{O}(\llbracket a = a \rrbracket) \\
 &= \left\{ (U_a)_{a \in A} \in \prod_{a \in A} \mathcal{O}(\llbracket a = a \rrbracket) \mid \forall a, b \in A (b \sqsubseteq a \Rightarrow U_b = U_a \wedge \llbracket b = b \rrbracket) \right\},
 \end{aligned}$$

$\llbracket a = a \rrbracket$ 对应 $\mathcal{O}(\Delta(A))$ 的元素 $(\llbracket a = b \rrbracket)_{b \in A}$, 这些开子空间覆盖了 $\Delta(A)$. 因此 $\Delta(A)$ 确实是 X 上的平展空间.

下面验证 Δ 的函子性. 对于完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合态射 $f: A \rightarrow B$ (命题 3.2.14), 由于 $\llbracket f(a) = f(a) \rrbracket = \llbracket a = a \rrbracket$, f 保持 \sqsubseteq (命题 3.2.14), 指标范畴之间的函子诱导余极限之间的态射

$$\Delta(A) = \operatorname{colim}_{a \in A} (\llbracket a = a \rrbracket) \rightarrow \operatorname{colim}_{b \in B} (\llbracket b = b \rrbracket) = \Delta(B).$$

□

注 3.2.18

与拓扑空间的情形类似 (见注 3.1.10), $\Delta\Theta$ 是如下的米田扩张.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(X) & \xrightarrow{j} & \operatorname{Presh}(X) \\ & \searrow i & \downarrow \Delta\Theta \\ & & \operatorname{Loc}/X \end{array}$$

命题 3.2.19

对任意位象 X , 如下三个函子均为范畴等价.

$$\begin{array}{ccc} & \operatorname{Et}(X) & \\ \Gamma \swarrow & & \nwarrow \Delta \\ \operatorname{Sh}(X) & \xrightarrow{\Theta} & \operatorname{CSet}(\mathcal{O}(X)) \end{array}$$

证明. 参见 [17] 定理 C1.3.11. 我们证明三个函子以任意方式复合均等价于恒等函子.

先从 X 上的层 F 开始. 由定义,

$$\Delta\Theta F = \operatorname{colim}_{s \in F(V), V \in \mathcal{O}(X)} V,$$

其中每个截面 $s \in F(V)$ 可视为一个元素 $s \in \Theta(F)$, 其范围 $\llbracket s = s \rrbracket = V$, 对应一个位象态射 $\lambda_s: V \rightarrow \Delta\Theta F$, 也即平展空间 $\Delta\Theta F$ 在 V 上的一个截面. 进一步, 对于 $W \leq V$, $s|_W$ 对应的映射为 $\lambda_{s|_W}: W \hookrightarrow V \xrightarrow{\lambda_s} \Delta\Theta F$. 因此这一过程给出了层的同态 $\lambda: F \rightarrow \Gamma\Delta\Theta F$. 为了证明 λ 为同构, 令 σ 为 $\Delta\Theta F$ 在 $U \in \mathcal{O}(X)$ 上的任何一个截面, 对每个 $s \in F(V)$ 考虑平展空间的拉回

$$\begin{array}{ccc} W_s & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \sigma \\ V & \xrightarrow{\lambda_s} & \Delta\Theta F, \end{array}$$

则 W_s 是 X 的开子空间, $W_s \leq U \wedge V$ ⁵. 上图中的态射 $W_s \rightarrow \Delta\Theta F$ 作为 $\Delta\Theta F$ 在 V_s 上的截面正是 σ 在 W_s 上的限制. 可以证明当 s 取遍 F 的元素时, $s|_{W_s}$ 构成 F 的相容族 (即对任意 $s \in F(V), s' \in F(V'), W_s \wedge W_{s'} \leq \llbracket s = s' \rrbracket$), 由 F 为层, 这些截面拼成了一个截面 $\bar{\sigma} \in F(U)$ 使得 $\lambda_{\bar{\sigma}} = \sigma$. 这证明了 λ 为同构.

从完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合 A 开始, 证明 $\Theta\Gamma\Delta A \simeq A$ 的方法与上述论证无异, 因为我们已经建立了完备 $\mathcal{O}(X)$ -值集合与层之间的等价 (命题 3.2.13).

最后, 设 $p: E \rightarrow X$ 为平展空间, 由定义, $\Theta\Gamma E$ 是 E 在所有 $U \in \mathcal{O}(X)$ 上的截面 $s: U \rightarrow E$ 的集合, 因为所有这些截面 $s: U \rightarrow E$ 构成了 E 的开覆盖, 所以它们构成余极限余锥, 从而有 $\Delta\Theta\Gamma E = \text{colim}_s U \simeq E$. \square

3.3 范畴上的预层

定义 3.3.1 (小范畴上的预层)

设 \mathcal{C} 是小范畴. 定义 \mathcal{C} 上的预层 (presheaf) 是 \mathcal{C}^{op} 到 \mathbf{Set} 的函子. 记 \mathcal{C} 上的预层范畴为 $\widehat{\mathcal{C}} := \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$.

注 3.3.2 (预层的一种重要观点)

设 \mathcal{C} 为一系列熟悉的几何对象组成的范畴, 如单纯形 (例 3.3.4), 欧氏空间 (例 3.4.23). 想象一个未知的空间 F , 我们了解这个空间仅有的手段就是用 \mathcal{C} 的对象 c 来探测 (probe), 即考虑态射 “ $c \rightarrow F$ ”. 记 $F(c)$ 为所有态射 “ $c \rightarrow F$ ” 的集合, 那么态射 $d \rightarrow c$ 与态射 “ $c \rightarrow F$ ” 应当可以复合为 $d \rightarrow c \rightarrow F$, 给出集合的映射 $F(c) \rightarrow F(d)$. 这便是预层 $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 由米田引理, 态射 “ $c \rightarrow F$ ” 可赋予真实的含义, 它就是态射 (自然变换) $\text{y}(c) \rightarrow F$. 在后文中, 我们将不再区分态射 $\text{y}(c) \rightarrow F$ 与 $F(c)$ 的元素.

例 3.3.3 (集合)

记 $\mathbf{1}$ 为仅有一个对象和一个态射的范畴. $\mathbf{1}$ 上的预层范畴 $\widehat{\mathbf{1}} = \mathbf{Set}^{\mathbf{1}^{\text{op}}}$ 等同于集合范畴 \mathbf{Set} . 它也可视为单点空间上的层范畴; 它在意象中扮演的角色等同于一个点在拓扑空间中扮演的角色.

⁵这里 $U \wedge V$ 以及下面出现的 \wedge 指的是作为 X 的开子空间的交. W_s 不一定等于 $U \wedge V$, 因为 W_s 是 U 和 V 在 X 上的一个平展空间中的交.

例 3.3.4 (单纯集)

令范畴 Δ 为有限全序集 $[0], [1], [2], \dots$ 与保序映射构成的范畴, 其中 $[n] = \{0, 1, \dots, n\}$ (称映射 $f: [n] \rightarrow [m]$ 为保序映射是指当 $i \leq j$ 时 $f(i) \leq f(j)$), $[n]$ 是抽象的 n 维单纯形. 称范畴 Δ 为单纯形范畴 (simplex category). 单纯形范畴上的预层称为单纯集 (simplicial set), 其直观是可用单纯形来探测的空间. 记单纯集的范畴为 $\mathbf{sSet} = \widehat{\Delta} = \mathbf{Fun}(\Delta^{\text{op}}, \mathbf{Set})$.

对于单纯集 $X: \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $X([n])$ 的直观是 X 中 n 维单形的集合 (其中含有“退化”的单形). 记米田嵌入 $\mathbf{y}([n])$ 为 Δ^n , 米田引理告诉我们

$$X([n]) \simeq \mathbf{Hom}_{\mathbf{sSet}}(\Delta^n, X),$$

因此上述 $X([n])$ 的直观是合理的.

例 3.3.5 (有向图)

有向图可用类似于单纯集 (例 3.3.4) 的方式定义. 考虑范畴

$$\mathcal{C} = \left\{ [0] \xrightleftharpoons[t]{s} [1] \right\},$$

其中 $s, t: [0] \rightarrow [1]$ 分别将 $0 \in [0]$ 映射到 $0 \in [1]$ 和 $1 \in [1]$. 那么 \mathcal{C} 上的预层 $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可视为有向图: $X([0])$ 是有向图的顶点集, $X([1])$ 是有向图的边集; 映射 $X(s), X(t): X([1]) \rightarrow X([0])$ 将有向图的边对应到其起点与终点.

例 3.3.6 (G -集)

设 G 是群. 定义范畴 BG 为仅有一个对象的范畴, 这个对象到自身的态射集为 G . BG 上的预层是函子 $(BG)^{\text{op}} \simeq B(G^{\text{op}}) \rightarrow \mathbf{Set}$, 等同于具有 G^{op} -左作用即 G -右作用的集合, 也称为 G -集或 G 的表示. 记 G -集的范畴为 $G\mathbf{Set}$.

下面我们说明小范畴 \mathcal{C} 上的预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是一个意象.

预层范畴中的极限与余极限**命题 3.3.7 (预层范畴完备且余完备)**

$\widehat{\mathcal{C}}$ 是完备 (complete) 且余完备 (cocomplete) 的, 也即具有一切 (小) 极限与余极限.

证明. 预层的极限可“逐点”计算: 设 $F: I \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}, i \mapsto F_i$ 是任意图表, 那么其极限为

$$(\lim_I F_i)(c) = \lim_I F_i(c),$$

余极限类似. □

事实上, 函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 中的极限和余极限都是逐点的 (假设相应的极限在 \mathcal{D} 中存在). 这可以解释为 Kan 扩张的函子性, 因为极限和余极限是 Kan 扩张的特殊情况 (例 A.7.3).

例 3.3.8 (预层范畴中常用的极限和余极限)

- $\widehat{\mathcal{C}}$ 的终对象 (空图的极限) 是常值预层 1, 将所有对象 c 对应到 Set 的终对象 1.
- $\widehat{\mathcal{C}}$ 的始对象 (空图的余极限) 是常值预层 0.
- $\widehat{\mathcal{C}}$ 中两个对象 X, Y 的和与积满足

$$(X + Y)(c) \simeq X(c) + Y(c), \quad (X \times Y)(c) \simeq X(c) \times Y(c).$$

- $\widehat{\mathcal{C}}$ 中态射 $f: X \rightarrow Y$ 的像 $\text{im } f = \text{coeq}(X \times_Y X \rightrightarrows X) \hookrightarrow Y$ (命题 1.3.24) 是如下预层:

$$(\text{im } f)(c) = \text{im}(f_c: X(c) \rightarrow Y(c)).$$

预层范畴中的指数对象

命题 3.3.9

$\widehat{\mathcal{C}}$ 是积闭范畴.

证明. 对 $X, Y \in \widehat{\mathcal{C}}$, 我们不能以 $Y^X(c) = Y(c)^{X(c)}$ 来定义指数对象 Y^X , 因为这个构造没有函子性. 一种可行的思路如下. 假设指数对象 Y^X 存在, 即有 (关于 Z 的) 自然同构

$$\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Z, Y^X) \simeq \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Z \times X, Y).$$

代入 $Z = \mathfrak{y}(c)$, 由米田引理便得到 (关于 c 的) 自然同构

$$Y^X(c) = \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c) \times X, Y),$$

这已经确定了函子 Y^X . 对任意 $Z \in \widehat{\mathcal{C}}$, 将其表示为可表函子的余极限 $Z = \text{colim}_{\mathfrak{y}(c) \rightarrow Z} \mathfrak{y}(c)$

(命题 A.4.7), 那么

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Z, Y^X) &\simeq \lim_{\mathfrak{J}(c) \rightarrow Z} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{J}(c), Y^X) \\
 &\simeq \lim_{\mathfrak{J}(c) \rightarrow Z} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{J}(c) \times X, Y) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathrm{colim}_{\mathfrak{J}(c) \rightarrow Z} (\mathfrak{J}(c) \times X), Y) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Z \times X, Y).
 \end{aligned}$$

最后一步用到 $- \times X$ 保持余极限, 因为预层的余极限是逐点的. \square

由于预层范畴的俯范畴也是预层范畴 (命题 A.4.16), 我们得到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 甚至是局部积闭范畴.

预层范畴中的子对象分类子

本节的目标是描述预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的子对象以及子对象分类子.

命题-定义 3.3.10 (子函子)

$\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射 $Y \rightarrow X$ 是单射, 当且仅当对每个对象 c , 映射 $Y(c) \rightarrow X(c)$ 都是子集, 且对每个态射 $c \rightarrow d$, 映射 $Y(d) \rightarrow Y(c)$ 都是 $X(d) \rightarrow X(c)$ 的限制; 此时也称 $Y \rightarrow X$ 为子函子 (subfunctor).

证明. 由单射的拉回刻画 (命题 1.3.4) 以及 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中极限的逐点计算 (命题 3.3.7) 即证. \square

筛的概念可帮助描述预层范畴的子对象分类子.

定义 3.3.11 (筛)

范畴 \mathcal{C} 的对象 c 上的一个筛 (英 sieve, 法 crible) 是指 \mathcal{C} 中一族指向 c 的箭头 $S = \{f: d \rightarrow c\}$, 构成 \mathcal{C} 的右理想; 也即对任意 $f \in S$ 与 \mathcal{C} 中任意箭头 g , 只要 fg 可定义, 就有 $fg \in S$.

对于两个筛 R, S , 若 $R \subset S$, 则称 R 比 S 更细, 或 R 是 S 的一个细化 (refinement). 设 R 是一族指向 c 的箭头, 定义 R 生成的筛为 $\{e \rightarrow d \rightarrow c \mid (d \rightarrow c) \in R\}$, 也即包含 R 中所有箭头的最细的筛.


对于 \mathcal{C} 中的态射 $f: d \rightarrow c$ 以及 c 上的筛 S , 定义筛的拉回 f^*S 为

$$f^*S = \{g: e \rightarrow d \mid fg \in S\}.$$

当范畴 \mathcal{C} 中存在拉回时, f^*S 恰好由 S 中所有元素沿 f 的拉回构成.

注 3.3.12 (筛的直观)

在现实生活中, 筛是一种能把大的东西挡住, 让小的东西通过的工具. 想象 S 的元素为可以“通过” S 的箭头. 若 $d \xrightarrow{f} c$ 可以“通过” S , 那么 $e \xrightarrow{g} d \xrightarrow{f} c$ 比 $d \xrightarrow{f} c$ “小”, 从而它也可以“通过” S .



一个筛越细, 能“通过”它的东西就越少, 这解释了细化的含义; 反之, 所有东西都能通过的筛就是最粗的筛.

例 3.3.13 (偏序集中的筛)

对于偏序集 P 的元素 p , 记 $\downarrow p = \{x \in P \mid x \leq p\}$. 那么 p 上的一个筛 S 即是 $\downarrow p$ 的子集, 使得若 $x \in S, y \leq x$, 则 $y \in S$. 称这样的 S 为 $\downarrow p$ 的向下封闭子集.

例 3.3.14 (覆盖产生筛)

设 X 为拓扑空间, $\{U_i\}$ 是其中开集 V 的一个开覆盖. 那么

$$\{W \subset V \mid \exists i, W \subset U_i\}$$

构成 $\text{Open}(X)$ 中 V 上的一个筛. 直观上每个 U_i 是筛上的一个“洞”, 比它小的对象能“通过”这个筛.

命题 3.3.15 (筛与子函子)

范畴 \mathcal{C} 的对象 c 上的筛自然地一一对应于 $\mathfrak{y}(c)$ 的子函子.

证明. 设 S 是 c 上的筛, 那么

$$X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}, X(d) := \{f: d \rightarrow c \mid f \in S\} \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(d, c) = \mathfrak{y}(c)(d)$$

构成 $\mathfrak{y}(c)$ 的子函子. 设 $X \rightarrow \mathfrak{y}(c)$ 为子函子, 那么

$$S := \{f: d \rightarrow c \mid f \in X(d)\}$$

是 c 上的筛. 很明显, 这两个对应是互逆的. 注意 X 的函子性恰好等价于筛 S 为右理想.

容易验证筛 S 沿态射 $f: d \rightarrow c$ 的拉回等同于 $\downarrow(c)$ 的子对象 X 沿 $f: \downarrow(d) \rightarrow \downarrow(c)$ 的拉回. \square

在后文中, 我们将自由地运用上述对应, 将 c 上的筛与 $\downarrow(c)$ 的子函子完全等同, 请读者务必熟悉.

例 3.3.16 (主筛)

对于范畴 \mathcal{C} 中的态射 $f: c' \rightarrow c$, 所有穿过 f 的态射 $c'' \rightarrow c' \xrightarrow{f} c$ 构成 c 上的一个筛 $\downarrow f$, 称为主筛 (principal sieve). 这类似于环的主理想. $\downarrow f$ 对应的 $\downarrow(c)$ 的子函子恰为 $\downarrow(f): \downarrow(c') \rightarrow \downarrow(c)$ 的像.

例 3.3.17 (覆盖产生的筛对应的子函子)

继续例 3.3.14, 设 S 为覆盖 $\{U_i\}$ 生成的筛 (视为 $\downarrow(V)$ 的子函子), 那么下图是余等化子.

$$\coprod_{i,j} \downarrow(U_i \cap U_j) \rightrightarrows \coprod_i \downarrow(U_i) \longrightarrow S \quad (3.3)$$

这是因为, 由 S 的定义, 对 $W \in \text{Open}(X)$, 若存在 i , $W \subset U_i$, 则 $S(W)$ 是单元集; 否则 $S(W)$ 是空集. 由此可知下图是集合范畴中的余等化子.

$$\coprod_{i,j} \text{Hom}_{\text{Open}(X)}(W, U_i \cap U_j) \rightrightarrows \coprod_i \text{Hom}_{\text{Open}(X)}(W, U_i) \rightarrow S(W)$$

而预层的余极限是“逐点”的, 于是得 (3.3).

对 X 上的任意预层 F , 以 $\text{Hom}_{\text{Presh}(X)}(-, F)$ 作用于 (3.3), 可知下图是集合范畴中的等化子.

$$\text{Hom}_{\text{Presh}(X)}(S, F) \longrightarrow \prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \cap U_j) \quad (3.4)$$

因此态射集合 $\text{Hom}_{\text{Presh}(X)}(S, F)$ 表达了预层 F 关于覆盖 $\{U_i\}$ 的下降资料 (descent data), 由覆盖 $\{U_i\}$ “下降”到 V . 若 F 为层, 就应该有

$$\text{Hom}_{\text{Presh}(X)}(S, F) \simeq F(V) \simeq \text{Hom}_{\text{Presh}(X)}(\downarrow(V), F).$$

例 3.3.18 (极大筛)

所有指向 c 的箭头的集合称为极大筛, 也即最粗的筛. 它对应 $\downarrow(c)$ 的子对象 $\downarrow(c)$ 自身. 注意, c 上的一个筛是极大筛当且仅当它包含 id_c . 设 S 是 c 上的筛, $f: d \rightarrow c$, 那么 $f \in S$ 当且仅当 f^*S 为 d 上的极大筛.

预层范畴的子对象分类子

假设 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中存在子对象分类子 Ω , 那么 Ω 是确定的: 由米田引理, 有自然同构

$$\Omega(c) \simeq \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{J}(c), \Omega) \simeq \text{Sub}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{J}(c)) \simeq \{c \text{ 上的筛}\}.$$

下面证明这个预层确实是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子.

命题 3.3.19 (预层范畴的子对象分类子)

在任意范畴 \mathcal{C} 上, 定义预层 $\Omega: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $\Omega(c) := \{c \text{ 上的筛}\}$, 且对态射 $f: d \rightarrow c$, $\Omega(f): \Omega(c) \rightarrow \Omega(d)$ 为筛的拉回. 那么 Ω 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子.

证明. 定义态射 $\top: 1 \rightarrow \Omega$, 对每个对象 c 选出 $\Omega(c) = \text{Sub}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{J}(c))$ 中的子对象 $\mathfrak{J}(c)$ 自身, 也即 c 上的极大筛. 设 $Y \rightarrow X$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的任意子对象. 定义态射 $\chi: X \rightarrow \Omega$, 将 $x \in X(c)$ 对应到 c 上的筛

$$\chi_c(x) := \{f: d \rightarrow c \mid X(f)(x) \in Y(d)\}. \quad (\star)$$

注意 $\chi_c(x)$ 是极大筛当且仅当 $\text{id}_c \in \chi_c(x)$, 也即 $x \in Y(c)$, 所以子对象 $Y \rightarrow X$ 是如下的拉回.

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \top \\ X & \xrightarrow{\chi} & \Omega \end{array}$$

这证明了 Ω 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子, 且 $\top: 1 \rightarrow \Omega$ 是万有子对象. □

注 3.3.20 (特征函数的定义的解释)

假设下图中右侧方块以及长方形为拉回, 可得左侧方块为拉回,

$$\begin{array}{ccccc} \chi_c(x) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \top \\ \mathfrak{J}(c) & \xrightarrow{x} & X & \xrightarrow{\chi} & \Omega \end{array}$$

因此 $\chi_c(x) = \{f \in \mathfrak{J}(c)(d) \mid x \circ f \in Y(d)\}$. 注意到对于 $x \in X(c)$, 有 $x \in Y(c)$ 当且仅当上图中存在提升 $\mathfrak{J}(c) \rightarrow Y$, 当且仅当 $\chi_c(x) = \mathfrak{J}(c)$. 这解释了态射 $\chi: X \rightarrow \Omega$ 的构造.

综合上述论证, 我们得到

命题 3.3.21

$\widehat{\mathcal{C}}$ 是一个意象.

例 3.3.22 (G -集)

例 3.3.6 介绍了 G -集范畴, 即 BG 上的预层范畴. 由于 BG 只有一个对象且态射均为自同构, 其上仅有两个筛, 空集与极大筛.

因此, G -集范畴的子对象分类子 Ω 是二元集合 $\{\top, \perp\}$, 其上带有 G 的平凡作用. 事实上, 一个 G -集 X 的子对象 Y 是其中 G -作用下封闭的子集. 其对应的特征函数 $X \rightarrow \{\top, \perp\}$ 就是子集 Y 的特征函数.

3.4 景

Attempting to define a “Weil cohomology” with the formal properties necessary to establish the Weil conjectures, Grothendieck discovered étale cohomology, a fusion of ordinary sheaf cohomology and Galois cohomology. The definition required an extension of the concept of sheaf to the idea of a sheaf on a site — a category equipped with an a priori notion of covering.

André Joyal, Myles Tierney, [19]

Grothendieck 意识到, 层的概念所需的关键信息是一个对象 U 何时被一族进入 U 的态射 (甚至不一定是 U 的子对象) 所覆盖.

从覆盖到 Grothendieck 拓扑

本小节有许多的定义, 在读者看来这些定义可能有些冗余. 这或许是历史的遗留, 但每个定义有各自的长处.

定义 3.4.1 (覆盖结构)

范畴 \mathcal{C} 上的一个覆盖结构 (coverage) T 是如下资料: 对每个对象 c 指定一个集合 $T(c)$, 其元素为态射族 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$, 称为 c 的 T -覆盖族 (covering family), 满足

- (拉回下的稳定性) 若 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I} \in T(c)$, 对任意态射 $g: d \rightarrow c$, 存在 $\{h_j: d_j \rightarrow d\}_{j \in J} \in T(d)$ 使得每个 gh_j 都穿过某个 f_i .

对于两个覆盖结构 T, T' , 若 $T \subset T'$, 则称 T' 较细 (fine).

注 3.4.2 (具有拉回的范畴上的覆盖结构)

对于具有拉回的范畴 \mathcal{C} , 我们通常要求覆盖结构满足如下更强的条件.

- (拉回下的稳定性) 若 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I} \in T(c)$, $g: d \rightarrow c$, 则 $\{g^*(f_i): d_i \rightarrow d\}_{i \in I} \in T(d)$.

定义 3.4.3 (关于态射族的层条件)

设 F 是范畴 \mathcal{C} 上的预层. 设 $M = \{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$ 是 \mathcal{C} 中的一族共终点的态射. 称 F 满足关于 M 的层条件, 是指对任意一组相容的元素 $(s_i \in F(c_i))_{i \in I}$, 存在唯一的 $s \in F(c)$ 满足

$$F(f_i)(s) = s_i \forall i \in I.$$

其中, 一组元素 $(s_i \in F(c_i))_{i \in I}$ 相容是指对任意态射 $f: d \rightarrow c_i$, $g: d \rightarrow c_j$, 有

$$F(f)(s_i) = F(g)(s_j) \in F(d).$$

若将上面的“存在唯一”改为“存在至多一个”, 得到的条件称为分离性条件.

在 \mathcal{C} 具有拉回的条件下, 层条件可简洁地表述为如下等化子,

$$F(c) \longrightarrow \prod_i F(c_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(c_i \times_c c_j).$$

设 $S \rightarrow \mathcal{Y}(c)$ 是 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$ 生成的筛对应的子函子 (命题 3.3.15), 那么一组相容的元素等同于自然变换 $S \rightarrow F$, 从而层条件等价于自然变换 $S \rightarrow F$ 唯一地穿过 $\mathcal{Y}(c)$, 也即如下映射是同构.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{Y}(c), F) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S, F)$$

(分离性条件等价于它是单射.) 对比例 3.3.17 中的式 (3.4). F 关于 S 的层条件也可表述为 F 是关于 $S \rightarrow \mathcal{Y}(c)$ 的局部对象 (定义 A.3.9), 这种表述的优势在于能一字不改地推广为 Lawvere–Tierney 拓扑的层条件 (定义 3.7.7).

定义 3.4.4 (关于覆盖的层条件)

设 F 是范畴 \mathcal{C} 上的预层. 设 T 是范畴 \mathcal{C} 上的覆盖结构. 称 F 满足关于 T 的层条件就是指 F 满足关于其中每个态射族的层条件.

注 3.4.5 (覆盖结构的粗细)

由定义, 覆盖结构越细, 对应的层条件就越强, 层就越少. 注意, 覆盖结构的粗细与筛的粗细是两个不同的概念. 对于覆盖结构 $T \subset T'$, 我们称 T' 较细; 对于筛 $S \subset S'$, 我们称 S 较细 (见注 3.3.12).

定义 3.4.6 (层范畴)

设 T 是范畴 \mathcal{C} 上的覆盖结构. 定义层范畴 $\text{Sh}(\mathcal{C}, T)$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中满足关于 T 的层条件的预层构成的全子范畴.

“覆盖结构”是从 *Grothendieck* 拓扑的概念中分离出的一个比较重要的条件. *Grothendieck* 拓扑的完整概念如下.

定义 3.4.7 (Grothendieck 拓扑)

范畴 \mathcal{C} 上的一个 *Grothendieck* 拓扑 (或 *Grothendieck* 覆盖结构) J 是如下结构: 对每个对象 c 指定一个集合 $J(c)$, 其元素为 c 上的筛, 称为覆盖筛 (covering sieve), 满足

- (1) (极大筛) 任何对象 c 上的极大筛 (定义 3.3.18) 属于 $J(c)$;
- (2) (拉回下的稳定性) 若 $S \in J(c)$, $f: d \rightarrow c$, 则 $f^*S \in J(d)$.
- (3) (传递性) 若 $S \in J(c)$, R 是 c 上的另一个筛, 使得对任意 $(f: d \rightarrow c) \in S$, 都有 $f^*R \in J(d)$, 那么 $R \in J(c)$.

注意由定义可得对 c 上的两个筛 $S \subset R$, 若 $S \in J(c)$, 则 $R \in J(c)$. 此外, 两个覆盖筛的交仍是覆盖筛.

命题-定义 3.4.8 (筛对态射的覆盖, Grothendieck 拓扑的等价条件)

固定范畴 \mathcal{C} 上的 *Grothendieck* 拓扑 J , 我们称一个对象 c 上的筛 S 覆盖态射 $f: d \rightarrow c$ 是指 $f^*S \in J(d)$. 例如 S 覆盖 id_c 就是说 S 覆盖 c . 此时 *Grothendieck* 拓扑的条件等价于如下的形式.

- (1') 筛 S 覆盖它的所有元素;
- (2') 若 S 覆盖 f , 则 S 也覆盖 fg (只要 f, g 可复合);
- (3') (传递性) 若 S 覆盖 f , R 覆盖 S 的每个元素, 则 R 覆盖 f .

证明.

- $(1)(2)(3) \Rightarrow (1')(2')(3')$. $(1')(2')$ 是直接的; 只有 $(3')$ 需要稍微说明. 假设 S 覆盖 $f: d \rightarrow c$ (即 $f^*S \in J(d)$) 且 R 覆盖 S 的每个元素. 对任意 $g \in f^*S$, 有 $fg \in S$, 从而 R 覆盖 fg , f^*R 覆盖 g . 由 (3) , $f^*R \in J(d)$.
- $(1')(2')(3') \Rightarrow (1)(2)(3)$. 只需要考虑 id_c 即可.

□

对于拓扑空间的开集范畴, “极大筛是覆盖” 相当于任何开集 U 都覆盖了自己; 传递性相当于若一族开集覆盖了 U 的每个局部, 那么它们也覆盖了 U .

注 3.4.9 (关于饱和性条件)

Grothendieck 拓扑的定义中, 要求覆盖族是筛且满足极大筛和传递性的条件, 这些都是饱和性条件 (saturation condition), 假设一个覆盖结构不满足这些条件, 我们也可以关于这些条件取 “闭包” 而不影响层条件:

- (筛) 一族态射 $M = \{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$ 的层条件等价于其生成的筛的层条件;
- (极大筛) 极大筛的层条件是平凡的 (一族态射只要包含了 id_c , 其层条件就是平凡的);
- (传递性) 若预层 F 满足 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$ 的层条件, 且对每个 i 都有一族态射 $\{h_{ij}: c_{ij} \rightarrow c_i\}_{j \in I_i}$ 使得 F 满足其层条件, 那么 F 也满足复合态射族 $\{f_i \circ h_{ij}: c_{ij} \rightarrow c\}_{i \in I, j \in I_i}$ 的层条件. (见 Elephant [17] C2.1 节引理 7.)

因此在 Grothendieck 拓扑的定义中只有拉回下的稳定性是关键.

命题 3.4.10 (筛与层条件的关系)

- (1) 设 R, S 是 c 上的筛. 若预层 F 满足关于 R 的层条件, 且 $R \subset S$, 则 F 也满足关于 S 的层条件.
- (2) 设 R, S 是 c 上的筛. 若预层 F 满足关于 R 的层条件, 且对任意 $f \in R$, F 满足关于 f^*S 的层条件, 则 F 也满足关于 S 的层条件.

证明.

- (1) 任意态射 $S \rightarrow F$ 复合 $R \hookrightarrow S$ 得到 $R \rightarrow F$, 从而唯一地延拓为 $\text{よ}(c) \rightarrow F$.
- (2) 考虑集合 $S' = \{fh \mid f \in R, h \in f^*S\}$. 由注 3.4.9 中关于传递性的讨论, F 满足关于 S' 的层条件. 而 $S' \subset S$, 故 S' 生成的筛包含于 S ; 由 (1), F 满足关于 S 的层条件.

□

命题 3.4.11

设 F 是范畴 \mathcal{C} 上的预层, 则 \mathcal{C} 上存在一个最细的 Grothendieck 拓扑 J_F 使得 F 满足关于 J_F 的层条件.

证明. 定义覆盖结构 J_F 如下,

$$J_F(c) = \{c \text{ 上的筛 } S \hookrightarrow \mathbf{y}(c) \mid \text{对任意 } f: d \rightarrow c, F \text{ 满足关于 } f^*S \text{ 的层条件}\}.$$

由定义, 对任意 Grothendieck 拓扑 J , 若 F 为 J -层, 则 (由 J -覆盖筛的拉回稳定性) $J \subset J_F$. 我们只需验证 J_F 为 Grothendieck 拓扑.

- (极大筛) 极大筛的拉回仍是极大筛, 极大筛的层条件是平凡的, 故极大筛均属于 J_F .
- (拉回下的稳定性) 假设 $S \in J_F(c)$, $f: d \rightarrow c$, 由于 f^*S 的拉回也是 S 的拉回, 故 $f^*S \in J_F(d)$.
- (传递性) 假设 $S \in J_F(c)$, 且 R 是 c 上的另一个筛, 使得对任意 $(f: d \rightarrow c) \in S$, $f^*R \in J_F(d)$.

由 $S \in J_F(c)$, 对任意 $h: b \rightarrow c$, F 满足 h^*S 的层条件.

对任意 $(k: a \rightarrow b) \in h^*S$, $(hk: a \rightarrow c) \in S$. 由 R 的假设, $(hk)^*R = k^*h^*R \in J_F(a)$; 特别地, F 满足关于 k^*h^*R 的层条件.

由以上结论及命题 3.4.10 (2), F 满足关于 h^*R 的层条件. 这说明 $R \in J_F(c)$.

□

命题 3.4.12 (覆盖与 Grothendieck 拓扑的关系)

设范畴 \mathcal{C} 上有覆盖结构 T . 那么存在 Grothendieck 拓扑 J 给出与 T 相同的层条件.

证明. 令 \bar{T} 为 T 中的覆盖族生成的筛的集合, 则 T 的层条件等价于 \bar{T} 的层条件. 令 J 为所有包含 \bar{T} 的 Grothendieck 拓扑的交, 则 J 为 Grothendieck 拓扑. (J 的表达式可显式写出, 此处略去.) 设 F 为 T -层. 由命题 3.4.11 的证明, $\bar{T} \subset J_F$, 从而 $J \subset J_F$. 这说明 F 为 J -层. 故 J 给出与 T 相同的层条件. □

注 3.4.13

一般而言, 即使覆盖结构很简洁, 也难以根据命题 3.4.12 具体写出对应的 Grothendieck 拓扑. 覆盖结构与 Grothendieck 拓扑的关系正如一个群的生成元和群本身的关系.

下面这个概念也被某些文献用作 Grothendieck 拓扑的定义.

定义 3.4.14 (Grothendieck 拓扑基)

设范畴 \mathcal{C} 有拉回. 其上的一组 *Grothendieck 拓扑基* (basis for a Grothendieck topology, 又称 *Grothendieck 预拓扑*, pretopology) K 是如下结构: 对每个对象 c 指定一个集合 $K(c)$, 其元素为态射族 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$, 满足

- (恒等) $\{\text{id}_c\} \in K(c)$;
- (拉回下的稳定性) 若 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I} \in K(c)$, $g: d \rightarrow c$, 则 $\{g^* f_i\}_{i \in I} \in K(d)$;
- (传递性) 若 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I} \in K(c)$, 且对每个 $i \in I$, 有 $\{g_{ij}: d_{ij} \rightarrow c_i\}_{j \in I_i} \in K(c_i)$, 则 $\{f_i \circ g_{ij}: d_{ij} \rightarrow c\}_{i \in I, j \in I_i} \in K(c)$.

定义 3.4.15 (基生成的 Grothendieck 拓扑)

Grothendieck 拓扑基 K 生成的 Grothendieck 拓扑 J 如下:

$$J(c) = \{c \text{ 上的筛 } S \mid \exists R \in K(c), R \subset S\}.$$

为了表达的方便, 我们也将用覆盖结构或 Grothendieck 拓扑基来代指其生成的 Grothendieck 拓扑.

定义 3.4.16 (景)

带有 Grothendieck 拓扑的 (小) 范畴称为景.

定义 3.4.17 (Grothendieck 拓扑语境下的“覆盖”)

当范畴 \mathcal{C} 上有 Grothendieck 拓扑 J 时, 作如下约定: 称一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 覆盖了对象 c 是指其生成的筛

$$\{h: d \rightarrow c \mid h \text{ 穿过某个 } f_i\}$$

是 J -覆盖筛.

注 3.4.18 (关于景的小性)

我们一般要求景是小的, 但是许多结论可以推广到所谓本质小的景, 即其有一个小的 J -稠密子范畴 (定义 3.9.24).

常见的景

例 3.4.19

每个范畴 \mathcal{C} 都构成一个平凡的景，其上的覆盖结构为空。该覆盖结构对应的 Grothendieck 拓扑称为平凡拓扑 $J_{\text{平凡}}$ ，其中仅包含每个对象上的极大筛。一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 覆盖 c 当且仅当某个 f_i 穿过 id_c ，即 f_i 为收缩。由定义，这个景上的层是 \mathcal{C} 上的预层。

例 3.4.20 (拓扑空间)

拓扑空间 X 的开集范畴 $\text{Open}(X)$ 构成一个景，其上的覆盖结构是开覆盖。注意此时“拉回下的稳定性”即是说若一族开集 $\{U_i\}$ 覆盖了 V ，那么对于 $W \subset V$ ， $\{U_i \wedge W\}$ 覆盖了 W 。

例 3.4.21 (拓扑空间范畴)

拓扑空间的范畴⁶上有一个由开覆盖确定的覆盖结构。

例 3.4.22 (位象)

对于位格 A ，将其视为范畴，我们定义 A 上的覆盖结构：当一族态射 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 满足 $U = \bigvee_{i \in I} U_i$ 时，称其为覆盖族。由此，每个位象都（反变地）对应一个景。

例 3.4.23 (Cartesius 空间)

考虑 Cartesius 空间⁷的范畴 CartSp ，其中的对象为 $\mathbb{R}^0, \mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \dots$ ，态射为光滑映射。称 \mathbb{R}^n 的开覆盖 $\{U_i\}$ 为好覆盖 (good cover) 是指 U_i 同胚于 \mathbb{R}^n ，且任意有限个 U_i 的交（假若非空）都同胚于 \mathbb{R}^n 。这给出了 CartSp 上的一个覆盖结构，称之为 *Cartesius 空间景*。Cartesius 空间景上的层称作光滑空间 (smooth space)，记 SmoothSp 为光滑空间的范畴。

记 Man 为 (光滑) 流形的范畴。光滑空间是光滑流形的推广：对于流形 M ，定义光滑空间

$$\underline{M}: \text{CartSp}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}, \mathbb{R}^n \mapsto \text{Hom}_{\text{Man}}(\mathbb{R}^n, M),$$

这给出了嵌入 $\text{Man} \rightarrow \text{SmoothSp}$ 。光滑空间是广义微分几何 (diffeology) 的研究对象。在量子场论中，由于人们常常需要考虑“场的空间”（例如两个流形之间的映射的

⁶Top 不是小范畴，因为每个集合都能配上离散拓扑成为一个拓扑空间。但是出于实用的目的，我们可以考虑其中小的子范畴，如可分 Hausdorff 空间范畴（回忆，可分空间是指有可数稠密子集的空间）。

空间), 操作其上的微分形式, 而它们不是传统意义上的流形, 故使用光滑空间的概念能够更清晰地显示几何意义. 参见 Frédéric Paugam [27] 第 3 章.

对于光滑空间 $X: \mathbf{CartSp}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $X(\mathbb{R}^n)$ 是“ \mathbb{R}^n 到 X 的光滑映射的集合”(这不过是米田引理), 也即空间 X 上 n 维“广义坐标系”的集合. 层条件表示的是“广义坐标系”的粘合条件, 即当 $\mathbb{R}^n = \bigcup U_i$ 为好覆盖时, 一族相容的广义坐标系 $U_i \rightarrow X$ 可粘合为广义坐标系 $\mathbb{R}^n \rightarrow X$.

一个重要的光滑空间是“微分形式的模空间” Ω^k , 它作为 \mathbf{CartSp} 上的预层将 \mathbb{R}^n 对应到其上 k -形式的集合 $\Omega^k(\mathbb{R}^n)$. 称其为微分形式的模空间是因为, 对任意流形 M 有自然同构

$$\text{Hom}_{\mathbf{SmoothSp}}(\underline{M}, \Omega^k) \simeq \Omega^k(M).$$

容易验证 Ω^k 满足层条件, 即对于 \mathbb{R}^n 的好覆盖 $\{U_i\}$, 每个 U_i 上相容的微分形式可以给出 \mathbb{R}^n 整体上的微分形式.

例 3.4.24 (超几何)

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -分次向量空间范畴有一个对称幺半范畴结构, 其交换同构 $V \otimes W \rightarrow W \otimes V$ 在奇部分的作用为 $v \otimes w \mapsto -w \otimes v$. 关于此对称幺半范畴结构的交换代数称为超交换代数⁸. 超几何是超交换代数对应的几何, 是一些量子场论 (如超对称场论, 超引力) 使用的语言. 考虑范畴 $\mathbf{SupCartSp}$ (超 Cartesius 空间), 其对象 $\mathbb{R}^{n|q} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{0|q}$ 是“有 n 个偶坐标和 q 个奇坐标”的空间 (物理学家所使用的术语), 即超交换代数 $C^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes \wedge^\bullet(\mathbb{R}^q)^*$ 的形式对偶.

定义 $\mathbf{SupCartSp}$ 上的覆盖结构 $\{\iota_i \times \text{id}: U_i \times \mathbb{R}^{0|q} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{0|q}\}$, 其中 $\{\iota_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^n\}$ 构成 \mathbb{R}^n 的好覆盖. 于是 $\mathbf{SupCartSp}$ 成为一景, 其上的层称作超光滑空间 (super smooth space). Urs Schreiber [28] 介绍了物理中旋量场等结构用超几何语言的表述, 以及其它对象在意象理论中的表述.

例 3.4.25 (Zariski 景)

考虑有限表现 (finitely presented) 环 (形如 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 的环) 的范畴 $\mathbf{Ring}_{\text{fp}}$. 这是一个小范畴⁹. 考虑其对偶范畴 $\mathbf{Ring}_{\text{fp}}^{\text{op}}$, 也即仿射概形的范畴. 对于有限表现环 A , 我们记 $\text{Spec } A \in \mathbf{Ring}_{\text{fp}}^{\text{op}}$ 为 A 在对偶范畴中的化身.

回忆, Zariski 拓扑的标准开集 (但不一定是全部的开集) 形如 $\text{Spec } A_f \rightarrow \text{Spec } A$, 也即局部化的环同态 $A \rightarrow A_f$. 若 n 个元素 $f_1, \dots, f_n \in A$ 生成了单位理想 (1)

⁷注. Cartesius 是法国数学家 René Descartes (“笛卡尔”) 的姓氏的拉丁化写法.

⁸对超几何与量子场论感兴趣的读者可阅读 IAS 的讲议 [13].

(f_1, \dots, f_n 构成了 $\operatorname{Spec} A$ 上的“单位分解”), 规定 $\{\operatorname{Spec} A_{f_i} \rightarrow \operatorname{Spec} A\}$ 构成覆盖. 这定义了 $\operatorname{Ring}_{\text{fp}}^{\text{op}}$ 上的一个覆盖结构, 这便是 *Zariski 景*. *Zariski 景* 可以提供综合代数几何 (synthetic algebraic geometry) 的模型 (见定义 6.4.17; 关于综合代数几何, 见 [11]).

例 3.4.26 (平展景)

平展景是“拓扑空间上开集范畴”在代数几何中的类比. 设 X 为概形, 考虑概形范畴的俯范畴 $\operatorname{Sch}/_X$ 中由平展映射 $U \rightarrow X$ 构成的全子范畴 $\operatorname{Sch}/_{X, \text{ét}}$. 其上的覆盖是一族平展映射, 其并构成概形的满射. 这称作 X 上的 (小) 平展景 (small étale site).

典范与次典范拓扑

命题-定义 3.4.27 (次典范和典范 Grothendieck 拓扑)

对于范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑 J , 若以下两个等价条件之一成立, 则称之为次典范 (subcanonical) Grothendieck 拓扑:

- 对每个 J -覆盖筛 $S = \{f_i: c_i \rightarrow c\}$, 考虑 c_i 之间在 c 上 (也即与 f_i 相容) 的所有映射, S 构成该图上的余极限余锥. 这样的筛又称为有效满 (effective-epimorphic) 的.
- 每个可表函子 $\mathfrak{y}(c)$ 都是层, 也即米田嵌入 $\mathcal{C} \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 穿过 $\operatorname{Sh}(\mathcal{C}, J)$.

定义典范 *Grothendieck 拓扑* 是最细的次典范 Grothendieck 拓扑. (回忆, 称一个 Grothendieck 拓扑较细是指其中覆盖筛较多).

证明. 设 S 为 c 上的筛, S 是有效满的当且仅当对任意对象 d , 任意态射 $S \rightarrow \mathfrak{y}(d)$ 唯一地延拓为态射 $\mathfrak{y}(c) \rightarrow \mathfrak{y}(d)$; 这就是说每个可表函子 $\mathfrak{y}(d)$ 都满足关于 S 的层条件. 因此, 定义中的两个条件等价.

由命题 3.4.11, 对每个 $c \in \mathcal{C}$ 存在一个使得 $\mathfrak{y}(c)$ 为层的最细的 Grothendieck 拓扑 $J_{\mathfrak{y}(c)}$. 进而存在使得所有 $\mathfrak{y}(c)$ 同时为层的最细的 Grothendieck 拓扑 $\bigcap_{c \in \mathcal{C}} J_{\mathfrak{y}(c)}$. 它就是最细的次典范 Grothendieck 拓扑. \square

⁹严格地说, 它是本质小 (essentially small) 范畴, 也即它的对象模掉同构之后构成一个集合.

例 3.4.28 (常见的次典范 Grothendieck 拓扑)

- 一个拓扑空间上的 Grothendieck 拓扑 (例 3.4.20) 是次典范的.
- Zariski 景 (例 3.4.25) 是次典范的.

例 3.4.29 (位象上的典范拓扑)

位象 (位格) 视为景 (例 3.4.22), 其上的 Grothendieck 拓扑是典范的, 因为位格中一族元素的余极限是它们的并. 换言之, 位象的每个开子空间都可视为其上的层.

例 3.4.30 (Grothendieck 意象上的典范拓扑)

一个 Grothendieck 意象 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 本身也可视为一个景, 其上的典范 Grothendieck 拓扑可描述如下: 一个筛 $\{f_i: U_i \rightarrow X \mid i \in I\}$ 是覆盖筛当且仅当下列等价条件之一成立.

- 筛 $\{f_i: U_i \rightarrow X \mid i \in I\}$ 构成余极限余锥;
- $\bigvee_{i \in I} \text{im } f_i = X$;
- 对任意态射 $g, h: X \rightarrow Y$, 若 $gf_i = hf_i (\forall i \in I)$, 则 $g = h$. 满足这个条件的态射族又称为联合满射族 (jointly epic family).

$\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 作为景, 其上的层范畴 $\text{Sh}(\text{Sh}(\mathcal{C}, J), \text{典范})$ 等价于 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 本身.

3.5 层化与 Grothendieck + 构造

回忆拓扑空间上一个开覆盖 $\{U_i\}$ 生成的筛 S 可表示为余极限 $\text{colim } \mathfrak{y}(U_i)$ (例 3.3.17). 自由余完备化 \mathfrak{y} 不保持余极限, 而层化的效果即是使 $S \rightarrow \mathfrak{y}(c)$ 变为同构, 层化弥补了自由余完备化所破坏的余极限. 一种通用的将某些态射变为同构的方法是局部化 (附录 A.3 节). 事实上, 层范畴是预层范畴的局部化, 而在层范畴中 S 与 $\mathfrak{y}(c)$ 变成了同构的对象. 使用 Adámek 与 Rosický [1] 引入的可表现范畴的一般理论 (附录 A.6 节), 可以得到层范畴的一种简单描述. 层范畴 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中关于所有 J -覆盖筛 $S \rightarrow \mathfrak{y}(c)$ 的局部对象的全子范畴. 由命题 A.3.16, $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的自反子范畴 ([1] 第 2 章 2D, 2E 节对此还有一种更加抽象的证明). 由命题 A.3.8, $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 关于 $W = \{(S \rightarrow \mathfrak{y}(c)) \in J(c)\}$ 生成的强饱和态射族 \overline{W} (注 A.3.17) 的局部化. 可以证明 \overline{W} 是 W 关于箭头范畴中 (小) 余极限的完备化. \overline{W} 中的元素形如

$$\text{colim}_i S_i \rightarrow \text{colim}_i \mathfrak{y}(c_i).$$

可以证明这个态射族具有右分式计算 (定义 A.3.20), 从而 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 等价于分式计算给出的范畴 $\widehat{\mathcal{C}}[\overline{W}^{-1}]$:

$$\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}[\overline{W}^{-1}]}(X, Y) = \text{colim}_{(X' \rightarrow X) \in \overline{W}} \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(X', Y). \quad (\star)$$

我们不会给出上述论证的全部细节 (参见 [26]), 而是采取另一种较具体的方式构造层化, 它被称为 *Grothendieck + 构造* (plus construction), 其与 (\star) 至少在精神上是相似的. 在证明层化的性质之后, 我们几乎不会再使用 $+$ 构造; 因此知道这种构造的存在就足够了.

定义 3.5.1 (Grothendieck + 构造)

设 J 为范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑, X 为 \mathcal{C} 上的预层, 定义预层 X^+ ,

$$\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), X^+) = X^+(c) := \text{colim}_{(S \rightarrow \mathfrak{y}(c)) \in J(c)} \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(S, X).$$

$X^+ : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ 的函子性来自拉回稳定性: 对任意态射 $f: c' \rightarrow c$, 有映射 $X^+(f): X^+(c) \rightarrow X^+(c')$, $[S \rightarrow X] \mapsto [f^*S \rightarrow S \rightarrow X]$. 很明显, 有典范的态射 $\eta_X: X \rightarrow X^+$ 将元素 $\mathfrak{y}(c) \rightarrow X$ 映射到 $[\mathfrak{y}(c) \rightarrow X]$, 并且 η_X 关于 X 有自然性, 即对于预层态射 $X \rightarrow Y$ 有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_Y \\ X^+ & \longrightarrow & Y^+. \end{array}$$

对于覆盖筛 $S \rightarrow \mathfrak{y}(c)$, $\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(S, X)$ 的元素是对所有 $(f: d \rightarrow c) \in S$ 选取相容的一族元素 $X(d)$ (见定义 3.4.3). 因此 $X^+(c)$ 的元素也可理解为 X 在 c 上 “相容族” 的等价类. 典范的映射 $\eta_X: X(c) \rightarrow X^+(c)$ 将 $x \in X(c)$ 映射到 x 产生的相容族 $(X(f)(x))_{f \in S}$.

另一个有用的事实是, 对元素 $x: \mathfrak{y}(c) \rightarrow X^+$ 的任意代表 $S \rightarrow X$ ($S \in J(c)$), 有如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f \mapsto x_f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \eta_X \\ \mathfrak{y}(c) & \xrightarrow{x} & X^+ \end{array}$$

直接验证上图交换: 对任意 $(f: d \rightarrow c) \in S$, 有 $f^*S = \mathfrak{y}(d)$, 从而 $[x_f: \mathfrak{y}(d) \rightarrow X] = [f^*S \rightarrow S \rightarrow X]$.

命题 3.5.2

$+$ 构造保持有限极限.

证明. 注意到余极限 $\text{colim}_{(S \rightarrow \mathfrak{y}(c)) \in J(c)}$ 的指标范畴为偏序集, 其中任意两个覆盖筛有共同的加细, 这说明该余极限为滤余极限. 结论来自滤余极限的一般性质 (命题 A.6.5). \square

命题 3.5.3

在定义 3.5.1 中, F 是层当且仅当 $\eta_F: F \rightarrow F^+$ 为同构, F 是分离对象当且仅当 $\eta_F: F \rightarrow F^+$ 为单射.

证明. 由 Grothendieck + 构造的定义以及层条件 (分离条件) 的定义即得. \square

一次 + 构造的结果 F^+ 不一定是层, 但下面的命题表明 F^+ 离层进了一步, 而 F^{++} 必然是层.

命题 3.5.4

对预层 F , F^+ 分离; 进一步, 当 F 分离时, F^+ 是层.

证明.

- F^+ 分离. 设 $x_1: S_1 \rightarrow F$, $x_2: S_2 \rightarrow F$ ($S_1, S_2 \in J(c)$) 是 $F^+(c)$ 的两个元素 (的代表), 两者在某个覆盖 $S \in J(c)$ 上相等, 即对任意 $(f: d \rightarrow c) \in S$, $f^*S_1 \rightarrow S_1 \xrightarrow{x_1} F$ 与 $f^*S_2 \rightarrow S_2 \xrightarrow{x_2} F$ 代表 $F^+(d)$ 的同一个元素, 而这表示存在 $S_f \in J(d)$ 使下图交换.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & f^*S_1 \rightarrow S_1 & & \\
 & \nearrow & & \searrow x_1 & \\
 S_f & & & & F \\
 & \searrow & & \nearrow x_2 & \\
 & & f^*S_2 \rightarrow S_2 & &
 \end{array}$$

由传递性, 所有 S_f (与 f 复合后) 构成 c 的覆盖筛, 故 x_1, x_2 代表了 $F^+(c)$ 的同一个元素.

- 假设 F 分离, 我们证明 F^+ 为层. 首先注意到若 $x_1: S_1 \rightarrow F$, $x_2: S_2 \rightarrow F$ ($S_1, S_2 \in J(c)$) 代表了 $F^+(c)$ 的同一个元素, 由于 F 分离, x_1, x_2 必须在 $S_1 \cap S_2$ 的每个元素上取值相等. (对任意 $(f: d \rightarrow c) \in S_1 \cap S_2$, 在 d 上使用分离性条件.) 因此 $F^+(c)$ 的一个元素 (F 在 c 上的相容族的等价类) 的所有代表的并是一个典范的代表, 即 c 上一个极大的相容族.

设 $S \in J(c)$, $S \rightarrow F^+$ 是任意态射, 即对每个 $(f: d \rightarrow c) \in S$ 有 $F^+(d)$ 的一个元素, 以 d 上的极大相容族 $S_f \rightarrow F$ 为代表. 这样我们便得到了 F 在 c 上的一个相容族

$$\left(\bigcup_{(f: d \rightarrow c) \in S} f \circ S_f \right) \rightarrow F, \quad (f \circ S_f := \{fg \mid g \in S_f\})$$

它代表了 $F^+(c)$ 的一个元素, 以延拓 $S \rightarrow F^+$.

\square

命题 3.5.5

$\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的正合局部化 (定义 A.3.1),

$$\text{Sh}(\mathcal{C}, J) \begin{array}{c} \xleftarrow{a} \\ \xrightarrow[\perp]{} \\ \xrightarrow{i} \end{array} \widehat{\mathcal{C}},$$

且反映函子 a 由两次 $+$ 构造给出.

证明. 对预层 $X \in \widehat{\mathcal{C}}$ 与层 $F \in \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$, 由于 η_F 为同构, 态射 $X \rightarrow F$ 对应于交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \simeq \\ X^+ & \longrightarrow & F^+ \end{array}$$

即任何态射 $X \rightarrow F$ 都穿过 $\eta_X: X \rightarrow X^+$; 进一步, 由下图知穿过的方式是唯一的.

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & X & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow & \nearrow \exists! & \\ \mathfrak{y}(c) & \longrightarrow & X^+ & & \end{array}$$

同理, 这说明任何态射 $X \rightarrow F$ 唯一地穿过 $X \rightarrow X^+ \rightarrow X^{++}$. 命题 3.5.4 说明 X^{++} 是层, 因此 $++$ 是 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 的左伴随. 由于 $+$ 构造保持有限极限 (命题 3.5.2), 两次 $+$ 构造当然也保持有限极限. \square

注意到对覆盖筛 $S \rightarrow \mathfrak{y}(c)$, $a(S) \rightarrow a(\mathfrak{y}(c))$ 是同构. 这是由于自然同构

$$\text{Hom}_{\text{Sh}(\mathcal{C}, J)}(a(S), -) \simeq \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(S, i(-)) \simeq \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), i(-)) \simeq \text{Hom}_{\text{Sh}(\mathcal{C}, J)}(a(\mathfrak{y}(c)), -).$$

这是局部化的一般现象.

定义 3.5.6 (景到层范畴的米田嵌入)

定义景 (\mathcal{C}, J) 的米田嵌入 $\mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)}$ 为 \mathcal{C} 的米田嵌入 $\mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 与层化 $a: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的复合.

由于米田嵌入 $\mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 与层化均保持有限极限, 景的米田嵌入也保持有限极限.

命题 3.5.7

层范畴 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的对象 F 可表示为形如 $\mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ 的对象的余极限:

$$F \simeq \text{colim}_{\mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)}(c) \rightarrow F} \mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)}(c).$$

证明.

$$\begin{aligned}
 F &\simeq a(F) && (F \text{ 为层}) \\
 &\simeq a(\operatorname{colim}_{\mathfrak{J}_{(c) \rightarrow F}^{\widehat{\mathcal{C}}}} \mathfrak{J}(c)) && (\text{命题 A.4.7}) \\
 &\simeq \operatorname{colim}_{\mathfrak{J}_{(c, J)(c) \rightarrow F}^{\operatorname{Sh}(\mathcal{C}, J)}} \mathfrak{J}_{(c, J)}(c) && (\text{左伴随保持余极限}).
 \end{aligned}$$

另见命题 A.6.24 的证明. \square

下面的命题体现了层化的一种直观, 它将 J -覆盖变为“真正的”覆盖, 即范畴论意义上的满射.

命题 3.5.8

在景 (\mathcal{C}, J) 中, 一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 覆盖 c (定义 3.4.17) 当且仅当典范的态射

$$\tilde{f}: \coprod_i \mathfrak{J}_{(c, J)}(c_i) \rightarrow \mathfrak{J}_{(c, J)}(c) \quad (\star)$$

为满射.

证明. 此处仅证明 “ \Rightarrow ” 部分, “ \Leftarrow ” 的证明在下一节的命题 3.6.7. 假设 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 覆盖 c , 即这族态射生成的筛 S 是 J -覆盖筛. 注意到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中自然的映射

$$f: \coprod_i \mathfrak{J}(c_i) \rightarrow S$$

为满射. 由于层化保持余极限与满射 (命题 1.3.5), 而 S 的层化为 $\mathfrak{J}_{(c, J)}(c)$, 故对上述映射层化即得 (\star) 为满射. \square

3.6 Grothendieck 意象

本节的目标是证明对于 (小) 景 (\mathcal{C}, J) , 层范畴 $\operatorname{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 为意象.

层范畴中的极限与余极限

命题 3.6.1

层范畴 $\operatorname{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 存在任意极限, 且极限等同于作为预层的极限.

证明. 设 $X = \lim_i X_i$ 是预层的极限, 而每个 X_i 是层. 对任意覆盖筛 $S \rightarrow \mathfrak{J}(c)$, 任意态射 $S \rightarrow X$ 给出一族态射 $S \rightarrow X_i$, 由层条件唯一地延拓为一族态射 $\mathfrak{J}(c) \rightarrow X_i$, 即 $\mathfrak{J}(c) \rightarrow X$. 这个命题是局部对象的性质 (命题 A.3.14) 以及自反子范畴的性质 (命题 A.3.6) 的特例. \square

特别地, 我们有如下几条推论.

命题 3.6.2

- 对象 $X \in \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的子对象偏序集 $\text{Sub}(X)$ 具有任意交. 而任意并可用交表示, 故 $\text{Sub}(X)$ 也具有任意并. 注意嵌入函子 $i: \text{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 保持单射 (命题 1.3.5).
- $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的终对象是 $1 \in \widehat{\mathcal{C}}$.

层范畴中的子对象分类子

本小节描述 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的子对象分类子.

回忆 \mathcal{C} 上预层范畴的子对象分类子 Ω 为 $\Omega(c) = \{c \text{ 上的筛}\}$ (命题 3.3.19). $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的子对象分类子 Ω_J 是 Ω 的一个子函子.

定义 3.6.3 (筛的闭包, 闭筛)

设 J 是范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑. 对于 c 上的筛 S , 定义其闭包 \overline{S} 为 S 覆盖的态射的集合, 也即

$$\overline{S} = \{f: d \rightarrow c \mid f^*S \in J(d)\}.$$

若 $\overline{S} = S$, 则称 S 为 J -闭筛 (closed sieve).

命题 3.6.4 (闭筛的性质)

设 J 是范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑. 对于 c 上的筛 S ,

- $S \leq \overline{S}$ (作为 $\mathbf{y}(c)$ 的子对象);
- \overline{S} 是闭筛, 即 $\overline{\overline{S}} = \overline{S}$;
- 拉回保持筛的闭包, 即 $f^*\overline{S} = \overline{f^*S}$;
- $S \in J(c)$ 当且仅当 \overline{S} 是极大筛.

证明. 由 Grothendieck 拓扑以及筛的闭包的定义即证. □

在 3.7 节我们将讲到, 对于 Grothendieck 拓扑 J 确定的 Lawvere–Tierney 拓扑 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ (命题 3.7.8), 筛的闭包正是子对象的闭包运算 (命题 3.7.3).

例 3.6.5 (拓扑空间上的闭筛)

在拓扑空间 X 上, 开集 U 上的筛 S 是闭筛当且仅当 S 关于任意并封闭, 从而等价于 S 是某个子开集 $V \subset U$ 生成的主筛 (定义 3.3.16). 注意, 闭筛的“闭”与闭子空间的“闭”无关.

命题-定义 3.6.6

设 J 是范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑. 定义子函子 $\Omega_J \hookrightarrow \Omega$,

$$\Omega_J(c) = \{c \text{ 上的闭筛}\},$$

其中 Ω_J 构成函子是由于拉回保持筛的闭包. 那么 Ω_J 是 J -层, 且是 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的子对象分类子.

证明. 首先说明 Ω_J 是层. 对任意覆盖筛 $R \in J(c)$, 设有一族相容的 J -闭筛

$$(S_f \in \Omega_J(d))_{(f: d \rightarrow c) \in R}, \quad g^* S_f = S_{fg}.$$

令 $S = \{fg \mid f \in R, g \in S_f\}$, 我们断言 $\bar{S} \in \Omega_J(c)$ 是唯一相容的元素.

- 先证明对任意 $f \in R$, $f^* S = S_f$. 由定义, 对任意 $g \in S_f$ 有 $g \in f^* S$. 另一方面, 对任意 $h \in f^* S$, 存在 $f' \in R, g \in S_{f'}$, 使得 $fh = f'g$, 那么 $h^* S_{f'} = g^* S_{f'}$ 为极大筛, $h \in S_f$.
- 对任意 $f \in R$, $f^* \bar{S} = S_f$. 这是由于拉回保持闭包, 以及 S_f 为闭筛.
- 满足上述条件的 c 上的闭筛 \bar{S} 是唯一的. 设 P, Q 是 c 上的两个闭筛, 满足对任意 $f \in R$, $f^* P = f^* Q$. 那么 $R \cap P = R \cap Q$. 由于 R 是覆盖筛, R 覆盖 P 的每个元素; 由于 P 是闭筛, P 覆盖 P 的每个元素. 从而 $R \cap P$ 覆盖 P 的每个元素. 这说明 P 恰为 $R \cap P$ 覆盖的态射的集合. 同理, 可得 $P = Q$.

然后说明 Ω_J 是子对象分类子. 设 X 为层, $Y \hookrightarrow X$ 为 $\hat{\mathcal{C}}$ 中的子对象, 其特征函数 $\chi: X \rightarrow \Omega$ 满足对任意对象 $c \in \mathcal{C}$ 与 $x \in X(c)$ 下图的两个方块均为拉回 (注 3.3.20).

$$\begin{array}{ccccc} \chi_c(x) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \downarrow(c) & \xrightarrow{x} & X & \xrightarrow{\chi} & \Omega \end{array}$$

我们证明 Y 为层当且仅当对任意对象 c 与 $x \in X(c)$, $\chi_c(x)$ 是闭筛.

- 假设 Y 为层. 对任意 $f: d \rightarrow c$, 若 $\chi_c(x)$ 覆盖了 f , 则在如下拉回图中 $S \in J(d)$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 S & \longrightarrow & \chi_c(x) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 1 \\
 \downarrow & \nearrow & \downarrow & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
 \mathfrak{J}(d) & \xrightarrow{f} & \mathfrak{J}(c) & \xrightarrow{x} & X & \xrightarrow{\chi} & \Omega
 \end{array}$$

由 Y 为层, 存在唯一的态射 $\mathfrak{J}(d) \rightarrow Y$ 使上图交换. 由拉回的泛性质它给出了态射 $\mathfrak{J}(d) \rightarrow \chi_c(x)$. 这说明 $S = \mathfrak{J}(d)$, 即 $f \in \chi_c(x)$, 这便证明了 $\chi_c(x)$ 是闭筛.

- 假设对任意对象 c 与 $x \in X(c)$, $\chi_c(x)$ 是闭筛. 对任意覆盖筛 $S \in J(c)$ 考虑下图,

$$\begin{array}{ccccccc}
 S & \xrightarrow{\quad} & \chi_c(x) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & 1 \\
 \downarrow & \nearrow & \downarrow & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
 \mathfrak{J}(c) & \xrightarrow{x} & X & \xrightarrow{\chi} & \Omega
 \end{array}$$

闭筛 $\chi_c(x)$ 包含了覆盖筛 S , 因此 $\chi_c(x)$ 是极大筛, 存在态射 $\mathfrak{J}(c) \rightarrow Y$ 使上图交换. 这证明了 Y 是层.

□

如下命题是层范畴中子对象分类子的应用, 它补全了命题 3.5.8 的证明.

命题 3.6.7

在景 (\mathcal{C}, J) 中, 对于一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$, 若典范的态射

$$\tilde{f}: \coprod_i \mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c_i) \rightarrow \mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c) \quad (\star)$$

为满射, 则 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 覆盖 c (定义 3.4.17).

证明. 假设 (\star) 为满射. 我们证明 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 生成的筛 S 为覆盖筛, 即证明 S 的闭包 \overline{S} 为极大筛. 首先, 由于 $\overline{S} \hookrightarrow \mathfrak{J}(c)$ 是闭筛, 其对应的态射 $\chi_{\overline{S}}: \mathfrak{J}(c) \rightarrow \Omega$ 穿过 $\Omega_J \hookrightarrow \Omega$. 由于 Ω_J 是 J -层, 它进而穿过 $\eta_{\mathfrak{J}(c)}: \mathfrak{J}(c) \rightarrow \mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c)$, 如下图的最底下一行所示.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \coprod_i \mathfrak{J}(c_i) & \xrightarrow{\quad} & 1 \\
 \downarrow f & \searrow \eta_P & \downarrow & \nearrow & \downarrow \top & & \downarrow \\
 \mathfrak{J}(c) & \xrightarrow{\eta_{\mathfrak{J}(c)}} & \mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c) & \longrightarrow & \Omega_J & \xrightarrow{i} & \Omega \\
 & & \downarrow \chi_{\overline{S}} & & & & \\
 & & \mathfrak{J}(c) & \xrightarrow{\chi_{\overline{S}}} & \Omega
 \end{array}$$

在上图中,

- 由于 $S \leq \bar{S}$, 存在态射 (1);
- 由于层化的性质, 存在态射 (2);
- 由于 (\star) 为满射, 存在态射 (3).

因此 \bar{S} 为极大筛, 命题得证. \square

层范畴中的指数对象

命题 3.6.8

设 J 是范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑, F 是 J -层, X 是预层, 那么预层的指数对象 F^X 是层.

证明. 对任意覆盖筛 $(S \rightarrow \downarrow(c)) \in J(c)$, 态射 $S \rightarrow F^X$ 等同于 $S \times X \rightarrow F$, 而 $S \times X$ 是 $\downarrow(c) \times X$ 的稠密子对象, 故 $S \times X \rightarrow F$ 唯一地延拓为 $\downarrow(c) \times X \rightarrow F$, 即 $\downarrow(c) \rightarrow F^X$, 故 F^X 是层.

上述命题是正合局部化的一般性质 (命题 A.3.19) 的特例. 命题 2.2.5 是它在位象理论中的类比. \square

于是我们得到如下命题.

命题 3.6.9

层范畴 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 具有指数对象, 且等同于预层的指数对象.

Grothendieck 意象

定义 3.6.10 (Grothendieck 意象)

对于范畴 \mathcal{E} , 若存在景 (\mathcal{C}, J) 使得 $\mathcal{E} \simeq \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$, 则称之为 *Grothendieck 意象*.

注 3.6.11

对于 Grothendieck 意象 \mathcal{E} , 定义 3.6.10 中的景 (\mathcal{C}, J) 远远不是唯一确定的. 这就如同一个群的生成元集合不是唯一确定的. 例如, 一个景的稠密子范畴对应的层范畴和原景上的层范畴等价, 这个命题称为比较原理 (命题 3.9.26).

例 3.6.12 (拓扑空间上的层意象)

对于拓扑空间 (或位象) X , $\mathrm{Sh}(X)$ 是意象, 其子对象分类子 Ω (作为预层) 为

$$\Omega(U) = \{U \text{ 的开子集}\}.$$

这与命题 3.6.6 的结论相符, 见例 3.6.5 的讨论.

注 3.6.13 (“小” 意象与 “大” 意象)

层以及层意象有两种不同的风味. 一种是一个空间上的层 (例 3.4.20), 一种是一类空间的范畴上的层, 如 CartSp 上的层 (例 3.4.23). Grothendieck 称前者的意象为小意象 (petit topos), 后者的意象为大意象 (gros topos). 这种区分不是绝对的, 而仅仅是看法的不同. 任何一个固定的意象都有两种看法: “小” 意象的看法将它看成一个广义空间 (上的层范畴), 而 “大” 意象的看法将它看成一类广义空间构成的范畴. 两种看法可以转化: 若将一个意象视为一个广义空间, 那么它 (作为范畴) 等价于其上 “平展空间” 的范畴 (注 3.1.14).

位象型意象

意象可以视为 “空间” 概念的推广, 因为由一个空间上的层意象可以重构出这个空间. 对于拓扑空间或位象 X , 回忆 $\mathrm{Sh}(X)$ 的终对象 1 是在所有开子集上取值为 1 的层, 故 $\mathrm{Sh}(X)$ 的子终对象 (定义 1.3.26) 是在每个开集上取值 0 或 1 的层. 由层条件, 当一个子终层 ($\mathrm{Sh}(X)$ 的子终对象) 在若干开子集 $U_i \in \mathcal{O}(X)$ 上取值为 1 时, 它在 $\bigvee_i U_i$ 上取值也为 1 ; 因此存在这个层取值为 1 的最大开子集. 这证明了如下的重构定理:

命题 3.6.14 (由层意象重构位象)

拓扑空间或位象 X 上的层意象 $\mathrm{Sh}(X)$ 的子终对象一一对应于 X 的开子集. 换言之, X 的开子集位格同构于 $\mathrm{Sh}(X)$ 的子终对象的格:

$$X \simeq \mathrm{Sub}_{\mathrm{Sh}(X)}(1).$$

对于一般的 Grothendieck 意象 \mathcal{C} , 其子终对象又称为开子空间 (法 ouvert, 见 SGA 4 [2]), 而子终对象的格 $\mathrm{Sub}_{\mathcal{C}}(1)$ 对应的位象称为其底层位象 (underlying locale), 或称位象反映 (localic reflection).

定义 3.6.15 (位象型意象)

若一个意象等价于形如 $\text{Sh}(X)$ 的范畴 (X 为位象), 则称之为位象型意象 (localic topos).

命题 3.6.16 (位象型意象的判定)

设 \mathcal{C} 为 Grothendieck 意象, 那么如下条件等价:

- (1) \mathcal{C} 为位象型意象;
- (2) 存在偏序集 P 以及其上的 Grothendieck 拓扑 J 使得 $\mathcal{C} \simeq \text{Sh}(P, J)$;
- (3) \mathcal{C} 由其子终对象生成, 即对 \mathcal{C} 中两个态射 $f, g: X \rightarrow Y$, 若对任意 $x: U \rightarrow X$ (U 为子终对象) 都有 $fx = gx$, 则 $f = g$.

证明.

- 由定义, $(1) \Rightarrow (2)$.
- $(2) \Rightarrow (3)$ 是因为, 对于 $p \in P$, $a \downarrow (p) \rightarrow 1$ 为子终对象, 而层的态射 $X \rightarrow Y$ 由所有映射 $X(p) \rightarrow Y(p)$ 决定.
- $(3) \Rightarrow (1)$. 设 \mathcal{C} 由其子终对象生成. Giraud 定理的证明 (3.11.2) 表明 $\mathcal{C} \simeq \text{Sh}(\text{Sub}(1))$, 故 \mathcal{C} 为位象型意象.

□

命题 3.6.17 (位象反映)

位象型意象在所有 Grothendieck 意象中构成自反子范畴, 即位象反映是取位象上层范畴的左伴随:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{Sub}_{\mathcal{C}}(1)} & \text{Topos} \\ \mathcal{Loc} & \xleftarrow[\text{Sh}]{\perp} & \end{array}$$

这就是说, 一个 Grothendieck 意象 \mathcal{C} 到一个位象型意象 $\text{Sh}(X)$ 的几何态射等同于 \mathcal{C} 的位象反映到 X 的位象态射.

证明. 几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}(X)$ 的逆像部分 $f^*: \text{Sh}(X) \rightarrow \mathcal{C}$ 保持有限极限, 从而保持子终对象 (命题 1.3.27), 进而给出一个映射 $f^*: \mathcal{O}(X) \rightarrow \text{Sub}_{\mathcal{C}}(1)$. 又 f^* 保持任意余极限, 故上述映射为位格的同态; 而 $\text{Sh}(X)$ 由子终对象生成, 故几何态射 f 被上述位格同态唯一确定.

□

位象反映的一个重要推论是函子 $\text{Sh}: \mathcal{Loc} \rightarrow \text{Topos}$ 保持 (2-范畴意义下的) 极限.

最后我们再给出一个例子说明什么样的意象不是位象型意象.

例 3.6.18 (非位象型 Grothendieck 意象的例子)

设 G 为群, G -集范畴 $G\mathbf{Set} = \mathbf{Fun}(BG^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ 是 Grothendieck 意象, 但当 G 非平凡时, $G\mathbf{Set}$ 不是位象型意象. 这是因为, $G\mathbf{Set}$ 的子终对象仅有空集 0 和单元集 1 , 而 G -集合态射 $1 \rightarrow S$ 是 S 在 G -作用下的不动点. 一个 G -集合一般不能由它的不动点决定 (G -集合可以完全没有不动点), 因此 $G\mathbf{Set}$ 不能由子终对象生成.

考虑一个带有 G -作用的拓扑空间 X (G 视为离散群). G -等变层范畴 $\mathbf{Sh}_G(X)$ (定义 3.12.1) 是 Grothendieck 意象, 但不一定是位象型意象. 事实上, $\mathbf{Sh}_G(X)$ 的底层位象为商空间 X/G .

3.7 Lawvere–Tierney 拓扑, 内蕴层化与局部化

Lawvere–Tierney 拓扑

回忆 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子 Ω 满足 $\Omega(c) = \{c \text{ 上的筛}\}$ (命题 3.3.19). Grothendieck 拓扑 J 给每个对象 c 赋予一族筛, 也即赋予一个子集 $J(c) \subset \Omega(c)$. 由拉回下的稳定性, J 构成 Ω 的子函子. 而由 Ω 为子对象分类子, $J \hookrightarrow \Omega$ 进一步对应一个态射 $j: \Omega \rightarrow \Omega$. 这个态射可以承载 Grothendieck 拓扑的所有信息, 而其好处在于仅涉及了意象中的子对象分类子, 从而可在任何意象 (而不仅是预层范畴) 中谈论. 下面的概念即是态射 j 在一般意象中的刻画.

定义 3.7.1 (Lawvere–Tierney 拓扑)

意象上的一个 Lawvere–Tierney 拓扑 (或称内蕴 Grothendieck 拓扑, 局部算子, local operator, 局部模态, local modality) 是一个态射 $j: \Omega \rightarrow \Omega$, 满足如下条件:

- (1) $j \circ \top = \top$;
- (2) $j \circ j = j$;
- (3) j 保持 \wedge , 即 $j \circ \wedge = \wedge \circ (j \times j)$.

命题 3.7.2

将定义 3.7.1 中的条件 (3) 改为

- (3') j 保持 Ω 上内蕴的序关系 $\Rightarrow: \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega$, 即 $j \circ \Rightarrow \leq \Rightarrow \circ (j \times j)$,

(\Rightarrow 的定义见 1.3.53) 得到的定义是等价的.

我们将用内语言证明命题 3.7.2, 见命题 4.3.8. 我们将用内语言给出 Lawvere–Tierney 拓扑的例子, 见例 4.3.10.

子对象的闭包

由米田引理, 态射 $\Omega \rightarrow \Omega$ 等同于自然变换 $\text{Sub} \rightarrow \text{Sub}$, 即子对象的一种运算.

命题-定义 3.7.3 (Lawvere–Tierney 拓扑与“闭包”)

Lawvere–Tierney 拓扑 j 等同于每个对象 X 的子对象格 $\text{Sub}(X)$ 上的一个“闭包”运算¹⁰ $A \mapsto \overline{A}$, 使得 \overline{A} 的特征函数为 $\chi_{\overline{A}} = j \circ \chi_A$, 且满足如下条件:

- (0) (自然性) 对态射 $f: Y \rightarrow X$, 有 $\overline{f^*A} = f^*\overline{A}$;
- (1) 对于 1 的子对象有 $\overline{1} = 1$ (或等价地, 对任意子对象 $A \rightarrow X$, 有 $A \leq \overline{A}$);
- (2) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$;
- (3) $\overline{A \wedge B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$.

因此 Lawvere–Tierney 拓扑也称作万有闭包运算 (universal closure operation). 称满足 $\overline{A} = A$ 的子对象 A 为闭子对象 (closed subobject).

上述命题中的条件 (1)(2)(3) 分别对应定义 3.7.1 中的条件 (1)(2)(3). 其中条件 (1) 等价于 $A \subset \overline{A}$ 是因为自然性 (对态射 $A \rightarrow X$, $A \rightarrow 1$ 分别使用自然性条件). 这三个条件也对应位象理论中“内核”的条件 (定义 2.2.12).

例 3.7.4 (子位象, 内核与 Lawvere–Tierney 拓扑)

设 $Y \rightarrow X$ 是子位象, 对应内核 $j: \mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ (命题 2.2.15). 回忆 $\text{Sh}(X)$ 的子对象分类子 Ω 满足 $\Omega(U) = \{U \text{ 的开子空间}\}$ (例 3.6.12). 定义态射 $j: \Omega \rightarrow \Omega$, $j(U)(V) = (Y \Rightarrow V) \wedge U$. 我们验证 j 是 $\text{Sh}(X)$ 上的 Lawvere–Tierney 拓扑:

- $j(U)(U) = (Y \Rightarrow U) \wedge U = U$, 即 $j \circ \top = \top$;
- $j(U) \circ j(U)(V) = [Y \Rightarrow ((Y \Rightarrow V) \wedge U)] \wedge U = (Y \Rightarrow V) \wedge U$, 即 $j \circ j = j$;
- $j(U)(V \wedge W) = (Y \Rightarrow (V \wedge W)) \wedge U = (Y \Rightarrow V) \wedge (Y \Rightarrow W) \wedge U = j(U)(V) \wedge j(U)(W)$, 即 j 保持 \wedge .

¹⁰这里所说的子对象的闭包与拓扑学上的闭包 (包含一个子集的最小闭集) 是不同的概念. 后者并非前者的特例!

定义 3.7.5 (稠密子对象)

对于子对象 $A \hookrightarrow X$, 若 $\overline{A} = X$, 则称之为稠密子对象 (稠密单射).

注 3.7.6

可以证明子对象 $A \hookrightarrow X$ 的闭包是 A 能稠密地嵌入的最大子对象. 这是由于闭包运算的自然性: 设 $A \leq B \hookrightarrow X$, 则 $B \wedge \overline{A}$ 等于 A 在 B 中的闭包. 因此 $B \leq \overline{A}$ 当且仅当 $A \hookrightarrow B$ 稠密. 这说明给定稠密单射的全体就决定了闭包运算.

定义 3.7.7 (关于 Lawvere–Tierney 拓扑的层)

设 j 是意象 \mathcal{E} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑. 定义关于 j 的层为关于所有稠密单射的局部对象 (定义 A.3.9). 具体地, 对于 \mathcal{E} 的对象 F , 若所有稠密子对象 $A \hookrightarrow X$ 诱导的映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \rightarrow \mathrm{Hom}(A, F)$$

均为同构, 则称 F 为 j -层. 相应地, 若上述映射均为单射, 则称 F 为 j -分离对象. 分别记 j -层的全子范畴和 j -分离对象的全子范畴为 $\mathrm{Sh}_j \mathcal{C}$, $\mathrm{Sep}_j \mathcal{C}$.

我们说明 j -层条件是预层范畴中的层条件 (3.4.3) 在一般意象中的推广.

命题 3.7.8 (Lawvere–Tierney 拓扑是 Grothendieck 拓扑的推广)

范畴 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑 J 确定了 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的 Lawvere–Tierney 拓扑 j , 使得 j 是子对象 $J \hookrightarrow \Omega$ 的特征函数; 具体地, 对 \mathcal{C} 的对象 c ,

$$j_c: \Omega(c) \rightarrow \Omega(c), S \mapsto \{f: d \rightarrow c \mid f^*S \in J(d)\}.$$

换言之, j 将每个筛 S 替换为 S 覆盖的所有态射的集合 (定义 3.4.8). 进一步, 关于 J 的层条件等价于 j -层条件.

证明. 由命题 3.3.19 的证明, 子对象 $J \hookrightarrow \Omega$ 的特征函数 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ 满足

$$j_c(S) = \{f: d \rightarrow c \mid \Omega(f)(S) \in J(d)\},$$

而 $\Omega(f)(S)$ 按定义为筛的拉回 f^*S , 故得 j_c 的表达式.

容易验证 j 满足 Lawvere–Tierney 拓扑的条件:

- $j \circ \top = \top$, 因为 $j_c(\text{极大筛}) = \text{极大筛}$;
- $j j = j$, 即命题 3.4.8 中的传递性;

- j 保持 \wedge , 因为 j 保持包含关系, 即当 $S \subset T$ 时 $j(S) \subset j(T)$.

下面说明两种层条件等价. 一个关键的观察是 $\mathbf{y}(c)$ 的稠密子对象等同于 c 的 J -覆盖筛. 这是因为, j 是 $J \hookrightarrow \Omega$ 的特征函数, 而由特征函数的构造 (见命题 3.3.19 的证明), 对于 c 上的筛 S , $S \in J(c)$ 当且仅当 $j_c(S)$ 是极大筛, 当且仅当 $\overline{S} = \mathbf{y}(c)$. 特别地, j -层条件 (关于稠密单射的局部对象) 蕴涵 J -层条件 (关于 $S \rightarrow \mathbf{y}(c)$ 的局部对象).

另一方面, 设预层 F 满足 J -层条件. 我们要证明 F 是关于 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中任意稠密单射 $A \rightarrow X$ 的局部对象, 也即态射 $A \rightarrow F$ 可唯一地延拓为 $X \rightarrow F$. 由于稠密子对象的拉回仍稠密 (闭包运算的自然性), 对 $x \in X(c)$, $A \rightarrow X$ 沿 $x: \mathbf{y}(c) \rightarrow X$ 的拉回 x^*A 为 $\mathbf{y}(c)$ 的稠密子对象, 即 c 的 J -覆盖筛.

$$\begin{array}{ccccc} x^*A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow & \nearrow \exists! & \\ \mathbf{y}(c) & \xrightarrow{x} & X & & \end{array}$$

如图, F 的 J -层条件说明态射 $x^*A \rightarrow F$ 可唯一地延拓为 $\mathbf{y}(c) \rightarrow F$, 这便唯一确定了自然变换 $X \rightarrow F$.¹¹ □

上述命题的另一个方向是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的所有 Lawvere–Tierney 拓扑都是来自 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑.

命题 3.7.9

预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的 Lawvere–Tierney 拓扑 j 确定了 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑 J , 使得对于 $S \in \Omega(c)$,

$$S \in J(c) \text{ 当且仅当 } j_c(S) = \text{极大筛}.$$

层范畴的性质

层范畴中的有限极限

命题 3.7.10

设 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ 是意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑, 则 $\text{Sh}_j \mathcal{C}$ 具有有限极限, 且等同于 \mathcal{C} 中的有限极限.

证明. 这是局部对象的性质 (命题 A.3.14). □

由单射的拉回刻画 (命题 1.3.4), 有如下推论.

¹¹ 此处可作如下解释. X 可表示为 $\mathbf{y}(c)$ 的余极限 (命题 A.4.7), 故态射 $X \rightarrow F$ 由所有态射 $\mathbf{y}(c) \rightarrow F$ 唯一确定. 当然, 这个事实有更直接的解释: 预层的态射 $X \rightarrow F$ 由每个分量的态射 $X(c) \rightarrow F(c)$ 决定.

命题 3.7.11

设 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ 是意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑, 则 $\text{Sh}_j \mathcal{C}$ 中一个态射是单射当且仅当它作为 \mathcal{C} 中的态射是单射.

层范畴中的子对象**命题-定义 3.7.12** (闭子对象分类子)

设 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ 是意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑. 定义 $\Omega_j \hookrightarrow \Omega$ 为 j 的不动点集, 也即 $\Omega_j = \text{eq}(\text{id}, j: \Omega \rightrightarrows \Omega)$. 那么 Ω_j 是“闭子对象分类子”: 对任意对象 X , 有自然同构

$$\{X \text{ 的闭子对象}\} \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \Omega_j).$$

证明. 对 X 的任意子对象 $A \hookrightarrow X$, 由 \overline{A} 的定义, \overline{A} 的特征函数为 $j \circ \chi_A$. 因此 $\overline{A} = A$ 当且仅当 $j \circ \chi_A = \chi_A$. 由 Ω_j 的定义, $j \circ \chi_A = \chi_A$ 当且仅当 χ_A 穿过 $\Omega_j \hookrightarrow \Omega$. 这说明 Ω_j 分类了闭子对象. \square

注意 Ω_j 的构造与“内核对应的子位象”(定义 2.2.13) 相似.

命题 3.7.13

设 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ 是意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑, X 为 j -层. 那么 X 的子对象 $A \hookrightarrow X$ 是闭子对象当且仅当 A 是 j -层.

证明.

- 假设 $A \hookrightarrow X$ 是闭子对象. 对任意稠密子对象 $B \hookrightarrow Y$, 设有态射 $f: B \rightarrow A$, 则由 X 为 j -层, 存在唯一的 $g: Y \rightarrow X$ 使下图交换.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{f} & A \\ \downarrow & \exists! \nearrow & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

这表示 $B \leq g^*A$. 因为 $B \hookrightarrow Y$ 稠密, 而 g^*A 为 Y 的闭子对象, 所以 $g^*A = Y$, 也即存在上图中的态射 $Y \rightarrow A$. 由 $A \hookrightarrow X$ 为单射, 这个态射 $Y \rightarrow A$ 是唯一的. 这证明了 A 为 j -层.

- 假设 A 为 j -层. 由下图中 $A \hookrightarrow \overline{A}$ 为稠密单射, 知 $\overline{A} \hookrightarrow X$ 穿过 $A \hookrightarrow X$ (X 为 j -层

保证了右下方三角形交换), 故 $\overline{A} = A$.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{id}} & A \\ \downarrow & \nearrow \exists! & \downarrow \\ \overline{A} & \hookrightarrow & X \end{array}$$

□

命题 3.7.14

定义 3.7.12 中的 Ω_j 是 j -层.

证明. 我们要证明任意稠密子对象 $m: A \hookrightarrow X$ 给出同构 $m^*: \text{Hom}(X, \Omega_j) \rightarrow \text{Hom}(A, \Omega_j)$; 由命题 3.7.12, 这等价于

$$m^*: \{X \text{ 的闭子对象}\} \rightarrow \{A \text{ 的闭子对象}\}, U \mapsto U \wedge A$$

为双射. 对 A 的闭子对象 $B \hookrightarrow A$, 回忆 $\exists_m B$ 表示 $B \hookrightarrow A \rightarrow X$ 作为 X 的子对象 (定义 1.3.20). 那么

$$m^* \overline{\exists_m B} = \overline{m^* \exists_m B} = \overline{\exists_m B \wedge A} = \overline{B} = B.$$

另一方面, 对于 X 的闭子对象 $Y \hookrightarrow X$,

$$\overline{\exists_m m^* Y} = \overline{Y \wedge A} = \overline{Y} \wedge \overline{A} = Y \wedge X = Y.$$

这证明了所需的双射.

□

命题 3.7.15

Ω_j 是 $\text{Sh}_j C$ 的子对象分类子.

证明. 由命题 3.7.11, 3.7.12, 3.7.13, 3.7.14 即证.

□

层范畴中的指数对象

命题 3.7.16

设 j 是意象 C 上的 Lawvere–Tierney 拓扑, F 是 j -层, X 是任意对象, 那么指数对象 F^X 是 j -层.

这个命题与 3.6.8 一样是正合局部化的性质 (命题 A.3.19) 的特例.

层化与局部化

[20] V.3 节构造了意象关于 Lawvere-Tierney 拓扑 j 的层化.

命题 3.7.17


设 j 为意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere-Tierney 拓扑, 则 $\text{Sh}_j \mathcal{C}$ 为 \mathcal{C} 的自反局部化.

我们在此不证明这个命题, 而将在下一章使用内语言完成层化的构造.

3.8 意象之间的态射

几何态射

几何态射是意象之间的态射, 它推广了拓扑空间的连续映射诱导的意象之间的伴随 3.1.23.



定义 3.8.1 (几何态射)

设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 为意象. 定义 \mathcal{C} 到 \mathcal{D} 的几何态射 (geometric morphism, 简称为态射) f 为一对伴随

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xleftarrow{f^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{f_*} \end{array} \mathcal{D},$$

且满足 f^* 保持有限极限. 称 f_* 为态射 f 的直像部分, f^* 为其逆像部分. 几何态射的复合即是伴随的复合: 对于几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $g: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, 令

$$(gf)_* = g_* f_*, \quad (gf)^* = f^* g^*.$$

由于 f^*, g^* 均保持有限极限, 当然 $(gf)^*$ 也保持有限极限, 于是有几何态射 $gf: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$.

设 $f, g: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为几何态射, 定义 f 到 g 的几何变换为自然变换 $f^* \rightarrow g^*$, 也即自然变换 $g_* \rightarrow f_*$ (命题 A.2.11). 由此, 意象, 几何态射与几何变换构成 2-范畴 Topos .

注 3.8.2

上面的定义中, 我们将这对伴随称为 \mathcal{C} 到 \mathcal{D} 的态射, 因为这使得拓扑空间到层意象的对应是协变的. 几何态射有另一种等价的定义, 只提到逆像部分 f^* , 且要求它存在右伴随. 右伴随若存在则是唯一的 (差一个唯一的自然同构), 因此该定义没有本质的不同. 由于 Grothendieck 意象满足伴随函子定理 (A.6.27) 的条件, Grothendieck 意象之间的几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 只需要一个保持有限极限和任意余极限的函子 $f^*: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$. 这与位象的态射 (保持有限交与任意并的函子, 定义 2.1.1) 相似 (命题 2.1.5).

回忆任何拓扑空间到一个点有唯一的映射, 其直像函子为整体截面函子 (例 3.1.24). 类似地, 任何 (Grothendieck) 意象到一点上的层意象 $\mathbf{Set} = \mathbf{Sh}(\mathbf{pt})$ 有整体截面给出的唯一的几何态射.

命题-定义 3.8.3 (整体截面几何态射)

Grothendieck 意象 \mathcal{C} 到 \mathbf{Set} 有 (自然同构意义下) 唯一的几何态射

$$\mathcal{C} \xleftarrow[\Gamma]{\Delta} \mathbf{Set},$$

称为整体截面几何态射 (global sections geometric morphism).

证明. 由于 Δ 作为左伴随保持余极限 (命题 A.2.5), 且由定义, Δ 保持有限极限 (特别地, 保持终对象 1), 故对任意集合 S 有自然同构

$$\Delta(S) \simeq \Delta\left(\coprod_{s \in S} 1\right) \simeq \prod_{s \in S} \Delta(1) \simeq \prod_{s \in S} 1,$$

即 Δ (在自然同构意义下) 唯一确定. 那么其右伴随也唯一确定. 具体地, Γ 是由 $1 \in \mathcal{C}$ 表示的函子

$$\Gamma = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(1, -),$$

这是因为

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\Delta(S), X) &\simeq \prod_{s \in S} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(1, X) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(1, X)). \end{aligned}$$

□

注 3.8.4 (常值层)

在层范畴的情形, 上述命题中的左伴随 Δ 给出“常值层”(例 3.1.24). 对于集合 S , 有时我们也将上述命题中的 $\Delta(S)$ 记为 \underline{S} . 对于集合 S 的元素 $s: 1 \rightarrow S$, 记其对应的整体元素为 $\underline{s} := L(s): 1 \rightarrow \underline{S}$.

位象 X 的点是终位象 1 到 X 的映射 (定义 2.1.11); 类似地可定义意象的点.

定义 3.8.5 (意象的点)

意象 \mathcal{C} 的一个点是 \mathbf{Set} (即 $\mathbf{Sh}(\mathbf{pt})$) 到 \mathcal{C} 的一个几何态射 $p: \mathbf{Sh}(\mathbf{pt}) \rightarrow \mathcal{C}$. 该几何态射的逆像部分 $p^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 称为茎.

例 3.8.6

拓扑空间 X 的一个点 x 给出意象 $\mathbf{Sh}(X)$ 的一个点 (例 3.1.25).

命题 3.8.7

设 X 是位象, 则层意象 $\mathbf{Sh}(X)$ 的点等同于 X 的点.

我们将在 3.9 节讨论更多意象的点.

例 3.8.8 (意象的俯范畴)

意象 \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 给出俯范畴之间的几何态射 $f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ (命题 1.1.41). 俯范畴 \mathcal{C}/X 可视为 $\mathbf{Topos}/\mathcal{C}$ 的对象, 有 2-函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Topos}/\mathcal{C}, X \mapsto \mathcal{C}/X$. (2-范畴的相关概念见 A.1 节.)

例 3.8.9 (连续映射作为几何态射)

拓扑空间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 给出层意象之间的几何态射 $f: \mathbf{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Sh}(Y)$ (命题 3.1.23, 3.1.20).

逻辑态射

意象之间还有另一种态射的概念, 侧重于它的范畴结构, 故称为逻辑态射.

定义 3.8.10 (逻辑态射)

设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 为意象. 定义 \mathcal{C} 到 \mathcal{D} 的逻辑态射 (logical morphism) 为保持有限极限, 子对象分类子和指数对象的函子 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$.

例 3.8.11

对于意象 \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$, 拉回 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 为逻辑态射, 因为它保持极限, 将子对象分类子 $\Omega \times Y \rightarrow Y$ 变为子对象分类子 $\Omega \times X \rightarrow X$, 且保持指数对象 (命题 1.1.43).

逻辑态射的意义在于它保持内语言中成立的语句, 见 4.1 节.

嵌入与满射

类比于子位象 (定义 2.2.1), 我们有子意象.

定义 3.8.12 (子意象, 几何嵌入)

对于几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 对应伴随

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xleftarrow{f^*} \\ \xrightarrow[\perp]{} \\ \xrightarrow{f_*} \end{array} \mathcal{D},$$

若 f_* 全忠实, 即 \mathcal{C} 为 \mathcal{D} 的正合局部化 (定义 A.3.1), 则称 f 为子意象 (subtopos), 或几何嵌入 (geometric embedding).

例 3.8.13

对于拓扑空间 (或位象) X 的子空间 $Y \hookrightarrow X$, 层意象的嵌入 $\text{Sh}(Y) \rightarrow \text{Sh}(X)$ 是子意象. 回忆子位象是一对伴随

$$\mathcal{O}(Y) \begin{array}{c} \xleftarrow{f^*} \\ \xrightarrow[\perp]{} \\ \xrightarrow{f_*} \end{array} \mathcal{O}(X),$$

其中 f_* 为单射, f^* 为满射.

例 3.8.14

层意象 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 是重要的子意象 (命题 3.5.5). 更一般地, 对于意象 \mathcal{C} 上的 Lawvere–Tierney 拓扑 j , $\text{Sh}_j \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{C}$ 是子意象 (命题 3.7.17).

类比于位象的满射 (定义 2.2.25), 我们有意象的满射.

定义 3.8.15 (意象的满射)

对于几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 对应伴随

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xleftarrow{f^*} \\ \perp \\ \xrightarrow{f_*} \end{array} \mathcal{D},$$

若 f^* 忠实, 则称 f 为意象的满射.

命题 3.8.16

对于意象 \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$,

- 若 f 单, 则 $f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ 是嵌入 (也即 Π_f 全忠实);
- 若 f 满, 则 $f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ 是满射 (也即 f^* 忠实).

证明.

- 由伴随三元组的性质 (命题 A.2.16), Π_f 全忠实当且仅当 Σ_f 全忠实. 而 Σ_f 将 $Z \rightarrow X$ 对应到复合 $Z \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$, 故 f 为单射保证了 Σ_f 全忠实.
- 设 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, 我们要证明 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 忠实. 设 $U \rightarrow Y, V \rightarrow Y$ 是 \mathcal{C}/Y 的两个对象, 由于拉回保持满射 (命题 1.3.7), 在下图中 $f^*V \rightarrow V, f^*U \rightarrow U$ 均为满射; 从而任意两个态射 $g, h: U \rightarrow V$ 相等当且仅当对应的态射 $f^*g, f^*h: f^*U \rightarrow f^*V$ 相等. 这说明 f^* 忠实.

$$\begin{array}{ccc} f^*U & \xrightarrow{\quad} & U \\ & \searrow f^*g & \searrow g \\ & f^*V & \xrightarrow{\quad} V \\ & \downarrow & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

□

意象的满射有另外一些等价的判定.

命题 3.8.17 (意象满射的等价定义)

对于意象的几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 如下条件等价.

- (1) f 为满射, 即 f^* 忠实;
- (2) 对任意 $X \in \mathcal{D}$, 单位 $X \rightarrow f_*f^*X$ 为单射;

- (3) f^* 反映同构, 即对 \mathcal{D} 中的任意态射 u , 若 f^*u 为同构, 则 u 为同构;
- (4) 对任意 $X \in \mathcal{D}$, 子对象格的同态 $f^*: \text{Sub}(X) \rightarrow \text{Sub}(f^*X)$ 为单射.

证明. • (1) \Leftrightarrow (2) 见命题 A.2.10 的证明.

•

[未完成:]

□

满-单分解

类比于位象的满-单分解 (命题 2.2.26), 我们有意象的满-单分解. 回忆对于位象态射 $f: X \rightarrow Y$, $\mathcal{O}(Y)$ 上的单子 f_*f^* 给出了 f 的像. 对于意象的几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, \mathcal{D} 上的单子 f_*f^* 也给出了 f 的像. 首先我们需要一个几何态射穿过子意象 $\text{Sh}_j \mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 的判定.

命题 3.8.18

设 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为几何态射, j 是 \mathcal{D} 上任意一个拓扑, 则如下条件等价.

- (1) 几何态射 f 穿过 $\text{Sh}_j \mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{D}$;
- (2) f_* 的像落在 $\text{Sh}_j \mathcal{D}$ 中;
- (3) f^* 将 j -稠密子对象变为 \mathcal{C} 中的同构.

证明.

- (1) \Rightarrow (2) 是明显的.
- (2) \Rightarrow (1). 假设 f_* 的像落在 $\text{Sh}_j \mathcal{D}$ 中. 我们断言存在几何态射 $g: \mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}_j \mathcal{D}$, $g_* = i^*f_*$, $g^* = f^*i_*$; 这是因为

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(g^*- , -) &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f^*i_*- , -) \\
 &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(i_*- , f_*-) \\
 &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(i_*- , i_*i^*f_*-) \\
 &\simeq \text{Hom}_{\text{Sh}_j \mathcal{D}}(- , i^*f_*-) \simeq \text{Hom}_{\text{Sh}_j \mathcal{D}}(- , g_*-).
 \end{aligned}$$

于是 f 分解为 $\mathcal{C} \xrightarrow{g} \text{Sh}_j \mathcal{D} \xrightarrow{i} \mathcal{D}$.

- (2) \Leftrightarrow (3). 对 \mathcal{D} 中任意稠密子对象 $A \rightarrow X$ 考虑下图, 其中上下两边为伴随给出的自

然同构.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(f^*X, -) & \xrightarrow{\simeq} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X, f_*-) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(f^*A, -) & \xrightarrow{\simeq} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, f_*-) \end{array}$$

(2) 等价于此图的右边为同构, 而 (3) 等价于此图的左边为同构, 故 (2) 等价于 (3).

□

命题 3.8.19 (几何态射的满-单分解, 存在性)

设 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为几何态射, 则存在 \mathcal{D} 上的 Lawvere-Tierney 拓扑 j 使得 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 分解为满射 $\mathcal{C} \rightarrow \mathrm{Sh}_j \mathcal{D}$ 与嵌入 $\mathrm{Sh}_j \mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{D}$ 的复合.

证明. 要定义 Lawvere-Tierney 拓扑 j , 只需定义子对象的万有闭包运算 (3.7.3). 对于 \mathcal{D} 中的子对象 $A \rightarrow X$, 定义 \overline{A} 为如下的拉回,

$$\begin{array}{ccc} \overline{A} & \longrightarrow & f_*f^*A \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & f_*f^*X \end{array}$$

其中 η 为伴随 $f^* \dashv f_*$ 的单位.

我们证明一个引理,

$$A \leq \overline{B} \Leftrightarrow f^*A \leq f^*B. \quad (\star)$$

假设 $A \leq \overline{B}$, 则有交换图 $\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & f_*f^*B \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & f_*f^*X \end{array}$, 进一步由伴随 $f^* \dashv f_*$ 得交换图 $\begin{array}{ccc} f^*A & \longrightarrow & f^*B \\ & \searrow & \downarrow \\ & & f^*X \end{array}$,

即 $f^*A \leq f^*B$. 反之, 若 $f^*A \leq f^*B$, 下图中存在唯一的态射 $A \rightarrow \overline{B}$.

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & f_*f^*A & & \\ & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & & \overline{B} & \longrightarrow & f_*f^*B \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & X & \xrightarrow{\eta_X} & f_*f^*X \end{array}$$

从而 (\star) 得证. 现在说明 $A \mapsto \overline{A}$ 满足万有闭包运算的条件.

- 自然性. 注意到 f_*f^* 保持拉回, 对 \mathcal{D} 中任意态射 $\varphi: Y \rightarrow X$ 以及子对象 $A \rightarrow X$ 考

虑下图, 其中前后左右四个面为拉回, 故 $\overline{\varphi^* A} \simeq \varphi^* \overline{A}$.

$$\begin{array}{ccccc}
 \overline{\varphi^* A} & \longrightarrow & f_* f^*(\varphi^* A) & & \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \\
 Y & \xrightarrow{\eta_Y} & f_* f^* Y & \longrightarrow & f_* f^* A \\
 \downarrow \varphi & \searrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 X & \xrightarrow{\eta_X} & f_* f^* X & &
 \end{array}$$

- $A \leq \overline{A}$. 由 (\star) , 这等价于 $f^* A \leq f^* \overline{A}$.
- $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$. 由 (\star) , $f^* \overline{A} \leq f^* A$; 同理, $f^* \overline{\overline{A}} \leq f^* \overline{A} \leq f^* A$; 再由 (\star) 得 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{A}$.
- $\overline{A \wedge B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$. 因为 $f_* f^*$ 保持拉回, 下图的上下左右前后六个面均为拉回.

$$\begin{array}{ccccc}
 \overline{A \wedge B} & \longrightarrow & f_* f^*(A \wedge B) & & \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \\
 \overline{A} & \xrightarrow{\eta_A} & f_* f^* A & \longrightarrow & f_* f^* A \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 \overline{B} & \xrightarrow{\eta_B} & f_* f^* B & \longrightarrow & f_* f^* B \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 X & \xrightarrow{\eta_X} & f_* f^* X & &
 \end{array}$$

由 (\star) , 对于 \mathcal{D} 中的稠密子对象 $A \rightarrow X$ 有 $f^* A = f^* X$, 即 f^* 将稠密单射变为同构. 由命题 3.8.18, f_* 穿过 $\text{Sh}_j \mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{D}$.

还需证明 $g: \mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}_j \mathcal{D}$ 为满射, 即 $g^* = f^* i_*$ 为忠实函子. 而 g^* 保持等化子, 故只需证明 g^* 反映同构 (即对于态射 u , 若 $g^* u$ 为同构, 则 u 为同构). **[未完成: SGL VII.4.3]**
 由 (\star) , 对于两个 j -闭子对象 $A, B \in \text{Sub}(X)$, 只要 $f^* A = f^* B$, 就有 $A = B$. \square

群作用与张量-同态伴随

几何态射有一类重要且有推广价值的例子: 带有群作用的集合范畴之间的几何态射.

设 G 是群. 回忆在例 3.3.6 中我们定义 $G\text{Set}$ 为单对象范畴 BG 上的预层范畴, 也即具有 G -右作用的集合的范畴.

如下是一个常见的构造, 它与模的张量积有相似的性质.

定义 3.8.20 (张量积)

设集合 X 具有 G -右作用, Z 具有 G -左作用. 定义 X 与 Z 在 G 上的张量积 $X \otimes_G Z$ 如下:

$$X \otimes_G Z := X \times Z \Big/ \left(\begin{array}{l} ((x \cdot g, z) \sim (x, g \cdot z)) \\ (x \in X, g \in G, z \in Z) \end{array} \right).$$

以范畴语言, $X \otimes_G Z$ 可表示为如下余等化子:

$$X \times G \times Z \rightrightarrows X \times Z \dashrightarrow X \otimes_G Z, \quad (3.5)$$

其中左边两个映射分别是 G 右作用于 X 和左作用于 Z .

以范畴语言叙述的目的是表明上述定义可以一字不改地应用于任何意象.

在上述定义中若 X, Z 没有其它结构, 那么 $X \otimes_G Z$ 只是一个集合; 若 Z 还有另一个群 H 的右作用, 且与 G -左作用交换 (类似于两个环上的双模), 那么 $X \otimes_G Z$ 继承这个 H -右作用: 将 $(-) \times H$ 作用于图 (3.5), 使用 $(-) \times H$ 保持余极限的性质. 我们可将这个事实表述如下.

命题-定义 3.8.21 (张量积)

设 $X: BG^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, $Z: BG \times BH^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 则可定义 $X \otimes_G Z: BH^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$. 具体地, H 在其上的右作用为 $(x, z) \cdot h := (x, z \cdot h)$. 这定义了函子

$$- \otimes_G Z: G\text{Set} \rightarrow H\text{Set}.$$

与张量积密切相关的是同态集.

定义 3.8.22 (同态集)

设 Z, Y 均有 H -右作用. 定义同态集 $\text{Hom}_H(Z, Y)$ 如下:

$$\text{Hom}_H(Z, Y) := \text{Hom}_{H\text{Set}}(Z, Y) = \left\{ f: Z \rightarrow Y \mid \begin{array}{l} f(z \cdot h) = f(z) \cdot h \\ (z \in Z, h \in H) \end{array} \right\}.$$

以范畴语言, $\text{Hom}_H(Z, Y)$ 可表示为如下等化子:

$$\text{Hom}_H(Z, Y) \dashrightarrow Y^Z \rightrightarrows Y^{Z \times H}, \quad (3.6)$$

其中右边两个映射分别对应 $Y^Z \times Z \times H$ 到 Y 的两个映射: 一个是 H 右作用于 Z 再使用取值映射 $\text{ev}: Y^Z \times Z \rightarrow Y$ (定义 1.1.6); 另一个是先取值, H 再右作用于 Y .

在上述定义中若 Z, Y 没有其它结构, 那么 $\text{Hom}_H(Z, Y)$ 只是一个集合; 若 Z 还有另一个群 G 的左作用, 且与 H -右作用交换, 那么 $\text{Hom}_H(Z, Y)$ 将获得一个 G -右作用: 将 $(-) \times G$ 作用于图 3.6, 使用 $(-) \times G$ 保持等化子的性质 (“极限与极限交换”). 我们可将这个事实表述如下.

命题-定义 3.8.23 (同态 “集”)

设 $Z: BH^{\text{op}} \times BG \rightarrow \text{Set}$, $Y: BH^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 则可定义 $\text{Hom}_H(Z, Y): BG^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$. 具体地, G 在其上的右作用为 $(f \cdot g)(z) := f(g \cdot z)$. 这定义了函子

$$\text{Hom}_H(Z, -): H\text{Set} \rightarrow G\text{Set}.$$

不出意外地, 上面定义的两个函子是一对伴随.

命题 3.8.24 (张量-同态伴随)

设 X 上有 G -右作用, Y 上有 H -右作用, Z 上有互相交换的 G -左作用与 H -右作用, 那么有自然同构

$$\text{Hom}_{H\text{Set}}(X \otimes_G Z, Y) \simeq \text{Hom}_{G\text{Set}}(X, \text{Hom}_H(Z, Y)),$$

也即有伴随

$$G\text{Set} \begin{array}{c} \xrightarrow{(-) \otimes_G Z} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{Hom}_H(Z, -)} \end{array} H\text{Set}.$$

设 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态, 这个同态给 H 赋予了两个方向的 G -作用. 我们记 ${}_{\phi}H$ 为 H 带有 G -左作用与 H -右作用, 记 H_{ϕ} 为 H 带有 H -左作用与 G -右作用.

命题 3.8.25

群同态 $\phi: G \rightarrow H$ 诱导了三元伴随

$$G\text{Set} \begin{array}{c} \xleftarrow{\phi_!} \\ \perp \\ \xrightarrow{\phi_*} \end{array} {}_{\phi}H\text{Set},$$

其中

$$\begin{aligned} \phi_! &= (-) \otimes_G {}_{\phi}H, \\ \phi^* &= \text{Hom}_H({}_{\phi}H, -) \simeq (-) \otimes_H H_{\phi}, \\ \phi_* &= \text{Hom}_G(H_{\phi}, -). \end{aligned}$$

由此, ϕ^* 作为 $\phi_!$ 的右伴随保持极限, 从而伴随 $\phi^* \dashv \phi_*$ 满足几何态射的条件.

命题 3.8.26

群同态 $\phi: G \rightarrow H$ 诱导了 $G\text{Set}$ 到 $H\text{Set}$ 的几何态射 (ϕ^*, ϕ_*) .

例 3.8.27

群同态 $1 \rightarrow H$ 诱导的三元伴随为

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{(-) \times H} & \\ \text{Set} & \xleftarrow[\perp]{\text{遗忘}} & H\text{Set}. \\ & \xrightarrow{(-)^H} & \end{array}$$

其中 X^H 表示 H 的阶数个 X 相乘, 带有明显的 H -右作用.

例 3.8.28

群同态 $G \rightarrow 1$ 诱导的三元伴随为

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\text{余不动点}} & \\ G\text{Set} & \xleftarrow[\perp]{\text{平凡}} & \text{Set}, \\ & \xrightarrow{\text{不动点}} & \end{array}$$

其中“余不动点”(coinvariant) 将 G -集合对应到其 G -作用的轨道的集合.

范畴是群的推广; 对于范畴 \mathcal{C} , 函子 $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ 可视为“带有 \mathcal{C} -右作用的一族集合”, 而函子 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 则是“带有 \mathcal{C} -左作用的一族集合”. 对于函子 $\phi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 记

- ${}_{\phi}\mathcal{D}$ 为函子 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, \phi-): \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ (“ \mathcal{D} 带有 \mathcal{C} -左作用与 \mathcal{D} -右作用”);
- \mathcal{D}_{ϕ} 为函子 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(\phi-, -): \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D} \rightarrow \text{Set}$ (“ \mathcal{D} 带有 \mathcal{D} -左作用与 \mathcal{C} -右作用”).

我们断言命题 3.8.25 可一字不动地推广为如下结论.

命题 3.8.29

函子 $\phi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 诱导了三元伴随

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{-\phi_!} & \\ \widehat{\mathcal{C}} & \xleftarrow[\perp]{\phi^*} & \widehat{\mathcal{D}}, \\ & \xrightarrow{-\phi_*} & \end{array}$$

其中

$$\begin{aligned} \phi_! &= (-) \otimes_{\mathcal{C}} {}_{\phi}\mathcal{D}, \\ \phi^* &= \text{Hom}_{\mathcal{D}}({}_{\phi}\mathcal{D}, -) \simeq (-) \otimes_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{\phi}, \\ \phi_* &= \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_{\phi}, -). \end{aligned}$$

当然, 需要给出此处推广的“张量积”与“Hom”的定义. 它们几乎照搬群作用的张量积的定义 (3.8.20, 3.8.21) 与 Hom 的定义 (3.8.22, 3.8.23).

定义 3.8.30 (张量积)

设 $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $Z: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. 定义 X 与 Z 在 \mathcal{C} 上的张量积如下:

$$X \otimes_{\mathcal{C}} Z := \coprod_{c \in \mathcal{C}} X(c) \times Z(c) \Big/ \begin{array}{l} ((x \cdot g, z) \sim (x, g \cdot z)) \\ (x \in X(c), g: c' \rightarrow c, z \in Z(c')) \end{array}$$

一般地, 设 $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $Z: \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. 定义 $X \otimes_{\mathcal{C}} Z: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 如下:

$$(X \otimes_{\mathcal{C}} Z)(d) := X \otimes_{\mathcal{C}} (Z(d, -)),$$

态射 $h: d' \rightarrow d$ 的作用为 $(x, z) \cdot h := (x, z \cdot h)$. 这定义了函子

$$- \otimes_{\mathcal{C}} Z: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \widehat{\mathcal{D}}.$$

定义 3.8.31 (同态“集”)

设 $Z: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, $Y: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 定义 Z 到 Y 的同态集如下:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Y) &:= \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(Z, Y) \\ &= \left\{ (f(d): Z(d) \rightarrow Y(d)) \left| \begin{array}{l} f(z \cdot g) = f(z) \cdot g \\ (z \in Z(d), g: d' \rightarrow d) \end{array} \right. \right\}. \end{aligned}$$

(当然, 这就是 Z 到 Y 的预层同态的集合.)

一般地, 设 $Z: \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, $Y: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 定义 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Y): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 如下:

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Y)(c) := \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z(-, c), Y),$$

态射 $h: c' \rightarrow c$ 的作用为 $(f \cdot h)(z) := f(h \cdot z)$. 这定义了函子

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, -): \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}.$$

若将 Z 视为函子 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{D}^{\text{op}}, \mathbf{Set}) = \widehat{\mathcal{D}}$, 则上述概念是“脉”函子 (命题 A.4.11) 的特例.

命题 3.8.32 (张量-同态伴随)

设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 为范畴. 对任意函子 $Z: \mathcal{C} \times \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 有伴随

$$\widehat{\mathcal{D}} \begin{array}{c} \xleftarrow{- \otimes_{\mathcal{C}} Z} \\ \perp \\ \xrightarrow{\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, -)} \end{array} \widehat{\mathcal{C}},$$

也即对函子 $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, Y: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 有自然同构

$$\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(X \otimes_{\mathcal{C}} Z, Y) \simeq \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(X, \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Y)).$$

当然, 上述命题中的 \mathbf{Set} 也可改为一般的意象.

注 3.8.33 (环上的模范畴的张量-同态伴随, 诱导和余诱导表示)

环上的模范畴有与命题 3.8.32 完全类似的张量-同态伴随, 并且环的同态有与命题 3.8.29 完全类似的三元伴随, 这个三元伴随的最左和最右部分在代数上分别称作诱导表示 (induced representation) 和余诱导表示 (coinduced representation). 具体地, 设 R, S 为 (不一定交换的) 环, 记 $R\text{Mod}, S\text{Mod}$ 为对应的左模范畴, 对任意 (左 S , 右 R)-模 Z , 有伴随

$$S\text{Mod} \begin{array}{c} \xleftarrow{Z \otimes_R -} \\ \perp \\ \xrightarrow{\text{Hom}_S(Z, -)} \end{array} R\text{Mod},$$

设有环同态 $\phi: R \rightarrow S$, 那么 S 可视为 (左 R , 右 S)-模或 (左 S , 右 R)-模, 从而诱导了三元伴随

$$R\text{Mod} \begin{array}{c} \xleftarrow{- \phi_!} \\ \perp \\ \xrightarrow{- \phi_*} \end{array} \phi^* - S\text{Mod},$$

其中

$$\begin{aligned} \phi_! &= S \otimes_R (-), & \text{“诱导表示”} \\ \phi^* &= \text{Hom}_S(S, -) \simeq S \otimes_S (-), & \text{“限制表示”} \\ \phi_* &= \text{Hom}_R(S, -). & \text{“余诱导表示”} \end{aligned}$$

例 3.8.34 (有向图与单纯集)

回忆有向图可视为 $\mathcal{C} = \{[0] \rightrightarrows [1]\}$ 上的预层 (例 3.3.5), 而范畴 \mathcal{C} 是 Δ 的子范畴. 嵌入 $i: \mathcal{C} \rightarrow \Delta$ 诱导了有向图范畴 diGrph 与单纯集范畴 sSet 之间的三元伴随

$$\text{diGrph} \begin{array}{c} \xleftarrow{- i_!} \\ \perp \\ \xrightarrow{- i_*} \end{array} i^* - \text{sSet},$$

展开定义得到如下描述.

- 对于有向图 G , 有 $(i_!G)_n \simeq G_0 + n \times G_1$, 直观上 $i_!G$ 是向 G 中添加尽可能少的元素使之成为单纯集.
- 对于单纯集 X , i^*X 是有向图 (X_0, X_1) .
- 对于有向图 G , 有 $(i_*G)_n \simeq \text{Hom}_{\text{diGrph}}(i^*\Delta^n, G)$, 其中 $i^*\Delta^n$ 是 Δ^n 的“1-骨架”, 直观上 i_*G 是向 G 中添加尽可能多的元素使之成为单纯集.

例 3.8.35 (单纯集的骨架和余骨架)

固定一个自然数 n . 考虑 Δ 中 $[0], [1], \dots, [n]$ 构成的全子范畴 $\Delta_{\leq n}$. 记 $\Delta_{\leq n}$ 上的预层范畴为 $\text{sSet}_{\leq n}$. 那么嵌入 $i: \Delta_{\leq n} \rightarrow \Delta$ 给出三元伴随

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{i_!} & \\ \text{sSet}_{\leq n} & \xleftarrow[i_*]{i^*} & \text{sSet} \\ & \xrightarrow{i_*} & \end{array}$$

其中

- $i_!$ 是添加尽可能少的元素成为单纯集;
- i^* 是截取 n 维及以下的单形;
- i_* 是添加尽可能多的元素成为单纯集.

定义上述函子的复合

- $\text{sk}_n := i_!i^*: \text{sSet} \rightarrow \text{sSet}$ 为单纯集的 n -骨架 (skeleton);
- $\text{cosk}_n := i_*i^*: \text{sSet} \rightarrow \text{sSet}$ 为单纯集的 n -余骨架 (coskeleton).

由三元伴随的性质 (命题 A.2.14), 有 $\text{sk}_n \dashv \text{cosk}_n$.

3.9 景之间的态射

类比于拓扑空间的连续映射, 意象的态射可由景的态射诱导. 不如说景的态射就是为了给出意象的态射而存在的. 因此有如下抽象的定义.

定义 3.9.1 (景的态射)

设 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$ 是景, 定义景的态射 $F: (\mathcal{C}, J) \rightarrow (\mathcal{D}, K)$ 为使得存在如下交换图的函子:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} \\ \downarrow \mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)} & & \downarrow \mathfrak{J}_{(\mathcal{D}, K)} \\ \text{Sh}(\mathcal{C}, J) & \xrightarrow{f^*} & \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \end{array}$$

其中 f^* 是某个意象态射 $f: \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的逆像部分. (符号 $\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}$ 表示米田嵌入再层化, 见定义 3.5.6.) 换言之, 景的态射应当诱导反方向的意象态射.

注意到定义 3.9.1 中, f^* 保持余极限, 而 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的任意对象都可表示为 $\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}$ 的像中某些对象的余极限 (命题 3.5.7), 故函子 f^* 由 F 唯一决定,

$$f^*(X) = \text{colim}_{\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c) \rightarrow X}^{\text{Sh}(\mathcal{D}, K)} \mathfrak{J}_{(\mathcal{D}, K)}(F(c)) \simeq a(\text{colim}_{\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c) \rightarrow X}^{\widehat{D}} \mathfrak{J}(F(c))).$$

其中 a 表示层化. 而 f^* 的右伴随 $f_*: \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 也可容易地写出: 对于 $X \in \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$,

$$\begin{aligned} (f_*X)(c) &\simeq \text{Hom}_{\text{Sh}(\mathcal{C}, J)}(\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c), f_*X) && \text{(米田引理)} \\ &\simeq \text{Hom}_{\text{Sh}(\mathcal{D}, K)}(f^*\mathfrak{J}_{(\mathcal{C}, J)}(c), X) && (f^* \dashv f_*) \\ &\simeq \text{Hom}_{\text{Sh}(\mathcal{D}, K)}(\mathfrak{J}_{(\mathcal{D}, K)}(F(c)), X) && \text{(交换图)} \\ &\simeq X(F(c)) = (F^*X)(c) && \text{(米田引理)}. \end{aligned}$$

但我们不会止步于上述抽象的定义, 因为引入景的态射的目的是用更少的信息给出意象的态射, 而上述定义没有告诉我们如何达成这一目的. 实际操作上往往有更具体的条件来刻画景的态射; 不幸的是, 这个条件会比较复杂. 我们先讨论一种较简单且常见的情形, 即存在有限极限的景之间的态射; 在之后的若干小节将逐步理解更一般的景的态射.

有限极限景的态射**定义 3.9.2 (有限极限景的态射)**

设 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$ 是有限极限景, 即范畴 \mathcal{C}, \mathcal{D} 存在有限极限. 定义有限极限景的态射 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为满足如下条件的函子:

- F 保持有限极限 (“左正合”);
- F 保持覆盖, 也即对 \mathcal{C} 中任意对象 c 的 J -覆盖 $R, \{F(f) \mid f \in R\}$ 生成了 $F(c)$ 上的一个 K -覆盖筛.

例 3.9.3

一个位格视为范畴存在有限极限. 位格的态射即是其作为有限极限景 (例 3.4.22) 的态射, 因为此时保持有限极限即是保持有限交, 保持覆盖即是保持任意并.

命题 3.9.4 (有限极限景的态射诱导层意象的几何态射)

设 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$ 是有限极限景. 那么有限极限景的态射 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是景的态射 (定义 3.9.1); 具体地, F 诱导的预层范畴间的函子 $F^*: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 限制为函子 $\text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$, 进而给出意象间的几何态射 $F: \text{Sh}(\mathcal{C}, J) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$.

证明. 设 X 为 \mathcal{D} 上的 K -层, 我们证明 $F^*X = X \circ (F^{\text{op}})$ 是 \mathcal{C} 上的 J -层. 设 R 为对象 $c \in \mathcal{C}$ 上的 J -覆盖筛, 且有相容族 $(s_f \in (F^*X)(c'))_{(f: c' \rightarrow c) \in R}$. 令 S 为 $\{F(f) \mid f \in R\}$ 生成的 $F(c)$ 上的筛, 由条件, S 为 K -覆盖筛. 我们要构造 S 上的一个相容族 $(t_g \in X(d))_{(g: d \rightarrow F(c)) \in S}$. 对于 $(g: d \rightarrow F(c)) \in S$, 选取 $(f: c' \rightarrow c) \in R$ 使得 g 穿过 $F(f)$ (如图);

$$\begin{array}{ccc} c' & & F(c') \xleftarrow{h} d \\ f \downarrow & \xRightarrow{F} & F(f) \downarrow \swarrow g \\ c & & F(c) \end{array}$$

定义 $t_g = X(h)(s_f)$. 需要证明该定义不依赖 f, h 的选取. 假设 $(f: c' \rightarrow c), (k: c'' \rightarrow c) \in S$ 使得 g 穿过 $F(f)$ 与 $F(k)$, 考虑下图 (注意 F 保持拉回, 故图中的方块为拉回),

$$\begin{array}{ccccc} & & & & d \\ & & & \swarrow h & \\ & F(c') & \xleftarrow{\quad} & F(c' \times_c c'') & \\ & \downarrow F(f) & & \downarrow & \swarrow \ell \\ F(c) & \xleftarrow{F(k)} & F(c'') & & \end{array}$$

这说明 $X(h)(s_f) = X(\ell)(s_k)$. 这完成了相容族 (t_g) 的构造 (注意当 $g = F(f)$ 时, $t_g = s_f$). 由 X 为 K -层, 存在唯一的元素 $t \in X(F(c))$ 使得对任意 $(g: d \rightarrow F(c)) \in S$ 有 $X(g)(t) = t_g$. 特别地对任意 $(f: c' \rightarrow c) \in R$, 有 $X(F(f))(t) = s_f$. 这证明了 F^*X 是 J -层. 于是有良定义的函子 $F^*: \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$. 由层的 (余) 极限逐点计算, 知 F^* 保持有限极限和任意余极限, 故构成意象间的几何态射 $F: \text{Sh}(\mathcal{C}, J) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$. \square

一个自然的问题是意象间的几何态射何时来自给定的景之间的态射. 一般而言, 给定两个景 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$, 我们明显不应该希望所有几何态射 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$ 都来自于景的态射 $(\mathcal{C}, J) \rightarrow (\mathcal{D}, K)$; 正如两个线性空间之间不是所有线性映射都来自于给定的基之间的映射. 但也有一些特例 (例 3.9.6).

命题 3.9.5

定义 3.9.2 与定义 3.9.1 对于次典范景是一致的. 具体地, 设 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$ 是有限极限景, 且 (\mathcal{D}, K) 是次典范的 (定义 3.4.27). 对于 Grothendieck 意象的几何态射 $f: \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$, 假设存在函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 使得下图交换,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} \\ \downarrow \mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)} & & \downarrow \mathfrak{y}_{(\mathcal{D}, K)} \\ \text{Sh}(\mathcal{C}, J) & \xrightarrow{f^*} & \text{Sh}(\mathcal{D}, K) \end{array}$$

那么 F 为有限极限景的态射.

证明. 由于 f^* 和 $\mathfrak{y}_{(\mathcal{C}, J)}$ 保持有限极限, 且 $\mathfrak{y}_{(\mathcal{D}, K)}$ 为全忠实函子, 故 F 保持有限极限. 又由于 f^* 保持余极限以及命题 3.5.8, 知 F 保持覆盖. \square

注意, 命题 3.9.5 中的次典范性对证明 F 的性质是关键; 我们不能期待定义 3.9.2 与定义 3.9.1 对于任何有限极限景都等价. 例如, 若一个景的任何对象都被空族覆盖, 则该景上的层范畴等价于终范畴 1, 故无法对函子 F 提出任何要求.

例 3.9.6 (位象间的几何态射)

由命题 3.9.4, 位象 X, Y 之间的态射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导层意象之间的态射 $f: \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sh}(Y)$. 位象反映的性质 (命题 3.6.17) 表明任意几何态射 $\text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sh}(Y)$ 都来自某个位象态射 $X \rightarrow Y$; 这也可由命题 3.9.5 说明.

例 3.9.7 (平展景之间的态射)

设 $f: X \rightarrow Y$ 为概形映射, 则拉回 $f^*: \text{Sch}_{Y, \text{ét}} \rightarrow \text{Sch}_{X, \text{ét}}$ 是平展景 (例 3.4.26) 之间的态射, 从而给出平展意象之间的几何态射 $\text{Sh}(\text{Sch}_{X, \text{ét}}) \rightarrow \text{Sh}(\text{Sch}_{Y, \text{ét}})$.

下面我们不再假设景具有有限极限.

预层意象的点

设 \mathcal{C} 为小范畴, 则预层意象 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的点即伴随

$$\text{Set} \begin{array}{c} \xleftarrow{L} \\ \perp \\ \xrightarrow{R} \end{array} \widehat{\mathcal{C}},$$

其中 L 保持有限极限. 由命题 A.5.5, $L \circ \mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 是 Set -值平坦函子. 这说明了如下结论.

命题 3.9.8 (预层意象的点)

设 \mathcal{C} 为小范畴, 则预层意象 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的点等同于 \mathbf{Set} -值平坦函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 即

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}\mathrm{opos}}(\mathbf{Set}, \widehat{\mathcal{C}}) \simeq \mathrm{Flat}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}).$$

对偶地, $\mathbf{Set}^{\mathcal{C}}$ 的点等同于 \mathbf{Set} -值平坦函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 等同于 \mathcal{C} 的 ind-对象 (定义 A.5.4).

例 3.9.9 (范畴的对象作为预层意象的点)

范畴 \mathcal{C} 的对象 c 可视为终范畴 1 到 \mathcal{C} 的函子; 由命题 3.8.29, 这给出了三元伴随

$$\mathbf{Set} \begin{array}{c} \xleftarrow{c_!} \\ \xleftarrow{\perp} \\ \xleftarrow{c_*} \end{array} c^* \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\perp} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} \widehat{\mathcal{C}},$$

由例 A.7.7 写出的具体公式得

- $c_!(S)(c') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c', c) \times S$, 即 $c_!(S) = \mathfrak{y}(c) \times S$;
- $c^*(X) = X(c) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), X)$;
- $c_*(S)(c') = S^{\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')}$.

它对应的 \mathbf{Set} -值平坦函子是 $c^* \circ \mathfrak{y} = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), \mathfrak{y}(-))$, 也即

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

本例中的点是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的本质点 (定义 3.10.7), 但不一定是全部的本质点. 关于意象的本质点的刻画, 见命题 3.10.8.

例 3.9.10 (“无穷远点”)

设 \mathbf{N} 为自然数的偏序集 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots$. 意象 $\mathbf{Set}^{\mathbf{N}}$ 除了有每个自然数对应的一点 (例 3.9.9) 之外, 还有一个“无穷远”的点

$$\mathbf{Set} \begin{array}{c} \xleftarrow{\mathrm{colim}} \\ \xleftarrow{\perp} \\ \xrightarrow{\text{常值}} \end{array} \mathbf{Set}^{\mathbf{N}},$$

其直像部分将集合 S 对应到常值函子 \underline{S} , 逆像部分将函子 $F: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Set}$ 对应到余极限 $\mathrm{colim} F$. 在命题 3.9.8 给出的对应中, 这个无穷远点对应的 \mathbf{Set} -值平坦函子 $\mathbf{N}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是常值函子 1 , 也是 $\mathfrak{y}(0) \rightarrow \mathfrak{y}(1) \rightarrow \mathfrak{y}(2) \rightarrow \cdots$ 的余极限, 即 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots$ 的形式余极限. 当然, 这是一个滤余极限.

层意象的点

层意象作为预层意象的子意象, 其中的点是预层意象的点, 满足一个额外的条件. 这个额外条件可以用景到 \mathbf{Set} 的连续函子 (保持覆盖的函子) 刻画.

定义 3.9.11 (景到集合范畴的连续函子)

设 (\mathcal{C}, J) 为景, 对于函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 若其米田扩张 $\widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 将任意 J -覆盖筛 (作为 \mathcal{C} 的子对象) $S \hookrightarrow \mathcal{C}$ 变为同构, 或等价地 F 将 \mathcal{C} 中的 J -覆盖筛 (视为 \mathcal{C} 中的余锥) 变为 \mathbf{Set} 中的余极限余锥, 则称之为景 (\mathcal{C}, J) 到 \mathbf{Set} 的连续函子.

命题 3.9.12 (层意象的点)

设 J 为 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑, $f: \mathbf{Set} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 为意象 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的点. 如下条件等价,

- (1) f 穿过嵌入 $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$;
- (2) f 的逆像部分 $f^*: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 将任意 J -覆盖筛 $S \hookrightarrow \mathcal{C}$ 变为同构, 也即 $f^* \circ \mathcal{Y}: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为连续函子.

证明. 这是命题 3.8.18 的特例. □

定义 3.9.13 (有足够多点的意象)

若意象 \mathcal{C} 中的同构可由茎探测, 则称其具有足够多的点 (enough points). 所谓同构可由茎探测, 是指一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 为同构当且仅当对 \mathcal{C} 的任意点 $p: \mathbf{Sh}(\mathbf{pt}) \rightarrow \mathcal{C}$, 都有 $p^*f: p^*X \rightarrow p^*Y$ 为同构.

指向预层意象的几何态射

前面 (命题 3.9.8, 3.9.12) 描述了 \mathbf{Set} 到预层意象 $\widehat{\mathcal{C}}$ 以及到层意象 $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的几何态射. 将 \mathbf{Set} 换成一般的 Grothendieck 意象, 仍有类似的结论.

命题-定义 3.9.14 (到 Grothendieck 意象的平坦函子等价于滤函子)

设 \mathcal{C} 为小范畴, \mathcal{E} 为 Grothendieck 意象; 对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, 如下条件等价.

- F 平坦, 即 F 的米田扩张 $\widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}$ 保持有限极限;
- F 是余滤函子 (cofiltering functor), 即
 - $\{F(c) \rightarrow 1\}$ 为联合满射族;

- 给定 $c, c' \in \mathcal{C}$, $\{F(d) \rightarrow F(c) \times F(c')\}_{d \rightarrow c, d \rightarrow c'}$ 为联合满射族;
- 给定 $u, v: c \rightarrow c'$, $\{F(d) \rightarrow \text{eq}(F(c) \rightrightarrows F(c'))\}_{d \rightarrow c}$ 等化 u, v 为联合满射族.

上述条件也等价于对任意有限图 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$,

$$\{F(d) \rightarrow \lim_i F(c_i)\}_{d \rightarrow c_i} \text{ 为 } X \text{ 上的锥}$$

为联合满射族.

记满足上述条件的函子的范畴为 $\text{Flat}(\mathcal{C}, \mathcal{E})$.

注 3.9.15

定义 3.9.14 中, “余滤函子”的条件是命题 A.5.5 中“元素的范畴 $\int^{\mathcal{C}} F$ 是余滤范畴”的条件的类比. 该条件等价于在 \mathcal{E} 的内语言 (参见 4.1 节) 中说 $\int^{\mathcal{C}} F$ 为余滤范畴, 即该范畴中的所有有限图上有锥. 例如,

- 条件 “ $\{F(c) \rightarrow 1\}$ 为联合满射族” 等价于在 \mathcal{E} 的内语言中说 $\int^{\mathcal{C}} F$ 至少存在一个对象 (关于存在量词在意象中的解释, 参见定义 4.2.3, 4.2.6).
- 条件 “ $\{F(d) \rightarrow F(c) \times F(c')\}_{d \rightarrow c, d \rightarrow c'}$ 为联合满射族” 等价于在 \mathcal{E} 的内语言中说 $\int^{\mathcal{C}} F$ 的任意两个对象上有锥.

命题 3.9.14 一个完整而繁琐的证明在 [20] 的 VII.8-VII.9 节. 这不过是 Set 情形的证明翻译为 \mathcal{E} 的内语言. 另外, [20] 称此处的函子 F 为滤函子 (filtering functor), 因为该书中的滤范畴是我们所谓余滤范畴.

命题 3.9.16

对小范畴 \mathcal{C} 与 Grothendieck 意象 \mathcal{E} 有自然的范畴等价

$$\text{Hom}_{\mathcal{T}_{\text{opos}}}(\mathcal{E}, \widehat{\mathcal{C}}) \simeq \text{Flat}(\mathcal{C}, \mathcal{E}).$$

指向层意象的几何态射

将定义 3.9.11 中的 Set 换为一般的 Grothendieck 意象 \mathcal{E} 就得到如下定义.

定义 3.9.17 (景到 Grothendieck 意象的连续函子)

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{E} 为 Grothendieck 意象. 对于函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, 若其米田扩张 $\widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{E}$ 将任意 J -覆盖筛 (作为 $\mathfrak{y}(c)$ 的子对象) $S \hookrightarrow \mathfrak{y}(c)$ 变为同构, 或等价地 F 将 \mathcal{C} 中的 J -覆盖筛 (作为余锥) 变为余极限余锥, 或等价地 F 将 \mathcal{C} 中的 J -覆盖族变为联合满射族, 则称 f 为连续函子.

将命题 3.9.12 中的 Set 换为一般的 Grothendieck 意象 \mathcal{E} 就得到如下命题.

命题 3.9.18 (指向层意象的几何态射)

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{E} 为 Grothendieck 意象, $f: \mathcal{E} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 为几何态射. 如下条件等价,

- (1) f 穿过嵌入 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$;
- (2) f 的逆像部分 f^* 将任意 J -覆盖筛 $S \hookrightarrow \mathfrak{y}(c)$ 变为同构, 也即 $f^* \circ \mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ 为连续函子.

结合命题 3.9.16, 我们得到指向层意象的几何态射的刻画.

命题 3.9.19

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{E} 为 Grothendieck 意象. 记 $\text{ConFlat}((\mathcal{C}, J), \mathcal{E})$ 为 \mathcal{C} 到 \mathcal{E} 的连续平坦函子的范畴, 则有如图所示的自然范畴等价.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{T}\text{opos}}(\mathcal{E}, \text{Sh}(\mathcal{C}, J)) & \xrightarrow{\cong} & \text{ConFlat}((\mathcal{C}, J), \mathcal{E}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathcal{T}\text{opos}}(\mathcal{E}, \widehat{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{\simeq} & \text{Flat}(\mathcal{C}, \mathcal{E}) \end{array}$$

如果具体写出 Grothendieck 意象 \mathcal{E} 的一个表现 $\mathcal{E} \simeq \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$, 我们就可以用景 (\mathcal{D}, K) 的信息来刻画连续平坦函子.

命题 3.9.20 (层意象取值的平坦函子)

本命题中以引号标示的文字使用层语义, 参见定义 4.2.6.

设 \mathcal{C} 为小范畴, (\mathcal{D}, K) 为景. 对于函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{D}, K)$, F 为平坦函子等价于如下条件同时成立.

- 对任意 $d \in \mathcal{D}$, “ $d \models$ 存在 $c \in \mathcal{C}$, $F(c)$ 非空”, 即存在 d 的覆盖 $\{d_i \rightarrow d\}$ 以及 $c_i \in \mathcal{C}$, 使得 $F(c_i)(d_i) \neq \emptyset$;

- 对任意 $c, c' \in \mathcal{C}$, $d \in \mathcal{D}$, $x \in F(c)(d)$, $x' \in F(c')(d)$, “ $d \models x$ 与 x' 上有锥”, 即存在 d 的覆盖 $\{g_i: d_i \rightarrow d\}_{i \in I}$, 且对每个 $i \in I$ 存在 $u_i: b_i \rightarrow c$, $u'_i: b_i \rightarrow c'$, $y_i \in F(b_i)(d_i)$, 使得 $F(u_i)(d_i)y_i = F(c)(g_i)x \in F(c)(d_i)$, $F(u'_i)(d_i)y_i = F(c')(g_i)x' \in F(c')(d_i)$;
- 对任意 $u, u': c \rightrightarrows c'$, $d \in \mathcal{D}$, $x \in F(c)(d)$ ($F(u)x = F(u')x$), “ $d \models (x \rightrightarrows F(u)x)$ 上有锥”, 即存在 d 的覆盖 $\{g_i: d_i \rightarrow d\}_{i \in I}$, 且对每个 $i \in I$ 存在 $v_i: b_i \rightarrow c$, $y_i \in F(b_i)(d_i)$, 使得 $uv = u'v$, $F(v)(d_i)y = F(c)(g_i)x \in F(c)(d_i)$.

这也等价于如下条件成立: 对 \mathcal{C} 中任意有限图, 记为 $\{c_j\}_{j \in J}$, 对任意 $d \in \mathcal{D}$, 以及任意一族相容的元素 $x_j \in F(c_j)(d)$, 存在 d 的覆盖 $\{g_i: d_i \rightarrow d\}$ 且对每个 i 存在 $\{c_j\}$ 上的锥 $u_{ij}: b_i \rightarrow c_j$, $y_i \in F(b_i)(d_i)$, 使得 $F(u_{ij})(d_i)y_i = F(c_j)(g_i)x_j \in F(c_j)(d_i)$.

对比 Set-值平坦函子的定义 (A.5.5), 上述命题不过是把同样的定义用层语义翻译到层意象.

景之间的态射

前面定义的范畴 \mathcal{C} 到 Grothendieck 意象 \mathcal{E} 的平坦函子可进一步推广为 \mathcal{C} 到景的“平坦函子”(回忆 Grothendieck 意象自身也可视为景); 为方便与其它概念的区分, 称之为覆盖平坦函子.

定义 3.9.21 (覆盖平坦函子)

设 \mathcal{C} 为小范畴, (E, J) 为景. 对于函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow E$, 若如下条件成立, 则称之为覆盖平坦函子 (covering-flat functor): 对任意有限图 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$,

定义 3.9.22 (景的态射)

[未完成:]

命题 3.9.23

设 $F: (\mathcal{C}, J) \rightarrow (\mathcal{D}, K)$ 是定义 3.9.22 中的景的态射, 那么其诱导的函子 $F^*: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 限制为函子 $\text{Sh}(\mathcal{D}, K) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$.

比较原理

定义 3.9.24 (景的稠密子范畴)

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{D} 为 \mathcal{C} 的全子范畴. 若对 \mathcal{C} 的任意对象 c , 所有由 \mathcal{D} 的对象到 c 的态射生成 c 的 J -覆盖, 则称 \mathcal{D} 为 J -稠密子范畴. 定义限制在 \mathcal{D} 上的 Grothendieck 拓扑 $J|_{\mathcal{D}}$: 令 \mathcal{D} 中的一个筛为覆盖筛当且仅当它在 \mathcal{C} 中生成的筛为覆盖筛.

命题 3.9.25

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{D} 为 \mathcal{C} 的 J -稠密子范畴, 且 \mathcal{D} 为小范畴. 那么 \mathcal{C} 上的 J -层在 \mathcal{D} 上的限制为 $J|_{\mathcal{D}}$ -层.

证明. 设 F 为 J -层, $S \in J|_{\mathcal{D}}(d)$, $s: S \rightarrow F$ 为任意态射. 记 \tilde{S} 为 S 生成的 \mathcal{C} 中的筛, \tilde{S} 的元素形如 fg , $f \in S$. 定义态射 $\tilde{S} \rightarrow F$ 将 fg 映射到 $F(g)(s_f)$. 良定性的证明如下. 假设

$$f_1 g_1 = f_2 g_2: c \rightarrow d, \quad \text{其中 } f_1, f_2 \in S,$$

设 R 是由 \mathcal{D} 的对象到 c 的态射生成的覆盖筛, 对任意 $h \in R$, $F(h)F(g_1)(s_{f_1}) = s_{f_1 g_1 h} = s_{f_2 g_2 h} = F(h)F(g_2)(s_{f_2})$. 由于 F 为 J -层, 这说明 $F(g_1)(s_{f_1}) = F(g_2)(s_{f_2})$, 良定性得证. 由此, 态射 $S \rightarrow F$ 唯一地延拓为 $\tilde{S} \rightarrow F$. 又由 F 为 J -层, 它唯一地延拓为 $\mathfrak{y}(d) \rightarrow F$. 这证明了 F 为 $J|_{\mathcal{D}}$ -层. □

命题 3.9.26 (比较原理)

设 (\mathcal{C}, J) 为景, \mathcal{D} 为 \mathcal{C} 的 J -稠密子范畴, 且 \mathcal{D} 为小范畴. 那么 \mathcal{C} 上的 J -层限制到 \mathcal{D} 上给出了范畴等价

$$\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sh}(\mathcal{D}, J|_{\mathcal{D}}).$$

证明. 考虑沿嵌入 $i: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 的右 Kan 扩张 (例 A.7.7)

$$i_*: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}, \quad i_* F(c) = \lim_{d \rightarrow c} F(d).$$

(其中极限的指标范畴由 \mathcal{D} 的对象到 c 的所有态射构成.) 我们断言 i_* 给出了限制函子 $\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \rightarrow \mathrm{Sh}(\mathcal{D}, J|_{\mathcal{D}})$ 的逆.

- 设 F 是 \mathcal{D} 上的 $J|_{\mathcal{D}}$ -层, 那么 $i_* F$ 的限制是 F : 对 \mathcal{D} 的对象 d , $i_* F(d) = \lim_{d' \rightarrow d} F(d') = F(d)$. 我们还需要说明 $i_* F$ 是 \mathcal{C} 上的 J -层. 对任意 $(S \rightarrow \mathfrak{y}(c)) \in J(c)$, 由伴随 $i^* \dashv i_*$, 态射 $S \rightarrow i_* F$ 等同于 $i^* S \rightarrow F$; $i^* S$ 是 S 中从 \mathcal{D} 出发的态射的集合. 由 \mathcal{D} 是 J -稠密子范畴,

- 设 [未完成:]

□

例 3.9.27 (拓扑空间的基)

设 X 为拓扑空间 (或位象), 那么稠密子范畴 $\mathcal{B} \hookrightarrow \text{Open}(X)$ 等同于 X 的拓扑基, 满足 $\text{Open}(X)$ 的每个对象均为 \mathcal{B} 的某些对象的并. 此时比较原理指出 $\text{Sh}(X) \simeq \text{Sh}(\mathcal{B})$, 即 X 上的层完全由其在 \mathcal{B} 上的取值决定.

例 3.9.28 (流形范畴)

考虑流形范畴 Man 带有“好覆盖”生成的覆盖结构, 则 CartSp (例 3.4.23) 为其稠密子范畴: 任何流形 M 都具有由一族坐标卡 $\mathbb{R}^n \rightarrow M$ 构成的好覆盖.

命题 3.9.26 的证明中使用的右 Kan 扩张

$$i_* F(c) = \lim_{d \rightarrow c} F(d)$$

在本例中具有清晰的直观. 考虑“微分形式的模空间” $\Omega^k \in \text{Sh}(\text{CartSp})$, 我们希望将其延拓为 Man 上的层, 从而定义任何流形上的微分形式. 要给出流形 M 上的一个微分形式, 只须对每个坐标卡 $\mathbb{R}^n \rightarrow M$ 给出 \mathbb{R}^n 上的一个微分形式, 使得任何两个坐标卡相交处所给的微分形式相容. 换言之, 我们定义

$$\Omega^k(M) = \lim_{\mathbb{R}^n \rightarrow M} \Omega^k(\mathbb{R}^n).$$

景之间的余态射

景之间的态射指向逆像的方向; 还有一个某种程度上对偶的概念, 称为景之间的余态射, 指向直像的方向.

定义 3.9.29 (景的余态射)

设 $(\mathcal{C}, J), (\mathcal{D}, K)$ 为景. 定义景的余态射 $F: (\mathcal{C}, J) \leftarrow (\mathcal{D}, K)$ 是一个函子 $F: \mathcal{C} \leftarrow \mathcal{D}$, 满足如下的覆盖提升性质:

- 对任意 $d \in \mathcal{D}$, 记 $c = F(d)$; 对任意 $S \in J(c)$ 存在 $R \in K(d)$ 使得 $F(R) \subset S$.

命题 3.9.30 (景的余态射给出意象态射)

对于景的余态射 $F: (\mathcal{C}, J) \leftarrow (\mathcal{D}, K)$, 存在意象之间的几何态射 $f: \mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \leftarrow \mathrm{Sh}(\mathcal{D}, K)$,

- 其直像部分 $f_*: \mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \leftarrow \mathrm{Sh}(\mathcal{D}, K)$ 为

$$f_*(X) = \lim_{\mathcal{J}(\mathcal{C}, J)} \mathcal{J}(F(d))$$

3.10 意象的几何性质

意象及其态射的一些性质得名于拓扑空间及其态射的性质.

平展性

定义 3.10.1 (平展态射)

定义意象之间的平展几何态射 (étale geometric morphism) 为等价于俯意象 $\mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}$ 的几何态射 (见注 3.1.14).

连通性

[未完成: 顺序? (放在本质几何态射后面)]

命题 3.10.2 (连通位象的等价定义)

对于位象 X , 如下条件等价:

- (1) X 连通 (定义 2.2.37);
- (2) $1 \in \mathrm{Sh}(X)$ 不能写成非平凡的无交并;
- (3) 常值层函子 $L = X^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathrm{Sh}(X)$ 全忠实;
- (4) 整体截面函子 $\Gamma = X_*: \mathrm{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持余积.

证明. 回忆 $\Gamma = X_* = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(X)}(1, -)$ (命题 3.8.3).

- (1) \Leftrightarrow (2) 是平凡的, 因为 $\mathrm{Sh}(X)$ 的子终对象一一对应于 X 的开子集;
- (2) \Rightarrow (4). $\Gamma(\coprod_{i \in I} A_i) = \mathrm{Hom}(1, \coprod_{i \in I} A_i) \simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}(1, A_i)$;
- (4) \Rightarrow (3). 由于 Γ 保持余积, $\Gamma L: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 也保持余积, 这说明 $\Gamma L = \mathrm{id}_{\mathbf{Set}}$.

- (3) \Rightarrow (2). 假设在 $\text{Sh}(X)$ 中有 $1 \simeq \coprod_{i \in I} U_i$, 且 $L = X^*$ 全忠实. 考虑所有态射 $U_i \rightarrow 1$ 之和

$$f: 1 \simeq \coprod_{i \in I} U_i \rightarrow \coprod_{i \in I} 1 \simeq X^* I.$$

因为 X^* 全忠实, 存在 $i_0: 1 \rightarrow I$ 使得 $f = X^*(i_0)$, 这说明 $U_{i_0} \simeq 1$.

□

由此, 我们作出如下定义.

定义 3.10.3 (意象的连通性)

一个 Grothendieck 意象 \mathcal{C} 称为连通的, 是指其到 $\text{Set} = \text{Sh}(\text{pt})$ 的几何态射 (定义 3.8.3) 的逆像部分为全忠实函子.

命题 3.10.4 (局部连通位象的等价定义)

对于位象 X , 如下条件等价:

- (1) X 局部连通 (定义 2.2.38);
- (2) 几何态射 $\text{Sh}(X) \rightarrow \text{Set}$ 本质 (定义 3.10.7), 也即 $X^*: \text{Set} \rightarrow \text{Sh}(X)$ 有左伴随 $X_!$;
- (3) $X^*: \text{Set} \rightarrow \text{Sh}(X)$ 保持指数对象.

证明.

- (1) \Rightarrow (2). 定义 $X_!: \text{Et}(X) \rightarrow \text{Set}$ 将平展空间 $E \rightarrow X$ 对应到 E 的连通分支的集合.

•

□

开几何态射

定义 3.10.5 (开几何态射)

称几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为开几何态射, 是指 f^* 为 Heyting 函子 (定义 B.2.8); 由于 f^* 总是凝聚函子 (定义 B.2.7), 开几何态射的条件也等价于 f^* 保持所有全称量词 \forall_g .

命题 3.10.6 (与位象开映射的关系)

对于位象态射 $f: X \rightarrow Y$, f 为开映射 (定义 2.2.28) 当且仅当 $f: \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sh}(Y)$ 为开几何态射.

证明. [未完成:]

□

本质几何态射**定义 3.10.7** (本质几何态射)

对于 Grothendieck 意象的几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 若 f^* 有左伴随 $f_!$ (也即有三元伴随 $f_! \dashv f^* \dashv f_*$), 则称之为本质几何态射 (essential geometric morphism). 本质几何态射 $\text{Set} \rightarrow \mathcal{C}$ 又称为 \mathcal{C} 的本质点.

命题 3.10.8 (意象本质点的刻画)

在范畴 \mathcal{C} 中, 若对象 X 满足 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ 保持余极限, 则称 X 为微小对象 (tiny object, 又称紧对象, compact object). (其直观可参见注 6.4.16.) 那么一个 Grothendieck 意象 \mathcal{C} 的本质点等价于 \mathcal{C} 的微小对象.

证明. 设 $f: \text{Set} \rightarrow \mathcal{C}$ 为本质点. 由于 $f_! \dashv f^*$, 可知 $f_!$ 保持余极限, 故 $f_!$ 完全由 $f_!(1)$ 决定. 令 $F = f_!(1)$, 则有

$$f^* \simeq \text{Hom}_{\text{Set}}(1, f^* -) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f_! 1, -) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, -).$$

又 f^* 保持余极限, 故 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, -)$ 保持余极限, 即 F 为微小对象. 反之, 设 F 为微小对象, 则 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, -)$ 保持极限和余极限. 由伴随函子定理, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, -)$ 具有左右伴随, 故构成本质几何态射. □

例 3.10.9 (俯范畴之间的基变换几何态射)

对于 Grothendieck 意象 \mathcal{C} , 其中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导的几何态射 $f: \mathcal{C}/X \rightarrow \mathcal{C}/Y$ 是本质几何态射 (命题 1.1.41).

例 3.10.10 (G -集范畴之间的几何态射)

群同态 $\phi: G \rightarrow H$ 诱导的几何态射 $\phi: G\text{Set} \rightarrow H\text{Set}$ 是本质的 (命题 3.8.25).

定义 3.10.11 (局部连通意象)

对于 Grothendieck 意象 \mathcal{C} , 若整体截面几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是本质的, 则称之为局部连通意象.

对于局部连通意象 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, $f_!$ 的直观是“连通分支的集合” Π_0 (见 ?? 节).

紧合几何态射

在拓扑空间范畴中, 称映射 $f: X \rightarrow Y$ 为紧合映射 (proper map) 是指 Y 的任何紧子集的原像是紧集. 紧合映射是紧性的推广: 一个空间 X 紧等价于映射 $X \rightarrow 1$ 是紧合映射.

定义 3.10.12 (紧合几何态射)**3.11 Giraud 定理**

Giraud¹² 找到了 Grothendieck 意象在全体范畴之中的刻画, 也即 Grothendieck 意象的一种公理化定义.

定义 3.11.1 (Giraud 公理)

称范畴 \mathcal{C} 满足 *Giraud 公理*, 是指

- \mathcal{C} 为可表现范畴 (定义 A.6.14);
- \mathcal{C} 具有万有余极限 (见注 1.1.42);
- \mathcal{C} 中的和无交 (见命题 1.3.61);
- \mathcal{C} 中的满射均为有效满射 (见命题 1.3.17).

命题 3.11.2

范畴 \mathcal{C} 为 Grothendieck 意象当且仅当它满足 Giraud 公理.

证明. 命题 A.6.24 证明了 Grothendieck 意象是可表现范畴. 结合第一章中对于意象的范畴论性质的讨论, 我们得到 Grothendieck 意象满足 Giraud 公理.

另一方面, 假设范畴 \mathcal{C} 满足 Giraud 公理, 下面分三步来证明 \mathcal{C} 是 Grothendieck 意象.

¹²Jean Giraud (1936–2007), 法国数学家, Grothendieck 的学生.

第一步, 景的构造 由可表现范畴的理论 (命题 A.6.23) 我们知道 \mathcal{C} 是一个预层范畴 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的自反局部化

$$\mathcal{C} \xleftarrow[\underset{y}{\xrightarrow{\perp}}]{L} \widehat{\mathcal{D}},$$

其中 $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ 是一族 λ -可表现对象构成的全子范畴, λ 为正则基数,

$$y: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{D}}, \quad c \mapsto \text{Hom}(-, c)|_{\mathcal{D}^{\text{op}}},$$

$$L: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{C}, \quad X \mapsto \text{colim}_{\mathfrak{K}(d) \rightarrow X, d \in \mathcal{D}} d.$$

考虑 \mathcal{D} 上的 Grothendieck 拓扑 J ,

$$J(d) = \left\{ \{f_i: d_i \rightarrow d\} \mid \coprod_i d_i \rightarrow d \text{ 为满射} \right\},$$

我们验证 J 确实是 Grothendieck 拓扑.

- (极大筛) 对象 d 上的极大筛的确属于 $J(d)$, 因为 $\text{id}: d \rightarrow d$ 为满射;
- (拉回稳定性) 对于 $\{f_i: d_i \rightarrow d\} \in J(d)$ 与任意态射 $g: e \rightarrow d$, 由 Giraud 公理中的“万有余极限”条款, 拉回保持余积和满射, 故 $\coprod_i e \times_d d_i \rightarrow e$ 为满射.
- (传递性) 设 $\{f_i: d_i \rightarrow d\} \in J(d)$, $R = \{g_j: e_j \rightarrow d\}$ 是 d 上的另一个筛, 满足对任意 i , $f_i^* R \in J(d_i)$, 即 $\coprod_j e_j \times_d d_i \rightarrow d_i$ 为满射. 那么下图中的复合为满射, 故 $R \in J(d)$.

$$\begin{array}{ccc} \coprod_i \coprod_j e_j \times_d d_i & \twoheadrightarrow & \coprod_i d_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod_j e_j & \twoheadrightarrow & d \end{array}$$

第二步, 层条件的验证 现在验证 $y: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{D}}$ 的像落在 $\text{Sh}(\mathcal{D}, J)$ 中, 即对于 $c \in \mathcal{C}$, $\text{Hom}(-, c)|_{\mathcal{D}^{\text{op}}}$ 是 \mathcal{D} 上的 J -层. 对任意覆盖 $\{f_i: d_i \rightarrow d\} \in J(d)$, 由 Giraud 公理, $\coprod_i d_i \rightarrow d$ 为有效满射, 即下图为余等化子.

$$\left(\coprod_i d_i \right) \times_d \left(\coprod_i d_i \right) \rightrightarrows \coprod_i d_i \rightarrow d$$

又由拉回保持余积,

$$\left(\coprod_i d_i \right) \times_d \left(\coprod_i d_i \right) \simeq \coprod_i (d_i \times_d (\coprod_j d_j)) \simeq \coprod_i \coprod_j (d_i \times_d d_j),$$

故下图为余等化子.

$$\coprod_i \coprod_j (d_i \times_d d_j) \rightrightarrows \coprod_i d_i \rightarrow d$$

这就是说, 给定一族态射 $x_i: d_i \rightarrow c$ 使得 x_i, x_j 在 $d_i \times_d d_j$ 上相容, 则存在唯一的 $x: d \rightarrow c$ 使得 $x_i = x f_i$. 因此 $\text{Hom}(-, c)|_{\mathcal{D}^{\text{op}}}$ 是 \mathcal{D} 上的 J -层. (特别地, 这说明 J 是次典范 Grothendieck 拓扑, 见定义 3.4.27.)

第三步, 范畴等价的证明 上面证明了 y 穿过 $i: \text{Sh}(\mathcal{D}, J) \rightarrow \widehat{\mathcal{D}}$; 那么由自反子范畴之间的包含关系的性质 (命题 A.3.5), 存在如下的伴随 $\tilde{L} \dashv \tilde{y}$, 其中 $\tilde{L} = L|_{\text{Sh}(\mathcal{D}, J)}$, $\tilde{y} = ay, y \simeq i\tilde{y}$.

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Sh}(\mathcal{D}, J) & \\
 \tilde{L} \swarrow & & \searrow a \\
 \mathcal{C} & & \widehat{\mathcal{D}} \\
 \tilde{y} \swarrow & L & \searrow i \\
 & \mathcal{D} & \\
 \downarrow y & & \\
 & \mathcal{D} &
 \end{array}$$

注意到自反子范畴中的余极限是大范畴中余极限的反映 (命题 A.3.6), \tilde{y} 是两个余完备的自反子范畴之间的含入, 故 \tilde{y} 保持余极限. 又注意到对于 $d \in \mathcal{D}$, 有 $L(\mathfrak{y}(d)) \simeq d$ (在命题 A.4.9 中取 F 为嵌入函子). 因此 $\tilde{y}\tilde{L}(\mathfrak{y}(d)) \simeq \mathfrak{y}(d)$. 而 $\tilde{y}\tilde{L}$ 保持余极限, $\text{Sh}(\mathcal{D}, J)$ 的对象可写为可表函子 $\mathfrak{y}(d)$ 的余极限, 故 $\tilde{y}\tilde{L} \simeq \text{id}_{\text{Sh}(\mathcal{D}, J)}$. 这证明了 $\mathcal{C} \simeq \text{Sh}(\mathcal{D}, J)$. \square

Giraud 定理可以在一些不容易构造景的情形证明一个范畴是 Grothendieck 意象, 例如下面介绍的等变层范畴.

3.12 等变层与拓扑群胚

本节中的“拓扑空间”可以是通常的拓扑空间, 也可以是位象, 因为我们不会使用空间的“点”的概念.

定义 3.12.1 (等变层)

设 X 为拓扑空间, 带有拓扑群 G 的左作用 $\mu: G \times X \rightarrow X$. 定义 X 上的 G -空间为 X 上带有 G -左作用的空间 $p: E \rightarrow X$, 且 p 保持 G -左作用; G -空间之间的态射为保持 G -左作用的态射. 定义 X 上的 G -等变层 (G -equivariant sheaf) 为平展的 G -空间 $p: E \rightarrow X$, 即 p 为局部同胚. 记 X 上的 G -等变层在 G -空间范畴中构成的全子范畴为 $\text{Sh}_G(X)$.

命题 3.12.2

对任意带有拓扑群 G 左作用的空间 X , $\text{Sh}_G(X)$ 是意象.

证明.

- $\text{Sh}_G(X)$ 由所有形如 $\bigcup_{g \in G} gU$ ($U \in \text{Open}(X)$) 的对象生成.
- $\text{Sh}_G(X)$ 中存在有限极限和任意余极限, 且等同于 $\text{Sh}(X)$ 中的有限极限和余极限. 这说明 $\text{Sh}_G(X)$ 与 $\text{Sh}(X)$ 同样满足 Giraud 定理的后三个条件.

由以上的事实及 Giraud 定理, $\text{Sh}_G(X)$ 为 Grothendieck 意象. \square

等变层是拓扑群胚上的层的特例.

定义 3.12.3 (拓扑群胚)

拓扑群胚是群胚理论在 \mathbf{Top} 中的模型. 具体地, 一个拓扑群胚包含如下资料,

- 两个拓扑空间 G_1, G_0 , 分别表示态射的空间与对象的空间;
- 连续映射 $s, t: G_1 \rightrightarrows G_0$, 分别表示态射的起点与终点;
- $m: G_1 \times_{G_0} G_1 \rightarrow G_1$ (其中 $G_1 \times_{G_0} G_1$ 是 s 与 t 的拉回), 表示态射的复合;
- $i: G_1 \rightarrow G_1$, 表示态射的逆;
- $e: G_0 \rightarrow G_1$, 表示恒等态射;

满足 $tm = t\pi_1$, $sm = s\pi_2$, $si = t$, $ti = s$, $se = te = \text{id}_{G_0}$, 以及结合律, 单位律.

$$\begin{array}{ccc}
 G_1 & \xrightarrow{(e, \text{id})} & G_1 \times_{G_0} G_1 & \xleftarrow{(\text{id}, e)} & G_1 \\
 & \searrow \text{id} & \downarrow m & \swarrow \text{id} & \\
 & & G_1 & &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 G_1 \times_{G_0} G_1 \times_{G_0} G_1 & \xrightarrow{m \times \text{id}} & G_1 \times_{G_0} G_1 \\
 \text{id} \times m \downarrow & & \downarrow m \\
 G_1 \times_{G_0} G_1 & \xrightarrow{m} & G_1 \times_{G_0} G_1
 \end{array}$$

记该拓扑群胚为 $G_1 \rightrightarrows G_0$.

例 3.12.4 (常见的拓扑群胚)

- 当 G_0 为一个点时, 拓扑群胚 $G_1 \rightrightarrows G_0$ 等同于拓扑群 G_1 , 即 “一个对象的群胚”.
- 一个拓扑空间 X 可视为平凡的拓扑群胚 $\text{id}, \text{id}: X \rightrightarrows X$, 即 “仅有恒等态射的群胚”.
- 由拓扑空间 X 还可构造另一个拓扑群胚 $\pi_1, \pi_2: X \times X \rightrightarrows X$, 即 “每两个对象之间有唯一的同构的群胚”.
- 对于拓扑群 G 的主丛 $p: P \rightarrow X$, 有 *Atiyah* 群胚 $p\pi_1, p\pi_2: (P \times P)/G \rightrightarrows X$. 它可理解为 X 各个点上的纤维以及纤维之间 (作为 G -右作用) 的同构构成的群胚.
- 设空间 X 带有拓扑群 G 的左作用 $\mu: G \times X \rightarrow X$, 则 $(\pi_2, \mu: G \times X \rightrightarrows X)$ 为拓扑群胚, 称为作用群胚 (action groupoid).

定义 3.12.5 (拓扑群胚上的层)

设 $\mathcal{G} = (G_1 \rightrightarrows G_0)$ 为拓扑群胚. 对于 G_0 上的空间 $p: E \rightarrow G_0$, 定义其上的 \mathcal{G} -左作用为连续映射 $\rho: G_1 \times_{G_0} E \rightarrow E$ (其中 $G_1 \times_{G_0} E$ 为 s 与 p 的拉回), 满足 $p\rho = t\pi_1$, 以及如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{(e, \text{id})} & G_1 \times_{G_0} E \\ & \searrow \text{id} & \downarrow \rho \\ & & E \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G_1 \times_{G_0} G_1 \times_{G_0} E & \xrightarrow{\text{id}_{G_1} \times \rho} & G_1 \times_{G_0} E \\ m \times \text{id}_E \downarrow & & \downarrow \rho \\ G_1 \times_{G_0} E & \xrightarrow{\rho} & E \end{array}$$

定义 \mathcal{G} 上的层为 G_0 上带有 \mathcal{G} -左作用的平展空间. \mathcal{G} 上的层以及保持 \mathcal{G} -左作用的态射构成范畴 $\text{Sh}(\mathcal{G})$. 这个范畴是一个意象, 也称为 \mathcal{G} 的分类意象 (classifying topos).

例 3.12.6 (常见拓扑群胚上的层)

- G_0 为一点, G_1 为普通的群 (视为离散拓扑群) 的情形, \mathcal{G} 上的层即为带有 G_1 -左作用的集合.
- G_0 为一点, G_1 为拓扑群的情形, \mathcal{G} 上的层即为带有连续 G_1 -左作用的离散空间.
- 拓扑空间 X 作为平凡的拓扑群胚, 其上的层即为 X 上通常的层.
- 对于非空空间 X , 拓扑群胚 $X \times X \rightrightarrows X$ 上的层范畴等价于 \mathbf{Set} , 即一点上的层范畴.
- 对于拓扑群 G 在空间 X 上作用的作用群胚, 其上的层即为等变层 (定义 3.12.1).

例 3.12.6 表明拓扑群胚上的层意象是许多概念的共同推广. 而下面的命题说明了拓扑群胚究竟推广到何种地步.

命题 3.12.7

任何一个有足够多点的意象 (定义 3.9.13) 都等价于某个拓扑群胚上的层意象.

证明见 [9].

3.13 意象的余极限

本小节描述意象的 2-范畴 \mathcal{Topos} 中的余极限. 意象的 2-范畴可视为范畴的 2-范畴 \mathcal{Cat} 的子范畴: 有 2-函子 $\mathcal{Topos} \rightarrow \mathcal{Cat}$ 将几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 映射到其直像部分 $f_*: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. 值得注意的是, \mathcal{Topos} 的对偶 2-范畴 $\mathcal{Topos}^{\text{op}}$ 也可视为 \mathcal{Cat} 的子范畴, 将几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 映射到其逆像部分 $f^*: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$. 在代数-几何对偶的观点下 (见本章开头的注), 一个意象是一个假想的空间上的集合值连续函数的范畴, 故意象作为“代数”的身份是由后一种嵌入 $\mathcal{Topos}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{Cat}$ 体现的; \mathcal{Topos} 中的余极限等同于 $\mathcal{Topos}^{\text{op}}$ 中的极限——而这个极限可以在 \mathcal{Cat} 中计算.

命题 3.13.1 (意象的余积)

设 $\{\mathcal{E}_i\}_{i \in I}$ 是一族意象, 则 $\prod_{i \in I} \mathcal{E}_i$ 是 $\{\mathcal{E}_i\}_{i \in I}$ 在 $\mathcal{Topos}^{\text{op}}$ 中的积, 也即 \mathcal{Topos} 中的余积.

证明.

□

第 4 章 意象的内语言

A mathematical statement is just a story you tell about some devices. Some of those stories are clever, some are stupid; some of those stories are true, some others are false. Doing mathematics is telling clever stories which are true.¹

Francis Borceux, [7]

4.1 Mitchell–Bénabou 语言	170
使用 Mitchell–Bénabou 语言表达意象中的对象和态射	173
4.2 Kripke–Joyal 语义	176
层语义	178
4.3 不同意象的内语言的联系	180
模态与层化	182

意象的用处在于许多数学可以在一个意象的内部进行. 相比于画交换图, 一种更优雅的做法是使用意象的内语言 (internal language) 进行推理. 本章介绍这种语言, 以及它在各个数学分支中的应用.

注 4.0.1
建议读者在阅读本章之前先阅读附录 B.

¹一句数学陈述不过是你对某些东西讲的一个故事. 这些故事或妙, 或蠢, 或真, 或假. 做数学就是要讲出又妙又真的故事.

169

4.1 Mitchell–Bénabou 语言

本节描述一种重要的语言, 称作 *Mitchell–Bénabou* 语言; 它是由给定的意象 \mathcal{C} 定义出的一种一阶或高阶语言, 其特点是利用子对象分类器 Ω , 将公式一视同仁地解释为 Ω 类型的项. 使用这种语言, 可将意象中的对象在语法上当作集合一样处理.

定义 4.1.1 (类型)

Mitchell–Bénabou 语言中的类型是 \mathcal{C} 的对象.

定义 4.1.2 (函数符号, 关系符号)

Mitchell–Bénabou 语言中的函数符号 $f: A_1 \cdots A_n \rightarrow B$ 是 \mathcal{C} 中的态射

$$f: A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow B.$$

特别地, 类型 X 的常量 (零元函数) 是态射 $1 \rightarrow X$, 也即对象 X 的整体元素.

Mitchell–Bénabou 语言中的关系符号 $R \hookrightarrow A_1 \cdots A_n$ 是 \mathcal{C} 中的态射

$$R: A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow \Omega,$$

也即 $A_1 \times \cdots \times A_n$ 的子对象, 其直观为“满足关系 R 的元素构成的子集”. 特别地, 原子命题 (零元关系) 是态射 $1 \rightarrow \Omega$, 也即真值.

以上两个定义给出了一个符号表 Σ , 自然, \mathcal{C} 中具有典范的 Σ -结构. 由定义 B.2.3, B.3.6, 可以归纳地得到所有项和公式的解释 (interpretation). 注意在附录 B 中公式被解释为子对象, 而在意象中它等同于类型 Ω 的项.

例 4.1.3 (变量, 一般元素)

设 x 是类型 X 的一个变量. 由定义 B.2.3, 其解释为 $\text{id}: X \rightarrow X$.

变量 x 可视为类型 X 的一般元素 (generic element). 其中“元素”是指广义元素, 即指向 X 的态射; “一般”是指如下的泛性质: 假若我们证明了含变量 x 的公式 $\phi(x)$, 那么对 X 的任意具体的项 (广义元素) $x_0: U \rightarrow X$, 都有 $\phi(x_0)$ 成立. 这是由于 id_X 是所有指向 X 的态射中的终对象.

例 4.1.4 (函数的取值)

使用取值映射 $\text{ev}: Y^X \times X \rightarrow Y$ (定义 1.1.6), 可将 Y^X 类型的项 (内语言中的“函

数”) $\theta: V \rightarrow Y^X$ 作用于 X 类型的项 $\sigma: U \rightarrow X$, 得到 Y 类型的项

$$\theta(\sigma): V \times U \xrightarrow{(\theta, \sigma)} Y^X \times X \xrightarrow{\text{ev}} Y.$$

例 4.1.5 (成员关系)

考虑成员关系 (例 1.1.24) $\in_X: \Omega^X \times X \rightarrow \Omega$, 可对 $PX = \Omega^X$ 类型的项 (内语言中的“子集”) $\eta: V \rightarrow \Omega^X$ 与 X 类型的项 $\sigma: U \rightarrow X$ 定义 Ω 类型的项

$$(\sigma \in \eta): V \times U \xrightarrow{(\eta, \sigma)} \Omega^X \times X \xrightarrow{\in_X} \Omega.$$

例 4.1.6 (等式)

对于类型 X 的变量 x_1, x_2 , 等式 $x_1 = x_2$ 被解释为 $\chi_\Delta: X \times X \rightarrow \Omega$, 即对角线 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 的特征函数 (例 1.1.20).

例 4.1.7 (存在量词与任意量词)

设 $\phi(x, y)$ 是含两个变量 $x \in X, y \in Y$ 的公式. 考虑投影 $\pi: X \times Y \rightarrow Y$ 诱导的子对象偏序集之间的三元伴随

$$\text{Sub}(X \times Y) \begin{array}{c} \xleftarrow{-\exists_\pi} \\ \xleftarrow{\perp} \pi^* \xleftarrow{-} \text{Sub}(Y) \\ \xleftarrow{-\forall_\pi} \end{array}$$

(命题 1.3.6, 1.3.20) 公式 $\exists x \in X \phi(x, y), \forall x \in X \phi(x, y)$ 分别解释为子对象 $\{(x, y) \in X \times Y \mid \phi(x, y)\}$ 在 \exists_π 与 \forall_π 下的像 (的特征函数). (在合适的语境下, 记号中的“ $\in X$ ”可省略.)

注意到 $\text{Hom}(-, \Omega^X) \simeq \text{Sub}(X \times -)$, 由米田引理, 子对象偏序集之间的三元伴随给出三个态射

$$\Omega^X \begin{array}{c} \xleftarrow{-\exists_X} \\ \xleftarrow{-} X^* \xleftarrow{-} \Omega \\ \xleftarrow{-\forall_X} \end{array}$$

它们是所谓“内蕴伴随”.

注 4.1.8

注意我们在两处使用了“属于”符号 \in : 一处是含全称量词或存在量词的公式 $\forall x \in X \phi(x)$ 或 $\exists x \in X \phi(x)$, 一处是成员关系 $x \in S$. 这并不会引起歧义, 因为对于子对

象 $S \hookrightarrow X$ 有

$$\forall x \in S \phi(x) \Leftrightarrow \forall x \in X (x \in S \Rightarrow \phi(x))$$

$$\exists x \in S \phi(x) \Leftrightarrow \exists x \in X (x \in S \wedge \phi(x)).$$

甚至当 S 是类型 PX 的一般的项时, 我们也可简记 $\forall x \in X (x \in S \Rightarrow \phi(x))$ 为 $\forall x \in S \phi(x)$, 简记 $\exists x \in X (x \in S \wedge \phi(x))$ 为 $\exists x \in S \phi(x)$.

例 4.1.9 (公式确定的子对象)

对公式 $\phi(x)$, 设其解释为 $\phi(x): X \rightarrow \Omega$, 那么 $\{x \in X \mid \phi(x)\}$ 的解释是以 $\phi(x)$ 为特征函数的子对象. 我们称之为公式 $\phi(x)$ 的外延 (extension)².

更一般地, ϕ 不仅可以是 X 上的公式, 而且可以是 Ω^X 的项 (即内语言中的“ X 上的公式”); 此时我们沿用记号 $\{x \in X \mid \phi(x)\}$ 表示 ϕ 自身, 视为 PX 的项.

任何子对象 $S \hookrightarrow X$ 都至少有一个公式与之对应, 即公式 $x \in S$, 因为 \in 的定义是 id_{Ω^X} 对应的态射 $\Omega^X \times X \rightarrow \Omega$.

命题-定义 4.1.10 (恒成立)

对公式 $\phi(x)$, 如下条件等价:

- (1) $\{x \in X \mid \phi(x)\} = X$;
- (2) $\phi(x): X \rightarrow \Omega$ 穿过 $\top: 1 \rightarrow \Omega$;
- (3) 公式 $\forall x \in X \phi(x): 1 \rightarrow \Omega$ 等于 \top .

我们称满足上述条件的公式 $\phi(x)$ (在 X 上) 恒成立 (is universally valid), 简称成立.

证明.

- (1) \Leftrightarrow (2) 由 $\{x \in X \mid \phi(x)\}$ 的定义即得.
- (2) \Leftrightarrow (3). 由任意量词的解释, 对于 $p \in \text{Sub}(1)$,

$$X \times p \leq \{x \in X \mid \phi(x)\} \quad \text{当且仅当} \quad p \leq \forall x \in X \phi(x).$$

因此 $\{x \in X \mid \phi(x)\} = X$ 等价于 $p = 1$ 满足以上两式, 等价于 $(\forall x \in X \phi(x)) = \top$.

□

²这与哲学上的用法是一致的: 外延是一个词语适用的对象的集合.

注 4.1.11

为了避免混淆, 作如下约定: 在本章中如无特殊说明, 自然语言 (中文) 的逻辑连接词“对任意”“存在”“或”等等是通常的 (“外部”的) 数学语言, 而符号 \forall, \exists, \vee 等等是某个意象的内语言, 即 Mitchell–Bénabou 语言.

使用 Mitchell–Bénabou 语言表达意象中的对象和态射

例 4.1.12 (像)

映射 $f: X \rightarrow Y$ 的像为

$$\text{im}(f) = \{y \in Y \mid \exists x \in X f(x) = y\}.$$

记 $\pi: X \times Y \rightarrow Y$ 为投影, 那么对于 $U \in \text{Sub}(Y)$, 有 $\pi^*U = X \times U$. 由存在量词的解释, 上述 $\text{im}(f)$ 的定义可翻译为

$$\text{im}(f) \leq U \quad \text{当且仅当} \quad \{(x, y) \in X \times Y \mid f(x) = y\} \leq X \times U.$$

而后者等价于 f 穿过 $U \hookrightarrow Y$; 故这个条件正是像的范畴论定义 (1.3.18). 为了体现与通常数学的一致性, 我们也将 $\text{im}(f)$ 记为 $\{f(x) \mid x \in X\}$.

例 4.1.13 (单射与满射)

对于意象中的态射 $f: X \rightarrow Y$,

- f 为单射当且仅当公式 $\forall x_1 \in X \forall x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$ 成立.
- f 为满射当且仅当公式 $\forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y$ 成立.

证明.

- 公式 $\forall x_1 \in X \forall x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$ 翻译为外部语言即左下图交换 (见命题 4.1.10).

$$\begin{array}{ccc} X \times X & \longrightarrow & 1 \\ (\chi_\Delta \circ (f \times f), \chi_\Delta) \downarrow & & \downarrow \top \\ \Omega \times \Omega & \rightrightarrows & \Omega \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \Delta \downarrow & & \downarrow \Delta \\ X \times X & \xrightarrow{f \times f} & Y \times Y \end{array}$$

注意到 f 是单射当且仅当上面的右图为拉回, 而右图为 (子对象的) 拉回等价于特征函数满足 $\chi_\Delta \circ (f \times f) = \chi_\Delta$. 这等价于上面的左图交换.

- 由例 4.1.12 中的讨论, 公式 $\forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y$ 成立等价于 $\text{im } f = Y$, 即 f 为满射.

□

例 4.1.14 (“有物” 与 “非空”)

在意象中, 称对象 X “有物” (inhabited), 是指 $X \rightarrow 1$ 为满射; 在内语言中此即公式 $\exists x \in X \top$ 成立. 称 X “非空” (nonempty) 是指公式 $\neg(\forall x \in X \perp)$ 成立. 一般而言, 有物与非空是不同的概念; 这一点从后面介绍的拓扑空间上的层语义的例子 (4.2.8) 可以看出 (考虑一个稠密开集作为子终对象, 它不是有物的, 却是非空的).

另外需要注意的是, 一个对象 X 有物, X 不一定有整体元素, 即 (以外部观点) 不一定存在态射 $1 \rightarrow X$. 这是因为一般的意象中没有选择公理, 见例 1.3.70.

例 4.1.15 (满射的集合)

X 到 Y 的满射的 “集合” 为

$$\text{Epi}(X, Y) = \{f \in Y^X \mid \forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y\} = \{f \in Y^X \mid \text{im } f = Y\}.$$

后一种写法使用了像的内语言定义 (命题 4.1.12).

例 4.1.16 (单元集)

回忆 “单元集映射” $\{-\}: X \rightarrow PX$ 是 $\delta_X: X \times X \rightarrow \Omega$ 对应的态射 (例 1.1.21). 换言之,

$$\{x\} = \{y \in X \mid y = x\}.$$

PX 上有一个谓词 “是单元集”. 首先我们定义子单元集 (subsingleton), 也即单元集的子集³:

$$\ulcorner S \text{ 是子单元集} \urcorner := \forall x \in S \forall y \in S x = y.$$

接着定义

$$\ulcorner S \text{ 是单元集} \urcorner := \ulcorner S \text{ 是子单元集} \urcorner \wedge \exists x \in S \top = (\exists! x \in S \top).$$

(其中 $\exists!$ 表示存在唯一, 见定义 B.1.12) 可以证明

$$\forall S \in PX (\ulcorner S \text{ 是单元集} \urcorner \Leftrightarrow \exists x \in X S = \{x\}).$$

³在经典逻辑中只有两个不同的子单元集, 即空集与单元集; 但在意象的内语言中则不然: 子单元集对应意象的子终对象, 见定义 1.3.26.

例 4.1.17 (函数及其图像)

设 $\Gamma \in P(X \times Y)$ 使得公式 $\forall x \exists! y (x, y) \in \Gamma$ 成立. 设 Γ 对应态射 $\tilde{f}: X \rightarrow PY$, 则有 $\forall x \exists y \tilde{f}(x) = \{y\}$, 也即 $\text{im } \tilde{f} \subset \text{im } \{-\}$. 这说明 \tilde{f} 穿过一个态射 $f: X \rightarrow Y$. 进一步, 可以证明

$$Y^X \simeq \{\Gamma \in P(X \times Y) \mid \forall x \exists! y (x, y) \in \Gamma\}.$$

例 4.1.18 (商集)

集合论中, 商集由等价类的集合构造; 在内语言中我们也可仿照这一构造. 首先回顾等价关系 (1.3.12) 的定义. 内语言中, 集合 X 上的等价关系是满足如下条件的二元关系 \sim :

- $x \sim x$;
- $x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
- $(x \sim y \wedge y \sim z) \Rightarrow x \sim z$.

对于 $x \in X$ 定义“等价类”

$$[x] := \{x' \in X \mid x' \sim x\},$$

从而有映射 $[-]: X \rightarrow PX$. 于是商集 X/\sim 可定义为

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\} := \text{im}([-]: X \rightarrow PX).$$

注意此时我们有

$$\forall \alpha \in (X/\sim) \exists x \in X \alpha = [x].$$

例 4.1.19 (Boole 意象)

一个意象是 Boole 的, 当且仅当

- (排中律) $\forall p \in \Omega (p \vee \neg p)$;
- (双重否定消去) $\forall p \in \Omega (\neg \neg p \Rightarrow p)$.

注意公式 $p \vee \neg p$ 成立不能推出 $p = \top$ 成立或 $p = \perp$ 成立 (后者是二值性, 见注 1.3.66), 因为 \vee 是内语言, 而“或”是“外部”语言.

下面证明排中律成立等价于双重否定消去成立. 假设排中律, 那么

$$\begin{aligned}
 \neg\neg p &= \neg\neg p \wedge (p \vee \neg p) \\
 &\Rightarrow (\neg\neg p \wedge p) \vee (\neg\neg p \wedge \neg p) \\
 &\Rightarrow (\neg\neg p \wedge p) \vee \perp \\
 &= (\neg\neg p \wedge p) \\
 &\Rightarrow p.
 \end{aligned}$$

另一方面, 假设双重否定消去成立. 注意到

$$\begin{aligned}
 \neg\neg(p \vee \neg p) &= \neg(\neg p \wedge \neg\neg p) && (\text{命题 1.3.40 (2)}) \\
 &= \neg\perp \\
 &= \top,
 \end{aligned}$$

故由双重否定消去知 $p \vee \neg p$ 成立.

例 4.1.20 (内蕴选择公理)

一个意象满足内蕴选择公理 (定义 1.3.69), 当且仅当对任意对象 X, Y 如下公式成立.

$$\forall f \in \text{Epi}(X, Y) \exists g \in X^Y \forall y \in Y f(g(y)) = y.$$

因为一般的意象不一定是 Boole 的, 也不一定满足内蕴选择公理, 所以在内语言中进行推理一般不能使用以上两例中写出的公式. 内语言中可以使用的推导法则是直觉主义谓词演算 (intuitionistic predicate calculus).

4.2 Kripke–Joyal 语义

语义 (semantics) 是将一种形式语言 (如前面介绍的 Mitchell–Bénabou 语言) 的公式转化为另一种语言 (如通常数学语言) 的方法. 回忆 Mitchell–Bénabou 语言中, 含一个变量 $x: X$ 的公式 $\phi(x)$ 被解释为一个态射 $\phi(x): X \rightarrow \Omega$. 子对象 $\{x \mid \phi(x)\}$ 是 $\top: 1 \rightarrow \Omega$ 沿 $\phi(x)$ 的拉回 (定义 4.1.9). 设 X 有整体元素 $x_0: 1 \rightarrow X$, 那么 x_0 满足公式 ϕ 当且仅当下图中虚线态射存在.

$$\begin{array}{ccccc}
 & \{x \mid \phi(x)\} & \longrightarrow & 1 & \\
 & \downarrow & & \downarrow \top & \\
 1 & \xrightarrow{x_0} & X & \xrightarrow{\phi(x)} & \Omega
 \end{array}$$

将“整体元素”推广为“广义元素”, 我们得到如下的定义.

定义 4.2.1

设 X 是一个意象的对象, $\phi(x)$ 是含变量 $x: X$ 的公式. 称广义元素 $x_0: U \rightarrow X$ 满足公式 ϕ , 是指下图中虚线态射存在, 也即 U 包含于公式 ϕ 确定的子对象.

$$\begin{array}{ccccc} & & \{x \mid \phi(x)\} & \longrightarrow & 1 \\ & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \top \\ U & \xrightarrow{x_0} & X & \xrightarrow{\phi(x)} & \Omega \end{array}$$

此时记 $U \models \phi(x_0)$, 也称为 U 力迫 (forces) $\phi(x_0)$. (力迫这个词来源于 Cohen, 见 6.6 节.)

命题 4.2.2

对于广义元素 $x_0: U \rightarrow X$, 设 $p: U' \rightarrow U$ 为满射, 若 $U' \models \phi(x_0 p)$, 则 $U \models \phi(x_0)$.

证明. 由条件有交换图 $\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{\quad} & \{x \mid \phi(x)\} \\ p \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{x_0} & X \end{array}$. 作 $\{x \mid \phi(x)\}$ 沿 x_0 的拉回 \tilde{U} , 那么 $\tilde{U} \rightarrow U$ 既单又满, 故为同构. 这说明 $U \models \phi(x_0)$. 这是满射关于单射的一种提升性质. \square

命题-定义 4.2.3 (Kripke–Joyal 语义的递归定义)

设 $x_0: U \rightarrow X$ 为广义元素, 如下条款递归地给出了 $U \models \phi(x_0)$ 的定义 (“按公式 ϕ 的复杂度归纳”):

- (1) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $U \models \phi(x_0) \wedge \psi(x_0)$ 当且仅当 $U \models \phi(x_0)$ 且 $U \models \psi(x_0)$.
- (2) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $U \models \phi(x_0) \vee \psi(x_0)$ 当且仅当存在 $p: V \rightarrow U$ 与 $q: W \rightarrow U$, 使得 $(p, q): V + W \rightarrow U$ 满, 且 $V \models \phi(x_0 p)$, $W \models \psi(x_0 q)$.
- (3) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $U \models \phi(x_0) \Rightarrow \psi(x_0)$ 当且仅当对任意 $p: V \rightarrow U$, 只要 $V \models \phi(x_0 p)$, 就有 $V \models \psi(x_0 p)$; 这又等价于 $U \wedge \{x \mid \phi(x)\} \models \psi(x_0)$.
- (4) 对于公式 $\phi(x)$, $U \models \neg \phi(x_0)$ 当且仅当对任意 $p: V \rightarrow U$, 只要 $V \models \phi(x_0 p)$, 就有 $V \simeq 0$.
- (5) 对于公式 $\phi(x, y)$, $U \models \exists y \phi(x_0, y)$ 当且仅当存在满射 $p: V \rightarrow U$ 以及广义元素 $y_0: V \rightarrow Y$ 使得 $V \models \phi(x_0 p, y_0)$.
- (6) 对于公式 $\phi(x, y)$, $U \models \forall y \phi(x_0, y)$ 当且仅当对任意 $y_0: V \rightarrow Y$, $p: V \rightarrow U$, 都有 $V \models \phi(x_0 p, y_0)$; 这又等价于 $U \times Y \models \phi(x_0 \pi_1, y \pi_2)$, 其中 π_1, π_2 为 $U \times Y$ 向两

个分量的投影.

证明. 这些性质的证明基本上是直接验证定义, 我们提供一些细节.

在 (2) 中, $x_0: U \rightarrow X$ 穿过 $\{x \mid \phi(x) \vee \psi(x)\} = \{x \mid \phi(x)\} \vee \{x \mid \psi(x)\}$, 当且仅当 U 的两个子对象 $\{u \in U \mid \phi(x_0u)\}$, $\{u \in U \mid \psi(x_0u)\}$ 之并等于 U . 取 V, W 为这两个子对象即可.

在 (4) 中, 若 $x_0: U \rightarrow X$ 穿过 $\{x \mid \exists y \phi(x, y)\}$, 作如下拉回,

$$\begin{array}{ccc} \{(u, y) \mid \phi(x_0u, y)\} & \longrightarrow & \{(x, y) \mid \phi(x, y)\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \{x \mid \exists y \phi(x, y)\} \end{array}$$

因为右边为满射, 所以左边 $\{(u, y) \mid \phi(x_0u, y)\} \rightarrow U$ 为满射. \square

层语义

Kripke-Joyal 语义在景上 (特别地, 在拓扑空间上) 有更具体的表述. 对于景 (\mathcal{C}, J) , 我们将定义记号 $c \models \phi$ 表示一个公式 ϕ 在 c 上局部成立, 而“局部”的含义与覆盖结构 J 有关.

命题-定义 4.2.4

设 $\phi(x)$ 是 Grothendieck 意象 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的内语言中含一个变量 $x \in X$ 的公式. 记 $\{x \mid \phi(x)\}$ 为 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 中 ϕ 确定的 X 的子对象. 对于 \mathcal{C} 的对象 c 与 $x_0 \in X(c)$, 如下条件等价,

- (1) $x_0 \in \{x \mid \phi(x)\}(c)$;
- (2) $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射 $x_0: \downarrow(c) \rightarrow X$ 穿过 $\{x \mid \phi(x)\} \hookrightarrow X$;
- (3) $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 中的态射 $x_0: \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c) \rightarrow X$ 穿过 $\{x \mid \phi(x)\} \hookrightarrow X$, 即 $\downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c) \models \phi(x_0)$.

当上述条件成立时, 记 $c \models \phi(x_0)$.

证明. (1) \Leftrightarrow (2) 是米田引理, (2) \Leftrightarrow (3) 是由于自反子范畴的性质. \square

命题 4.2.5 (层语义的局部性)

若存在 c 的覆盖 (筛) $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 使得对每个 i 都有 $c_i \models \phi(x_0f_i)$, 那么 $c \models \phi(x_0)$.

证明. 取 f_i 生成的筛 $S \rightarrow \downarrow(c)$, 则有满射 $\coprod_i \downarrow(c_i) \rightarrow S$. 层化后有满射 $\coprod_i \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c_i) \rightarrow \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ (层化保持满射, 命题 1.3.5). 于是由命题 4.2.2 即证. \square

命题-定义 4.2.6 (层语义)

设 X 是 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的对象, $\phi(x)$ 是 X 上的公式, c 是 \mathcal{C} 的对象, $x_0 \in X(c)$. 如下条款递归地给出了 $c \models \phi(x_0)$ 的定义 (“按公式 ϕ 的复杂度归纳”):

- (1) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $c \models \phi(x_0) \wedge \psi(x_0)$ 当且仅当 $c \models \phi(x_0)$ 且 $c \models \psi(x_0)$.
- (2) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $c \models \phi(x_0) \vee \psi(x_0)$ 当且仅当存在覆盖 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$, 使得对每个 i , $c_i \models \phi(x_0 f_i)$ 或 $c_i \models \psi(x_0 f_i)$.
- (3) 对于公式 $\phi(x), \psi(x)$, $c \models \phi(x_0) \Rightarrow \psi(x_0)$ 当且仅当对任意 $p: d \rightarrow c$, 只要 $d \models \phi(x_0 p)$, 就有 $d \models \psi(x_0 p)$.
- (4) 对于公式 $\phi(x)$, $c \models \neg \phi(x)$ 当且仅当对任意 $p: d \rightarrow c$, 只要 $d \models \phi(x_0 p)$, 就有 d 被空集覆盖. (特别地, $c \models \perp$ 当且仅当 \emptyset 覆盖 c .)
- (5) 对于公式 $\phi(x, y)$, $c \models \exists y \phi(x_0, y)$ 当且仅当存在覆盖 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 以及元素 $y_i \in Y(c_i)$ 使得对每个 i 有 $c_i \models \phi(x_0 f_i, y_i)$.
- (6) 对于公式 $\phi(x, y)$, $c \models \forall y \phi(x_0, y)$ 当且仅当对任意 $y_0 \in Y(d)$, $p: d \rightarrow c$, 都有 $d \models \phi(x_0 p, y_0)$.

证明. 这些性质的证明基本上是翻译命题 4.2.3. 我们提供一些细节.

在 (2) 中, $c \models \phi(x_0) \vee \psi(x_0)$ 当且仅当存在 $V, W \in \text{Sh}(\mathcal{C}, J)$, $p: V \rightarrow \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ 与 $q: W \rightarrow \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ 使得 $(p, q): V + W \rightarrow \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ 满, 且 $V \models \phi(x_0 p)$, $W \models \psi(x_0 q)$. 而每个层 F 都是形如 $\downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c')$ 的对象的余极限 (命题 3.5.7), 特别地, 存在一族对象 c_i 以及满射 $\coprod_i \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c_i) \rightarrow F$. 又因为一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}$ 构成覆盖当且仅当对应的态射 $\coprod_i \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c_i) \rightarrow \downarrow_{(\mathcal{C}, J)}(c)$ 为满射 (命题 3.6.7), 这证明了 (2). \square

例 4.2.7 (一个点上的层语义)

一个点上的层意象 $\text{Set} \simeq \text{Sh}(*)$ 中 $* \models \phi(x_0)$ 即是公式 $\phi(x_0)$ 在通常数学的意义下成立.

例 4.2.8 (拓扑空间上的层语义)

设 X 为拓扑空间, 那么 $\text{Sh}(X)$ 的内语言中的命题 (即终对象 1 上的公式) 对应于 X 的开集, 直观上这个开集表示该命题成立的范围. 此时对于 $U, V \in \text{Open}(X)$, 有

$U \models V$ 等价于 $U \leq V$. 例如,

- $\neg U$ 对应开集 U 的补集的内部. 因此, $X \models (\neg\neg U)$ 当且仅当 $\neg U = \emptyset$, 当且仅当 U 是 X 的稠密开集.
- 设 (X, \mathcal{O}_X) 为环化空间, 即拓扑空间 X 配备 $\text{Sh}(X)$ 中的环 \mathcal{O}_X . 对于 $f \in \mathcal{O}_X$, 命题

$$\lceil f \text{ 可逆} \rceil := \exists g \in \mathcal{O}_X fg = 1$$

直观上表示 “ f 可逆的地方”. 由命题 4.2.6 (5), 对于开集 U , $U \models \lceil f \text{ 可逆} \rceil$ 当且仅当存在 U 的开覆盖 $\{U_i\}$ 以及 $g_i \in \mathcal{O}_X(U_i)$ 使得 $U_i \models (fg_i = 1)$.

- 记 S^1 为圆圈, 考虑二重覆叠 $S^1 \rightarrow S^1$ 对应的层 $X \in \text{Sh}(S^1)$. 此时内语言中的命题 $\lceil X \text{ 有元素} \rceil$, 即

$$\exists x \in X \top$$

的值为真 \top , 因为存在 S^1 的一个覆盖, 在每一处上 X 都有截面. 但 X 没有全局截面.

- 所谓局部环化空间 (locally ringed space) 是指一个环化空间 (X, \mathcal{O}_X) , 使得 \mathcal{O}_X 的每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环. 由命题 4.3.4, 这等价于 \mathcal{O}_X 在内语言中是一个局部环, 即如下公式成立:

$$\forall x \in \mathcal{O}_X \forall y \in \mathcal{O}_X \lceil x + y \text{ 可逆} \rceil \Rightarrow \lceil x \text{ 可逆} \rceil \vee \lceil y \text{ 可逆} \rceil.$$

4.3 不同意象的内语言的联系

本节说明意象的几何态射联系了两者的内语言, 其中几何公式表现出良好的性质.

回忆, 几何公式 (定义 B.1.14) 是由原子公式, 真 \top , 二元合取 \wedge , 存在量词 \exists , 假 \perp 以及任意析取 \vee 构成的公式. 我们将关心几何公式的相继式 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$, 它等同于蕴涵式 $\forall \vec{x} \phi \Rightarrow \psi$; 注意这里只允许最外层使用一个蕴涵 \Rightarrow , 而几何公式 ϕ, ψ 中不能出现蕴涵.

命题 4.3.1 (几何态射保持几何公式的相继式)

设 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是意象的几何态射. 若几何公式的相继式 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$ 在 \mathcal{D} 中成立, 则其沿 f 的拉回在 \mathcal{C} 中成立.

上述命题更严格 (且更一般) 的表述如下. 设 M 是 \mathcal{D} 中的 Σ -结构 (定义 B.2.1), f^*M 是沿 f 拉回所得的 \mathcal{C} 中的 Σ -结构 (注意 f^* 保持有限极限, 以及命题 B.2.2).

那么对符号表 Σ 上任意语境 \vec{x} 中的几何公式 $\vec{x}.\phi$,

$$f^*(\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M) \simeq \llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_{f^*M}.$$

关于 $\llbracket - \rrbracket_M$ 的含义见定义 B.2.10.

证明. 对 ϕ 的结构归纳. 我们仅举一例说明论证的方法.

- 若 ϕ 形如 $\exists y \psi$ 且结论对 ψ 已经证明, 则

$$\begin{aligned} f^*(\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M) &= f^*(\llbracket \vec{x}.\exists y \psi \rrbracket_M) \\ &\simeq f^*(\exists_\pi \llbracket (\vec{x}, y).\psi \rrbracket_M) && (\llbracket - \rrbracket_M \text{ 的定义}) \\ &\simeq \exists_\pi f^*(\llbracket (\vec{x}, y).\psi \rrbracket_M) && (f^* \text{ 保持像}) \\ &\simeq \exists_\pi \llbracket (\vec{x}, y).\psi \rrbracket_{f^*M} && (\text{归纳假设}) \\ &\simeq \llbracket \vec{x}.\exists y \psi \rrbracket_{f^*M} = \llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket. \end{aligned}$$

□

例 4.3.2

意象间几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 的拉回部分 f^* 保持单射与满射, 这个事实在有了逻辑上的解释: 一个态射 g 是单射可以表达为几何公式的相继式

$$g(x) = g(y) \vdash_{(x,y)} x = y,$$

而 g 是满射可以表达为几何公式的相继式

$$\vdash_y \exists x g(x) = y.$$

命题 4.3.3

拓扑空间上几何公式的真值由一个点散布到其邻域. 具体地, 设 S 为拓扑空间, 若几何公式的相继式 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$ 在一点 $p \in S$ 处成立, 则其在 p 的某邻域 U 上成立.

命题 4.3.4 (拓扑空间上几何公式的逐点检验)

设 S 为拓扑空间, 几何公式的相继式 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$ 在 S 上成立当且仅当其在每个点处成立.

证明. “仅当” 部分是由于命题 4.3.1: 每个点对应一个几何态射 $p: \mathbf{Set} \simeq \mathbf{Sh}(\mathbf{pt}) \rightarrow \mathbf{Sh}(S)$, 而 p^* 保持几何公式. “当” 的部分是由于命题 4.3.3, 以及内语言的局部性 (命题 4.2.5). □

例 4.3.5

由命题 4.3.4 以及例 4.3.2, 拓扑空间上层的同态为单射 (满射), 当且仅当其在每个茎上均为单射 (满射).

模态与层化

A Grothendieck topology appears most naturally as a modal operator of the nature “it is locally the case that”.

William Lawvere

本节以内语言重新定义 Lawvere–Tierney 拓扑 (定义 3.7.1), 并以内语言构造层化. 本节中的“集合”是指某个固定的意象中的对象.

定义 4.3.6 (Lawvere–Tierney 拓扑, 内语言定义)

满足如下条件的映射 $\Box: \Omega \rightarrow \Omega$ 称作 *Lawvere–Tierney 拓扑*, 或模态:

- $\varphi \Rightarrow \Box\varphi$;
- $\Box\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi$;
- $\Box(\varphi \wedge \psi) = \Box\varphi \wedge \Box\psi$.

由命题 4.3.8, 该条件可替换为 $\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \Rightarrow \Box\psi)$.

此处以及后文中我们省略了公式中的任意量词 $\forall\varphi\forall\psi$.

注 4.3.7 (Lawvere–Tierney 拓扑作为模态的直观)

Lawvere 指出 Lawvere–Tierney 拓扑 \Box 应视为一种模态 (B.5 节). 逻辑学中, 模态是将命题变为命题的算子, 表达某命题以某种特定方式成立. 一般地, $\Box\varphi$ 是 φ 的某种弱化.

当 \Box 表示层化时, $\Box\varphi$ 表达的是命题 p 在局部上成立 (即该命题在某个覆盖的每一部分上成立; 例如流形是局部上同胚于欧氏空间的空间, 局部常值函数是局部上常值的函数). 条件 $\Box\Box\varphi = \Box\varphi$ 表示 “ φ 在局部上在局部上成立” 等同于 “ φ 在局部上成立”. 条件 $\Box(\varphi \wedge \psi) = \Box\varphi \wedge \Box\psi$ 表示 “ $\varphi \wedge \psi$ 在局部上成立” 等同于 “ φ, ψ 都在局部上成立”.

上成立”。参见 [22].

另一种直观是当 \Box 表示子空间时, $\Box\varphi$ 表达 φ 在子空间上成立; 例如在 \Box 来自于子位象时 (定义 2.2.12, 例 2.2.14) 我们已经看到这种直观.

命题 4.3.8 (Lawvere–Tierney 拓扑的等价定义)

对于映射 $\Box: \Omega \rightarrow \Omega$, 条件 $\Box(\varphi \wedge \psi) = \Box\varphi \wedge \Box\psi$ 等价于 $\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \Rightarrow \Box\psi)$.

证明.

- 假设 $\Box(\varphi \wedge \psi) = \Box\varphi \wedge \Box\psi$. 要证明 $\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \Rightarrow \Box\psi)$, 只需证明

$$(\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge \Box\varphi) \Rightarrow \Box\psi.$$

由假设,

$$\begin{aligned} (\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge \Box\varphi) &= \Box((\varphi \Rightarrow \psi) \wedge \varphi) \\ &= \Box(\psi \wedge \varphi) \\ &= \Box\psi \wedge \Box\varphi \\ &\Rightarrow \Box\psi. \end{aligned}$$

- 另一方面, 假设 $\Box(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \Rightarrow \Box\psi)$. 由于 $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$, 有 $\Box(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \Box\varphi$, 同理有 $\Box(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \Box\psi$, 故 $\Box(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$. 下面要证明

$$(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi),$$

即

$$\Box\varphi \Rightarrow (\Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)).$$

由假设, 这只需证明

$$\Box(\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow (\varphi \wedge \psi))).$$

上式显然成立.

□

作为命题 4.3.8 的推论, 我们得到 Lawvere–Tierney 拓扑是单调递增的:

$$(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\Box\varphi \Rightarrow \Box\psi).$$

例 4.3.9

在 **Set** (即经典逻辑) 中只有两个模态, $\Box\varphi = \varphi$ 以及 $\Box\varphi = \top$. 前者对应的是一个点本身, 而后者对应的是空集: “ φ 在空集上成立” 是空条件.

例 4.3.10

在意象中, 如下映射 $\Box: \Omega \rightarrow \Omega$ 都是 Lawvere–Tierney 拓扑:

- $\Box\varphi = (\mu \Rightarrow \varphi)$, 其中 μ 是一个固定的命题 (即类型 Ω 的常量), 其直观为 “ φ 在 μ 成立的地方成立”;
- $\Box\varphi = (\nu \vee \varphi)$, 其中 ν 是一个固定的命题, 其直观为 “ φ 在 ν 不成立的地方成立”;
- $\Box\varphi = \neg\neg\varphi$, 见定义 6.6.1.

定义 4.3.11 (分离性与层条件, 内语言定义)

对于给定的 Lawvere–Tierney 拓扑 \Box , 称集合 F “ \Box -分离” 是指如下公式成立:

$$\forall x, y \in F, \quad \Box(x = y) \Rightarrow x = y.$$

称集合 F 为 \Box -层是指 F \Box -分离, 且如下公式成立:

$$\forall S \subset F, \quad \Box(\ulcorner S \text{ 是单元集} \urcorner) \Rightarrow \exists x \in F. \Box(x \in S).$$

(其中 $\forall S \subset F$ 是 $\forall S \in \Omega^F$ 的意思.)

若 \Box 的直观是某命题局部上成立, 那么 F \Box -分离的直观就是 “若 F 的两个元素 x, y 在局部上相等, 则它们相等”; F 为 \Box -层的直观就是 “若子集 $S \subset F$ 在局部上是单元集, 则存在 F 的元素 x 局部上属于 S ”.

定义 4.3.12 (+ 构造)

对任意集合 F , 定义 F^+ 为如下商集 (4.1.18):

$$F^+ = \{S \subset F \mid \Box \ulcorner S \text{ 是单元集} \urcorner\} / \sim, \quad \text{其中 } S \sim T : \Leftrightarrow \Box(S = T).$$

典范的映射 $F \rightarrow F^+$ 由 $x \mapsto [\{x\}]$ 给出.

注意 $S \sim T \Rightarrow (\Box(x \in S) \Leftrightarrow \Box(x \in T))$.

命题 4.3.13

对任意集合 F ,

- F^+ \Box -分离;
- 若 F \Box -分离, 则 F^+ 为 \Box -层.

证明.

- 要证明 F^+ \Box -分离, 即如下公式在 F^+ 上恒成立:

$$\Box(x = y) \Rightarrow x = y.$$

在内语言中这个命题是明显的: 由 F^+ 的定义, 有

$$\forall S, T \in \{S \subset F \mid \Box \ulcorner S \text{ 为单元集} \urcorner\}$$

$$\Box([S] = [T]) \Leftrightarrow \Box\Box(S = T) \Leftrightarrow \Box(S = T) \Leftrightarrow [S] = [T].$$

- ⁴要证明 F^+ 为层, 即证明如下公式成立:

$$\forall S \subset F^+, \quad \Box(\ulcorner S \text{ 为单元集} \urcorner) \Rightarrow \exists \alpha \in F^+ \alpha \in S.$$

定义压平 $f: PF^+ \rightarrow PF$ 如下:

$$f(S) := \{x \in F \mid \exists [A] \in S \Box(x \in A)\}.$$

这里, $\exists [A] \in S$ 是 $\exists A ([A] \in S \wedge \dots)$ 的意思. 其中“压平”的直观是将多层的 $\{\}$ 替换为单层. 例如, 当 S 为单元集 $\{\{\{a\}\}\}$ 时, $f(S) = \{a\}$, 这是因为

$$\begin{aligned} \exists [A] \in S \Box(x \in A) &\Rightarrow \exists A ([A] = \{\{a\}\}) \wedge \Box(x \in A) \\ &\Rightarrow \exists A \Box(A = \{a\} \wedge x \in A) \\ &\Rightarrow \Box(x = a) \\ &\Rightarrow x = a \text{ (由 } \Box\text{-分离性)}. \end{aligned}$$

由单元集的定义,

$$\ulcorner S \text{ 为单元集} \urcorner \Rightarrow \exists A \subset F (\Box \ulcorner A \text{ 为单元集} \urcorner \wedge S = \{[A]\}).$$

而

$$\begin{aligned} \ulcorner A \text{ 为单元集} \urcorner \wedge S = \{[A]\} &\Rightarrow \exists a \in F S = \{\{[a]\}\} \\ &\Rightarrow \exists a \in F f(S) = \{a\} \\ &\Rightarrow \ulcorner f(S) \text{ 为单元集} \urcorner. \end{aligned}$$

综合上述论证, 使用模态 \Box 的性质, 我们证明了

$$\Box(\ulcorner S \text{ 为单元集} \urcorner) \Rightarrow \Box(\ulcorner f(S) \text{ 为单元集} \urcorner).$$

□

命题 4.3.14 (层范畴的子对象分类子, 内语言刻画)

设 $\square: \Omega \rightarrow \Omega$ 是 Lawvere–Tierney 拓扑, 则 \square -层范畴的子对象分类子为

$$\Omega_{\square} = \{p \in \Omega \mid \square p = p\}.$$

⁴此证明来自杨家同.

第 5 章 语法景与分类意象

5.1 语法范畴: 语法–语义对偶	187
语法景	192
5.2 分类意象	193
对象的分类意象	194
子终对象的分类意象	195
带基点对象的分类意象	195
命题理论的分类意象	195
群的分类意象	196
环的分类意象	197
域的分类意象	199
线性序的分类意象	200
G -旋子的分类意象	202
几何理论的分类意象	204
Grothendieck 意象作为分类意象	204

5.1 语法范畴: 语法–语义对偶

The importance of syntactic categories lies in the fact that they allow us to associate with a theory (in the sense of axiomatic presentation), which is a ‘linguistic’, unstructured kind of entity, a well-structured mathematical object whose ‘geometry’ embodies the syntactic aspects of the theory.

Olivia Caramello, [10]

[C]ategories and theories are practically indistinguishable.

Michael Makkai, Gonzalo Reyes,
*First Order Categorical Logic: Model-Theoretical Methods in the
 Theory of Topoi and Related Categories*

范畴逻辑学的一个一般性的现象是理论 (一阶逻辑, 类型论等等) 与范畴之间的对应. 某些范畴可以为理论提供语义 (semantics), 某些理论可以作为范畴的语法 (syntactics). 语法-语义对偶可类比于代数-几何对偶, 语法是“代数”, 语义则是“几何”. 这一点已经在 2.3 节体现.

附录 A.9 节介绍了 Lawvere 理论. 一个 Lawvere 理论 \mathbb{T} 作为范畴可视为其万有模型所在的范畴 (注 A.9.11). 在万有模型中成立的公式恰是理论 \mathbb{T} 中可证的所有公式.

一般地, 对于一阶理论 \mathbb{T} , 我们可以构造一个范畴 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$, 称之为语法范畴 (syntactic category), 其对象和态射是按照指定的语法在形式上可构造的所有对象和态射; 换言之, $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中含有理论 \mathbb{T} 的任何模型所必须具备的对象和态射, 从而包含理论 \mathbb{T} 的万有模型. 一个理论的语法范畴也可视为这个理论“无坐标”式的表示.

定义 5.1.1 (几种一阶理论的语法范畴)

设 \mathbb{T} 是符号表 Σ 上的几何 (常理, 贯理, 一阶) 理论 (定义 B.1.21). 定义其语法范畴 (syntactic category) $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 为如下的范畴,

- 其对象是 Σ 上带语境的几何 (常理, 贯理, 一阶) 公式 (\vec{x}, ϕ) 的 α -等价类, α 等价是指两个公式仅有变量名的差异.
- 对象 (\vec{x}, ϕ) 到 (\vec{y}, ψ) 的态射 (其中不妨设语境 \vec{x}, \vec{y} 不交) 是公式 $\theta(\vec{x}, \vec{y})$ 的 \mathbb{T} -可证等价类, 满足 \mathbb{T} -可证的函数性 (functionality), 即如下相继式 \mathbb{T} -可证:

- $\theta \vdash_{\vec{x}, \vec{y}} \phi \wedge \psi$;
- (像的存在性) $\phi \vdash_{\vec{x}} \exists \vec{y} \theta$;
- (像的唯一性) $\theta \wedge \theta[\vec{z}/\vec{y}] \vdash_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \vec{y} = \vec{z}$, 这里 $\theta[\vec{z}/\vec{y}]$ 是指将公式 θ 中的 \vec{y} 替换为 \vec{z} , 公式 $\vec{y} = \vec{z}$ 是 $(y_1 = z_1) \wedge \cdots \wedge (y_n = z_n)$ 的简略写法.

直观上, $\theta(\vec{x}, \vec{y})$ 是公式之间的变量代换.

- 对象 (\vec{x}, ϕ) 到自身的恒等态射为 $\phi \wedge (\vec{x} = \vec{x}')$.
- 态射 $\theta: (\vec{x}, \phi) \rightarrow (\vec{y}, \psi)$, $\eta: (\vec{y}, \psi) \rightarrow (\vec{z}, \chi)$ 的复合为 $\exists \vec{y}(\eta \wedge \theta)$.

注 5.1.2

我们将带语境的公式 (\vec{x}, ϕ) 想象为“ \vec{x} 的所有可能取值中满足公式 ψ 的那些值的集合”. 由此不难想象常理 (贯理, 几何) 理论的语法范畴 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 具有如下范畴论结构.

- 终对象为 (\emptyset, \top) ; 对任何对象 (\vec{x}, ϕ) , 其到终对象的唯一态射由公式 ϕ 给出.
- 两个对象 (\vec{x}, ϕ) , (\vec{y}, ψ) 的乘积为 $((\vec{x}, \vec{y}), \phi \wedge \psi)$, 乘积到 (\vec{x}, ϕ) 的投影映射由如下公式给出:

$$\theta(\vec{x}, \vec{y}, \vec{x}') = \phi \wedge \psi \wedge (\vec{x}' = \vec{x}).$$

(为防止变量名重复, 将原来的 \vec{x} 替换为 \vec{x}' .)

- 指向同一对象的两个态射的拉回为

$$\lim \left(\begin{array}{ccc} & (\vec{y}, \psi) & \\ & \downarrow [\gamma] & \\ (\vec{x}, \phi) & \xrightarrow{[\theta]} & (\vec{z}, \chi) \end{array} \right) \simeq ((\vec{x}, \vec{y}), \exists \vec{z}(\theta \wedge \gamma)),$$

该对象到 (\vec{x}, ϕ) 的投影映射由如下公式给出:

$$\theta(\vec{x}, \vec{y}, \vec{x}') = \exists \vec{z}(\theta \wedge \gamma) \wedge (\vec{x}' = \vec{x}).$$

(注意当 \vec{z} 是零个变量时, 公式 $\exists \vec{z} \theta$ 应当理解为 θ 本身, 所以前一条中的乘积是这里拉回的特殊情形)

承认上述构造的正确性, 那么 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 具有有限极限. 进一步, 根据理论的丰富程度, 其语法范畴还有更多结构 (命题 5.1.5), 其子对象的格上具有与该理论背后的逻辑相应的运算.

命题 5.1.3 (语法范畴中的子对象的结构)

设 \mathbb{T} 是定义 5.1.1 中的理论, 则 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中的所有子对象都同构于如下形式的子对象:

$$(\vec{x}, \psi) \xrightarrow{[\theta]} (\vec{x}, \phi), \quad \theta = (\psi \wedge (\vec{x}' = \vec{x})),$$

其中 $\psi \vdash_{\vec{x}} \phi$ 是 \mathbb{T} -可证的. 进一步, 两个公式 ψ, χ 对应的子对象之间有关系 $(\vec{x}, \psi) \leq (\vec{x}, \chi)$ 当且仅当 $\psi \vdash_{\vec{x}} \chi$ 是 \mathbb{T} -可证的.

证明参见 [17] D1.4.4.

命题 5.1.4 (语法范畴中子对象的拉回)

设 \mathbb{T} 是定义 5.1.1 中的理论, 则 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中子对象 $(\vec{x}, \psi) \xrightarrow{[\theta]} (\vec{x}, \phi)$ 沿态射 $[\theta]: (\vec{z}, \chi) \rightarrow (\vec{x}, \phi)$ 的拉回为

$$((\vec{x}, \vec{z}), \theta \wedge \psi).$$

命题 5.1.5 (语法范畴的更多范畴论结构)

常理 (贯理, 几何) 理论的语法范畴是常理 (贯理, 几何) 范畴 (定义 B.2.6–B.2.9).

证明. (略证) 设 \mathbb{T} 为常理理论. 对于 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中的态射 $[\theta]: (\vec{x}, \varphi) \rightarrow (\vec{y}, \psi)$, 定义其像为 (\vec{y}, ψ) 的子对象

$$\text{im}[\theta] := (\vec{y}, \exists \vec{x} \theta) \hookrightarrow (\vec{y}, \psi).$$

下面说明 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中的拉回保持像: 考虑拉回图

$$\begin{array}{ccc} ((\vec{x}, \vec{y}), \exists \vec{z} (\theta \wedge \gamma)) & \rightarrow & (\vec{y}, \psi) \\ \downarrow [\exists \vec{z} (\theta \wedge \gamma) \wedge (\vec{x}' = x)] & & \downarrow [\gamma] \\ (\vec{x}, \phi) & \xrightarrow{[\theta]} & (\vec{z}, \chi) \end{array}$$

不难证明左边态射的像, 以及右边态射的像的拉回, 均同构于

$$(\vec{x}, \exists (\vec{y}, \vec{z}) (\theta \wedge \gamma)).$$

设 \mathbb{T} 是贯理理论, 则 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中的子对象格存在有限并: (\vec{x}, ϕ) 的子对象 (\vec{x}, χ) , (\vec{x}, ψ) 的并为 $(\vec{x}, \chi \vee \psi)$. 拉回保持子对象的并是由于 \wedge 对 \vee 的分配公理 (定义 B.1.23).

设 \mathbb{T} 是几何理论, 则类似地, $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}$ 中的子对象格存在任意并, 且拉回保持任意并. \square

代数理论的语法范畴比前面介绍的语法范畴更简单一些; 其中的态射是直接的变量代换.

定义 5.1.6 (代数理论的语法范畴)

设 \mathbb{T} 是符号表 Σ 上的代数理论. 定义其语法范畴 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}^{\text{alg}}$ 为如下的范畴,

- 其对象 (\vec{x}, ϕ) 是 Σ 上带语境的原子公式的有限合取, 即 $\phi = (s_1 = t_1) \wedge \cdots \wedge (s_n = t_n)$, 其中对每个 i , s_i, t_i 是相同类型的项.
- 对象 (\vec{x}, ϕ) 到 (\vec{y}, ψ) 的态射是一列项 $\vec{t} = (t_1(\vec{x}), \cdots, t_m(\vec{x}))$, 使得 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi(t_1(\vec{x}), \cdots, t_m(\vec{x}))$ 是 \mathbb{T} -可证的. 直观上, \vec{t} 是公式之间的变量代换.

注 5.1.7

设 \mathbb{T} 是代数理论, 那么 $\mathcal{C}_{\mathbb{T}}^{\text{alg}}$ 具有有限极限:

- 终对象为 (\emptyset, \top) .
- 指向同一对象的两个态射的拉回为

$$\lim \left(\begin{array}{ccc} & (\vec{y}, \psi) & \\ & \downarrow \vec{s} & \\ (\vec{x}, \phi) & \xrightarrow{\vec{t}} & (\vec{z}, \chi) \end{array} \right) \simeq ((\vec{x}, \vec{y}), \phi \wedge \psi \wedge (\vec{s} = \vec{t})).$$

注 5.1.8

由定义, 一个理论的语法范畴依赖于理论所属的类别 (几何, 常理, 贯理, \dots). 一个代数理论也可以视为贯理理论, 但一个代数理论的语法范畴与它作为贯理理论的语法范畴不同.

注 5.1.9

代数理论 \mathbb{T} 的语法范畴等价于其有限表现模型 (定义 A.9.19) 的范畴的对偶范畴, 见下面的例.

例 5.1.10

考虑群的理论 \mathbb{T}_{Grp} 的两个有限表现模型 $G = \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$, $H = \langle z \rangle \simeq \mathbb{Z}$. 它们也可视为带语境的公式: G 是语境 (x, y) 下的公式 $x^2 = y^3$, 而 H 是语境 z 下的公式 \top . 我们有公式之间的代换

$$\langle z \rangle \rightarrow \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle, (x, y) = (z^3, z^2),$$

(注意到 $\top \vdash_z (z^3)^2 = (z^2)^3$ 是 \mathbb{T}_{Grp} -可证的.) 它对应着反方向的群同态 $G \rightarrow H, x \mapsto z^3, y \mapsto z^2$. 这解释了等价 $\mathbb{T}_{\text{Grp}} \simeq \text{Grp}_{\text{fp}}^{\text{op}}$.

对范畴 \mathcal{C} 中群理论的任意模型 F , 视为保持有限极限的函子 $F: \mathbb{T}_{\text{Grp}} \rightarrow \mathcal{C}$, 有

$$F(G) = \{(x, y) \in F^2 \mid x^2 = y^3\}, \quad F(H) = \{z \in F \mid \top\} = F.$$

群同态 $G \rightarrow H$ 对应着 $F(H)$ 到 $F(G)$ 的态射 $z \mapsto (z^3, z^2)$.

注 5.1.11

如下的观点或许有助于理解代数理论的语法范畴的对象与态射: 想象其对象为“代数簇”, 也即“仿射空间”中由一系列公式确定的子集, 它是一个几何对象; 而公式的代换是“代数簇”之间的映射. 注意对于环的理论的语法范畴 (即有限表现环范畴的对偶范畴) 这种观点与代数几何的看法完全一致.

语法景

定义 5.1.12 (几种范畴上自然的 Grothendieck 拓扑)

- 对于常理范畴 \mathcal{C} (定义 B.2.6), 定义其上的常理拓扑 (regular topology) $J_{\mathcal{C}}^{\text{reg}}$, 一个筛为 $J_{\mathcal{C}}^{\text{reg}}$ -覆盖筛当且仅当它包含一个态射 $f: d \rightarrow c$, 满足 $\text{im } f = \text{id}_c$.
- 对于贯理范畴 \mathcal{C} (定义 B.2.7), 定义其上的贯理拓扑 (coherent topology) $J_{\mathcal{C}}^{\text{coh}}$, 一个筛为 $J_{\mathcal{C}}^{\text{coh}}$ -覆盖筛当且仅当它包含一族有限个态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{1 \leq i \leq n}$, 满足 $\bigvee_{i=1}^n \text{im } f_i = \text{id}_c$.
- 对于几何范畴 \mathcal{C} (定义 B.2.9), 定义其上的几何拓扑 (geometric topology) $J_{\mathcal{C}}^{\text{geom}}$, 一个筛为 $J_{\mathcal{C}}^{\text{geom}}$ -覆盖筛当且仅当它包含一族态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{i \in I}$, 满足 $\bigvee_{i \in I} \text{im } f_i = \text{id}_c$.

命题 5.1.13

Grothendieck 拓扑 $J^{\text{reg}}, J^{\text{coh}}, J^{\text{geom}}$ 均为次典范拓扑 (定义 3.4.27), 从而有全忠实的米田嵌入 $\mathbf{y}_{(\mathcal{C}, \text{reg})}: \mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}, J^{\text{reg}})$ 等等.

证明. 设 \mathcal{C} 是贯理范畴, $S \hookrightarrow \mathbf{y}(c)$ 为 $J_{\mathcal{C}}^{\text{coh}}$ -覆盖筛, 由定义, 它包含一族有限个态射 $\{f_i: c_i \rightarrow c\}_{1 \leq i \leq n}$, 满足 $\bigvee_{i=1}^n \text{im } f_i = \text{id}_c$. 我们要证明若态射 $g, h: c \rightarrow d$ 满足 $gf_i = hf_i$ ($1 \leq i \leq n$), 则 $g = h$. \square


命题 5.1.14 (几种理论的语法景)

- 对于常理理论 \mathbb{T} 的语法范畴上的常理拓扑, 一族态射覆盖 (\vec{x}, ϕ) 当且仅当其中存在一个态射 $\theta: (\vec{y}, \psi) \rightarrow (\vec{x}, \phi)$ 满足 $\phi \vdash_{\vec{x}} \exists \vec{y} \theta$.
- 对于贯理 (几何) 理论 \mathbb{T} 的语法范畴上的贯理 (几何) 拓扑, 一族态射覆盖 (\vec{x}, ϕ) 当且仅当其中存在一族有限个 (任意多个) 态射 $\theta^{(i)}: (\vec{y}^{(i)}, \psi^{(i)}) \rightarrow (\vec{x}, \phi)$ 满足 $\phi \vdash_{\vec{x}} \bigvee_i \exists \vec{y}^{(i)} \theta^{(i)}$.

5.2 分类意象

The notion of classifying topos really formalizes the notion of “content” of a mathematical theory. If you discover that two theories have the same classifying topos, this means that the two theories tell the same story in different languages.

Olivia Caramello



在代数拓扑中, 对于拓扑群 G 可构造分类空间 BG , 使得 (足够好的) 空间 X 上 G -主丛的等价类一一对应于 X 到 BG 的映射同伦类 (被 BG “分类”),

$$GBund(X) \simeq [X, BG];$$

从而恒等映射 id_{BG} 对应着 BG 上一个万有 G -主丛 $EG \rightarrow BG$, 任何空间 X 上的 G -主丛都是通过某个映射 $X \rightarrow BG$ 将万有 G -主丛拉回得到.

类似地, 在许多情形下, 意象 \mathcal{C} 上的一种结构 T (即某个理论的模型) 可由它到一个特殊的意象的态射来分类, 这就是分类意象的概念; 某种结构 T 的分类意象可视为 “所有 T 构成的空间”, 也可称作 T 的模空间. 若将意象 \mathcal{C} 视为空间, 那么 \mathcal{C} 上的一个结构 T 可视为空间的 “每一点” 上都有一个结构 T , 从而这给出 \mathcal{C} 到模空间的一个几何态射. 例如, 设 \mathcal{E} 为环的分类意象, 那么 \mathcal{E} 应当视为 “所有环构成的空间” (上的层范畴), 拓扑空间 X 上的一个环层即是 X 的 “每一点” 上都有一个环, 这等同于 $\text{Sh}(X)$ 到 \mathcal{E} 的一个几何态射. 与分类空间的情况类似, 分类意象到自身的恒等态射对应着其上的 “万有 T 结构”, 又称重言 (tautological) T 结构.

对象的分类意象

命题 5.2.1

记 \mathbf{Fin} 为有限集合的范畴, 那么 \mathbf{Fin} 是一个对象在有限余极限下自由生成的范畴, 即对任意具有有限余极限的范畴 \mathcal{C} , \mathcal{C} 的对象等同于保持有限余极限的函子 $\mathbf{Fin} \rightarrow \mathcal{C}$.

证明. \mathcal{C} 的对象 X 对应函子

$$(-) \cdot X: \mathbf{Fin} \rightarrow \mathcal{C}, \quad n \mapsto X + \cdots + X (n \text{ 个 } X \text{ 的和}),$$

不难证明这个函子保持有限余极限: 注意它不仅保持有限和 (显然的), 还保持余等化子, 例如

$$\mathrm{coeq}(1 \rightrightarrows 2) \cdot X \simeq X \simeq \mathrm{coeq}(1 \cdot X \rightrightarrows 2 \cdot X).$$

另一方面, 任何保持有限余极限的函子 $F: \mathbf{Fin} \rightarrow \mathcal{C}$ 都满足 $F(n)$ 同构于 n 个 $F(1)$ 的和. \square

命题 5.2.2 (对象的分类意象)

意象 $\mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}$ 是对象的分类意象, 又称对象分类子 (object classifier), 即对任何余完备¹意象 \mathcal{C} , 有范畴等价

$$\mathcal{C} \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Topos}}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}).$$

证明. 由命题 5.2.1, $\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}}$ 是一个对象在有限极限下自由生成的范畴, 也即对任何具有有限极限的范畴 \mathcal{C} , 其对象等同于保持有限极限的函子 $\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. 而由自由余完备化的性质 (命题 A.4.9, 且注意到米田嵌入保持有限极限), 后者又对应一个函子 $\widehat{\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}}} \rightarrow \mathcal{C}$, 其保持有限极限与任意余极限; 于是这等同于几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}$. \square

注 5.2.3

命题 5.2.2 可类比于环的如下命题: 对任何环 R , 有双射

$$R \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\mathbb{Z}[x], R).$$

环 $\mathbb{Z}[x]$ 中的元素 x 是环的“万有元素”, 任何环 R 的任何元素都可以唯一地通过环同态 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow R$ 中 x 的像给出.

要找出 $\mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}$ 中的“万有对象”, 在命题 5.2.2 中取 $\mathcal{C} = \mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}$, 考虑恒等函子 $\mathrm{id}_{\mathcal{C}}$. 它对应的函子 $\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{Fin}}$ 就是米田嵌入 $\mathbf{y}_{\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}}}$. 对象 $1 \in \mathbf{Fin}^{\mathrm{op}}$ 在 $\mathbf{y}_{\mathbf{Fin}^{\mathrm{op}}}$ 下的像为

¹余完备是本节关于分类意象的讨论必不可少的条件. 本节中我们都假设所考虑的意象是余完备的, 如 Grothendieck 意象.

$\text{Hom}_{\text{Fin}^{\text{op}}}(-, 1) = \text{Hom}_{\text{Fin}}(1, -)$ 也即嵌入函子 $i: \text{Fin} \rightarrow \text{Set}$. 因此, 任何意象 \mathcal{C} 中的任何对象都可以唯一地通过几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Set}^{\text{Fin}}$ 将 i 拉回得到.

子终对象的分类意象

考虑范畴 $2 = \{0 \rightarrow 1\}$. 意象 $\text{Fun}(2, \text{Set})$ (例 1.2.7) 又称 *Sierpiński* 意象, 因为它又是 *Sierpiński* 空间上的层范畴. (*Sierpiński* 空间是有两个点 a, b 和三个开集 $\emptyset, \{a\}, \{a, b\}$ 的拓扑空间; 其上的层在 \emptyset 上取值 1, 在 $\{a\} \hookrightarrow \{a, b\}$ 上的取值为 Set 中的任意箭头, 即 2 上的预层.)

命题 5.2.4 (子终对象的分类意象)

Sierpiński 意象是子终对象的分类意象, 即对任何意象 \mathcal{C} 有范畴等价

$$\text{Sub}_{\mathcal{C}}(1) \simeq \text{Hom}_{\text{Topos}}(\mathcal{C}, \text{Fun}(2, \text{Set})).$$

证明. 对任何具有有限极限的范畴 \mathcal{C} , 其子终对象等同于保持有限极限的函子 $2 \rightarrow \mathcal{C}$. 这是因为, 若 $f: 2 \rightarrow \mathcal{C}$ 保持有限极限, 则 $f(1)$ 是 \mathcal{C} 的终对象 1, 而 $\Delta_0: 0 \rightarrow 0 \times 0$ 诱导的态射 $f(0) \rightarrow f(0 \times 0) \simeq f(0) \times f(0)$ 为同构, 这说明 $f(0)$ 为子终对象 (命题 1.3.27), 反之亦然. (另一种看法是范畴 2 等价于子终对象的 Lawvere 理论, 见例 A.9.16.) 与命题 5.2.2 的证明类似, 可得保持有限乘积的函子 $2 \rightarrow \mathcal{C}$ 等同于几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Fun}(2, \text{Set})$. \square

带基点对象的分类意象

考虑带基点有限集的范畴 Fin_* , 类似于命题 5.2.1, 可知对于具有有限余极限的范畴 \mathcal{C} , 保持有限余极限的函子 $\text{Fin}_* \rightarrow \mathcal{C}$ 等同于 \mathcal{C} 中的态射 $X \rightarrow 0$ (0 为 \mathcal{C} 的始对象). 取对偶, 可知对于具有有限极限的范畴 \mathcal{C} , 保持有限极限的函子 $\text{Fin}_*^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ 等同于 \mathcal{C} 中的态射 $1 \rightarrow X$, 也即带基点对象. 由此得如下的结论.

命题 5.2.5 (带基点对象的分量意象)

意象 $\text{Set}^{\text{Fin}_*}$ 是带基点对象的分量意象, 即对任何意象 \mathcal{C} 有范畴等价

$$\mathcal{C}_{1/} \simeq \text{Hom}_{\text{Topos}}(\mathcal{C}, \text{Set}^{\text{Fin}_*}).$$

命题理论的分类意象

2.3 节介绍了几何命题理论与位象的关系. 它是几何 (一阶) 理论与分类意象的关系的特例.

命题 5.2.6

几何命题理论 \mathbb{T} 的 Lindenbaum 代数 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}}$ (定义 2.3.15) 上的层范畴 $\text{Sh}(\mathcal{LA}_{\mathbb{T}})$ 是 \mathbb{T} 的分类意象.

证明. 回忆对任何位象 X 有 $\text{Sub}_{\text{Sh}(X)}(1) \simeq \mathcal{O}(X)$ (命题 3.6.14). 理论 \mathbb{T} 在意象 \mathcal{C} 中的一个模型是对 \mathbb{T} 的每个符号 $p \in \Sigma$ 指定一个子终对象 $U_p \rightarrow 1$, 满足 \mathbb{T} 的每条公理 (参见定义 B.2.13), 这等同于位格的同态 $\mathcal{LA}_{\mathbb{T}} \rightarrow \text{Sub}_{\mathcal{C}}(1)$, 而由位象反映的性质 (命题 3.6.17) 这等同于几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{LA}_{\mathbb{T}})$. \square

注 5.2.7

位象与几何命题理论是一个代数–几何对偶的两面. 从另一面看命题 5.2.6, 回忆任何位象都给出一个典范的几何命题理论 \mathbb{T}_X (命题 2.3.21), 我们看到任何位象 X 都可视为分类意象; “位象型意象”和“几何命题理论的分类意象”是同一类东西.

例 5.2.8

由一个符号和零条公理构成的命题理论 \mathbb{T}_1 (例 2.3.20) 在意象中的一个模型等同于一个子终对象. \mathbb{T}_1 的 Lindenbaum 代数对应 Sierpiński 空间, 因此由命题 5.2.6, 子终对象的分类意象是 Sierpinski 意象 (命题 5.2.4).

例 5.2.9 (实数的分类意象)

实数的理论 $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ (例 2.3.23) 在意象 \mathcal{C} 中的模型可理解为 \mathcal{C} 的“内蕴实数”, 或“每个点上有一个实数”. 特别地, $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ 在层意象 $\text{Sh}(X)$ 中的一个模型等同于一个位象态射 $X \rightarrow \mathbb{R}$, 即“ X 的每点上有一个实数”. 由命题 5.2.6, $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ 的分类意象是 $\text{Sh}(\mathbb{R})$. 当然, 在本例中可把 \mathbb{R} 替换为任何位象.

群的分类意象

记 Grp_{fp} 为有限表现群的范畴. 群的理论作为代数理论, 其语法范畴等价于 $\text{Grp}_{\text{fp}}^{\text{op}}$ (命题 5.1.9). 因此, 意象 \mathcal{C} 中的群等同于保持有限极限的函子 $\text{Grp}_{\text{fp}}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. 再应用预层范畴的性质, 我们得到如下结论.

命题 5.2.10 (群的分类意象)

意象 $\text{Fun}(\text{Grp}_{\text{fp}}, \text{Set})$ 是群的分类意象, 即对任何意象 \mathcal{C} 有范畴等价

$$\text{Grp}(\mathcal{C}) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{T}\text{opos}}(\mathcal{C}, \text{Fun}(\text{Grp}_{\text{fp}}, \text{Set})).$$

注 5.2.11

范畴 $\mathbf{Fun}(\mathbf{Grp}_{\text{fp}}, \mathbf{Set})$ 的一个对象可理解为“由一个抽象的群 \mathbb{G} 出发可定义的一个抽象的集合”，例如

- 最简单的, “ $\{x \in \mathbb{G} \mid \top\}$ ”, 作为函子 $\mathbf{Grp}_{\text{fp}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 它将一个有限表现群 G 对应到 G 的底层集合, 它是可表函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}_{\text{fp}}}(\langle x \rangle, -);$$

- “ $\{(x, y) \in \mathbb{G}^2 \mid x^2 = y^3\}$ ”, 作为函子 $\mathbf{Grp}_{\text{fp}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 它将一个有限表现群 G 对应到集合 $\{(x, y) \in G \mid x^2 = y^3\}$, 它是可表函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}_{\text{fp}}}(\langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle, -);$$

- “ $\{x \in \mathbb{G} \mid x \text{ 为挠元}\}$ ”, 作为函子 $\mathbf{Grp}_{\text{fp}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 它将一个有限表现群 G 对应到它的挠元的集合, 这个函子不可表, 它是可表函子的余极限

$$\mathrm{colim}_{n \in \mathbb{N}} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}_{\text{fp}}}(\langle x \mid x^n = 1 \rangle, -).$$

注意 $\mathbf{Fun}(\mathbf{Grp}_{\text{fp}}, \mathbf{Set})$ 的所有对象都是可表函子的余极限 (命题 A.4.7), 也就是由 \mathbb{G} 通过类似的过程可定义的一个抽象的集合.

这个“抽象的群” \mathbb{G} 就是群的理论在意象中的万有模型; 群的理论在任何意象 \mathcal{C} 中的任何模型都是通过某个几何态射 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Fun}(\mathbf{Grp}_{\text{fp}}, \mathbf{Set})$ 将 \mathbb{G} 拉回得到.

一般地, 一个理论的分类意象是由其一个抽象的模型 (即“万有模型”) 出发可定义的抽象集合的全体. 在例 5.2.3 中, 我们将“对象的分类意象”类比于多项式环 $\mathbb{Z}[x]$. 进一步, 一个一般的理论的分类意象, 即“具有某种额外结构的对象的分类意象”, 则可类比于多项式环的商环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$, 后者是由抽象的模型 (x_1, \dots, x_n) (模型是指方程 $f_1 = \dots = f_m = 0$ 的解) 出发可定义的抽象表达式 (即 \mathbb{Z} -系数多项式) 的全体.

环的分类意象

在理论上, 环的分类意象和群的分类意象是类似的; 但是, 环的分类意象由于代数几何的发展而获得了更重要的意义.

记 $\mathbf{Ring}_{\text{fp}}$ 为有限表现环的范畴. 回忆有限表现环即是形如 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 的环.

命题 5.2.12 (环的分类意象)

意象 $\text{Fun}(\text{Ring}_{\text{fp}}, \text{Set})$ 是环的分类意象, 即对任何意象 \mathcal{C} , 有范畴等价

$$\text{Ring}(\mathcal{C}) \simeq \text{Hom}_{\text{Topos}}(\mathcal{C}, \text{Fun}(\text{Ring}_{\text{fp}}, \text{Set})).$$

以 Aff_{fp} 表示有限表现环范畴的对偶范畴 $(\text{Ring}_{\text{fp}})^{\text{op}}$, 也即环的理论 (作为代数理论) 的语法范畴. 意象 \mathcal{C} 中的环等同于保持有限极限的函子 $F: \text{Aff}_{\text{fp}} \rightarrow \mathcal{C}$, 其米田扩张 $\tilde{F}: \widehat{\text{Aff}_{\text{fp}}} \simeq \text{Fun}(\text{Ring}_{\text{fp}}, \text{Set}) \rightarrow \mathcal{C}$ 给出命题 5.2.12 中的几何态射 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Fun}(\text{Ring}_{\text{fp}}, \text{Set})$ 的拉回部分.

回忆 \mathbb{Z} 上的 Zariski 景 (定义 3.4.25) 是 Aff_{fp} 配备仿射开覆盖 J_{Zar} 所得的景. 其上的层范畴 $\text{Sh}(\text{Aff}_{\text{fp}}, J_{\text{Zar}})$ 称为 \mathbb{Z} 上的 Zariski 意象. 它是环的分类意象的一个子意象 (即正合局部化). 我们将说明 Zariski 意象恰为局部环的分类意象, 仿佛从“所有环构成的空间”中选出了那些局部环构成的“子空间”.

向环的理论添加两个公理

$$(0 = 1) \vdash \perp, \quad x + y = 1 \vdash_{(x,y)} (\exists z \, xz = 1) \vee (\exists z \, yz = 1)$$

就得到局部环的理论 (定义 B.1.33), 它是一个贯理理论.

例 5.2.13 (拓扑空间上的局部环层)

设 X 为拓扑空间, 则由几何公式的性质 (命题 4.3.4), $\text{Sh}(X)$ 中的环 R 是局部环当且仅当每个茎 $R_x (x \in X)$ 为 Set 中的局部环. 于是带有一个局部环的意象可视为传统的局部环化空间的推广.

命题 5.2.14 (局部环与连续函子)

设 \mathcal{C} 为意象, R 为 \mathcal{C} 中的环, 对应保持有限极限的函子 $F: \text{Aff}_{\text{fp}} \rightarrow \mathcal{C}$. 则 R 为局部环当且仅当 F 构成 Zariski 景 $(\text{Aff}_{\text{fp}}, J_{\text{Zar}})$ 到 \mathcal{C} 的连续函子 (定义 3.9.17).

证明. 由定义, F 构成 Zariski 景到 \mathcal{C} 的连续函子当且仅当 F 将任意 Zariski 覆盖

$$\{\text{Spec } A_{f_i} \rightarrow \text{Spec } A\} \quad (A \in \text{Ring}_{\text{fp}}, f_1, \dots, f_n \in A \text{ 生成单位理想})$$

变为 \mathcal{C} 中的联合满射族.

一方面, 假若 F 为连续函子, 则特别地, F 将 Zariski 覆盖

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } \mathbb{Z}[x]_x & & \text{Spec } \mathbb{Z}[x]_{1-x} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \text{Spec } \mathbb{Z}[x] & \end{array}$$

变为联合满射族, 而该覆盖的像为

$$\begin{array}{ccc} \{x \in R \mid \exists y xy = 1\} & & \{x \in R \mid \exists y (1-x)y = 1\} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & R, & \end{array}$$

这说明 R 满足公式 $\vdash_x \exists y xy = 1 \vee \exists y (1-x)y = 1$; 又 F 将 $\text{Spec } 0$ (0 表示零环, $\text{Spec } 0$ 为 Aff 的始对象, 它在 Zariski 拓扑中被空集覆盖) 变为 0 , 这表明 R 满足公式 $(0=1) \vdash \perp$; 从而 R 为局部环.

另一方面, 若 R 为局部环, 则对任意自然数 n , R 满足内语言中的如下条件 (这也是局部环的等价定义):

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1 \vdash_{(x_1, \dots, x_n)} \exists y x_1 y = 1 \vee \cdots \vee \exists y x_n y = 1.$$

由此, 对任意有限生成环 A 与 A 中生成单位理想的一组元素 $f_1, \dots, f_n \in A$, $F(\text{Spec } A)$ 被

$$F(\text{Spec } A_{f_i}) = \{x \in F(\text{Spec } A) \mid \exists y f_i(x)y = 1\} \quad (1 \leq i \leq n)$$

覆盖, 这证明了 F 为 Zariski 景上的连续函子. □

这进而证明了如下结论.

命题 5.2.15 (局部环的分类意象)

\mathbb{Z} 上的 Zariski 意象是局部环的分类意象, 即对任何意象 \mathcal{C} 有范畴等价

$$\text{LocalRing}(\mathcal{C}) \simeq \text{Hom}_{\text{Topos}}(\mathcal{C}, \text{Sh}(\text{Aff}_{\text{fp}}, J_{\text{Zar}})).$$

其中 $\text{LocalRing}(\mathcal{C})$ 是 \mathcal{C} 中的局部环的范畴.

域的分类意象

回忆, 域的理论是一种贯理理论 (例 B.1.34). 记 $(\mathcal{C}_{\text{fld}}, J^{\text{coh}})$ 为域的语法景, 带有贯理拓扑 (定义 5.1.12). 由定义, 这个 Grothendieck 拓扑反映了域的理论的推理系统; 例如, 由于域理论中的公理

$$\vdash_x x = 0 \vee \exists y xy = 1,$$

景 $(\mathcal{C}_{\text{fld}}, J^{\text{coh}})$ 中对象 $\langle x \rangle$ 的两个子对象

$$(x, x = 0), \quad (x, \exists y xy = 1)$$

覆盖了 (x, \top) (命题 5.1.14).

向域的理论中加入一条公理 $\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \uparrow 1} = 0$, 就得到特征 p 域的理论. 记相应的语

法范畴为 $\mathcal{C}_{\text{fld}, p}$.

例 5.2.16 (域的特征)

域的特征可描述为几何态射

$$\begin{array}{c} \mathrm{Sh}(\mathcal{C}_{\mathrm{fld}}, J^{\mathrm{coh}}) \\ \downarrow f \\ \mathrm{Sh}(\mathrm{Spec} \mathbb{Z}), \end{array}$$

使得对于素数 p (视为 $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ 的点), 点 p 处的纤维是特征 p 域的分类意象.

回忆 $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ 对应的位格 $\mathcal{O}(\mathrm{Spec} \mathbb{Z})$ 由开子空间 U_n 生成 (例 2.1.12), 满足 $U_0 = \perp$, $U_1 = \top$, $U_{n+m} \leq U_n \vee U_m$, $U_{nm} = U_n \wedge U_m$. 考虑景的态射 (定义 3.9.2)

$$F: \mathcal{O}(\mathrm{Spec} \mathbb{Z}) \rightarrow (\mathcal{C}_{\mathrm{fld}}, J^{\mathrm{coh}}),$$

对任意整数 n , F 将 U_n 映射到

$$F(U_n) := X_n := (\emptyset, \exists x (\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n x = 1) \in \mathcal{C}_{\mathrm{fld}},$$

注意 X_n 为 $\mathcal{C}_{\mathrm{fld}}$ 的子终对象 (也是 $\mathrm{Sh}(\mathcal{C}_{\mathrm{fld}}, J^{\mathrm{coh}})$ 的子终对象) 且 $X_{nm} = X_n \wedge X_m$ (nm 可逆等价于 n 可逆且 m 可逆), $X_{n+m} \leq X_n \vee X_m$ ($n+m$ 可逆推出 n 可逆或 m 可逆). 这定义了意象间的几何态射 $f: \mathrm{Sh}(\mathcal{C}_{\mathrm{fld}}, J^{\mathrm{coh}}) \rightarrow \mathrm{Sh}(\mathrm{Spec} \mathbb{Z})$. 直观上, 每个素数 p 都对应 $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ 的一个点, 该点处 f 的纤维是“特征 p 域的分类意象”.

线性序的分类意象

定义 5.2.17 (线性序)

一个线性序是一个集合 I 带有一个关系 \leq 与两个元素 $0, 1 \in S$, 满足

- $0 \neq 1$;
- 对任意 $x \in I$, $0 \leq x$, $x \leq 1$;
- 对任意 $x \in I$, $x \leq x$;
- 对任意 $x, y \in S$, 有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$;
- 对任意 $x, y \in S$, 若 $x \leq y$, $y \leq x$, 则 $x = y$;
- 对任意 $x, y, z \in S$, 若 $x \leq y$, $y \leq z$, 则 $x \leq z$.

由上述定义, 线性序是一个贯理理论的模型, 于是其分类意象可以通过贯理理论的语法景构造 (命题 5.1.14). 但是其分类意象具有更简单的形式.

命题 5.2.18 (线性序给出单形函子)

设 $(I, \leq, 0, 1)$ 为意象 \mathcal{C} 中的线性序, 则存在“单形”函子 (参见例 A.4.14)

$$F: \Delta \rightarrow \mathcal{C}, [n] \mapsto \{(x_1, \dots, x_n) \in I^n \mid x_1 \leq \dots \leq x_n\},$$

诱导脉-几何实现伴随 (参见命题 A.4.11)

$$\mathcal{C} \xleftarrow[\frac{\perp}{N}]{|-|} \mathbf{sSet}.$$

线性序可视为实数轴上区间 $I = [0, 1]$ 的推广. 命题 5.2.18 表明, 基于实数区间构造的单纯集的脉-几何实现伴随可推广到任意线性序.

命题 5.2.19 (线性序与平坦函子)

命题 5.2.18 给出了意象 \mathcal{C} 中的线性序与平坦函子 $\Delta \rightarrow \mathcal{C}$ 之间的等价

$$\mathbf{LinearOrder}(\mathcal{C}) \simeq \mathbf{Flat}(\Delta, \mathcal{C}).$$

证明. 对于函子 $F: \Delta \rightarrow \mathcal{C}$, 记 $F([n])$ 为 Δ^n . 由定义 3.9.14, F 为平坦函子当且仅当

- $\Delta^0 \rightarrow 1$ 为满射;
- 给定 $[k], [\ell]$, $\{\Delta^n \rightarrow \Delta^k \times \Delta^\ell\}$ 为联合满射族;
- 给定 $u, v: [k] \rightarrow [\ell]$, $\{\Delta^n \rightarrow \text{eq}(\Delta^k \rightrightarrows \Delta^\ell)\}_{[n] \rightarrow [k]}$ 等化 u, v 为联合满射族.

一方面, 对于线性序 $(I, \leq, 0, 1)$, 命题 5.2.18 构造的函子 F 是平坦函子. 例如两个态射 $\Delta^2 \rightarrow \Delta^1 \times \Delta^1$ 构成联合满射族, 如图,



这是由于线性序的公理 $x \leq y \vee y \leq x$. 而对于给定的映射 $u, v: [k] \rightarrow [\ell]$, 其在范畴 Δ 中具有等化子 $[n] \rightarrow [k]$, 线性序的公理表明对应的两个映射 $\Delta^k \rightarrow \Delta^\ell$ 的等化子恰为 $[n] \rightarrow [k]$ 对应的嵌入 $\Delta^n \rightarrow \Delta^k$.

另一方面, 给定平坦函子 $F: \Delta \rightarrow \mathcal{C}$, 令 $I = \Delta^1, \leq$ 为子对象 $\Delta^2 \rightarrow \Delta^1 \times \Delta^1$, $0, 1$ 分别为两个元素 $1 \simeq \Delta^0 \rightarrow \Delta^1$, 即得到线性序 $(I, \leq, 0, 1)$. □

这证明了如下结论.

命题 5.2.20

单纯集的范畴 \mathbf{sSet} 是线性序的分类意象, 即对任何意象 \mathcal{C} , 命题 5.2.18 给出范畴等价

$$\mathbf{LinearOrder}(\mathcal{C}) \simeq \mathbf{Hom}_{\mathcal{T}_{\text{opos}}}(\mathcal{C}, \mathbf{sSet}).$$

 G -旋子的分类意象
定义 5.2.21 (群作用, 内蕴)

设 \mathcal{C} 为具有有限极限的范畴, G 为 \mathcal{C} 中的群, 其乘法映射与单位元分别为 $m: G \times G \rightarrow G, e: 1 \rightarrow G$. 设 X 为 \mathcal{C} 的对象. 定义 X 上的 G -左作用为一个映射 $\rho: G \times X \rightarrow X$, 满足如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\rho} & G \times X \\ m \downarrow & & \downarrow \rho \\ G \times X & \xrightarrow{\rho} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{e} & G \times X \\ \text{id}_X \searrow & & \downarrow \rho \\ & & X \end{array}$$

等价地, 群作用也可定义为半群的同态 $G \rightarrow X^X$.

定义 5.2.22 (群作用, 外蕴)

设 G 为 (\mathbf{Set} 中的) 群, \mathcal{C} 为范畴. 记 BG 为仅有一个对象 $*$ 的范畴, 其中 $*$ 的自同构群为 G . 定义 \mathcal{C} 中对象 X 上的 G -左作用为函子 $BG \rightarrow \mathcal{C}$, 将 $*$ 对应到 X . 换言之, G -左作用为半群的同态 $G \rightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$.

命题 5.2.23

设 G 为 (\mathbf{Set} 中的) 群, \mathcal{C} 为意象, $\underline{G} \in \mathcal{C}$ 是 G 对应的常值层, 那么 \mathcal{C} 中对象的 (外蕴) G -左作用等同于 (内蕴) \underline{G} -左作用.

证明. 常值层为整体截面的左伴随 (命题 3.8.3), 故 \mathcal{C} 中的态射 $\underline{G} \rightarrow X^X$ 等同于 \mathbf{Set} 中的态射 $G \rightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(1, X^X) \simeq \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$. 容易验证两者要成为群作用需满足的性质相等价. \square

下面的概念是“空间上的 G -主丛”的推广.

定义 5.2.24 (意象上的 G -旋子)

设 G 为群. 定义 \mathcal{C} 上的一个 G -旋子²(torsor) 为 \mathcal{C} 的对象 T , 带有 G -左作用 (也即 G -左作用) $\mu: G \times T \rightarrow T$, 满足

- (i) 映射 $T \rightarrow 1$ 为满射, 即 T 有物 (关于有物与非空的讨论, 见 4.1.14);
- (ii) 映射 $(\mu, \pi_2): G \times T \rightarrow T \times T$ 为同构.

记 \mathcal{C} 上的 G -旋子构成范畴为 $\text{Tors}_G(\mathcal{C})$, 其中态射是保持 G -左作用的映射.

例 5.2.25 (集合范畴中的 G -旋子)

由于集合范畴 Set 是一个点上的层范畴, Set 中的 G -旋子即是“一个点上的 G -主丛”, 即一个非空集合 T , 带有 G -左作用 $\mu: G \times T \rightarrow T$, 满足 $(\mu, \pi_2): G \times T \rightarrow T \times T$ 为双射. 后一个条件等价于这个作用是自由且传递的: “自由”等价于 $(\mu, \pi_2): G \times T \rightarrow T \times T$ 为单射, “传递”等价于其为满射.

另一种看法是, 两个映射 $\mu, \pi_2: G \times T \rightarrow T$ 给出了一个范畴 (具体地, G 在 T 上作用的作用群胚) 的箭头集合到对象集合的两个映射, 分别将一个箭头映射到其终点与起点. 那么 $(\mu, \pi_2): G \times T \rightarrow T \times T$ 为双射就是说, 作用群胚的任何两个对象 x, y 之间有且仅有一个态射 $x \rightarrow y$.

例 5.2.26 (空间上的 G -主丛)

仍设 G 为离散群. 拓扑空间 X 上的 G -主丛等价于平展映射 $E \rightarrow X$, 带有 X 上的 G -左作用 $G \times E \rightarrow E$, 使得每个纤维 E_x 非空且带有 G 的自由传递作用. 这等价于层意象 $\text{Sh}(X)$ 上的 G -旋子.

意象上的旋子是如下理论模型.

定义 5.2.27 (G -旋子的理论)

设 G 为离散群, 定义 G -旋子的理论 \mathbb{T}_G . 其中只有一个类型 T , 对每个元素 $g \in G$ 都有一个一元函数符号 g , 公理如下.

- (群作用) 对每一对 $g, h \in G$ 有一条公理 $\vdash_x g(hx) = (gh)x$ (注意这里没有用到任意量词 \forall);
- (有物) $\vdash \exists x. T$;

²Torsor 似乎没有通行的中文译名, 这可能是因为它在拓扑学中一般被称作主丛. 这里我跟随我的一位老师将其译为旋子.

- (自由性) 对每一对不同的 $g, h \in G$ 有一条公理 $(gx = hx) \vdash_x \perp$ (同上, 这里没有用到 \forall);
- (传递性) $\vdash_{(x,y)} \bigvee_{g \in G} gx = y$.

理论 \mathbb{T}_G 是一种几何理论 (定义 B.1.21), 因为它用到了“真” \top , 存在量词 \exists , “假” \perp 和无穷析取 \bigvee .

命题 5.2.28

设 G 为群, 则意象 \mathcal{E} 中的 G -旋子等同于平坦函子 $BG \rightarrow \mathcal{E}$.

证明. 设 $F: BG \rightarrow \mathcal{E}$ 为任意函子, 记 $T = F(*)$; 函子 F 对应 T 上的一个 G -左作用, 记 $g \in G$ 的作用为 $\rho_g: T \rightarrow T$. 由平坦函子的刻画 (命题 3.9.14, 注 3.9.15), 函子 $F: BG \rightarrow \mathcal{E}$ 平坦当且仅当如下条件成立:

- $T \rightarrow 1$ 为满射;
- $\{(\rho_g, \rho_{g'}): T \rightarrow T \times T\}_{g, g' \in G}$ 为联合满射族;
- 对任意 $g \neq g'$, $\text{eq}(\rho_g, \rho_{g'}: T \rightrightarrows T) \simeq 0$.

这恰好是 G -旋子的定义中的三个条件 (有物, 传递, 自由). □

几何理论的分类意象

定义 5.2.29 (几何理论的语法景和分类意象)

设 \mathbb{T} 为一几何理论.

$\text{Sh}(\mathcal{C}_{\mathbb{T}},)$

Grothendieck 意象作为分类意象

正如每个位象都是某个几何命题理论的分类位象 (2.3.21), 每个 Grothendieck 意象 $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 也都是某个几何理论的分类意象; 特别地, $\text{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的点 (命题 3.9.12) 等同于该理论在 \mathbf{Set} 中的模型.

第 6 章 意象理论的应用

6.1 非标准分析

非标准分析起源于对无穷小与极限等概念的重新审视. 不同于 Cauchy–Weierstrass 的 ε - δ 方法, 它将无穷小量视为扩充实数集中实实在在的对象. 一种称作传达原理的工具提供了经典分析与非标准分析之间的桥梁.

基本概念

首先我们介绍比较经典的非标准分析的概念.

定义 6.1.1 (超滤)

偏序集中的滤子是关于交封闭的向上封闭子集 (参见 “位象的点”, 定义 2.1.11 后的注). Boole 代数 B 上的超滤是 Boole 代数同态 $B \rightarrow \{\perp, \top\}$ 下 \top 的原像. 超滤 \mathcal{F} 也可由如下等价的条件之一定义:

- \mathcal{F} 是极大的真滤子;
- \mathcal{F} 是真滤子, 且对任意 $a \in B$, 要么 $a \in \mathcal{F}$, 要么 $\neg a \in \mathcal{F}$.

集合 S 上的超滤是指 Boole 代数 2^S 上的超滤.

集合 S 上的超滤的直观是指定一些子集 $I \subset S$ 为 “重要” 的, “重要” 是指当 S 上的一个命题在 I 上成立时, 我们就认为该命题 “几乎处处” 成立. 由定义, “重要” 子集的补集一定是不 “重要” 的.

注 6.1.2

一个集合上超滤构成的空间是其子集 Boole 代数的 Stone 空间, 这是代数–几何对偶的一例. 参见定义 2.1.11 后的注, 以及 2.3 节.

超滤给出了非标准实数的一种定义.

定义 6.1.3 (非标准实数)

取定 \mathbb{N} 上的一个超滤 \mathcal{F} , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 单元集 $\{n\}$ 不属于 \mathcal{F} . 考虑所有序列 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. 定义序列的等价关系 \sim , 对于 $f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $f \sim g$ 当且仅当

$$\{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = g(n)\} \in \mathcal{F},$$

也即 f 与 g “几乎处处相等”, 其中“几乎处处”是相对于 \mathcal{F} 而言的. 定义非标准实数为上述序列的等价类. 还可定义非标准实数的序关系: 对于非标准实数 f, g , $f < g$ 当且仅当

$$\{n \in \mathbb{N} \mid f(n) < g(n)\} \in \mathcal{F}.$$

非标准实数的另一种抽象的定义是, 非标准实数的集合是如下的极限, 称为 \mathbb{N} 个 \mathbb{R} 关于超滤 \mathcal{F} 的超积 (ultraproduct).

$$\operatorname{colim}_{I \in \mathcal{F}} \prod_{i \in I} \mathbb{R}.$$

当然, 不仅是实数, 对任意集合 S 我们都可以依照上述方法定义 S 的非标准元素.

命题 6.1.4 (传达原理)**例 6.1.5****滤商**

基于超滤的非标准实数可理解为某个意象中的实数, 这个意象来自一种叫做滤商 (filterquotient) 的构造. 一般地, 对于意象 \mathcal{C} 的子终对象 (定义 1.3.26) 的滤子 \mathcal{U} , 可定义滤商 \mathcal{C}/\mathcal{U} .

定义 6.1.6 (意象的滤商)

余极限

$$\mathcal{C}/\mathcal{U} := \operatorname{colim}_{U \in \mathcal{U}} \mathcal{C}/U$$

超滤范畴

[未完成:]

6.2 可计算性理论与有效意象

通常数学中可定义的函数不一定能在计算机上编程计算,其中最著名的是停机问题:不存在一个程序能够判断任何程序是否停机. 研究类似问题的学科称作可计算性理论. 有效意象 (effective topos) \mathbf{Eff} 是一个可用内语言研究可计算性理论的意象,或用一种诗意的表达,是“可计算数学的世界”(相对于 \mathbf{Set} 是“通常数学的世界”).

基础知识

首先我们需要用形式化的语言描述计算的概念. 我们知道,通用的计算机是这样工作的:

- 计算机可以执行一些 (有限个) 基本指令 (instructions); 程序 (program) 是有限个指令的序列 (特别地,这意味着只有可数个程序);
- 计算机可以存储,输入或输出数据 (data)¹, 程序也是一种数据;
- 计算机一次只执行一条指令².

数据是多种多样的,例如一个程序可以作为数据输入另一个程序,两个数据可以放在一起成为一个数据. 为了将所有数据表示为同一种东西,我们需要编码 (code). 一种常用的编码是 Gödel 数,它将任何一个数据对应到一个确定的自然数;我们不需要其细节,而只要知道如下性质:

-
- 对于两个自然数 n, m , 数对 (n, m) 可编码为一个自然数,记为 $\langle n, m \rangle$;

若以 Gödel 数来编码所有数据,则我们考虑的程序是 \mathbb{N} 到 \mathbb{N} 的某种函数;它在可计算性理论中称为部分递归函数 (partial recursive function).

定义 6.2.1 (部分递归函数)

对于集合 X, Y , 部分函数 $f: X \rightarrow Y$ 是指定义在 X 的一个子集上取值于 Y 的函数. 对于 $x \in X$, 以符号 $f(x) \downarrow$ 表示 $f(x)$ 有定义. 在部分函数 $\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N} (k \geq 0)$ 中, 归纳地定义基础递归函数 (primitive recursive function):

- 常值函数 $\bar{n}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto n$ 是基础递归函数;
- 后继 $\text{succ}: n \mapsto n + 1$ 是基础递归函数;
- 投影 $(x_1, \dots, x_k) \mapsto x_i$ 是基础递归函数;

¹我们假设储存空间是无限的.

²并行计算机可一次执行多条指令,但它不改变计算的能力,只是增加计算的效率.

- 基础递归函数的复合是基础递归函数;
- 给定基础递归函数 $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ 以及 $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$, 如下定义的函数 f 也是基础递归函数, 这个过程称作基础递归 (primitive recursion):

$$\begin{aligned} f(0, x_1, \dots, x_k) &= g(x_1, \dots, x_k), \\ f(n+1, x_1, \dots, x_k) &= h(n, f(n, x_1, \dots, x_k), x_1, \dots, x_k). \end{aligned}$$

若子集 $A \subset \mathbb{N}$ 的特征函数 1_A 是基础递归函数, 则称之为基础递归谓词.

例 6.2.2 (常见的基础递归函数)

很多函数都是基础递归函数.

- 加法 $+: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 是基础递归函数, 基础递归函数.
因为它有如下定义:
$$\begin{aligned} 0 + x &= x, \\ (n+1) + x &= \text{succ}(n + x). \end{aligned}$$
- 谓词 “等于零” iszero 是基础递归谓词:
$$\begin{aligned} \text{iszero}(0) &= 1, \\ \text{iszero}(n+1) &= 0. \end{aligned}$$
- 乘法, 幂, 阶乘都是基础递归函数.
- 谓词 “大于等于”, “等于”, “是素数” 都是基础递归谓词.
- 前驱 $\text{pred}: n \mapsto \begin{cases} 0 & n = 0 \\ n-1 & n > 0 \end{cases}$ 是

定义 6.2.3 (部分递归函数)

部分递归函数的定义是在基础递归函数的基础上增加如下操作: 给定[未完成:]

定义 6.2.4 (实现)

归纳地定义 “自然数 n 实现公式 φ ” 如下 (关于公式, 见定义 B.1.12, B.1.14):

- φ 为原子公式 (关系或等式). 当 φ 取值为真时, 我们称 0 实现 φ ;
- $\varphi = (\psi \wedge \chi)$. 当 m 实现 ψ 且 n 实现 χ 时, 我们称 $\langle m, n \rangle$ 实现 φ ;
- $\varphi = (\psi \vee \chi)$. 当 m 实现 ψ 时, 我们称 $\langle 0, m \rangle$ 实现 φ , 当 n 实现 χ 时, 我们称 $\langle 1, n \rangle$ 实现 φ ; (注意: $\psi \vee \chi$ 要被实现, 必须要明确指出 ψ, χ 中的某一个被实现)
- $\varphi = (\psi \Rightarrow \chi)$. 若每当 m 实现 ψ 时, 都有 $n(m)$ 良定义且 $n(m)$ 实现 χ , 我们称 n 实现 φ ;

- [未完成:]

部分组合代数

定义 6.2.5 (部分组合代数)

一个部分组合代数 (partial combinatory algebra, PCA) 是一个集合 A 带有一个部分的二元运算 $A \times A \rightarrow A$ (符号 \rightarrow 表示部分函数, 即定义在子集上的函数, 以 $x \downarrow$ 表示 x 有定义), 满足如下条件:

- 存在 $k \in A$, 使得 $kx \downarrow$, 且 $(kx)y = x$;
- 存在 $s \in A$, 使得 $sx \downarrow$, $(sx)y \downarrow$, 且 $((sx)y)z = (xz)(yz)$.

直观上, A 的一个元素是一段数据 (程序也是一种数据), 二元运算 xy 是程序 x 对输入 y 的输出.

6.3 代数几何的函子观点

代数几何中的函子观点将概形视为某种特殊的函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Set}$, 也即“环范畴上的变集合”. (此处的环是指交换环.) 对于环 A , 一个概形的“ A -点”即是这个函子在阶段 A 的元素. 一个概形可理解为同时所有环上解一个方程组, 例如 Fermat 概形为函子

$$A \mapsto \{(x, y, z) \in A^3 \mid x^n + y^n = z^n\},$$

它在阶段 \mathbb{R} 当然有点, 而人们关心的是其在阶段 \mathbb{Q} 是否就有点.

Ingo Blechschmidt 的博士论文 [4] 指出, 在函子观点下, 我们考虑的对象生活在一个意象中, 这个意象的内语言即可用于对这些对象进行各种操作与推理.

定义 6.3.1 (仿射直线与仿射空间, 函子定义)

定义仿射直线 (affine line) \mathbb{A}^1 为遗忘函子

$$\mathbb{A}^1: \text{Ring} \rightarrow \text{Set}, A \mapsto A.$$

换言之, 仿射直线的 A -点等同于 A 的元素. 对于自然数 n , 定义仿射空间 \mathbb{A}^n 为 $(\mathbb{A}^1)^n$, 即函子 $A \mapsto A^n$. (回忆函子范畴中的极限是逐对象的.)

由于 \mathbb{A}^1 是环范畴到集合范畴的遗忘函子, 它自然带有一个环结构. 因此在内语言中我们可以像操作一个普通的环一样操作 \mathbb{A}^1 . 例如, 对任何整系数多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$, 有多项式映

射 $f: \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^1$.

例 6.3.2 (多项式方程的解)

设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 为整系数多项式. f 在 \mathbb{A}^1 上的“解集”

$$\{x \in \mathbb{A}^1 \mid f(x) = 0\}$$

为函子

$$\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}, A \mapsto \{x \in A \mid f(x) = 0\}.$$

这是因为它按定义是如下的拉回, 而拉回是逐对象计算的.

$$\begin{array}{ccc} \{x \in \mathbb{A}^1 \mid f(x) = 0\} & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow 0 \\ \mathbb{A}^1 & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}^1 \end{array}$$

一般地, 设 $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 为整系数多项式, 其“解集”

$$\{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n \mid f_1(x) = \dots = f_m(x) = 0\}$$

为函子

$$\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}, A \mapsto \{x = (x_1, \dots, x_n) \in A^n \mid f_1(x) = \dots = f_m(x) = 0\}.$$

使用含 $\vee, \Rightarrow, \exists$ 等逻辑符号的公式可以定义更多对象. 如下将所谓乘法群概形定义为 \mathbb{A}^1 的一个子集.

定义 6.3.3 (乘法群概形, 内语言定义)

乘法群概形 \mathbb{G}_m 是 \mathbb{A}^1 中的“可逆元构成的子集”:

$$\mathbb{G}_m := \{x \in \mathbb{A}^1 \mid \lceil x \text{ 可逆} \rceil\} = \{x \in \mathbb{A}^1 \mid \exists y \in \mathbb{A}^1 xy = 1\}.$$

一般地, 群概形 GL_n 是 $(\mathbb{A}^1)^{n \times n}$ 中可逆矩阵构成的子集:

$$\begin{aligned} GL_n &:= \{M \in (\mathbb{A}^1)^{n \times n} \mid \lceil M \text{ 可逆} \rceil\} \\ &= \{M \in (\mathbb{A}^1)^{n \times n} \mid \exists N \in (\mathbb{A}^1)^{n \times n} MN = NM = 1\}. \end{aligned}$$

由定义, \mathbb{G}_m 是 $\{(x, y) \in \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1 \mid xy = 1\}$ 在第一分量投影下的像, 故 \mathbb{G}_m 作为函子可具体表示为

$$\mathbb{G}_m: \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}, A \mapsto \{x \in A \mid x \text{ 可逆}\}.$$

命题 6.3.4 (\mathbb{A}^1 是“域”)

\mathbb{A}^1 是一个“域”. 这句话的意思是如下公式成立,

$$\forall x \in \mathbb{A}^1 (x \neq 0 \Rightarrow \lceil x \text{ 可逆} \rceil).$$

(回忆 $x \neq 0$ 是指 $\neg(x = 0)$, 即 $(x = 0) \Rightarrow \perp$.) 因此, “乘法群概形” \mathbb{G}_m 也可表示为

$$\mathbb{G}_m = \{x \in \mathbb{A}^1 \mid x \neq 0\}.$$

证明. 由层语义 (定义 4.2.6), 对于 $x_0 \in \mathbb{A}^1(A) = A$, $A \models (x_0 \neq 0)$ 的含义是对任意环同态 $\varphi: A \rightarrow B$, 若 $\varphi(x_0) = 0$, 则 $B = 0$ (零环). 令 $B = A/(x_0)$, 考虑投影映射 $\varphi: A \rightarrow B$, 得 $B = 0$, 即 (x_0) 是 A 的单位理想, x_0 在 A 中可逆.

□

定义 6.3.5 (射影空间, 内语言定义)

射影空间 \mathbb{P}^n 是 \mathbb{A}^{n+1} 中“过原点的直线的集合”:

$$\mathbb{P}^n := \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^{n+1} \mid x_0 \neq 0 \vee \dots \vee x_n \neq 0\} / \sim,$$

其中 \sim 是如下等价关系.

$$x \sim x' \quad \text{当且仅当} \quad \exists \lambda \in \mathbb{G}_m \ x' = \lambda x.$$

定义 6.3.6 (仿射概形, 函子定义)

定义仿射概形为可表函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Set}$. 对于环 A , 记

$$\text{Spec } A = \text{Hom}(A, -): \text{Ring} \rightarrow \text{Set}.$$

由米田引理, 仿射概形的范畴 Aff 等价于 Ring^{op} .

例 6.3.7

- 仿射直线 \mathbb{A}^1 是仿射概形 $\text{Spec } \mathbb{Z}[x]$; 这是因为环同态 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow A$ 一一对应于 A 的元素.
- 仿射概形的和, 积均为仿射概形: $\text{Spec } A + \text{Spec } B \simeq \text{Spec}(A \times B)$, $\text{Spec } A \times \text{Spec } B \simeq \text{Spec}(A \otimes B)$.

“小”意象与“大”意象

6.4 综合微分几何与光滑无穷小分析

代数几何的函子观点可类似地用于微分几何.

综合微分几何的理论

我们首先在本小节叙述一种偏向语法的,“公理化”的理论,而暂时不关心其模型.我们将看到这种理论的语法比通常的微分几何更加符合直观.

公理 6.4.1 (空间)

综合微分几何所谓的空间 (或称集合) 是一个固定的意象 \mathcal{E} 中的对象; 光滑映射 (或称映射) 是 \mathcal{E} 中的态射.

公理 6.4.2 (直线)

综合微分几何所谓的直线是 \mathcal{E} 中一个固定的环 R .

注 6.4.3

字母 R 提示了这个对象与通常微分几何的对象 \mathbb{R} 在直观上的相似性, 但它与 \mathbb{R} 有不同的性质, 如“幂零无穷小量”的存在性. 因此, 我们不能要求 R 是域.


定义 6.4.4 (直线上原点的一阶无穷小邻域)

定义 R 上“原点的一阶无穷小邻域”

$$D = \{x \in R \mid x^2 = 0\}.$$

例 6.4.5 (相切曲线的共同切向量)

平面 R^2 上的直线 $y = 0$ 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的交集是 D . 这是因为将 $y = 0$ 代入圆的方程, 就得到 $x^2 + 1 = 1$, 也即 $x^2 = 0$.



直观上, 直线与圆相切, 两者在相切处有一条公共的“无穷小线段”. 更一般地, 任意

两条相切的曲线都有一条公共的形如 D 的无穷小线段, 这便是两条曲线共同的切向量.

Kock–Lawvere 公理与导数

公理 6.4.6 (Kock–Lawvere 公理)

对任意映射 $f: D \rightarrow R$, 存在唯一的 $a, b \in R$, 使得

$$f(d) = a + d \cdot b, \quad \forall d \in D.$$

换言之, 作为 R -代数有

$$\text{Hom}(D, R) \simeq R[x]/(x^2).$$

Kock–Lawvere 公理反映了如下的直观: R 上的一个函数在一个很小的邻域上近乎是一次函数. 由此, 我们立刻得到如下的推论.

命题-定义 6.4.7 (导函数)

对任意函数 $f: R \rightarrow R$, 存在唯一的函数 $f': R \rightarrow R$ 满足

$$f(x + d) = f(x) + d \cdot f'(x), \quad \forall x \in R \forall d \in D.$$

称 f' 为 f 的导函数. 归纳地定义 k 阶导数 $f^{(k)}(x)$.

也就是说, 综合微分几何要求任何函数 $R \rightarrow R$ 都是任意次可导的.

Weil 代数与无穷小几何对象

无穷小线段 D 对应代数 $R[x]/(x^2)$. 一般地, 在代数–几何对偶中与无穷小几何对象相对应的代数是 R 上的 Weil 代数³.

定义 6.4.8 (Weil 代数)

Weil 代数是形如 $W = R \oplus J$ 的 R -代数, 其中 J 是有限生成自由 R -模, 且为幂零理想. 等价地,

$$W = R[x_1, \dots, x_n]/I,$$

且存在正整数 N 使得 $x_i^N \in I (i = 1, \dots, n)$.

³Weil 代数有两种含义, 这里所说的不是来自 Lie 代数的那种 Weil 代数.

注 6.4.9

上面的概念在“经典数学”(经典逻辑)中对应局部 *Artin* 代数, 其中 Artin 代数是指不存在无限的理想下降链(这称为下降链条件)的代数. 设 k 为域, A 是局部 Artin k -代数, \mathfrak{m} 是 A 的唯一极大理想, 并且额外假设 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 是同构. 可以证明⁴ $A \simeq k \oplus \mathfrak{m}$, \mathfrak{m} 是有限维 k -线性空间且为幂零理想. 定义 6.4.8 即是这个结果的类比.

局部 Artin 环在代数几何的形变理论中有重要作用, 这正是因为它对应无穷小几何对象.

定义 6.4.10 (Weil 代数的谱)

对于 Weil 代数 W , 定义 W 的谱为 R -代数同态的空间

$$\mathrm{Spec} W = \mathrm{Hom}_{R\mathrm{Alg}}(W, R),$$

称之为无穷小几何对象.

例 6.4.11 (常见的无穷小几何对象)

- 点

$$\mathrm{pt} \simeq \{x \in R \mid x = 0\} = \mathrm{Spec} R;$$

- 无穷小线段的平方

$$D^2 \simeq \{(x, y) \in R^2 \mid x^2 = y^2 = 0\} = \mathrm{Spec} R[x, y]/(x^2, y^2);$$

- R^2 上原点的一阶无穷小邻域

$$D(2) := \{(x, y) \in R^2 \mid x^2 = xy = y^2 = 0\} = \mathrm{Spec} R[x, y]/(x^2, xy, y^2);$$

- 高阶无穷小邻域

$$D_k := \{x \in R \mid x^{k+1} = 0\} = \mathrm{Spec} R[x]/(x^{k+1}) \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

前面介绍的 Kock–Lawvere 公理可表述为 $\mathrm{Hom}(\mathrm{Spec} R[x]/(x^2), R) \simeq R[x]/(x^2)$. 类似地有如下公理.

⁴由中山 (Nakayama) 引理以及下降链条件可得 \mathfrak{m} 幂零; 又由下降链条件可得每个 $\mathfrak{m}^j/\mathfrak{m}^{j+1}$ 是有限维 k -线性空间, 从而 A 是有限维 k -线性空间.

公理 6.4.12 (Kock–Lawvere 公理)

对于 Weil 代数 W , 有

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Spec} W, R) \simeq W.$$

注 6.4.13 (Weil 代数与 Kock–Lawvere 公理的直观)

设 $W = R \oplus J$ 是 Weil 代数. 投影 $W \rightarrow R$ 对应点 pt 到无穷小几何对象 $\mathrm{Spec} W$ 的原点的嵌入

$$\mathrm{pt} = \mathrm{Spec} R \rightarrow \mathrm{Spec} W.$$

Kock–Lawvere 公理说的是 Weil 代数 W 等同于 $\mathrm{Spec} W$ 上的函数代数. 投影 $W \rightarrow R$ 可视为 $\mathrm{Spec} W$ 上的函数在原点处取值; 理想 J 是投影 $W \rightarrow R$ 的核, 可视为在原点取值为 0 的函数的集合. 要求 J 为幂零理想, 也即要求在原点取值为 0 的函数都幂零, 直观上说明 $\mathrm{Spec} W$ 是“无穷小”的.

Lawvere 以如下的性质刻画无穷小几何对象.

定义 6.4.14 (无穷小对象, 奇妙右伴随)

对于空间 S , 若 $(-)^S$ 有右伴随, 则称 S 为无穷小对象. 记该右伴随为 $(-)_S$, 称之为奇妙右伴随 (amazing right adjoint).

例 6.4.15

在集合范畴 \mathbf{Set} 中, 只有终对象 1 是无穷小对象.

注 6.4.16

回忆对意象中任意对象 S , $(-)^S$ 都有左伴随 $(-) \times S$, 而 $(-)^S$ 有右伴随是非常稀奇的事情. 重要的是此时 $(-)^S$ 保持余极限. 一个直观如下. 设空间 X 被一族空间 U_i 覆盖 (X 可写成 U_i 和 $U_i \times_X U_j$ 的某种余极限), 那么 X^S 也被 U_i^S 覆盖, 即 S 到 X 的任何映射都必须穿过某个 U_i ; 这是 S 的像“太小”导致的.

类似的性质在不是意象的范畴中也有用处. 例如 Abel 群范畴 \mathbf{Ab} 中, 函子 $\mathrm{Hom}(A, -)$ 保持余极限当且仅当 A 是有限生成投射 \mathbb{Z} -模, 这也是一种“小”的性质.

[未完成: 使用 SDG 的例子, 如 Riemann 曲率]

[未完成: 无穷小对象的定义, amazing right adjoint]

综合微分几何的模型

本小节介绍综合微分几何的一些模型. 相对简单的模型就能实现 Kock–Lawvere 公理; 而为了使模型满足更多的公理, 以及更加贴近传统的微分几何 (更加 “有用”), 我们就需要作越来越复杂的调整. 构造综合微分几何模型的贯穿始终的思想是代数–几何对偶.

“代数” 模型

首先考虑一个最简单的模型.

定义 6.4.17

考虑有限表现仿射 \mathbb{R} -概形范畴 $\mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}^{\text{op}}$. 回忆, 有限表现 \mathbb{R} -代数即形如 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 的代数; 对于有限表现 \mathbb{R} -代数 A , 以 $\text{Spec } A$ 表示其在对偶范畴中的化身.

所谓代数模型 (algebraic model) 是 $\mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}^{\text{op}}$ 上的层意象

$$\text{Fun}(\mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}^{\text{op}}, \text{Set}).$$

定义 6.4.18 (直线)

定义 直线

$$R := \mathcal{Y}(\text{Spec } \mathbb{R}[x]).$$

注 6.4.19

这里考虑的意象是 \mathbb{R} -代数的分类意象, 而 R 是其中的一般 \mathbb{R} -代数 (generic \mathbb{R} -algebra).

这些结论对有限生成 \mathbb{R} -代数范畴同样成立.

注意到对 $A \in \mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}$,

$$R(A) = \text{Hom}_{\mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}^{\text{op}}}(\text{Spec } A, \text{Spec } \mathbb{R}[x]) = \text{Hom}_{\mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}}}(\mathbb{R}[x], A) \simeq A \text{ (作为集合)},$$

我们发现, R 正是代数范畴到集合范畴的遗忘函子

$$R \simeq \text{遗忘}: \mathbb{R}\mathbf{Alg}_{\text{fp}} \rightarrow \text{Set}.$$

因此, 使用米田方法, 我们就得到

命题 6.4.20

R 是交换环.

有了 R , 我们考虑 “由方程定义的子流形”

$$M = \{(x_1, \dots, x_n) \in R^n \mid f_1 = \dots = f_m = 0\},$$

其中 $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 是多项式. 其范畴语义为拉回

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^n & \xrightarrow{(f_1, \dots, f_m)} & R^m, \end{array}$$

对应 $\mathbb{R}\mathbf{Alg}$ 中的推出

$$\begin{array}{ccc} ? & \longleftarrow & \mathbb{R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n] & \xleftarrow{y_i \mapsto f_i} & \mathbb{R}[y_1, \dots, y_m], \end{array}$$

故

$$M = \mathfrak{J}(\mathrm{Spec} \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n] / (f_1, \dots, f_m)).$$

定义 6.4.21 (直线上原点的一阶无穷小邻域)

定义

$$D := \{x \in R \mid x^2 = 0\} = \mathfrak{J}(\mathrm{Spec} \mathbb{R}[x] / (x^2)).$$

我们验证它满足公理 6.4.6, 以外部语言叙述即

命题 6.4.22

$$R^D(A) \simeq A[x] / (x^2).$$

证明. 由预层意象指数对象的构造 (命题 3.3.9 的证明),

$$\begin{aligned} R^D(A) &= \mathrm{Hom}(\mathfrak{J}(\mathrm{Spec} A) \times D, R) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\mathfrak{J}(\mathrm{Spec} A) \times \mathfrak{J}(\mathrm{Spec} \mathbb{R}[x] / (x^2)), \mathfrak{J}(\mathrm{Spec} \mathbb{R}[x])) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\mathfrak{J}(\mathrm{Spec} A \times \mathrm{Spec} \mathbb{R}[x] / (x^2)), \mathfrak{J}(\mathrm{Spec} \mathbb{R}[x])) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}\mathbf{Alg}}(\mathbb{R}[x], A \otimes \mathbb{R}[x] / (x^2)) \\ &\simeq A \otimes \mathbb{R}[x] / (x^2) \simeq A[x] / (x^2) \text{ (作为集合)}. \end{aligned}$$

其中用到 \mathbb{R} -代数的张量积是 $\mathbb{R}\mathbf{Alg}$ 中的和, 即 $\mathbb{R}\mathbf{Alg}^{\mathrm{op}}$ 中的积. □

光滑代数

\mathbb{R} -代数上的运算是多项式运算; 若将多项式运算扩充为全体“光滑”运算, 则可产生一个更接近微分几何的模型.

定义 6.4.23 (光滑代数)

光滑代数 (C^∞ -代数) 是指满足如下条件的集合 A : 对每个非负整数 n 与每个 n 元光滑函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ 都有一个 n 元运算, 称为光滑运算 $A(f): A^n \rightarrow A$, 使得 $f \mapsto A(f)$ 保持复合, 即对于 $h = g \circ (f_1, \dots, f_k)$, 有

$$A(h) = A(g) \circ (A(f_1), \dots, A(f_k)).$$

换言之, 光滑代数是 Lawvere 理论 \mathbf{CartSp} 的模型 (例 A.9.17). 光滑代数的同态是保持所有光滑运算的映射. 记光滑代数的范畴为 $C^\infty\mathbf{Alg}$.

注 6.4.24

如上定义的 C^∞ -代数首先是 \mathbb{R} -代数: 考虑 0 元函数 $\mathbb{R}^0 \rightarrow \mathbb{R}$ 就得到了常量 $A^0 \rightarrow A$, 考虑加法与乘法函数 $+, \times: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 就得到 A 上的加法与乘法, 考虑映射 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto x(y + z) = xy + xz$, 使用 $f \mapsto A(f)$ 保持复合的条件, 就得到 A 上的分配律, 如此这般.

例 6.4.25

设 M 是光滑流形, 那么 M 上的光滑函数空间 $C^\infty(M)$ 构成光滑代数: 对 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 定义 $A(f)(f_1, \dots, f_n) = f \circ (f_1, \dots, f_n)$.

例 6.4.26

$\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 是光滑代数: 对 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 定义

$$A(f)(a_1 + b_1\varepsilon, \dots, a_n + b_n\varepsilon) = f(a_1, \dots, a_n) + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{(a_1, \dots, a_n)} b_i\varepsilon.$$

$\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 可视为“无穷小线段上的光滑函数空间”.

例 6.4.27

光滑流形上一点处的光滑函数芽 (定义 3.1.6) 构成光滑代数.

类比于 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 是 n 个元素生成的自由 \mathbb{R} -代数 (交换含么代数), 有如下命题.

命题 6.4.28

$C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 n 个元素生成的自由光滑代数.

证明. 要证明的是对任意光滑代数 A 与任意 n 个元素 $a_1, \dots, a_n \in A$, 存在唯一的同态 $\varphi: C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow A$ 将每个坐标函数 x_i 映射到 a_i . 由定义, 对任意 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, φ 必须把 $f = f \circ (x_1, \dots, x_n)$ 映射到 $f(a_1, \dots, a_n)$, 这便唯一确定了 φ ; 而它确实将投影 x_i 映射到 a_i : $x_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$. \square

类比于位格与位象的关系, 以及环与仿射概形的关系, 我们作如下的定义. 其中记号遵循 Moerdijk 与 Reyes [25].

定义 6.4.29 (光滑处所)

定义光滑处所 (smooth locus, 复数 loci) 的范畴 \mathbb{L} 为有限生成光滑代数范畴的对偶,

$$\mathbb{L} := C^\infty \mathbf{Alg}_{\text{fg}}^{\text{op}},$$

对于光滑代数 A , 记 ℓA 为 A 在对偶范畴中的化身.

我们发现意象 $\hat{\mathbb{L}} = \mathbf{Fun}(C^\infty \mathbf{Alg}_{\text{fg}}, \mathbf{Set})$ 是综合微分几何某种意义上的模型 (不过它尚且缺少一些微分几何关心的性质).

定义 6.4.30

定义直线

$$R := \mathbf{y}(\ell C^\infty(\mathbb{R})).$$

6.5 量子理论与 Bohr 意象

A description of physical reality is made in terms of two sets of objects: observables and states.

Ludwig Faddeev,
Elementary Introduction to Quantum Field Theory

一个物理系统最核心的对象是其中的状态与可观测量。可观测量的代数与状态的空间互为对偶：例如经典力学中，可观测量是状态空间上的函数；反过来，状态空间上的点可视为可观测量代数到 \mathbb{R} 的代数同态。

量子理论有多种不同的公理化，我们考虑的公理化使用 C^* -代数 \mathcal{A} 表示量子系统，可观测量是 \mathcal{A} 中的自伴元素，而状态是线性映射 $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 。此外人们常常以一个 Hilbert 空间 H 表示系统中的纯态 (pure states)，可观测量通过一个表示 $\pi: \mathcal{A} \rightarrow \text{End}(H)$ 对应到 H 上的自伴算子，而纯态 $\psi \in H$ 对应一个映射 $\rho: A \mapsto \langle \psi | A | \psi \rangle := \langle \psi, \pi(A)\psi \rangle$ ，它给出状态 ψ 下可观测量 A 的“期望值”。在这种公理化的量子理论中，每个量子系统都对应一个意象，称为 *Bohr* 意象，使得 \mathcal{A} 在这个意象的内语言中成为交换 C^* -代数，且系统中的状态与可观测量在这个意象的内语言中可理解为一个经典力学系统的状态和可观测量。

C^* -代数，经典语境与 Bohr 景

定义 6.5.1 (C^* -代数, $*$ -子代数)

C^* -代数是 \mathbb{C} 上的 Banach 代数⁵ $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ ，带有“伴随”运算 $(-)^*: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ ，满足对任意 $x \in \mathcal{A}$,

- $(a^*)^* = a$,
- $(\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^* \ (\lambda \in \mathbb{C})$,
- $(ab)^* = b^* a^*$,
- $\|a^* a\| = \|a\| \cdot \|a^*\| = \|a\|^2$.

C^* -代数的 $*$ -子代数是指关于 $(-)^*$ 封闭的子代数。

定义 6.5.2 (量子力学系统, 可观测量)

- 一个量子力学系统 (quantum mechanical system) 是一个 C^* -代数 \mathcal{A} ;
- 系统中的可观测量 (observable) 是 \mathcal{A} 中的自伴元素，即满足 $a^* = a$ 的元素;
- 系统中的状态 (state) 是线性函数 $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足
 - (正性) $\rho(aa^*) \geq 0$;
 - (归一性) $\rho(1) = 1$.

⁵Banach 代数是配有乘法的完备赋范线性空间，满足 $\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$ 。后面我们将要在意象内部使用 C^* 代数的概念，这需要谨慎地定义实数，但我们忽略这一问题。

例 6.5.3 (Hilbert 空间上的有界线性算子的代数)

对于 Hilbert 空间 H , H 上的有界线性算子的代数 $\mathcal{B}(H)$ 是 C^* -代数, 其中 a^* 是 a 的伴随算子. 事实上, 每个 C^* -代数都同构于某个形如 $\mathcal{B}(H)$ 的代数的 $*$ -子代数, 因此后者也可作为 C^* -代数的一种具体定义. 量子力学最初就是使用 Hilbert 空间上的自伴算子叙述的.

我们给出经典力学系统的一种定义. 注意经典与量子系统的相似性.

定义 6.5.4 (Poisson 代数)

Poisson 代数是 \mathbb{R} 上的含么交换结合代数 \mathcal{A} 配备一个运算 $\{-, -\}: \mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, 称为 *Poisson* 括号, 满足

- $(\mathcal{A}, \{-, -\})$ 是 Lie 代数;
- 对任意 $a \in \mathcal{A}$, $\{a, -\}: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 是导子, 也即 $\{a, xy\} = \{a, x\}y + x\{a, y\}$.

例 6.5.5 (辛流形上的光滑函数代数)

在经典力学中, 相空间 (phase space) 是一个辛流形 (X, ω) , 其上的光滑函数代数 $C^\infty(X)$ 有自然的 Poisson 代数结构: 对 $f \in C^\infty(X)$ 定义向量场 v_f 满足 $\omega(v_f, -) = df$, 则 $\{f, g\} := \omega(v_f, v_g)$ 给出 $C^\infty(X)$ 上的 Poisson 代数结构.

定义 6.5.6 (经典力学系统)

- 一个经典力学系统 (classical mechanical system) 是一个 Poisson 代数 $(\mathcal{A}, \{-, -\})$;
- 系统中的可观测量 (observable) 是 \mathcal{A} 中的元素;
- 系统中的状态 (state) 是线性函数 $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足
 - (正性) $\rho(a^2) \geq 0$;
 - (归一性) $\rho(1) = 1$.
- 系统中的纯态 (pure state) 是满足上面条件的代数同态 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$.

注 6.5.7 (相空间上的点对应纯态)

由定义 6.5.6, 对于辛流形 (X, ω) , X 上的一个点 p 对应一个纯态 $C^\infty(X) \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto f(p)$. 在 X 为紧流形的情形, 可以证明纯态 $C^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ 一定形如 $f \mapsto f(p)$.

量子力学中的 Heisenberg 不确定性原理表明, 不交换的可观测量不可同时确定, 而一族相交换的可观测量可以同时确定. 因此我们格外关注那些交换的子代数. 因为一个状态对应的函数 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 只有在交换的子代数上局部地谈论才有意义, 我们自然应当视之为交换子代数范畴上的一个层.

定义 6.5.8 (经典语境)

对于量子力学系统 \mathcal{A} , 称 \mathcal{A} 的一个交换 $*$ -子代数为一个经典语境 (classical context). 记 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 为经典语境在包含关系下构成的偏序集.

注 6.5.9

语境这个名字的含义是, 一个可观测量只在某些特定的语境下才有确定的值. 在一个固定的交换 $*$ -子代数中, 可观测量的表现无异于一个经典系统, 故称之为经典语境.

这里我们稍微偏题, 介绍偏序集上的层.

偏序集上的层**定义 6.5.10** (Alexandroff 空间)

若一个拓扑空间中开集的任意交仍是开集, 则称其为 Alexandroff 空间. 记 Alexandroff 空间构成的 Top 的全子范畴为 AlexSp.

定义 6.5.11 (偏序集上的 Alexandroff 空间)

设 P 为偏序集. 称子集 $Q \subset P$ 为向上封闭集是指对任意 $x \in Q, y \in P$, 若 $x \leq y$, 则 $y \in Q$. 定义 P 上的 Alexandroff 空间 $\text{Alex } P$ 是以 P 为底层集合, 以向上封闭集为开集的拓扑空间; 它满足定义 6.5.10 的条件. 记 $\uparrow x = \{y \in P \mid x \leq y\}$; 那么所有 $\uparrow x$ 构成 $\text{Alex } P$ 的开集基, 且 $\uparrow x$ 是包含 x 的所有开集的交. 由偏序集给出 Alexandroff 空间的构造是一个函子

$$\text{Alex}: \text{Poset} \rightarrow \text{AlexSp}.$$

命题 6.5.12 (偏序集等价于 T0 Alexandroff 空间)

记 $\text{T0AlexSp} \hookrightarrow \text{AlexSp}$ 为满足 T0 条件 (对任意两个不同的点, 存在开集包含其中一个而不包含另一个) 的 Alexandroff 空间的全子范畴, 则定义 6.5.11 给出了范畴等价

$$\text{Alex: Poset} \simeq \text{T0AlexSp},$$

其逆定义如下: 对一个 T0 Alexandroff 空间, 定义其底层集合上的关系 \leq 使得 $x \leq y$ 当且仅当所有包含 x 的开集都包含 y , 这给出了一个偏序集.

命题 6.5.13

对任意偏序集 P 有范畴等价

$$\text{Presh}(P^{\text{op}}) \simeq \text{Fun}(P, \text{Set}) \simeq \text{Sh}(\text{Alex } P).$$

证明. 设 F 为 $\text{Alex } P$ 上的层, 它限制在子范畴 $\{\uparrow x \mid x \in P\}^{\text{op}} \simeq P$ 上即给出函子 $P \rightarrow \text{Set}$. 另一方面, 对于函子 $G: P \rightarrow \text{Set}$, 定义 $\text{Alex } P$ 上的预层

$$F: \text{Open}(\text{Alex } P) \rightarrow \text{Set}, \quad U \mapsto \lim_{x \in U} G(x),$$

设 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为开覆盖, 对任意一族相容的元素 $(s_i \in F(U_i))_{i \in I}$, 设 $s_i = (t_x \in G(x))_{x \in U_i}$, 那么 $s := (t_x)_{x \in U} \in F(U)$ 是满足 $s|_{U_i} = s_i$ 的唯一元素. 这说明 F 是层. 容易验证以上两个构造互逆. \square

Bohr 意象**定义 6.5.14** (Bohr 景, Bohr 意象)

对于量子力学系统 \mathcal{A} , 定义其 Bohr 景为拓扑空间 $\text{Alex } \mathcal{C}(\mathcal{A})$, Bohr 意象为 $\text{Sh}(\text{Alex } \mathcal{C}(\mathcal{A}))$; 由命题 6.5.13, Bohr 意象也等价于函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{C}(\mathcal{A}), \text{Set})$. 进一步, Bohr 意象还配备如下环对象 (这样的结构称为环化意象, ringed topos),

$$\underline{\mathcal{A}}: \mathcal{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Set}, \quad C \mapsto C.$$

它是 Bohr 意象中的 交换 C^* -代数.

Gelfand 对偶

定义 6.5.15 (Gelfand 谱)

对于交换 C^* -代数 \mathcal{A} , 定义其 *Gelfand 谱*

$$\Sigma(\mathcal{A}) := \{C^*\text{-代数同态 } \lambda: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}\},$$

其拓扑为使得所有映射 $\Sigma(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}, \lambda \mapsto \lambda(x)$ 都连续的最弱拓扑. 由 Gelfand–Mazur 定理, Gelfand 谱 $\Sigma(\mathcal{A})$ 也是 \mathcal{A} 的极大理想的集合.

$\Sigma(\mathcal{A})$ 上拓扑的定义旨在保证每个元素 $x \in \mathcal{A}$ 都对应 $\Sigma(\mathcal{A})$ 上的一个复值连续函数. 如下定理表明这个对应实际上是一个同构; 这是代数–几何对偶的一例.

命题 6.5.16 (Gelfand 对偶)

记 \mathbf{CC}^* 为交换 C^* -代数的范畴, \mathbf{CHaus} 为紧 Hausdorff 空间的范畴, 那么 Gelfand 谱给出反变函子 $\Sigma: (\mathbf{CC}^*)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{CHaus}$, 且有范畴等价

$$(\mathbf{CC}^*)^{\text{op}} \xrightleftharpoons[C(-, \mathbb{C})]{\Sigma} \mathbf{CHaus},$$

其中 $C(X, \mathbb{C})$ 是空间 X 上复值连续函数的 C^* -代数.

注 6.5.17 (Gelfand 对偶的适用范围)

Gelfand 对偶的证明需要选择公理 (命题 1.3.68), 从而不能在一般的意象中使用. 选择公理此处用于构造空间的点; 若将紧 Hausdorff 空间推广为无点拓扑学中的相应概念——紧完全正则位象 (compact completely regular locale), 则可得到 Gelfand 对偶的构造性证明 (见 [12]), 从而可以将其推广到任何意象.

对非交换的 C^* -代数, 我们也可赋予类似于 Gelfand 谱的一个“空间”, 只不过这个空间是以 Bohr 意象中的内位象的形式出现.

定义 6.5.18 (谱预层)

对于量子力学系统 \mathcal{A} 的两个经典语境 $A_1 \subset A_2$, 有限制映射 $\Sigma(A_2) \rightarrow \Sigma(A_1)$. 这定义了 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 上的预层 Σ .

注 6.5.19

预层 Σ 整合了所有经典语境的几何信息.

一般而言, 一个可观测量只能给出预层 Σ 的局部截面, 而无法给出整体截面.

Bohr 意象中对象 Σ 的构造可视为将 Gelfand 谱的构造由交换代数推广到非交换代数, 成为与交换子代数相对偶的空间的系统. 它实际上是 Bohr 意象中的内蕴位象 (internal locale). 而交换子代数的全体构成 Bohr 意象中的一个内蕴代数. 由此, Bohr 意象的内语言允许我们像谈论经典态一样谈论量子态.

Bohr 意象中的命题

在一个经典系统中, 命题是状态空间的子集, 表示这个命题在何种状态下成立. 类似地, 量子系统中的命题是预层意象中 Σ 的子对象, 或称子函子.

6.6 连续统假设的独立性

1874 年, Georg Cantor 证明了自然数与实数 (又称连续统) 之间不存在一一对应. 更一般地, 对任意集合 X , X 的基数总是小于 PX . Cantor 接着于 1878 年提出了连续统假设 (continuum hypothesis),

在自然数集合 \mathbb{N} 与连续统 PN 之间不存在其它的基数.

1900 年, Hilbert 将连续统假设放在他的 23 个问题的第一位. 1940 年, Kurt Gödel 证明连续统假设与 Zermelo–Fraenkel 集合论 (例 B.1.29) 相容. 1963 年, Paul Cohen 的文章 *The Independence of the Continuum Hypothesis* 证明了连续统假设独立于带有选择公理的 Zermelo–Fraenkel 集合论 ZFC, 即 ZFC 既不能证明连续统假设, 也不能证明其否定. 在文章中, Cohen 定义了一个关系 “ P 力迫 α ” (因此他的方法被称为力迫法), 以后人的观点, 它正是某个意象中的 Kripke–Joyal 语义 (定义 4.2.6). 于是 Cohen 的论证相当于直接在这个意象中工作. 这个意象就是本节主要介绍的对象.

双重否定与稠密拓扑

类比于位象的双重否定子位象 (例 2.2.23), 在意象上有双重否定给出的子意象, 它是 Boole 意象.

命题-定义 6.6.1 (双重否定作为 Lawvere–Tierney 拓扑)

在一个意象中, $\neg\neg: \Omega \rightarrow \Omega$ 定义了其上的 Lawvere–Tierney 拓扑 (定义 3.7.1, 内语言定义见 4.3.6).

证明. 要证明的是如下公式. 实际上这些公式在任何 Heyting 代数中成立.

- $\neg\neg\top = \top$. 这是因为 $\neg\top = \perp$, $\neg\perp = \top$.
- $\neg\neg\neg = \neg$. 这个公式的证明与命题 2.2.18 完全相同 (只是将 \leq 替换为内语言的 \Rightarrow): 注意到 $x \Rightarrow \neg\neg x$, 故 $\neg(\neg\neg x) \Rightarrow \neg x$, 而又有 $\neg x \Rightarrow \neg\neg(\neg x)$, 所以 $\neg\neg\neg x = \neg x$.) 由此, 得 $\neg\neg\neg\neg = \neg\neg$.
- $\neg\neg(x \wedge y) = (\neg\neg x) \wedge (\neg\neg y)$, 这个公式的证明与命题 2.2.21 完全相同.

□

命题 6.6.2

对任何意象 \mathcal{C} , 有 $\text{Sh}_{\neg\neg}\mathcal{C}$ 为 Boole 意象.

证明. $\text{Sh}_{\neg\neg}\mathcal{C}$ 的子对象分类子为 $\Omega_{\neg\neg} = \{p \in \Omega \mid \neg\neg p = p\}$ (命题 4.3.14). $\Omega_{\neg\neg}$ 上的 Heyting 代数结构继承自 Ω , 因此 $\forall p \in \Omega_{\neg\neg} (\neg\neg p \Rightarrow p)$, 即 $\text{Sh}_{\neg\neg}\mathcal{C}$ 为 Boole 意象 (命题 4.1.19). □

回忆预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的 Lawvere–Tierney 拓扑一一对应于 \mathcal{C} 上的 Grothendieck 拓扑 (命题 3.7.9). 双重否定 $\neg\neg$ 对应的 Grothendieck 拓扑有另一种简洁的表述.

定义 6.6.3 (稠密拓扑)

设 \mathcal{C} 为范畴. 定义其上的稠密拓扑 (dense topology) $J_{\text{稠密}}$ 为

$$J_{\text{稠密}}(c) = \{c \text{ 上的筛 } S \mid \text{对任意 } f: d \rightarrow c, \text{ 存在 } g: e \rightarrow d, fg \in S\}.$$

换言之, 称 S 为 c 的 $J_{\text{稠密}}$ -覆盖是指 S 中的箭头可以穿过所有指向 c 的箭头.

例 6.6.4 (拓扑空间上的稠密拓扑)

设 X 为拓扑空间, $\text{Open}(X)$ 上的稠密拓扑可描述如下: 开集 U 的一族子集 $\{U_i\}$ 构成 $J_{\text{稠密}}$ -覆盖当且仅当 $\bigcup_i U_i$ 在 U 中稠密.

命题 6.6.5

在预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上, 相应于 Lawvere–Tierney 拓扑 $\neg\neg$ 的 Grothendieck 拓扑是 $J_{\text{稠密}}$.

证明. 设 S 为 c 上的筛. 作为 $\mathcal{Y}(c)$ 的子对象有

$$\neg S = \{f: d \rightarrow c \mid \forall g: e \rightarrow d, fg \notin S\}.$$

进而有

$$\begin{aligned}\neg\neg S &= \{f: d \rightarrow c \mid \forall g: e \rightarrow d, fg \notin \neg S\} \\ &= \{f: d \rightarrow c \mid \forall g: e \rightarrow d, \exists h: k \rightarrow e, fgh \in S\}.\end{aligned}$$

故 $\text{id}_c \in \neg\neg S$ 当且仅当 S 是 $J_{\text{稠密}}$ -覆盖.

□

我们将要使用的是命题 6.6.5 中 \mathcal{C} 为偏序集的情形. 回忆, 偏序集 \mathcal{P} 中一个元素 p 上的筛 S 是 $\downarrow p$ 的一个向下封闭子集 (例 3.3.13). 筛 S 是 $J_{\text{稠密}}$ -覆盖, 当且仅当 S 在 $\downarrow p$ 中稠密, 即对任意 $q \leq p$, 存在 $s \in S, s \leq q$.

意象中基数的比较

定义 6.6.6 (基数的比较)

对于一个意象中的两个对象 X, Y ,

- 若存在单射 $X \rightarrow Y$, 则称 X 的基数小于等于 Y , 记为 $X \leq Y$;
- 若 $X \leq Y$ 且 $\text{Epi}(X, Y) \simeq 0$ (定义 4.1.15), 则称 X 的基数小于 Y , 记为 $X < Y$.

命题 6.6.7 (Cantor 定理)

在任何意象中, 对任何对象 X 有 $X < PX$.

证明. 首先, $\{-\}: X \rightarrow PX$ 为单射 (命题 1.1.22).

下证 $\text{Epi}(X, PX) \simeq 0$. 以下论证均在内语言中进行. 假设 $f: X \rightarrow PX$ 为满射, 即

$$\forall S \subset X \exists x \in X f(x) = S.$$

引入一些新的记号, 以 $x \notin S$ 代表 $\neg(x \in S)$; 记

$$T := \{x \in X \mid x \notin f(x)\}.$$

假设 $f(x) = T$, 则有

$$x \in T \Rightarrow x \notin T,$$

$$x \notin T \Rightarrow x \in T.$$

两者导致矛盾⁶. 这说明 $\text{Epi}(X, PX) \simeq 0$.

□

由“ \leq ”的定义, 显然 \leq 有传递性 (单射的复合是单射). 然而我们需要一些额外的条件才能得到“ $<$ ”的传递性.

⁶注意, 这里不需要排中律. 一般地, 在 Heyting 代数中有 $(p \Rightarrow \neg p) \wedge (\neg p \Rightarrow p) = \perp$. 这是因为 $(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg p$, 而 $\neg p \wedge (\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow \perp$.

命题 6.6.8

在 Boole 意象中, 若 $X < Y$, $Y \leq Z$, 且 Y 存在整体元素 $y: 1 \rightarrow Y$, 则 $X < Z$.

证明. 由排中律, $Z = Y + \neg Y$. 设有整体元素 $y: 1 \rightarrow Y$, 则嵌入 $i: Y \hookrightarrow Z$ 有收缩

$$r = (\text{id}_Y, y): Z = Y + \neg Y \rightarrow Y.$$

由于 $ri = \text{id}_Y$, r 为满射. 进而内语言中如下公式成立,

$$\forall f \in \text{Epi}(X, Z), r \circ f \in \text{Epi}(X, Y).$$

特别地, 若 $\text{Epi}(X, Y) \simeq 0$, 则 $\text{Epi}(X, Z) \simeq 0$. □

连续统假设反例的构造

构造违反连续统假设的意象的大致过程如下.

- (1) 从经典的集合论模型开始, 选取一个充分大的基数 κ , 使得 $\mathbb{N} < 2^{\mathbb{N}} < \kappa$.
- (2) 回忆, 对于 Grothendieck 意象 \mathcal{E} (想象为一个新的“集合宇宙”), 使用常值层函子 $\Delta: \text{Set} \rightarrow \mathcal{E}$ (定义 3.8.3) 可将普通集合视为 \mathcal{E} 中的“集合”. 特别地, $\Delta\mathbb{N}$ 是 \mathcal{E} 中的自然数对象 (定义 1.3.56).
- (3) 我们精心构造这样一个意象, 使得单射 $\Delta\kappa \rightarrow P(\Delta\mathbb{N})$ 存在, 并且 $\Delta: \text{Set} \rightarrow \mathcal{E}$ 保持基数的“ $<$ ”关系. (注意 $P(\Delta\mathbb{N})$ 不同于 $\Delta(2^{\mathbb{N}})$.)
- (4) 此时有 $\Delta\mathbb{N} < \Delta(2^{\mathbb{N}}) < \Delta\kappa \leq P(\Delta\mathbb{N})$, 连续统假设不成立.

上述构造最出人意料的是第 (3) 步, 我们仿佛要构造一个不存在的单射 $\kappa \rightarrow P\mathbb{N}$. 注意到映射 $\kappa \rightarrow P\mathbb{N}$ 等同于 $\kappa \times \mathbb{N} \rightarrow \{\top, \perp\}$. 下面构造的 Cohen 偏序集与这样的映射有关.

定义 6.6.9 (Cohen 偏序集)

对于基数 κ , 定义偏序集

$$\mathcal{P}_\kappa = \{p: S \rightarrow \{\top, \perp\} \mid S \hookrightarrow \kappa \times \mathbb{N} \text{ 为有限子集}\},$$

其上的序为: $p_1 \leq p_2$ 当且仅当 p_2 是 p_1 的一个限制.

注 6.6.10 (\mathcal{P}_κ 的元素的直观)

请注意 \mathcal{P}_κ 上定义的偏序与表面上的包含关系相反. 这是因为, 我们想象 \mathcal{P}_κ 的一个元素为加在映射 $\kappa \times \mathbb{N} \rightarrow \{\top, \perp\}$ 上的一个条件 (一个条件是有限个形如 $p(x, n) = \top$

或 $p(x, n) = \perp$ 的等式给出的), 这个条件在全体映射 $\kappa \times \mathbb{N} \rightarrow \{\top, \perp\}$ 的空间中划出了一个子空间. 如下的陈述等价:

- 条件 p_1 蕴涵条件 p_2 ;
- p_2 是 p_1 的一个限制;
- p_1 对应的子空间包含于 p_2 对应的子空间;
- $p_1 \leq p_2$.

考虑常值层函子 $\Delta: \mathbf{Set} \rightarrow \widehat{\mathcal{P}_\kappa}$, 注意到 $\Delta(\kappa \times \mathbb{N}) \simeq \Delta\kappa \times \Delta\mathbb{N}$ (Δ 保持有限极限).

定义 6.6.11 (Cohen 意象)

定义 *Cohen 意象* 为 $\mathrm{Sh}_{\neg\neg} \widehat{\mathcal{P}_\kappa}$, 也即 $\mathrm{Sh}(\mathcal{P}_\kappa, J_{\text{稠密}})$ (命题 6.6.5).

定义 6.6.12 (子对象 A)

定义子对象 $A \hookrightarrow \Delta(\kappa \times \mathbb{N})$,

$$A(p) = \{(x, n) \in \kappa \times \mathbb{N} \mid p(x, n) = \perp\}.$$

其中 $p(x, n)$ 可能未定义, $p(x, n) = \perp$ 的含义是 $p(x, n)$ 有定义且其值为 \perp . 注意对于 $q \leq p$, p 是 q 的限制, 因此 $A(p) \subset A(q)$, 即 A 构成 $\Delta(\kappa \times \mathbb{N})$ 的子函子.

命题 6.6.13

子对象 $A \hookrightarrow \Delta(\kappa \times \mathbb{N})$ 是 $\neg\neg$ -闭的 (定义 3.7.3, 命题 3.7.12).

证明. 由命题 3.3.19, A 的特征函数为 $\chi_A: \Delta(\kappa \times \mathbb{N}) \rightarrow \Omega$,

$$\begin{aligned} \chi_A(p)(x, n) &= \{r \leq p \mid (x, n) \in A(r)\} \\ &= \{r \leq p \mid r(x, n) = \perp\}. \end{aligned}$$

记 $S = \{r \leq p \mid r(x, n) = \perp\} \in \Omega(p)$. 由命题 6.6.5 的证明,

$$\neg\neg S = \{r \leq p \mid \forall s \leq r \exists t \leq s \, t(x, n) = \perp\}.$$

对于 $r \in \neg\neg S$, 若 $r(x, n)$ 未定义, 令 s 为 r 的扩张, 使得 $s(x, n) = \top$, 得到矛盾; 若 $r(x, n) = \top$, 亦得矛盾. 故只能有 $r(x, n) = \perp$, 即 $r \in S$. 我们证明了 $\neg\neg S = S$, 即 χ_A 穿过 $\Omega_{\neg\neg}$. \square

命题 6.6.14

子对象 $A \hookrightarrow \Delta(\kappa \times \mathbb{N})$ 对应的态射 $\gamma: \Delta\kappa \rightarrow \Omega_{\neg\neg}^{\Delta\mathbb{N}}$ 是单射.

证明. 对于预层的态射, 只需逐对象验证 $\gamma_p: \kappa \rightarrow \Omega_{\neg\neg}^{\Delta\mathbb{N}}(p)$ 为单射. 回忆 $\Omega_{\neg\neg}^{\Delta\mathbb{N}}(p)$ 等同于 $\text{Hom}_{\widehat{\mathcal{P}}_\kappa}(\mathfrak{J}(p) \times \Delta\mathbb{N}, \Omega_{\neg\neg})$, 即有如下两图之间的对应,

$$\begin{array}{ccc} \Delta\kappa \times \Delta\mathbb{N} & \xrightarrow{\chi_A} & \Omega_{\neg\neg} \\ \uparrow (q \leq p, n) \mapsto (x, n) & \nearrow \gamma_p(x) & \\ \mathfrak{J}(p) \times \Delta\mathbb{N} & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \Delta\kappa & \xrightarrow{\gamma} & \Omega_{\neg\neg}^{\Delta\mathbb{N}} \\ \uparrow (q \leq p) \mapsto x & \nearrow \gamma_p(x) & \\ \mathfrak{J}(p) & & \end{array}$$

只需证明对不同的 $x \in \kappa$, 映射 $\gamma_p(x): \mathfrak{J}(p) \times \Delta\mathbb{N} \rightarrow \Omega_{\neg\neg}$ 互不相同. 映射 $\gamma_p(x)$ 可表示为

$$\gamma_p(x)(q \leq p, n) = \chi_A(q)(x, n) = \{r \leq q \mid r(x, n) = \perp\}.$$

设 $x \neq x'$. 由于 p 的定义域有限, 总存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $p(x, n_0), p(x', n_0)$ 均未定义. 于是可将 p 扩充为 q ($q \leq p$), 使得 $q(x, n_0) = \perp$, $q(x', n_0) = \top$. 那么 $q \in \gamma_p(x)(p, n_0)$, $q \notin \gamma_p(x')(p, n_0)$. 这证明了所需的结论. \square

考虑层化 $a: \widehat{\mathcal{P}}_\kappa \rightarrow \text{Sh}_{\neg\neg} \widehat{\mathcal{P}}_\kappa$, 那么 $a\Delta: \text{Set} \rightarrow \text{Sh}_{\neg\neg} \widehat{\mathcal{P}}_\kappa$ 是意象 $\text{Sh}_{\neg\neg} \widehat{\mathcal{P}}_\kappa$ 对应的常值层函子; 且 $a\Delta$ 保持有限极限, 从而保持单射.

$$\begin{array}{ccc} & \widehat{\mathcal{P}}_\kappa & \\ a \swarrow & \Delta & \nwarrow \\ \text{Sh}_{\neg\neg} \widehat{\mathcal{P}}_\kappa & \xleftarrow{\Gamma} & \text{Set} \\ i \nearrow & a\Delta & \searrow \\ & \Gamma & \end{array}$$

定义 6.6.15 (Souslin 性质)

称意象中的一个对象 X 具有 *Souslin* 性质是指 X 的一族两两不交的子对象至多有可数个. 称意象 \mathcal{E} 具有 *Souslin* 性质是指 \mathcal{E} 由其中具有 *Souslin* 性质的对象生成.

命题 6.6.16

设 \mathcal{E} 为具有 *Souslin* 性质的 Grothendieck 意象, $\Delta: \text{Set} \rightarrow \mathcal{E}$ 为常值层函子. 则对于无限集合 $X < Y$, 有 $\Delta(X) < \Delta(Y)$.

命题 6.6.17

Cohen 意象具有 *Souslin* 性质.

这两个命题的证明见 [20] VI.3 节. 综上所述, 在 Cohen 意象中有

$$a\Delta(\mathbb{N}) < a\Delta(2^{\mathbb{N}}) < a\Delta(\kappa) \leq P(\Delta\mathbb{N}).$$

6.7 凝聚态数学

作为原理的介绍, 本节忽视集合论问题.

定义 6.7.1 (投射有限集景)

投射有限集景 \mathbf{ProFin} 是投射有限集的范畴 (例 A.5.14), 配备有限联合满射族生成的覆盖. 该覆盖对应 \mathbf{ProFin} 上的典范 Grothendieck 拓扑 (定义 3.4.27).

定义 6.7.2 (凝聚态集合)

凝聚态集合 (condensed set) 是投射有限集景 \mathbf{ProFin} 上的层. 记凝聚态集合的范畴为 \mathbf{Cond} . 定义凝聚态群 (Abel 群, 环, ...) 为 \mathbf{Cond} 中的群 (Abel 群, 环, ...).

注 6.7.3

凝聚态集合也可等价地定义为紧 Hausdorff 空间的范畴 \mathbf{CHaus} 上的层, 其 Grothendieck 拓扑为满射. 这是因为 $\mathbf{Profin} \rightarrow \mathbf{CHaus}$ 是稠密子范畴 (见比较原理, 命题 3.9.26).

任何一个 Grothendieck 意象中的 Abel 群构成 Abel 范畴. 凝聚态 Abel 群也构成一个 Abel 范畴. 相比之下, 拓扑 Abel 群范畴没有这样好的性质: 考虑 Abel 群 \mathbb{R} 带有离散拓扑 $\mathbb{R}_{\text{散}}$ 和通常拓扑 $\mathbb{R}_{\text{常}}$. 恒等映射 $\mathbb{R}_{\text{散}} \rightarrow \mathbb{R}_{\text{常}}$ 既单又满, 却不是同构.

例 6.7.4 (拓扑空间视为凝聚态集合)

对于拓扑空间 X , 定义凝聚态集合 $\underline{X}: S \mapsto \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(S, X)$. 当然, 对于拓扑群 (Abel 群, 环, ...), 也有相应的凝聚态群 (Abel 群, 环, ...).

凝聚态集合 \underline{X} 包含了 X 的许多重要的拓扑信息. 例如, 考虑投射有限集 $\mathbb{N} \cup \infty$ (例 A.5.15), $\underline{X}(\mathbb{N} \cup \infty)$ 的元素等同于 X 中的收敛序列.

对于好的空间 X (所谓紧生成 Hausdorff 空间), \underline{X} 包含的信息足够还原 X 的拓扑, 这就是说这类拓扑空间的范畴全忠实地嵌入凝聚态集合范畴.

注 6.7.5 (凝聚态集合作为拓扑空间的推广, Johnstone 拓扑意象)

由例 6.7.4, 凝聚态集合可视为拓扑空间的推广: 对于凝聚态集合 X 与投射有限集 S , $X(S)$ 的元素可视为 S 到 X 的假想的“连续映射”; 特别地, $X(\mathbb{N} \cup \infty)$ 的元素可视为 X 中假想的“收敛序列”.

称拓扑空间 X 为序列空间 (sequential space) 是指: 对任意拓扑空间 Y , 集合映射

$f: X \rightarrow Y$ 连续当且仅当 f 将 X 中的收敛序列映射到 Y 中的收敛序列. 很多常见的拓扑空间 (如 CW 复形) 都是序列空间. 考虑单点 pt 和 $\mathbb{N} \cup \infty$ 构成的 \mathbf{Top} 的全子范畴, 配备典范 Grothendieck 拓扑成为一个景, 这个景上的层范畴即是 Johnstone 的拓扑意象 \mathcal{T} . 那么序列空间的范畴全忠实地嵌入 \mathcal{T} , 正如紧生成 Hausdorff 空间全忠实地嵌入凝聚态集合范畴一样.

第 A 章 范畴论基础

A.1 2-范畴	234
2-范畴中的万有性质	240
俯 2-范畴	240
A.2 伴随	240
伴随保持极限	242
伴随的自然变换	245
伴随三元组	246
伴随函子的 Frobenius 互反律	247
A.3 自反子范畴与局部化	248
局部对象	252
分式计算	256
A.4 预层范畴与米田嵌入	259
米田引理	259
可表函子的余极限	260
自由余完备化, 脉与几何实现	261
预层范畴的俯范畴	263
A.5 (余) 滤范畴和 (余) 滤 (余) 极限	264
Set-值平坦函子	265
A.6 可表现范畴	270
可表现对象	270
稠密子范畴	275
可表现范畴的性质与判定	276
可表现范畴的伴随函子定理	277
A.7 Kan 扩张	278
A.8 单子论	281
A.9 万有代数	289
Lawvere 理论	289
模型的表现	294

代数理论之间的态射	295
单子与代数理论	298
A.10 纤维范畴与索引范畴	298
A.11 下降	306

本章提供书中使用的一些范畴论概念和结论, 而不是成体系的范畴论教程.

A.1 2-范畴

假设读者已经熟悉范畴, 函子, 自然变换的概念.

定义 A.1.1 (严格 2-范畴)

严格 2-范畴是指 \mathbf{Cat} -充实范畴, 其中 \mathbf{Cat} 是 (小) 范畴的范畴. 具体地说, 一个严格 2-范畴 \mathcal{C} 包含如下资料,

- 一族对象 A, B, C, \dots ;
- 对每两个对象 A, B 有一个范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 其中的对象称为 \mathcal{C} 的态射, 态射称为 \mathcal{C} 的 2-态射;
- 对每三个对象 A, B, C 有一个函子 “复合” $\circ: \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$;
- 对每个对象 A 有一个对象 “恒等” $i_A: 1 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$;

满足如下严格的结合律,¹

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{Hom}(C, D) \times \mathrm{Hom}(B, C) \times \mathrm{Hom}(A, B) & \xrightarrow{\circ_{B, C, D}} & \mathrm{Hom}(B, D) \times \mathrm{Hom}(A, B) \\
 \downarrow \circ_{A, B, C} & & \downarrow \circ_{A, B, D} \\
 \mathrm{Hom}(C, D) \times \mathrm{Hom}(A, C) & \xrightarrow{\circ_{A, C, D}} & \mathrm{Hom}(A, D)
 \end{array}$$

以及如下严格的单位律.

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathrm{Hom}(A, B) & & & & \mathrm{Hom}(A, B) \\
 i_B \times \mathrm{id} \downarrow & \searrow \mathrm{id} & & \swarrow \mathrm{id} & \downarrow \mathrm{id} \times i_A \\
 \mathrm{Hom}(B, B) \times \mathrm{Hom}(A, B) & \xrightarrow{\circ_{A, B, B}} & \mathrm{Hom}(A, B) & \xleftarrow{\circ_{A, A, B}} & \mathrm{Hom}(A, B) \times \mathrm{Hom}(A, A)
 \end{array}$$

¹“严格”的含义是, 这张图中两条路径给出的函子严格相等 (也即构成 1-范畴 \mathbf{Cat} 中的交换图). 图中我使用了 “三个范畴的乘积”, 而更严格的写法应该分别写出两种顺序的乘积 $(- \times -) \times -$ 与 $- \times (- \times -)$, 并以幺半范畴 \mathbf{Cat} 中的结合子相连接 (例如定义 A.1.10 中就完整地写出了结合子). 类似地, 后面的图中我使用了 $\mathrm{Hom}(A, B) \times 1$ 与 $\mathrm{Hom}(A, B)$ 的同构, 而这也应该理解为幺半范畴中的单位子.

严格 2-范畴的概念不够好, 因为我们不应该要求两个函子相等, 而是应该要求指定一个自然同构.²

定义 A.1.2 (弱 2-范畴)

一个弱 2-范畴 (以下简称 2-范畴, 又叫 *bicategory*) \mathcal{C} 包含如下资料,

- 一族对象 A, B, C, \dots ;
- 对每两个对象 A, B 有一个范畴 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 其中的对象称为 \mathcal{C} 的态射, 态射称为 \mathcal{C} 的 2-态射;
- 对每三个对象 A, B, C 有一个函子 “复合” $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$;
- 对每个对象 A 有一个对象 “恒等” $i_A: 1 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$;
- 对每两个对象 A, B 有两个自然同构 “单位子 (unit)”

$$\rho_{A,B}: (- \circ i_A) \xrightarrow{\cong} (-), \quad \lambda_{A,B}: (i_B \circ -) \xrightarrow{\cong} (-);$$

- 对每四个对象 A, B, C, D 有一个自然同构 “结合子 (associator)”

$$\alpha_{A,B,C,D}: ((- \circ -) \circ -) \xrightarrow{\cong} (- \circ (- \circ -));$$

满足五边形恒等式, 又叫结合律的融贯性 (coherence).

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (- \circ -) \circ (- \circ -) & & \\
 & \nearrow \alpha & & \searrow \alpha & \\
 ((- \circ -) \circ -) \circ - & & & & - \circ (- \circ (- \circ -)) \\
 & \searrow \alpha & & \nearrow \alpha & \\
 (- \circ (- \circ -)) \circ - & \xrightarrow{\alpha} & - \circ ((- \circ -) \circ -) & &
 \end{array}$$

以及三角形恒等式, 又叫单位律的融贯性.

$$\begin{array}{ccc}
 (- \circ i) \circ - & \xrightarrow{\alpha} & - \circ (i \circ -) \\
 & \searrow \rho & \downarrow \lambda \\
 & & - \circ -
 \end{array}$$

²在范畴的 2-范畴 Cat 中, 1-态射 (函子) 之间不能谈论相等, 只能谈论自然同构; 而 2-态射 (自然变换) 之间可以谈论相等. 一般地, 对于 n -范畴 (无论何种模型) 中小于 n 阶的态射, 我们都不能谈论相等, 只能谈论等价; 而对于 n -范畴中的 n -态射则有相等的概念, 如集合中的元素, 范畴中的态射, 2-范畴中的 2-态射等等.

注 A.1.3 (横向复合, “须”)

复合 $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$ 的函子性给出了 2-态射的横向复合

$$\begin{array}{ccc}
 A & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \alpha \\ \xrightarrow{f'} \end{array} & B & \begin{array}{c} \xrightarrow{g} \\ \Downarrow \beta \\ \xrightarrow{g'} \end{array} & C \\
 & & & & = & & A & \begin{array}{c} \xrightarrow{gf} \\ \Downarrow \beta \cdot \alpha \\ \xrightarrow{g'f'} \end{array} & C
 \end{array}$$

以及所谓 “须” (whiskering) 运算 (也可视为 2-态射与 1-态射的横向复合).

$$\begin{array}{ccc}
 A & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \alpha \\ \xrightarrow{f'} \end{array} & B & \xrightarrow{g} & C \\
 & & & & = & & A & \begin{array}{c} \xrightarrow{gf} \\ \Downarrow g \cdot \alpha \\ \xrightarrow{g'f'} \end{array} & C
 \end{array}$$

例 A.1.4 (范畴的 2-范畴)

范畴, 函子以及自然变换构成一个严格 2-范畴 Cat .

例 A.1.5 (群的 2-范畴)

群等同于仅有一个对象, 且所有态射均为同构的范畴. 因此, 群构成 2-范畴 Cat 的子 2-范畴 Grp . 我们可以具体写出 Grp 中的 2-态射. 对于群同态 $\varphi, \psi: G \rightarrow H$, 一个 2-态射 $\alpha: \varphi \rightarrow \psi$ 是一个元素 $h \in H$, 满足如下交换图, 即 $\psi(g) = h\varphi(g)h^{-1}$.

$$\begin{array}{ccc}
 \bullet & \xrightarrow{\varphi(g)} & \bullet \\
 h \downarrow & & \downarrow h \\
 \bullet & \xrightarrow{\psi(g)} & \bullet
 \end{array}$$

这样的 2-态射在某些文献中也称为群的 “同伦”.

例 A.1.6 (幺半范畴)

幺半范畴 (monoidal category) 是范畴 \mathcal{M} 带有如下资料:

- 二元运算 $\otimes: \mathcal{M} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$;
- “单位” $1 \in \text{Ob } \mathcal{M}$;
- 自然同构 “单位子”

$$\rho: (- \otimes 1) \xrightarrow{\sim} (-), \quad \lambda: (1 \otimes -) \xrightarrow{\sim} (-);$$

- 自然同构“结合子”

$$\alpha: ((- \otimes -) \otimes -) \xrightarrow{\sim} (- \otimes (- \otimes -));$$

满足三角形恒等式以及五边形恒等式. 对比定义 A.1.2, 可知幺半范畴 \mathcal{M} 可视为仅有一个对象的 2-范畴, 记为 \mathcal{BM} . 具体地, \mathcal{M} 的对象是 \mathcal{BM} 中的 1-态射, 运算 \otimes 是 \mathcal{BM} 中 1-态射的复合, 而 \mathcal{M} 中的五边形恒等式正是 2-范畴 \mathcal{BM} 中的五边形恒等式.

幺半范畴的例子包括

- 模范畴 $R\text{Mod}$ 带有张量积 \otimes_R , 单位为 R ;
- 范畴的范畴 Cat 带有范畴的乘积 \times , 单位为 1;
- 带点拓扑空间范畴带有压缩积 (smash product) \wedge , 单位为 S^0 ;
- 增广单纯形范畴 (augmented simplex category) Δ_+ , 即有限全序集 $[-1] = \emptyset, [0] = \{0\}, [1] = \{0, 1\}, [2] = \{0, 1, 2\}, \dots$ 以及保序映射构成的范畴, 带有运算 $[m] \oplus [n] = [m + n + 1]$, 单位为 $[-1]$.

值得注意的是, 幺半范畴也等同于范畴的 2-范畴 Cat 中的幺半群, 也即幺半群的 Lawvere 理论 \mathbb{T}_{mon} (例 A.9.10) 到 2-范畴 Cat 的保持有限积的 2-函子.

例 A.1.7 (基本 2-群胚)

记 $I = [0, 1]$ 为单位区间. 设 X 为拓扑空间, 定义 X 的基本 2-群胚 $\Pi_2(X)$ 为如下的 2-范畴,

- 对象为 X 的点;
- 态射为 X 中的道路 (对两点 p, q , 由 p 到 q 的道路 $f: p \rightarrow q$ 是连续映射 $f: I \rightarrow X$, 满足 $f(0) = p, f(1) = q$);
- 2-态射为道路之间的定端点同伦, 再模掉更高阶的同伦; 对于 p 到 q 的两条道路 f, g , 所谓定端点同伦 $\alpha: f \rightarrow g$ 是连续映射 $\alpha: I \times I \rightarrow X$, 如下图所示.


$$\begin{array}{ccc} & f & \\ p & \boxed{\alpha} & q \\ & g & \end{array}$$

若两个这样的同伦 $\alpha, \alpha': I \times I \rightarrow X$ 相对于正方形的边界同伦, 则将其视为同一个 2-态射.

- 对每三个点 p, q, r , 复合 $\cdot: \text{Hom}(q, r) \times \text{Hom}(p, q) \rightarrow \text{Hom}(p, r)$ 的定义为

$$(f \cdot g)(t) = \begin{cases} g(2t) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ f(2t - 1) & 1/2 < t \leq 1 \end{cases}.$$

这个复合不满足严格的结合律, 但存在如左下图显式的同伦 $\alpha: (f \cdot g) \cdot h \rightarrow f \cdot (g \cdot h)$. 五边形公理体现为如右下图两个同伦之间的同伦.



考虑点 p 处的恒等态射, 即常值道路 i_p ; 它到自身的 2-态射构成一个群, 即 X 的第二阶同伦群 $\pi_2(X, p)$.

例 A.1.8 (局部离散 2-范畴)

一个普通范畴 \mathcal{C} 可视为 2-范畴: 其态射范畴 $\text{Hom}(A, B)$ 为离散范畴, 即 2-态射仅有恒等. 称这样的 2-范畴为局部离散 2-范畴 (locally discrete 2-category).

定义 A.1.9 (对偶)

一个 2-范畴 \mathcal{C} 不仅有一种“对偶”, 而是有三种:

- \mathcal{C}^{op} , 反转 1-态射的方向;
- \mathcal{C}^{co} , 反转 2-态射的方向;
- $\mathcal{C}^{\text{coop}}$, 同时反转 1-态射和 2-态射的方向.

定义 A.1.10 (2-函子)

2-范畴之间一种合适的函子概念是 2-函子 (又称伪函子, pseudofunctor³), 它的定义是将严格 2-函子的定义中的等式改为自然同构. 具体地, 对于 2-范畴 \mathcal{C}, \mathcal{D} , 一个 2-函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 包含如下资料,

- 对 \mathcal{C} 的每个对象 A , 有一个 \mathcal{D} 的对象 $F(A)$;

- 对 \mathcal{C} 的每两个对象 A, B , 有一个函子 $F_{A,B}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$;
- (保持态射的复合) 对 \mathcal{C} 的每三个对象 A, B, C , 有一个自然同构

$$\gamma_{A,B,C}: F_{A,C}(- \circ -) \xrightarrow{\sim} F_{B,C}(-) \circ F_{A,B}(-);$$

- (保持恒等态射) 对 \mathcal{C} 的每个对象 A , 有一个自然同构

$$\iota_A: F_{A,A} \circ i_A \xrightarrow{\sim} i_{F(A)};$$

满足如下融贯性等式.

$$\begin{array}{ccc}
 & F((- \circ -) \circ -) & \xrightarrow{\gamma} F(- \circ -) \circ F(-) \\
 \swarrow \alpha & & \downarrow \gamma \\
 F(- \circ (- \circ -)) & & (F(-) \circ F(-)) \circ F(-) \\
 \downarrow \gamma & & \swarrow \alpha \\
 F(-) \circ F(- \circ -) & \xrightarrow{\gamma} & F(-) \circ (F(-) \circ F(-))
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 F(-) \circ F(i) & \xrightarrow{\iota} & F(-) \circ i \\
 \uparrow \gamma & & \downarrow \rho \\
 F(- \circ i) & \xrightarrow{\rho} & F(-)
 \end{array}$$

例 A.1.11 (Hom 函子)

对于 2-范畴 \mathcal{C} 中的对象 X , 有 2-函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -): \mathcal{C} \rightarrow \text{Cat}$.

- 在对象层面, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 即 \mathcal{C} 本身的资料;
- 对两个对象 A, B , 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Cat}}(\text{Hom}(X, A), \text{Hom}(X, B))$ 来自于复合函子 $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, B)$;
- 2-函子的定义中其它结构和性质皆出自 2-范畴 \mathcal{C} 的结构和性质.

类似地, 有 2-函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$.

³注意我们所说的 2-范畴均为弱 2-范畴. 此外有若干种不同的 2-函子的概念, 但“伪函子”这个名字不好听, 故以 2-函子称呼这种概念.

2-范畴中的万有性质

命题-定义 A.1.12 (2-范畴的终对象)

设 \mathcal{C} 为 2-范畴, 称 \mathcal{C} 的对象 1 为终对象是指对任何对象 X , $\text{Hom}(X, 1)$ 等价于终范畴. 展开所有定义, 这意味着对任何对象 X 存在 1-态射 $X \rightarrow 1$, 且对任何两个 1-态射 $f, g: X \rightarrow 1$, 存在唯一的 2-态射 $\alpha: f \rightarrow g$, 且 α 为同构.

与普通范畴中类似, 终对象 (乃至一般的极限) 可定义为函子 $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$ 的表示对象.

俯 2-范畴

定义 A.1.13 (俯 2-范畴)

设 \mathcal{C} 为 2-范畴, X 为其对象. 定义俯 2-范畴 \mathcal{C}/X 如下,

- 对象为 \mathcal{C} 中的态射 $Y \rightarrow X$;
- 态射为 (差一个 2-同构的) 交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & X & \end{array}$$

(其中 \searrow 和 \nearrow 箭头之间有一个 \simeq 的 2-态射)

- 2-态射为如下的图.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & X & \end{array}$$

(其中 \searrow 和 \nearrow 箭头之间有一个 \simeq 的 2-态射)

A.2 伴随

2-范畴是谈论伴随的自然的语境.

定义 A.2.1 (伴随)

一个 2-范畴中的一组伴随 $D \xleftarrow[\underset{G}{\perp}]{F} C$ 是如下资料:

- 两个对象 C, D ,
- 两个态射 $F: C \rightarrow D$ (称为左伴随), $G: D \rightarrow C$ (称为右伴随),

- 两个 2-态射 $\eta: \text{id}_C \rightarrow GF$ (称为单位), $\varepsilon: FG \rightarrow \text{id}_D$ (称为余单位);

满足如下 2-态射的等式,

$$\begin{array}{ccc}
 C & \xrightarrow{\text{id}_C} & C \\
 \searrow F & \eta \Downarrow & \nearrow G \\
 & D & \\
 & \xrightarrow{\text{id}_D} & D
 \end{array} = \text{id}_F, \quad
 \begin{array}{ccc}
 & C & \xrightarrow{\text{id}_C} & C \\
 & \nearrow G & \Downarrow \varepsilon & \searrow F \\
 D & \xrightarrow{\text{id}_D} & D & \\
 & \eta \Downarrow & \nearrow G & \\
 & C & \xrightarrow{\text{id}_C} & C
 \end{array} = \text{id}_G.$$

这个条件也可用线图⁴表示为

$$\begin{array}{c} \eta \\ \text{---} \\ F \text{---} G \text{---} \varepsilon \end{array} = \begin{array}{c} | \\ | \\ | \end{array}, \quad
 \begin{array}{c} \eta \\ \text{---} \\ G \text{---} F \text{---} \varepsilon \end{array} = \begin{array}{c} | \\ | \\ | \end{array}.$$

例 A.2.2 (伴随函子)

2-范畴 $\mathcal{C}at$ 中的伴随就是熟知的伴随函子. 对于伴随函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, 如下的线图给出了映射

$$\text{Hom}(Fc, d) \rightarrow \text{Hom}(c, Gd).$$

$$\begin{array}{c} c \\ | \\ \text{---} f \text{---} F \\ | \\ d \end{array} \mapsto \begin{array}{c} c \\ | \\ \text{---} F \text{---} G \\ | \\ d \end{array}$$

其中我们将对象 c 视为函子 $1 \rightarrow \mathcal{C}$. 考虑一个形如 \cup 的线图, 我们得到上述映射为同构. 更一般地, 两对伴随给出的如下对应为同构, 有人称为“搭档” (mates).

$$\begin{array}{c} \cup \\ \cup \end{array} \mapsto \begin{array}{c} \cup \\ \cup \end{array}$$

⁴线图是表示一些 2-范畴结构的工具. 在一个图中, 平面区域表示 2-范畴的对象, 平面区域之间的分界线表示 1-态射, 分界线上的分段点表示 2-态射.

例 A.2.3 (终点)

设一个 2-范畴 \mathcal{C} 有终对象 1. 对于 \mathcal{C} 的对象 X , 若 1-态射 $X \rightarrow 1$ 有右伴随, 则称 X 有终点. 例如 2-范畴 Cat 的一个对象有终点就是说它有终对象. 因此, 表达“范畴的终对象”可使用 Cat 中纯粹 2-范畴的语言, 而无需“拆开”这个范畴本身的结构.

命题-定义 A.2.4 (游走的伴随)

如下定义一个 2-范畴 Adj , 其中

- 有两个对象 C, D ;
- 态射由两个态射 $F: C \rightarrow D, G: D \rightarrow C$ 自由生成;
- 2-态射由 $\eta: id_C \rightarrow GF, \varepsilon: FG \rightarrow id_D$ 在定义 A.2.1 中的关系下自由生成.

那么 Adj 是游走的伴随 (walking adjunction), 即任何 2-范畴 \mathcal{X} 中的一对伴随等同于一个 2-函子 $Adj \rightarrow \mathcal{X}$. 稍具体一些, Adj 中的态射范畴可表示如下.

- $Hom(C, C) = id_C \xrightarrow{\eta} GF \xrightleftharpoons{\varepsilon} GF GF \xrightleftharpoons{\varepsilon} \cdots$. 记 Δ_+ 为有限全序集 $[-1], [0], [1], [2], \dots$ 与保序映射构成的范畴 (其中 $[n] = \{0, 1, \dots, n\}$, $[-1] = \emptyset$), 则 $Hom(C, C) \simeq \Delta_+$. Δ_+ 是所谓增广单纯形范畴 (augmented simplex category), 即单纯形范畴 Δ 添加一个始对象 $[-1]$. 后面将会提到 (注 A.8.4) 由于 Δ_+ 中的 $[0]$ 是游走的幺半群 (例 B.2.24), 保持幺半群结构的函子 $\Delta_+ \rightarrow End(\mathcal{C})$ 等同于 $End(\mathcal{C})$ 中的幺半群, 也即 \mathcal{C} 上的单子.
- $Hom(C, D) = F \xrightleftharpoons[\varepsilon]{\eta} FGF \xrightleftharpoons{\varepsilon} FGFGF \xrightleftharpoons{\varepsilon} \cdots$. 记 Δ_\perp 为 Δ 的对象 $[0], [1], [2], \dots$ 以及其中保持最小元的映射构成的子范畴. 则 $Hom(C, D) \simeq \Delta_\perp$.
- $Hom(D, D) \simeq Hom(C, C)^{op}$, $Hom(D, C) \simeq Hom(C, D)^{op}$.

伴随保持极限

现在我们谈论范畴之间的伴随函子.

命题 A.2.5

右伴随保持极限, 左伴随保持余极限.

证明. 由对偶性, 我们仅须证明前一个命题, 即右伴随保持极限. 设有伴随 $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[\underset{G}{\downarrow}]{\underset{F}{\uparrow}} \mathcal{C}$, 设

$X: I \rightarrow \mathcal{D}$ 是任意图表 (I 是小范畴). 若极限 $\lim_i X_i$ 存在, 则有自然同构


$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G \lim_i X_i) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, \lim_i X_i) \quad (1)$$

$$\simeq \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, X_i) \quad (2)$$

$$\simeq \lim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, GX_i) \quad (3)$$

$$\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, \lim_i GX_i). \quad (4)$$

由米田引理, 得同构 $G \lim_i X_i \simeq \lim_i GX_i$, 故右伴随保持极限⁵. 该证明可总结于下图中:



正方体的左右两面 (“米田嵌入保持极限”) 用在 (2), (4) 两处; 上下两面表达了 F 是 G 的左伴随, 用在 (1), (3) 两处; “后”面 (F^* 和 F^* 所在的方块) 是由于 “预层的极限逐点计算”. 由于米田嵌入是全忠实函子, 我们得到正方体的 “前”面 (G 和 G^I 所在的方块) 交换, 而这正是要证的结论. \square

例 A.2.6

遗忘函子 $\mathrm{Top} \rightarrow \mathrm{Set}$ 同时有左伴随和右伴随.

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{\text{离散}} & \\ \mathrm{Top} & \xrightleftharpoons[\text{平凡}]{\text{遗忘} \perp} & \mathrm{Set} \\ & \xleftarrow{\text{平凡}} & \end{array}$$

因此这个遗忘同时保持极限与余极限; 换言之, 拓扑空间的极限与余极限可用底层集合的极限与余极限来计算.

⁵严格地说, 我们不仅要证明存在同构 $G \lim_i X_i \simeq \lim_i GX_i$, 还要证明 (由极限的泛性质给出的) 典范的态射 $G \lim_i X_i \rightarrow \lim_i GX_i$ 是同构. 追踪上述一串自然同构的每一步, 可以发现所得的态射 $G \lim_i X_i \simeq \lim_i GX_i$ 确实是由极限的泛性质给出的.

例 A.2.7

群胚是一种特殊的范畴, 即有嵌入 $i: \mathbf{Gpd} \rightarrow \mathbf{Cat}$. 这个函子同时有左伴随和右伴随.

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{\pi_1} & \\ \mathbf{Gpd} & \xrightleftharpoons[i]{\perp} & \mathbf{Cat} \\ & \xleftarrow{\text{极大子群胚}} & \end{array}$$

(其中 π_1 给出范畴的基本群胚, 即一个范畴中“形式地加入所有态射的逆”得到的群胚.) 因此 i 同时保持极限与余极限.

命题 A.2.8 (伴随产生一对全子范畴的等价)

设有伴随

$$\mathcal{D} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C},$$

其单位和余单位分别为 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$, $\varepsilon: FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$. 考虑

- \mathcal{C} 中由使得 $\eta_X: X \rightarrow GF(X)$ 为同构的 X 构成的全子范畴 $\tilde{\mathcal{C}}$, 以及
- \mathcal{D} 中由使得 $\varepsilon_Y: FG(Y) \rightarrow Y$ 为同构的 Y 构成的全子范畴 $\tilde{\mathcal{D}}$,

那么 F 与 G 限制为一对互逆的范畴等价

$$\tilde{G}: \tilde{\mathcal{D}} \xrightarrow{\sim} \tilde{\mathcal{C}}, \quad \tilde{F}: \tilde{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} \tilde{\mathcal{D}}.$$

证明. 由条件, η 限制为自然变换

$$\tilde{\eta} = \eta|_{\tilde{\mathcal{C}}}: \text{id}_{\tilde{\mathcal{C}}} \rightarrow \tilde{G}\tilde{F},$$

且 $\tilde{\eta}$ 的每个分量 $\tilde{\eta}_X: X \rightarrow \tilde{G}\tilde{F}(X)$ 均为同构. 因此 $\tilde{\eta}$ 为自然同构. 类似地, $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon|_{\tilde{\mathcal{D}}}: \tilde{F}\tilde{G} \rightarrow \text{id}_{\tilde{\mathcal{D}}}$ 为自然同构. \square

例 A.2.9 (Galois 对应)

偏序集之间的 *Galois* 对应是指一对伴随

$$P^{\text{op}} \xrightleftharpoons[G]{F} Q,$$

也即两个反序的映射 $F: Q \rightarrow P$, $G: P \rightarrow Q$, 满足对于 $x \in P, y \in Q$,

$$x \leq FG(x), \quad y \leq GF(y).$$

命题 A.2.8 给出偏序集的同构

$$\{x \in P \mid x = FG(x)\}^{\text{op}} \simeq \{y \in Q \mid y = GF(y)\}.$$

命题 A.2.10

对于伴随函子 $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C}$,

- F 全忠实当且仅当单位 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ 为同构;
- G 全忠实当且仅当余单位 $\varepsilon: FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ 为同构.

证明. 考虑下图,

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) & \xrightarrow{F} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)) \\ & \searrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \eta_Y) & \downarrow \simeq \\ & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GF(Y)) \end{array}$$

F 全忠实, 即上边为自然同构, 当且仅当斜边为自然同构, 即 (由米田引理) η 为自然同构. 第二个结论是对偶的; 考虑下图即可.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y) & \xrightarrow{G} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(G(X), G(Y)) \\ & \searrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varepsilon_X, Y) & \downarrow \simeq \\ & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FG(X), Y) \end{array}$$

□

伴随的自然变换

类似于函子之间的自然变换, 伴随之间也有自然变换

定义 A.2.11 (伴随的自然变换)

设有两对伴随

$$\mathcal{C} \xrightleftharpoons[G_1]{F_1} \mathcal{D}, \quad \mathcal{C} \xrightleftharpoons[G_2]{F_2} \mathcal{D}.$$

定义伴随之间的自然变换 $(F_1 \dashv G_1) \rightarrow (F_2 \dashv G_2)$ 为一对自然变换 $\alpha: F_1 \rightarrow F_2$, $\beta: G_2 \rightarrow G_1$ (请注意方向的区别), 使得下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_2 -, -) & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_1 -, -) \\ \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G_2 -) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G_1 -) \end{array}$$

由米田引理, 给定 α 可以唯一确定 β , 反之亦然.

命题-定义 A.2.12

范畴, 伴随以及伴随之间的自然变换构成一个 2-范畴 $\mathcal{Cat}_{\mathrm{Adj}}$.

伴随三元组

定义 A.2.13 (伴随三元组)

范畴 (或一般 2-范畴中的对象) \mathcal{C}, \mathcal{D} 之间的伴随三元组 (adjoint triple) 是如下三个函子与两组伴随,

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{F} & \\ \mathcal{C} & \xrightleftharpoons[G \dashv]{\perp} & \mathcal{D} \\ & \xleftarrow[H]{\perp} & \end{array}$$

事实上, 伴随三元组 $F \dashv G \dashv H$ 等同于 2-范畴 $\mathcal{Cat}_{\mathrm{Adj}}$ 中的伴随 $(F \dashv G) \dashv (G \dashv H)$.

命题 A.2.14 (伴随三元组诱导伴随)

伴随三元组 $F \dashv G \dashv H$ 诱导两对伴随 $GF \dashv GH, FG \dashv HG$.

证明. 对于伴随函子, 结论很容易验证. 对一般的 2-范畴中的伴随, 其证明 (的一部分) 可用线图表示如下.

□

注 A.2.15

在命题 A.2.14 中, GF 为单子, GH 为余单子 (命题 A.8.3).

命题 A.2.16

对于定义 A.2.13 中的伴随三元组 $F \dashv G \dashv H$, 第一个伴随的单位 $\mathrm{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow GF$ 为同构当且仅当第二个伴随的余单位 $GH \rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$ 为同构. 因此, 由命题 A.2.10, F 全忠实当且仅当 H 全忠实.

证明. 考虑如下交换图,

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(X, Y) & \xleftarrow{\mathrm{Hom}(X, \varepsilon_Y)} & \mathrm{Hom}(X, GH(Y)) \\ \mathrm{Hom}(\eta_X, Y) \uparrow & & \uparrow \simeq \\ \mathrm{Hom}(GF(X), Y) & \xleftarrow{\simeq} & \mathrm{Hom}(F(X), H(Y)) \end{array}$$

伴随给出右边与下边的同构, 故左边为同构当且仅当上边为同构. 由米田引理即证. \square

伴随函子的 Frobenius 互反律

Frobenius 互反律是在代数拓扑, 表示论, 逻辑等等许多场合出现的一种重要现象.

定义 A.2.17 (Frobenius 互反律)

设范畴 \mathcal{C}, \mathcal{D} 具有乘积, 考虑一对伴随函子 $\mathcal{C} \xrightleftharpoons[f^*]{f_!} \mathcal{D}$. 若对 \mathcal{C} 的任意对象 X 与 \mathcal{D} 的任意对象 Y , 典范的投影映射

$$\pi: f_!(f^*Y \times X) \rightarrow Y \times f_!(X)$$

为同构, 则称伴随 $f_! \dashv f^*$ 满足 *Frobenius 互反律* (reciprocity). 这个概念还可推广到更一般的么半范畴, 其中乘积推广为某种运算 \otimes , 要求 f^* 保持 \otimes .

命题 A.2.18 (基变换)

设范畴 \mathcal{C} 存在拉回, 对于态射 $f: X \rightarrow Y$, 记 $f_! = \Sigma_f$ 为拉回 $f^*: \mathcal{C}/Y \rightarrow \mathcal{C}/X$ 的左伴随 (命题 1.1.33), 那么伴随 $f_! \dashv f^*$ 满足 Frobenius 互反律.

证明. 此时 Frobenius 互反律说的是对任意态射 $U \rightarrow X$ 与 $V \rightarrow Y$, $f^*V \times_X U \simeq U \times_Y U$.

这是因为下图中两个小方块为拉回, 故大长方形为拉回.

$$\begin{array}{ccccc} f^*V \times_X U & \longrightarrow & f^*V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

□

命题 A.2.19

设范畴 \mathcal{C}, \mathcal{D} 存在拉回, 且为积闭范畴 (定义 1.1.2). 对于伴随函子 $\mathcal{C} \xrightleftharpoons[f^*]{f_!} \mathcal{D}$, 其满足 Frobenius 互反律当且仅当 f^* 保持指数对象.

证明. Frobenius 互反律说的是下图的外层方块交换, 而 f^* 保持指数对象说的是下图的里层方块交换; 由伴随的唯一性, 两者等价.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xleftarrow[(-)^W]{(-) \times W} & \mathcal{D} \\ \uparrow f_! \dashv & f^* & f^* \vdash \uparrow f_! \\ \mathcal{C} & \xleftarrow[(-) \times f^* W]{(-)^{f^* W}} & \mathcal{C} \end{array}$$

□

这个结论的应用包括“意象中拉回保持指数对象” (命题 1.1.43), 子位象的性质 (命题 2.2.5) 以及位象开映射的等价定义 (命题 2.2.29).

A.3 自反子范畴与局部化

定义 A.3.1 (自反子范畴, 自反局部化)

若一个全子范畴的嵌入 $i: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 则称 i 为自反子范畴 (reflective subcategory), a 为自反局部化 (reflective localization).

$$\mathcal{D} \xleftarrow[a]{i} \mathcal{C}$$

对于 \mathcal{C} 的对象 c , $a(c)$ 称作 c 的反映 (reflection). 若进一步有 a 保持有限极限, 则称之为 (左) 正合局部化 (left-exact localization).

注意文献中有些地方以“局部化”代指我们所谓正合局部化.

由定义, 每个对象 c 到其反映有典范的态射 $c \rightarrow a(c)$, 来自上述伴随的单位 $\text{id}_c \rightarrow i \circ a$; 而且 c 到 \mathcal{D} 的任何对象的态射都唯一地穿过这个态射. 由命题 A.2.10, 一对伴随 $\mathcal{D} \xrightleftharpoons[i]{a} \mathcal{C}$ 构成自反子范畴当且仅当对 \mathcal{D} 的所有对象 d , 余单位 $\varepsilon_d: ai(d) \rightarrow d$ 为同构.

例 A.3.2

将偏序集视为范畴, 那么嵌入 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 为自反子范畴, 反映函子 $a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为向上取整. 对于实数 r 与整数 n , $r \leq n$ 当且仅当 $a(r) \leq n$.

例 A.3.3

Abel 群范畴 \mathbf{Ab} 是群范畴 \mathbf{Grp} 的自反子范畴, 群 G 的反映是其 Abel 化 (abelianization) $G/[G, G]$. 类似地, 对于环 R , 交换 R -代数的范畴是 R -代数范畴的自反子范畴, 代数 A 的反映是 A 商掉由交换子生成的理想.

例 A.3.4

设 R 为环, 子集 $S \subset R$ 包含 1 且对乘法封闭⁶. R 关于 S 的局部化 $S^{-1}R$ 是在 R 中“强行使得 S 的元素都可逆”得到的环, 可构造为“分式环”

$$\left\{ \frac{x}{s} \mid x \in R, s \in S \right\} / \left(\frac{x}{s} \sim \frac{x'}{s'} \Leftrightarrow \exists t \in S, t(xs' - x's) = 0 \right).$$

$(S^{-1}R)$ -模范畴可视为 R -模范畴的全子范畴, 即

$$(S^{-1}R)\text{Mod} \simeq \{M \in R\text{Mod} \mid \forall s \in S, s \text{ 在 } M \text{ 上的作用可逆}\}.$$

$(S^{-1}R)\text{Mod}$ 作为 $R\text{Mod}$ 的自反子范畴, 其嵌入与反映恰为张量-同态伴随

$$(S^{-1}R)\text{Mod} \xrightleftharpoons[\text{Hom}(S^{-1}R, -)]{S^{-1}R \otimes -} R\text{Mod}.$$

容易证明 $S^{-1}R \otimes -$ 保持有限极限; 人们称 $S^{-1}R$ 为平坦 R -代数. 在代数-几何对偶中, 局部化可类比为向量丛限制到子空间上的过程.

一个范畴 \mathcal{C} 的全体自反子范畴在包含关系下构成一个偏序集. 关于这个偏序, 有如下实用结论.

⁶这是一种饱和性条件, 其目的是使用分式计算 (calculus of fractions). 后面我们将介绍范畴的局部化中的类似方法.

命题 A.3.5

设 \mathcal{D}, \mathcal{E} 是 \mathcal{C} 的自反子范畴, 如图,

$$\mathcal{D} \begin{array}{c} \xleftarrow{a_1} \\ \perp \\ \xrightarrow{i_1} \end{array} \mathcal{C} \quad \mathcal{E} \begin{array}{c} \xleftarrow{a_2} \\ \perp \\ \xrightarrow{i_2} \end{array} \mathcal{C}$$

则以下条件等价.

- (1) i_1 穿过 i_2 ;
- (2) a_1 穿过 a_2 ;
- (3) 存在一对伴随 $\mathcal{D} \begin{array}{c} \xleftarrow{a_3} \\ \perp \\ \xrightarrow{i_3} \end{array} \mathcal{E}$ 使得 $i_1 = i_2 i_3$, $a_1 = a_3 a_2$.

证明.

- (3) \Rightarrow (1), (3) \Rightarrow (2) 是明显的.
- (1) \Rightarrow (3). 令 $a_3 = a_1 i_2$ 即可.
- (2) \Rightarrow (3). 令 $i_3 = a_2 i_1$ 即可.

□

自反子范畴中的极限与余极限可由原来范畴中的极限和余极限得到.

命题 A.3.6 (自反子范畴中的极限与余极限)

设 $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ 为自反子范畴, 记其反映函子为 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. 对任意图 $X: I \rightarrow \mathcal{D}$,

- $\lim_i^{\mathcal{D}} X_i$ 存在当且仅当 $\lim_i^{\mathcal{C}} X_i$ 存在, 且此时有 $\lim_i^{\mathcal{D}} X_i \simeq \lim_i^{\mathcal{C}} X_i$.
- 当 $\operatorname{colim}_i^{\mathcal{C}} X_i$ 存在时, $\operatorname{colim}_i^{\mathcal{D}} X_i$ 存在, 且有 $\operatorname{colim}_i^{\mathcal{D}} X_i \simeq a(\operatorname{colim}_i^{\mathcal{C}} X_i)$, 注意这里需要取 a 下的像.

证明.

- 假设 $\lim_i^{\mathcal{D}} X_i$ 存在. 嵌入 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 作为右伴随保持极限, 故 $\lim_i^{\mathcal{C}} X_i$ 存在且同构于 $\lim_i^{\mathcal{D}} X_i$.
- 假设 $\lim_i^{\mathcal{C}} X_i$ 存在. 那么有自然同构

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(-, \lim_i^{\mathcal{C}} X_i) &\simeq \lim_i^{\operatorname{Set}} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X_i) \\ &\simeq \lim_i^{\operatorname{Set}} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(a(-), X_i) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(a(-), \lim_i^{\mathcal{C}} X_i), \end{aligned}$$

这说明 $\lim_i^C X_i$ 差一个同构落在 \mathcal{D} 中, 因而 $\lim_i^D X_i \simeq \lim_i^C X_i$.

- 假设 $\operatorname{colim}_i^C X_i$ 存在. 反映 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 作为左伴随保持余极限, 故 $\lim_i^D X_i$ 存在且同构于 $a(\lim_i^C X_i)$.

□

自反局部化是一般的局部化概念的特例. 在某些范畴中, 一些态射本来不可逆, 但我们希望它们可逆; 通过局部化我们可以构造一个新的范畴让这些态射变得可逆, 同时新的范畴尽可能逼近原来的范畴.

定义 A.3.7 (局部化)

设 \mathcal{C} 为范畴, W 为 \mathcal{C} 中的一族态射. 若存在范畴 $\mathcal{C}[W^{-1}]$ 与函子 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[W^{-1}]$ 满足如下条件, 则称之为 \mathcal{C} 关于 W 的局部化.

- 对任意 $w \in W$, $a(w)$ 为同构;
- (万有性质) 对任意范畴 \mathcal{E} 与函子 $b: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, 若 b 将 W 的元素变为同构, 则 b 穿过 a 有“唯一”的分解, “唯一”是指两种分解至多差一个唯一的自然同构. 更具体地说, 存在函子 $f: \mathcal{C}[W^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$ 以及自然同构 $\rho: b \xrightarrow{\sim} fa$, 且对任意两个自然同构 $\rho: b \xrightarrow{\sim} fa, \rho': b \xrightarrow{\sim} f'a$ 都存在唯一的自然同构 $\kappa: f \rightarrow f'$, 满足 $\rho' = (\kappa \cdot a)\rho$.

注意局部化的万有性质是 2-范畴中的始对象 (定义 A.1.12), 故 $\mathcal{C}[W^{-1}]$ 是在范畴等价 (而非范畴同构) 的意义下唯一确定的.

命题 A.3.8 (自反子范畴是局部化)

对于自反子范畴 (A.3.1)

$$\mathcal{D} \xrightleftharpoons[\underset{i}{\rightarrow}]{\overset{a}{\leftarrow}} \mathcal{C},$$

记

$$W = \{\mathcal{C} \text{ 中的态射 } f \mid a(f) \text{ 可逆}\},$$

则函子 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 给出定义 A.3.7 中的局部化 $\mathcal{C}[W^{-1}]$.

证明. 我们要证明对任意范畴 \mathcal{E} 以及函子 $b: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, 若 b 将 W 的元素变为同构, 则 b 穿过 a 有唯一的分解. 考虑伴随的单位 $\eta: \operatorname{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow ia$, 作如下自然变换 $\rho: b \rightarrow bia$.

$$\rho = b \cdot \eta = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\operatorname{id}_{\mathcal{C}}} & \mathcal{C} \xrightarrow{b} \mathcal{E} \\ & \searrow a \quad \Downarrow \eta \quad \nearrow i & \\ & \mathcal{D} & \end{array}$$

对 \mathcal{C} 的每个对象 c , 由于 $\eta_c: c \rightarrow ia(c)$ 被 a 变为同构⁷, 按定义它也被 b 变为同构. 因此 ρ 为自然同构.⁸ 我们得到一个 b 穿过 a 的分解.

对任意一个 b 穿过 a 的分解 $\rho': b \xrightarrow{\sim} b'a$, 考虑伴随的余单位 $\varepsilon: ai \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ (由命题 A.2.10 它对 \mathcal{D} 的每个对象都给出同构), 我们得到如下自然变换 $\kappa: bi \rightarrow b'$.

$$\kappa = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{b} & \mathcal{E} \\ i \nearrow & \Downarrow \varepsilon & \Downarrow \rho' \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{id}_{\mathcal{D}}} & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{c} a \searrow \\ b' \nearrow \end{array}$$

那么 κ 为自然同构. 进一步, 由伴随的定义有如下等式,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\text{id}_{\mathcal{C}}} & \mathcal{C} \\ a \searrow & \Downarrow \eta & \nearrow i \\ \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{id}_{\mathcal{D}}} & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{b} & \mathcal{E} \\ & \Downarrow \rho' & \\ & & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{c} a \searrow \\ b' \nearrow \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{b} & \mathcal{E} \\ a \searrow & \Downarrow \rho' & \\ \mathcal{D} & & \mathcal{D} \end{array} \begin{array}{c} a \searrow \\ b' \nearrow \end{array}$$

即 $\rho' = (\kappa \cdot a)\rho$. 这样的 κ 是唯一的, 因为 ρ', ρ 均为自然同构, 而 a 是本质满函子. \square

局部对象

在自反局部化 (A.3.8) 中, 子范畴 \mathcal{D} 有一种实用的描述: 它是局部对象的子范畴.

定义 A.3.9 (局部对象)

设 S 是范畴 \mathcal{C} 中的一族态射, X 为 \mathcal{C} 的对象. 若对任意 $(f: A \rightarrow B) \in S$,

$$\text{Hom}(f, X): \text{Hom}(B, X) \rightarrow \text{Hom}(A, X)$$

均为双射 ([1] 将这个条件称作 X 垂直于 f), 则称 X 为 S -局部对象 (local object). 记 S -局部对象的全子范畴为 $\mathcal{C}_S \hookrightarrow \mathcal{C}$.

直观上, “在 S -局部对象 X 看来”, S 中的态射 $f: A \rightarrow B$ 就像是一个同构.

定义 A.3.10 (S -等价)

设 S 是范畴 \mathcal{C} 中的一族态射, $f: A \rightarrow B$ 为 \mathcal{C} 中的态射. 若对任意 S -局部对象 X ,

$$\text{Hom}(f, X): \text{Hom}(B, X) \rightarrow \text{Hom}(A, X)$$

均为双射, 则称 f 为 S -等价.

⁷这是由于“幂等性” $iaia \simeq ia$.

⁸若一个自然变换在每个对象上给出同构, 那么它是自然同构.

定义 A.3.11 (局部化态射)

设 S 是范畴 \mathcal{C} 中的一族态射. 对于态射 $f: X \rightarrow X'$, 若 X' 为 S -局部对象且 f 为 S -等价, 则称之为 S -局部化态射.

例 A.3.12 (完备 Boole 代数作为位格范畴的局部对象)

考虑一个元素 a 生成的自由位格 $\{\perp, a, \top\}$ (定义 2.1.1) 与自由 Boole 代数 $\{\perp, a, \neg a, \top\}$. 位格范畴 \mathbf{Frm} 中关于态射

$$\{\perp, a, \top\} \hookrightarrow \{\perp, a, \neg a, \top\}$$

的局部对象为完备 Boole 代数. 位格 $\mathcal{O}(X)$ 的局部化态射是“双重否定子位象” $X_{\neg\neg} \hookrightarrow X$ (例 2.2.23).

例 A.3.13 (Abel 群作为群范畴的局部对象)

考虑 2 个元素生成的自由群 F_2 以及自由 Abel 群 \mathbb{Z}^2 . 群范畴 \mathbf{Grp} 中关于态射 $F_2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ 的局部对象即为 Abel 群. 群 G 的局部化态射即商映射 $G \rightarrow G/[G, G]$.

命题 A.3.14 (局部对象关于极限封闭)

设 S 是范畴 \mathcal{C} 中的一族态射, $X: I \rightarrow \mathcal{C}_S \hookrightarrow \mathcal{C}$ 为 S -局部对象的图. 假设 X 的极限 $\lim_i X_i$ 存在, 那么 $\lim_i X_i$ 是 S -局部对象.

证明. 对任意 $(f: A \rightarrow B) \in S$ 以及 $g: A \rightarrow \lim_i X_i$, 由于 X_i 为 S -局部对象, 锥 $(\pi_i \circ g: A \rightarrow X_i)_{i \in I}$ 确定了唯一的锥 $(h_i: B \rightarrow X_i)_{i \in I}$ 使得下图交换.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & \lim_i X_i \\ f \downarrow & & \downarrow \pi_i \\ B & \xrightarrow{h_i} & X_i \end{array}$$

□

上述性质的应用之一是预层范畴中的层关于极限封闭 (命题 3.6.1, 3.7.10).

命题 A.3.15 (自反子范畴可视为局部对象的子范畴)

沿用命题 A.3.8 的记号, 子范畴 $i: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 等价于 W -局部对象的全子范畴 $\mathcal{C}_W \hookrightarrow \mathcal{C}$.

证明. 对于 \mathcal{D} 的对象 X , 由于自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, i(X)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(a(-), X),$$

知 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, i(X))$ 将 W 的元素对应到集合的双射, 即 $i(X)$ 是 W -局部对象.

另一方面, 设 \mathcal{C} 的对象 Y 是 W -局部对象, 我们证明 $\eta_Y: Y \rightarrow ia(Y)$ 为同构. 首先, η_Y 是 W 的元素, 由 Y 是 W -局部对象得同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\eta_Y, Y): \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(ia(Y), Y) \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Y).$$

考虑右边的元素 id_Y 在左边的原像, 知 η_Y 有左逆 $\eta_Y^{-1}: ia(Y) \rightarrow Y$. 但 $ia(Y)$ 也是 W -局部对象, 同理可得 η_Y^{-1} 有左逆. 左逆的左逆一定是自身. 这证明了 $\eta_Y: Y \rightarrow ia(Y)$ 为同构. \square

上面说明自反子范畴是局部对象的子范畴; 另一方面, 我们希望局部对象的子范畴是自反子范畴, 从而通过自反子范畴的“反映” $c \rightarrow a(c)$, 每个对象 c 都被一个尽可能接近的 S -局部对象替代. 这不总是可行的 (例 A.3.12 的完备 Boole 代数范畴不是自反子范畴), 但对于可表现范畴有一些部分的结论.

命题 A.3.16

设 S 是可表现范畴 \mathcal{C} 中的一族态射构成的小集合. 那么 $\mathcal{C}_S \hookrightarrow \mathcal{C}$ 为自反子范畴.

见 [1] 命题 1.36.

注 A.3.17 (强饱和态射族)

对于余完备范畴 \mathcal{C} 中的一族态射 S , 称其为强饱和态射族 (strongly saturated class of morphisms) 是指 S 关于沿 \mathcal{C} 中任何态射的推出封闭, 关于箭头范畴 $\mathrm{Fun}(\bullet \rightarrow \bullet, \mathcal{C})$ 中的余极限封闭, 且满足三选二性质: 若三个态射 f, g, h 满足 $f = gh$, 只要其中两个属于 S , 则三个都属于 S .

任何一族态射 S 都生成一个最小的强饱和态射族 \bar{S} . 可以证明, 在命题 A.3.16 中, 对于 S -局部对象的子范畴 $\mathcal{C}_S \hookrightarrow \mathcal{C}$ 的左伴随 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_S$, 被 a 变为同构的态射的族恰为 \bar{S} . [24] 5.5.4.15 证明了这一命题的 ∞ -范畴版本, 当然它可以逐字翻译为普通范畴的版本.

命题 A.3.18 (正合局部化的判定)

设 \mathcal{C} 具有有限极限, 沿用命题 A.3.8 的记号, a 是正合局部化当且仅当 W 关于基变换稳定, 即 W 的元素的拉回仍是 W 的元素.

证明. 该证明取自 $n\text{Lab}$.⁹ 命题的一半是显然的: 假设 a 是正合局部化, 那么 a 保持拉回, 而同构的拉回为同构, 故 W 的元素的拉回仍是 W 的元素.

另一方面, 假设 W 关于基变换稳定. 首先, 因为 \mathcal{C} 的终对象显然是 W -局部对象, 所以 a 保持终对象. 下面证明 a 保持拉回. 注意 W 满足“三选二性质”: 若三个态射 f, g, h 满足 $f = gh$, 只要其中两个属于 W , 则三个都属于 W . 考虑任意两个态射 $X \rightarrow Y \leftarrow Z$. 以下论证中涉及的态射 $X \rightarrow a(X)$ 默认为伴随的单位 η_X . 注意 $\eta_X \in W$.

容易说明 $a(X) \times_{a(Y)} a(Z)$ 是 W -局部对象. 因此, 要证明 a 保持拉回, 只需证明 $(X \times_Y Z \rightarrow a(X) \times_{a(Y)} a(Z)) \in W$. 将其分解为

$$X \times_Y Z \rightarrow X \times_{a(Y)} Z \rightarrow a(X) \times_{a(Y)} Z \rightarrow a(X) \times_{a(Y)} a(Z).$$

只需证明这三个态射均属于 W .

- 对于第一个态射 $X \times_Y Z \rightarrow X \times_{a(Y)} Z$, 它是 $\Delta: Y \rightarrow Y \times_{a(Y)} Y$ 的拉回 (左下图), 又 $\pi_1 \Delta = \text{id}_Y$, π_1 是右下图的拉回.

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \Delta \\ X \times_{a(Y)} Z & \longrightarrow & Y \times_{a(Y)} Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Y \times_{a(Y)} Y & \xrightarrow{\pi_2} & Y \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \eta_Y \\ Y & \xrightarrow{\eta_Y} & a(Y) \end{array}$$

- 第二个和第三个态射的原理相同; 第二个态射是如下的拉回.

$$\begin{array}{ccccc} X \times_{a(Y)} Z & \hookrightarrow & X \times Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \eta_X \times \text{id}_Z & & \downarrow \eta_X \\ a(X) \times_{a(Y)} Z & \hookrightarrow & a(X) \times Z & \longrightarrow & a(X) \end{array}$$

□

命题 A.3.19 (指数理想的判定)

设 \mathcal{C} 为积闭范畴, \mathcal{D} 为自反子范畴, 反映函子为 a . 称 \mathcal{D} 为指数理想 (exponential ideal) 是指对任意 \mathcal{C} 的对象 X 与 \mathcal{D} 的对象 Y , 都有 Y^X 为 \mathcal{D} 的对象 (至多相差一个同构). 那么 \mathcal{D} 为指数理想当且仅当 a 保持有限积.

⁹[https://ncatlab.org/nlab/show/reflective+sub-\(infinity,1\)-category](https://ncatlab.org/nlab/show/reflective+sub-(infinity,1)-category)

证明. 假设 a 保持有限积, 则有自然同构 $a(Z \times X) \simeq a(Z) \times a(X) \simeq a(a(Z) \times X)$,

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y^X) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z \times X, Y) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z \times X), Y) && (Y \text{ 是 } \mathcal{D} \text{ 的对象}) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(a(Z) \times X), Y) && (a \text{ 保持有限积, 且 } a^2 \simeq a) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z) \times X, Y) && (Y \text{ 是 } \mathcal{D} \text{ 的对象}) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z), Y^X),
 \end{aligned}$$

故任何态射 $Z \rightarrow Y^X$ 唯一地穿过 $Z \rightarrow a(Z)$, 这说明 Y^X 是 \mathcal{D} 的对象.

另一方面, 假设对任意 \mathcal{C} 的对象 X 与 \mathcal{D} 的对象 Y , 都有 Y^X 为 \mathcal{D} 的对象. 那么有自然同构

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z \times X, Y) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y^X) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z), Y^X) && (Y^X \text{ 为 } \mathcal{D} \text{ 的对象}) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z) \times X, Y) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(Z) \times a(X), Y) && (\text{重复上述论证可得}).
 \end{aligned}$$

故任何态射 $Z \times X \rightarrow Y$ 唯一地穿过 $Z \times X \rightarrow a(Z) \times a(X)$, 这说明 $a(Z) \times a(X) \simeq a(Z \times X)$. \square

分式计算

局部化 $\mathcal{C}[W^{-1}]$ 有一种明显的构造: 其对象与 \mathcal{C} 相同, 而态射为折线形的图表

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \bullet & & \bullet & & \cdots & \bullet \\
 & \swarrow^{w_1} & \searrow_{f_1} & \swarrow^{w_2} & \searrow_{f_2} & \cdots & \swarrow^{w_r} \searrow_{f_r} \\
 \bullet & & \bullet & & \bullet & & \bullet
 \end{array} \quad (w_i \in W).$$

实践中未必需要如此复杂的态射. 正如环的局部化 $S^{-1}R$ 的元素可写成分式 x/s ($s \in S$), 我们也希望范畴的局部化 $\mathcal{C}[W^{-1}]$ 中态射可写成 fw^{-1} ($w \in W$), 如下图. 将态射写成这种形式的方法称作右分式计算¹⁰. 这对态射族 W 有一定的要求.

$$\begin{array}{ccc}
 & \bullet & \\
 & \swarrow^w \searrow^f & \\
 \bullet & \xrightarrow{fw^{-1}} & \bullet
 \end{array}$$

定义 A.3.20 (分式计算)

若范畴 \mathcal{C} 中的一族态射 W 满足如下条件, 则称 (\mathcal{C}, W) 具有右分式计算 (calculus of right fractions):

¹⁰这里 fw^{-1} 是一个纯粹形式的记号. 称之为“右分式”的原因是 w^{-1} 在右边, 但这种称呼在文献中并不统一.

(0) W 包含所有恒等态射, 且关于态射复合封闭;

(1) 如图, 给定 $w \in W$ 与 f , 总存在 $w' \in W$ 与 f' 使下图交换;

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \xrightarrow{f'} & \bullet \\ w' \downarrow & & \downarrow w \\ \bullet & \xrightarrow{f} & \bullet \end{array}$$

(2) 如图, 若 $w \in W$ 余等化 f, g , 总存在 $w' \in W$ 等化 f, g .

$$\bullet \xrightarrow{w'} \bullet \xrightarrow[f]{f} \bullet \xrightarrow{w} \bullet$$

设计条件 (1)(2) 是为了如下的命题.

命题-定义 A.3.21 (分式计算的构造)

设 (\mathcal{C}, W) 具有右分式计算. 如下构造定义了范畴 $\mathcal{C}[W^{-1}]$.

- 其对象为 \mathcal{C} 的对象;
- 态射 $X \rightarrow Y$ 为 \mathcal{C} 中图表 $fw^{-1} := \begin{array}{ccc} & \bullet & \\ w \swarrow & & \searrow f \\ X & & Y \end{array}$ 的等价类, 其中 $w \in W$;
- 两个态射 $fw^{-1}, f'(w')^{-1}$ 等价是指存在 s, t 使得下图交换, 且 $ws = w't \in W$;

$$\begin{array}{ccccc} & & \bullet & & \\ & s \swarrow & & \searrow t & \\ \bullet & & & & \bullet \\ w \swarrow & & & & \searrow f' \\ X & & w' & & Y \\ & \nwarrow & & \nearrow f & \end{array}$$

(我们也可将这种等价做成一个 2-态射, 从而形成一个 2-范畴.)


- 态射的复合: 给定图中的 f, w, g, v ($w, v \in W$), 由定义 A.3.20 (1), 存在 f', v' ($v' \in W$) 使下图交换.

$$\begin{array}{ccccc} & & \bullet & & \\ & v' \swarrow & & \searrow f' & \\ \bullet & & & & \bullet \\ w \swarrow & & f \searrow & & \swarrow v \searrow g \\ X & & Y & & Z \end{array}$$

定义 $(gv^{-1}) \circ (fw^{-1})$ 为 $(gf')(wv')^{-1}$.


证明. 我们需要证明上面的等价关系以及态射复合的良好性. 首先证明一个引理: 在定义 A.3.20 (1) 中, 态射 $f'(w')^{-1}$ 的等价类是唯一确定的. 考虑下图, 给定 f, w, f', w', f'', w''

$(w, w', w'' \in W)$, 取 g, v ($v \in W$) 使 $w''g = wv$.




此时不一定有 $f''g = f'v$, 但有 $wf''g = wf'v$; 由定义 A.3.20 (2), 存在 $\tilde{w} \in W$ 使得 $f''g\tilde{w} = f'v\tilde{w}$. 这证明了 $f'(w')^{-1}$ 与 $f''(w'')^{-1}$ 等价.

下面说明等价关系的传递性. 考虑下图, 给定 $f_1, w_1, f_2, w_2, f_3, w_3$ ($w_1, w_2, w_3 \in W$), 以及 p, q, s, t 构成 $f_1w_1^{-1}, f_2w_2^{-1}, f_3w_3^{-1}$ 之间的两个等价, 我们要证明 $f_1w_1^{-1}$ 与 $f_3w_3^{-1}$ 等价.




注意 $w_2q, w_2s \in W$. 由前述引理知 $q(w_2q)^{-1}$ 等价于 $s(w_2s)^{-1}$, 即存在 m, n 使得上图交换, 且 $w_2qm = w_2sn \in W$. 那么 pm, tn 给出了 $f_1w_1^{-1}$ 与 $f_3w_3^{-1}$ 之间的等价.

由传递性, 我们还得到等价关系的另一种刻画. 注意到在如下交换图中, fw^{-1} 必然等价于 $f'(w')^{-1}$; 称下图为一个基础等价. 由传递性, 两个态射 $f_1w_1^{-1}, f_2w_2^{-1}$ 等价当且仅当它们可以通过一系列基础等价 (方向任意) 相连接.



我们还需要说明复合的良好性. 注意由前面的引理, 只要给定两个态射 fw^{-1}, gv^{-1} 的代表元 f, w, g, v , 就唯一确定了复合 $(gv^{-1}) \circ (fw^{-1})$. 考虑如下交换图 ($u, v, v', w, w' \in W$), 有 $(gh)(wu)^{-1} = (g'th)(w'su)^{-1}$. 这说明基础等价给出相同的复合, 故复合不依赖于等价类的代表元的选取.



定义函子 $a: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[W^{-1}]$ 将态射 $f: X \rightarrow Y$ 变为态射 $f(\text{id}_X)^{-1}$. 在完成上述所有构造之后, 验证它是局部化不过是例行公事: 对任意函子 $b: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, 若 b 将 W 的元素变为同

构, 则可构造函数 $b': \mathcal{C}[W^{-1}] \rightarrow \mathcal{E}$, 将态射 fw^{-1} 对应到态射 $b(f)b(w)^{-1}$ (它不依赖代表元 f, w 的选取). 我们发现 $b = b'a$. 余下的细节留给读者. \square

上述构造所得的范畴 $\mathcal{C}[W^{-1}]$ 中的同态集可等价地表示如下.

命题 A.3.22

设 (\mathcal{C}, W) 具有右分式计算, 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}[W^{-1}]}(X, Y) \simeq \mathrm{colim}_{(X' \rightarrow X) \in W} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y).$$

A.4 预层范畴与米田嵌入

固定如下记号: \mathcal{C} 为小范畴, $\mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}} = \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathrm{Set})$ 为米田嵌入.

米田引理

由 \mathcal{C} 的对象 c , 可得 \mathcal{C} 上的预层 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, c)$. 这事实上是 \mathcal{C} 到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的嵌入.

定义 A.4.1 (米田嵌入)

小范畴 \mathcal{C} 的米田嵌入是指函子 $\mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}, c \mapsto \mathfrak{y}(c) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, c)$. 米田嵌入的像 $\mathfrak{y}(c)$ 称为可表函子 (representable functor).

注 A.4.2

米田嵌入是 Hom 函子 $\mathrm{Hom}: \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathrm{Set}$ 对应的函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathrm{Set})$. 这是因为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是“范畴的范畴” Cat 中的指数对象.

一个自然变换 $\mathfrak{y}(c) \rightarrow F$ 由其中 $\mathrm{id}_c \in \mathfrak{y}(c)(c)$ 的像 ($F(c)$ 的元素) 唯一决定, 因此有如下的结论.

命题 A.4.3 (米田引理)

对任意 $F \in \widehat{\mathcal{C}}$, 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), F) \simeq F(c),$$

其两个方向的映射分别为

$$\begin{aligned} (\alpha: \mathfrak{y}(c) \rightarrow F) &\mapsto \alpha_c(\mathrm{id}_c) \in F(c), \\ ((f: d \rightarrow c) \mapsto (F(f)(a) \in F(d))) &\leftarrow (a \in F(c)) \end{aligned}$$

注 A.4.4

米田引理在逻辑上是平凡的; 它带给我们的观点, 即 \mathcal{C} 的对象 c 可等同于函子 $\mathbf{y}(c)$, 比命题本身更重要.

可表函子的余极限**定义 A.4.5 (元素的范畴)**

对 $X \in \widehat{\mathcal{C}}$, 定义 X 的元素的范畴 $\int_{\mathcal{C}} X$ 如下. 其对象为 (c, x) , $x \in X(c)$, 态射 $(c, x) \rightarrow (d, y)$ 为 \mathcal{C} 中的态射 $f: c \rightarrow d$, 满足 $X(f)(y) = x$. 由定义, 存在“投影”函子 $\pi_X: \int_{\mathcal{C}} X \rightarrow \mathcal{C}$, $(c, x) \mapsto c$.

与之对偶, 设 $X \in \mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$, 定义 X 的元素的范畴 $\int^{\mathcal{C}} X$ 如下. 其对象为 (c, x) , $x \in X(c)$, 态射 $(c, x) \rightarrow (d, y)$ 为 \mathcal{C} 中的态射 $f: c \rightarrow d$, 满足 $X(f)(x) = y$. 此时存在投影函子 $\pi_X: \int^{\mathcal{C}} X \rightarrow \mathcal{C}$, $(c, x) \mapsto c$.

元素的范畴是一种 Grothendieck 构造 (定义 A.10.9).

注 A.4.6 (元素的范畴同构于“广义俯范畴”)

对于 $X \in \widehat{\mathcal{C}}$, 由米田引理, X 的元素的范畴同构于如下范畴: 其对象为态射 $\mathbf{y}(c) \rightarrow X$, 其态射为形如 $\begin{array}{ccc} \mathbf{y}(c) & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \mathbf{y}(d) & \rightarrow & X \end{array}$ 的交换图; 这是 $\widehat{\mathcal{C}}/X$ 的全子范畴. 若将 X 视为 \mathcal{C} 的“广义元素”, 则 X 的元素的范畴可视为“俯范畴” \mathcal{C}/X . 特别地, 当 $X = \mathbf{y}(c)$ 时, X 的元素的范畴同构于 \mathcal{C}/c .

在其它文献中, 这个范畴有时也记作 $(\mathbf{y} \downarrow X)$ 或 (\mathbf{y}, X) .

事实上, 所有态射 $\mathbf{y}(c) \rightarrow X$ 共同将 X 表示为一个余极限.

命题 A.4.7 (预层为可表函子的余极限)

$\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象 X 是如下余极限:

$$X \simeq \operatorname{colim} \left(\mathbf{y} \circ \pi_X: \int_{\mathcal{C}} X \rightarrow \widehat{\mathcal{C}} \right) = \operatorname{colim}_{\mathbf{y}(c) \rightarrow X} \mathbf{y}(c),$$

其万有余锥由所有态射 $\mathbf{y}(c) \rightarrow X$ 给出.

证明. 任给余锥 $(\phi_{c,x}: \mathfrak{y}(c) \rightarrow Y)_{(c,x)}$, 定义态射 $\eta: X \rightarrow Y$, $\eta_c: X(c) \rightarrow Y(c)$, $x \mapsto \phi_{c,x}$. 那么下图交换, 并且 η 是唯一使得下图交换的态射.

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{y}(c) & \xrightarrow{x} & X \\ & \searrow \phi_{c,x} & \downarrow \eta \\ & & Y \end{array}$$

□

例 A.4.8 (单纯集)

对于 $\mathcal{C} = \Delta$ (例 3.3.4), $\widehat{\mathcal{C}}$ 中对象 X 的元素可视为单纯集 X 中的单纯形, 包含退化的单纯形. 此时上述命题即是说 X 等同于其所有单纯形的粘合. 这符合了单纯集是由单纯形组成的直观.

自由余完备化, 脉与几何实现

在上个小节, 我们看到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是 \mathcal{C} 经过某种添加余极限的过程得到的余完备范畴. 称 $\widehat{\mathcal{C}}$ 为 \mathcal{C} 的自由余完备化 (free cocompletion); 以下命题解释了这句话中“自由”的含义, 即余完备范畴到一般范畴的“遗忘”的左伴随.

命题 A.4.9

设 \mathcal{C} 是 (小) 范畴, \mathcal{D} 是余完备范畴, 那么米田嵌入 $\mathfrak{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 给出了等价

$$\mathfrak{y}^*: \text{Fun}^{\text{colim}}(\widehat{\mathcal{C}}, \mathcal{D}) \xrightarrow{\sim} \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}),$$

其中 $\text{Fun}^{\text{colim}}$ 表示保持余极限的函子构成的范畴. 换言之, 对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 存在本质唯一¹¹的保持余极限的函子 $L: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{D}$ 使得下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\mathfrak{y}} & \widehat{\mathcal{C}} \\ & \searrow F & \downarrow L \\ & & \mathcal{D} \end{array}$$

例 A.4.10

Set 是终范畴 1 的自由余完备化; 这就是说, 对任意余完备范畴 \mathcal{D} , 一个保持余极限的函子 $F: \text{Set} \rightarrow \mathcal{D}$ 由对象 $F(1)$ 唯一确定.

¹¹这里“本质唯一”是指两个满足条件的函子之间差一个唯一的自然同构. 这也是 2-范畴中的泛性质 (定义 A.1.12).

事实上我们可以具体写出命题 A.4.9 中的函子 L .

命题 A.4.11 (脉-几何实现伴随, 米田扩张)

设 \mathcal{C} 是 (小) 范畴, \mathcal{D} 是余完备范畴. 对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 存在一对伴随

$$\widehat{\mathcal{C}} \begin{array}{c} \xrightarrow{L} \\ \xleftarrow[R]{\perp} \end{array} \mathcal{D},$$

其中 $R: \mathcal{D} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$, $R(d) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F-, d)$; 其左伴随 L 由如下余极限给出:

$$L(X) = X \otimes_{\mathcal{C}} F = \text{colim} \left(F \circ \pi_X: \int_{\mathcal{C}} X \rightarrow \mathcal{D} \right) = \text{colim}_{\mathbf{f}(c) \rightarrow X} F(c).$$

作为左伴随, L 自然保持余极限 (命题 A.2.5). 我们有时称 L 为 F 的米田扩张.

注 A.4.12

上面的伴随可解读为脉 (nerve, 函子 R) 与几何实现 (geometric realization, 函子 L) 的伴随, 其中 \mathcal{C} 是某种几何图形构成的范畴 (如下面例子中的 Δ). 脉与几何实现的概念由 Daniel Kan 1958 年的文章 *Functors involving c.s.s complexes* 提出. 这篇文章也首次引入了 Kan 扩张 (定义 A.7.1). 事实上, 几何实现是沿米田嵌入的左 Kan 扩张.

注 A.4.13

上面的伴随还是一种张量-同态伴随. 若将右伴随 R 理解为“同态集” (它是定义 3.8.31 的进一步推广); 则左伴随 L 也可记为“张量积” $- \otimes_{\mathcal{C}} F: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{D}$.

例 A.4.14 (单纯集的几何实现)

设 $\mathcal{C} = \Delta$ (例 3.3.4), $\mathcal{D} = \mathbf{Top}$ 为拓扑空间范畴. 我们知道 \mathbf{Top} 是余完备的. 设 $F: \Delta \rightarrow \mathbf{Top}$ 将 $[n]$ 对应到 n -维标准拓扑单形

$$F([n]) := \Delta^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n \mid x_1 \leq \dots \leq x_n\}.$$

那么命题 A.4.11 给出了“脉-几何实现伴随”

$$\mathbf{sSet} \begin{array}{c} \xrightarrow{|\cdot|} \\ \xleftarrow[\text{Sing}]{\perp} \end{array} \mathbf{Top}, \quad \text{Sing}(X)_n = \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(\Delta^n, X),$$

其中“脉”函子 Sing 给出拓扑空间的奇异单纯集 (singular simplicial set), 而几何实

现 $|-|$ 将单纯集 X 对应到一个 CW 复形

$$|X| = \operatorname{colim}_{\Delta^n \rightarrow X} |\Delta^n|,$$

它是 X 的所有单形 $\Delta^n \rightarrow X$ 的几何实现“粘起来”(取余极限)的结果.

在以上讨论中, 可将 \mathbf{Top} 改为小范畴的范畴 \mathbf{Cat} ($F: \Delta \rightarrow \mathbf{Cat}$ 将 $[n]$ 对应到范畴 $0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow n$), 得到范畴版本的脉-几何实现伴随

$$\mathbf{sSet} \begin{array}{c} \xrightarrow{|-|} \\ \perp \\ \xleftarrow{N} \end{array} \mathbf{Cat}, \quad N(\mathcal{C})_n := \mathbf{Fun}(0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow n, \mathcal{C}).$$

在 ∞ -范畴理论 (单纯范畴模型) 中还有单纯集与单纯范畴的脉-几何实现伴随

$$\mathbf{sSet} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathfrak{C}[-]} \\ \perp \\ \xleftarrow{N^c} \end{array} \mathbf{sCat}.$$

例 A.4.15 (几何空间与函子 $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的几何实现)

(本例需要一些背景知识.) 定义几何空间 (又称局部环化空间) (X, \mathcal{O}_X) 为拓扑空间 X 配备环层 \mathcal{O}_X , 使得每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ (定义 3.1.6) 为局部环. 我们知道几何空间的范畴 \mathbf{GeoSp} 是余完备的.

设 $\mathcal{C} = \mathbf{Aff}$ 为仿射概形的范畴 (它等价于交换环范畴的对偶 $\mathbf{Ring}^{\mathrm{op}}$), $\mathcal{D} = \mathbf{GeoSp}$ 为几何空间的范畴. 我们知道仿射概形是几何空间, 即存在嵌入函子 $F: \mathbf{Aff} \rightarrow \mathbf{GeoSp}$. 注意到 $\widehat{\mathcal{C}} \simeq \mathbf{Fun}(\mathbf{Ring}, \mathbf{Set})$. 那么命题 A.4.11 给出“脉-几何实现伴随”

$$\mathbf{Fun}(\mathbf{Ring}, \mathbf{Set}) \begin{array}{c} \xrightarrow{|-|} \\ \perp \\ \xleftarrow{R} \end{array} \mathbf{GeoSp},$$

其中右伴随 R 给出几何空间的点函子 (functor of points), 它是代数几何中表示几何空间的一种方便工具. 这对伴随给出两边某个全子范畴的等价 (命题 A.2.8), 这个全子范畴正是概形的范畴. 换言之, 概形既可视作满足某些条件的几何空间, 又可视作满足某些条件的函子 $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}$. 本例取自 Demazure 和 Gabriel 的 *Introduction to Algebraic Geometry and Algebraic Groups* 1.1 节.

预层范畴的俯范畴

预层范畴的俯范畴仍是预层范畴. 这个事实可证明预层范畴的局部积闭性.

命题 A.4.16

预层范畴的俯范畴等价于“广义俯范畴”上的预层范畴: 对 $X \in \widehat{\mathcal{C}}$, 记 X 的元素的范畴为 \mathcal{C}/X (注 A.4.6), 则

$$\widehat{\mathcal{C}}/X \simeq \widehat{\mathcal{C}/X}.$$

证明. 对于 $\widehat{\mathcal{C}}/X$ 的对象 $F \rightarrow X$, 定义 \mathcal{C}/X 上的预层

$$G = \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}/X}(-, F).$$

换言之, G 在 \mathcal{C}/X 的对象 $s: \mathfrak{Y}(c) \rightarrow X$ 上的取值为 s 在映射 $F(c) \rightarrow X(c)$ 下的原像.

反过来, 对于 \mathcal{C}/X 上的预层 G , 定义 $\widehat{\mathcal{C}}/X$ 的对象 $F \rightarrow X$ 如下. 预层 F 在对象 $c \in \mathcal{C}$ 上的取值为

$$F(c) := \coprod_{s: \mathfrak{Y}(c) \rightarrow X} G(s),$$

带有自然的投影 $F(c) \rightarrow X(c)$ (将 $G(s)$ 中的元素映射到 s), 也即自然变换 $F \rightarrow X$.

容易验证, 上述两个构造是互逆的范畴等价. □

注 A.4.17

意象 $\widehat{\mathcal{C}}/X$ 可视为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的平展空间 (注 3.1.14). 因此命题 A.4.16 可类比于“层范畴的俯范畴等价于平展空间上的层范畴”.

例 A.4.18

设 $\mathcal{C} = \mathbf{1}$ 是终范畴, X 是 $\widehat{\mathcal{C}} \simeq \mathbf{Set}$ 的对象, 那么 $\mathcal{C}/X \simeq X$ (视为离散范畴). 此时上述命题化为

$$\mathbf{Set}/X \simeq \mathbf{Set}^X.$$

A.5 (余) 滤范畴和 (余) 滤 (余) 极限

回忆对于范畴 \mathcal{C} 中的图 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$, 其上的锥是 \mathcal{C} 的对象 c (称为顶点) 以及一族相容的态射 $c \rightarrow X(i)$. 对偶地, 余锥是 \mathcal{C} 的对象 c 以及一族相容的态射 $X(i) \rightarrow c$.

定义 A.5.1 (滤范畴, 滤余极限)


若一个范畴中任意有限图都存在余锥, 则称之为滤范畴 (filtered category). 可以证明, 只需要三种形状的图

$$\emptyset, \quad \bullet \bullet, \quad \bullet \rightrightarrows \bullet$$

上都有余锥, 则所有有限图上都有余锥, 故滤范畴可定义为这三种图上有余锥的范畴. 对偏序集而言, 这个条件即是说任意有限子集都有上界, 称这样的偏序集为正向集 (directed set). 以滤范畴为指标范畴的余极限称为滤余极限 (filtered colimit).¹²

例 A.5.2

下图是一个滤范畴的例子.



命题 A.5.3 (滤范畴的等价刻画)

设 J 为小范畴, 则 J 为滤范畴当且仅当 \mathbf{Set} 中任意 J -余极限与有限极限交换.

证明. 见命题 A.6.5. □

定义 A.5.4 (ind-对象)

对于范畴 \mathcal{C} , 定义 \mathcal{C} 的一个 “ind-对象¹³” 为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中可表函子的一个滤余极限. 记 “ind-对象¹⁴” 构成的 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的全子范畴为 $\mathbf{Ind}(\mathcal{C})$.

范畴 \mathcal{C} 的 “ind-对象” 有另一种刻画, 即 \mathcal{C}^{op} 到 \mathbf{Set} 的平坦函子.

Set-值平坦函子

在没有有限极限的范畴上, 我们引入平坦函子来模拟 “保持有限极限” 这一现象. 平坦函子也是定义景之间的态射所需的关键概念. 最简单的情形是取值于集合范畴的函子.

命题-定义 A.5.5 (Set-值平坦函子)

设 \mathcal{C} 为任意范畴, 对函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 以下条件等价.

(1) F 的元素的范畴 $\int^{\mathcal{C}} F$ (定义 A.4.5) 为余滤范畴 (定义 A.5.12). 具体地,

¹²曾经, 以正向集为指标范畴的余极限又称为正向极限 (directed limit). 正向极限是一个引起混淆的术语, 因此不建议使用. 另外不幸的是, 有些文献中 “滤范畴” 和 “余滤范畴” 的概念与此处定义的反, 如 [20].

¹⁴“ind-对象” 中 ind 来自 inductive limit, 它是滤余极限的别名. 由于这个概念已经广为人知, 且找不到合适的中文译名, 姑且以 “ind-对象” 称之. 但也有作者用 inductive limit 表示一般的余极限, 如 [2]; 他们的滤余极限是 *limites inductives filtrantes* (filtered inductive limits).

- 存在 $c \in \mathcal{C}$, $F(c)$ 非空;
- 对任意 $c, c' \in \mathcal{C}$, $x \in F(c)$, $x' \in F(c')$, x 与 x' 上有锥, 即存在 $u: b \rightarrow c$, $u': b \rightarrow c'$, $y \in F(b)$ 使得 $F(u)y = x$, $F(u')y = x'$;
- 对任意 $c, c' \in \mathcal{C}$, $u, u': c \rightrightarrows c'$ 以及 $x \in F(c)$ ($F(u)x = F(u')x$), $x \rightrightarrows F(u)x$ 上有锥, 即存在 $v: b \rightarrow c$ 与 $y \in F(b)$ 使得 $uv = u'v$, $F(v)y = x$.

(2) F 是可表函子 (即形如 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -)$ 的函子) 的滤余极限.

(3) F 的米田扩张 $L = - \otimes_{\mathcal{C}} F: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ (命题 A.4.11) 保持有限极限.

称满足上述条件的函子为 **Set-值平坦函子** (Set-valued flat functor). F 的米田扩张也可视为与 F 作张量积 (定义 3.8.30, 注 A.4.13), 这解释了“平坦”这个名称 (在代数中, 称一个模 M 平坦是指张量积 $- \otimes M$ 左正合). 记 \mathcal{C} 上的 Set-值平坦函子构成的 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$ 的全子范畴为 $\text{Flat}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$.

证明.

- (1) \Rightarrow (2). 由命题 A.4.7 的对偶版本即得. 具体地,

$$F = \text{colim} \left(\left(\int^{\mathcal{C}} F \right)^{\text{op}} \xrightarrow{\pi^{\text{op}}} \mathcal{C}^{\text{op}} \xrightarrow{\mathfrak{y}} \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}) \right),$$

其中 \mathfrak{y} 表示 \mathcal{C}^{op} 的米田嵌入. 由 $\int^{\mathcal{C}} F$ 为余滤范畴, 知 $\left(\int^{\mathcal{C}} F \right)^{\text{op}}$ 为滤范畴.

- (2) \Rightarrow (3). 设 F 为滤余极限 $\text{colim}_j \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c_j, -)$, 其中指标范畴 J 为滤范畴. 那么 F 的米田扩张为 $L: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为

$$\begin{aligned} L(X) &\simeq \text{colim}_{\mathfrak{y}(c) \rightarrow X} F(c) \\ &\simeq \text{colim}_{\mathfrak{y}(c) \rightarrow X} \text{colim}_j \text{Hom}(c_j, c) \\ &\simeq \text{colim}_j \text{colim}_{\mathfrak{y}(c) \rightarrow X} \text{Hom}(c_j, c) \\ &\simeq \text{colim}_j X(c_j), \end{aligned}$$

由命题 A.5.3, J -余极限与有限极限交换, 故 L 保持有限极限.

- (3) \Rightarrow (1).

设 I 为有限范畴, $X: I \rightarrow \int^{\mathcal{C}} F$ 为图, 我们要证明 X 上有锥. 对于 $i \in I$, 记 $X(i) = (c_i, x_i)$, 其中 $x_i \in F(c_i)$. 注意到 X 可视为 $\lim_{i \in I} F(c_i)$ 的元素. 因为 L 保持有限极限, 典范的映射

$$L(\lim_{i \in I} \mathfrak{y}(c_i)) \rightarrow \lim_{i \in I} L(\mathfrak{y}(c_i)) \simeq \lim_{i \in I} F(c_i)$$

为同构. 而

$$L(\lim_{i \in I} \downarrow(c_i)) \simeq \operatorname{colim}_{\downarrow(c) \rightarrow \lim_{i \in I} \downarrow(c_i)} F(c),$$

故存在一个态射 $f: \downarrow(c) \rightarrow \lim_{i \in I} \downarrow(c_i)$, 即一个锥 $(f_i: c \rightarrow c_i)_{i \in I}$, 以及 $x \in F(c)$, 使得 $F(f_i)(x) = x_i \in F(c_i)$. 这就是说 X 上有锥.

□

命题 A.5.6 (平坦函子保持所有存在的有限极限)

平坦函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持所有 \mathcal{C} 中存在的有限极限 (意思是, \mathcal{C} 中不一定存在有限极限, 但只要某个有限极限恰好存在, 则被该函子保持). 若 \mathcal{C} 存在所有有限极限, 那么一个函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 平坦当且仅当 F 保持有限极限.

证明.

- 若 $F = \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -)$ 为可表函子, 则 F 当然保持所有 \mathcal{C} 中存在的有限极限.
- 若 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为平坦函子, 即可表函子的滤余极限, 则由于滤余极限与有限极限交换 (命题 A.5.3), F 亦保持所有 \mathcal{C} 中存在的有限极限.
- 假设 \mathcal{C} 存在所有有限极限, 而 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持有限极限. 我们证明 $\int^{\mathcal{C}} F$ 为余滤范畴. 设 I 为有限范畴, $X: I \rightarrow \int^{\mathcal{C}} F$ 为图, 记 $X(i) = (c_i, x_i)$, 其中 $x_i \in F(c_i)$. 注意到 X 可视为 $\lim_{i \in I} F(c_i)$ 的元素. 因为 F 保持有限极限, 典范的映射

$$F(\lim_{i \in I} c_i) \rightarrow \lim_{i \in I} F(c_i)$$

为同构. 故存在 $x \in F(\lim_{i \in I} c_i)$ 使得 $F(p_i)(x) = x_i$ ($p_i: \lim_{i \in I} c_i \rightarrow c_i$ 为投影). 这说明 X 上有锥.

□

注 A.5.7 (元素的范畴为滤范畴; ind-对象的等价定义)

由命题 A.5.5 (将 \mathcal{C} 替换为 \mathcal{C}^{op}), $\operatorname{Ind}(\mathcal{C})$ 等价于 $\operatorname{Flat}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$. 由该命题的 (1) 部分知对于 $X \in \operatorname{Ind}(\mathcal{C})$, $\int_{\mathcal{C}} X$ 为滤范畴. 图 $\int_{\mathcal{C}} X \rightarrow \mathcal{C} \xrightarrow{\downarrow} \widehat{\mathcal{C}}$ 的余极限正是 X . 这解释了“ind-对象”的另一个等价定义: \mathcal{C} 的一个“ind-对象”为一个图 $I \rightarrow \mathcal{C}$, 其中 I 为滤范畴; 其用意是表达这个“ind-对象”是这个图的形式滤余极限.

命题 A.5.8

对于范畴 \mathcal{C} , $\operatorname{Ind}(\mathcal{C})$ 具有滤余极限.

证明. 设 J 为滤范畴, 考虑图表 $F: J \rightarrow \text{Ind}(\mathcal{C})$, 令 G 为复合 $J \xrightarrow{F} \text{Ind}(\mathcal{C}) \hookrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 的余极限, 我们证明 $G \in \text{Ind}(\mathcal{C})$, 即 $\int_{\mathcal{C}} G$ 为滤范畴.

对任意有限图表 $X: I \rightarrow \int_{\mathcal{C}} G$, 记 $X(i) = (c_i, g_i)$, 则 X 可视为 $\lim_{i \in I} \text{colim}_{j \in J} F_j(c_i)$ 的元素, 而由 J -余极限与 I -极限交换, X 又可视为 $\text{colim}_{j \in J} \lim_{i \in I} F_j(c_i)$ 的元素, 即存在 j 使得 X 穿过 $I \rightarrow \int_{\mathcal{C}} F_j$. 已知 $\int_{\mathcal{C}} F_j$ 是滤范畴, 故 X 上有锥. 结论得证. \square

命题 A.5.9 (关于滤余极限的完备化)

对于范畴 \mathcal{C} , $\text{Ind}(\mathcal{C})$ 是其关于滤余极限的完备化. 这就是说, 对任意具有滤余极限的范畴 \mathcal{D} , 函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 可本质唯一地延拓为保持滤余极限的函子 $\text{Ind}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$.

证明. 设有函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. 定义 $\tilde{F}: \text{Ind}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$,

$$\tilde{F}(X) := \text{colim}_{\mathbf{j}(c) \rightarrow X} F(c).$$

(由注 A.5.7, 该余极限为滤余极限, 故存在于 \mathcal{D} 中.) 考虑到保持滤余极限的要求, 函子 \tilde{F} 在 X 上的取值被可表函子上的取值唯一确定. 这与米田扩张 (命题 A.4.11) 类似. \square

注 A.5.10 (形式滤余极限)

我们知道 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是 \mathcal{C} 的自由余完备化. 由上述命题, $\text{Ind}(\mathcal{C})$ 是 \mathcal{C} 关于滤余极限的完备化 (cocompletion under filtered colimits). \mathcal{C} 的 ind-对象可以想象为 \mathcal{C} 的对象形式上 (formally) 取滤余极限的结果. 所谓 \mathcal{C} 的对象的形式滤余极限, 就是指米田嵌入到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 后的滤余极限.

例 A.5.11

集合范畴 Set 等价于有限集范畴 Fin 的 ind-对象的范畴: 考虑函子

$$\alpha: \text{Set} \rightarrow \text{Ind}(\text{Fin}), \quad S \mapsto \text{Hom}_{\text{Set}}(-, S)$$

以及

$$\beta: \text{Ind}(\text{Fin}) \rightarrow \text{Set}, \quad F \mapsto \text{colim}_{\mathbf{j}(X) \rightarrow F} X,$$

此处视 F 为函子 $\text{Fin}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, X 表示有限集合, 余极限的指标范畴为 $\int_{\text{Fin}} F$. 那么

$$\begin{aligned} \alpha(\beta(F)) &\simeq \text{Hom}_{\text{Set}}(-, \text{colim}_{\mathbf{j}(X) \rightarrow F} X) \\ &\simeq \text{colim}_{\mathbf{j}(X) \rightarrow F} \text{Hom}_{\text{Set}}(-, X) \\ &\simeq F; \end{aligned} \quad (\star)$$

$$\begin{aligned}\beta(\alpha(S)) &\simeq \operatorname{colim}_{\mathfrak{J}(X) \rightarrow \mathfrak{J}(S)} X \\ &\simeq S.\end{aligned}$$

其中关键的一步 (\star) 使用了如下事实: 对于有限集 Y , $\operatorname{Hom}_{\mathbf{Set}}(Y, -)$ 保持滤余极限. 类似地, 可证明群范畴 \mathbf{Grp} 等价于有限群范畴 \mathbf{FinGrp} 的 ind -对象的范畴, 同样是因为对于有限群 Y , $\operatorname{Hom}_{\mathbf{Grp}}(Y, -)$ 保持滤余极限. 这一规律适用于任何代数理论; 其原因参见例 A.6.12.

定义 A.5.12 (余滤范畴, 余滤极限)

若一个范畴中任意有限图都存在锥, 则称之为余滤范畴 (cofiltered category). 换言之, 称滤范畴 (定义 A.5.1) 的对偶为余滤范畴. 以余滤范畴为指标范畴的极限称为余滤极限 (cofiltered limit).¹⁵

定义 A.5.13 (pro-对象)

对于范畴 \mathcal{C} , 定义 \mathcal{C} 的一个 “pro-对象¹⁶” 为 $\operatorname{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$ 中可表函子的一个余滤极限; 与 ind -对象完全对偶, pro-对象可视为 \mathcal{C} 的对象的形式余滤极限. 记 “pro-对象” 构成的 $\operatorname{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})^{\operatorname{op}}$ 的全子范畴为 $\operatorname{Pro}(\mathcal{C})$. 由定义, 有

$$\operatorname{Pro}(\mathcal{C}) \simeq \operatorname{Ind}(\mathcal{C}^{\operatorname{op}})^{\operatorname{op}} \simeq \operatorname{Flat}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})^{\operatorname{op}}.$$

例 A.5.14 (投射有限集)

有限集合范畴 \mathbf{Fin} 的 “pro-对象” 称作投射有限集 (profinite set). 投射有限集的范畴 ProFin 等价于 Stone 空间的范畴 $\mathbf{StoneSp}$ (定义 2.3.10):

$$\begin{aligned}\operatorname{ProFin} &\simeq \operatorname{Pro}(\mathbf{FinBooleAlg}^{\operatorname{op}}) && (\text{注 2.3.14}) \\ &\simeq (\operatorname{Ind}(\mathbf{FinBooleAlg}))^{\operatorname{op}} && (\text{定义 A.5.13}) \\ &\simeq (\mathbf{BooleAlg})^{\operatorname{op}} && (\text{例 A.5.11}) \\ &\simeq \mathbf{StoneSp} && (\text{Stone 对偶, 命题 2.3.13}).\end{aligned}$$

¹⁵注意余滤极限是一种特殊的极限, 而不是一种余极限.

¹⁶“pro-对象” 中 pro 来自投射极限 (projective limit), 它是余滤极限的别名. 但也有作者用 projective limit 表示一般的极限.

例 A.5.15 ($\mathbb{N} \cup \infty$)

$\mathbb{N} \cup \infty$ 是一个 Stone 空间, 由离散空间 \mathbb{N} 加上一个点 ∞ 构成, 其拓扑基为 $\{n\} (n \in \mathbb{N})$ 以及 $\{k \in \mathbb{N} \mid k > n\} (n \in \mathbb{N})$. 由例 A.5.14 中的等价, $\mathbb{N} \cup \infty$ 亦可视为投射有限集, 作为函子 $\mathbf{Fin} \rightarrow \mathbf{Set}$, 它是

$$S \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(\mathbb{N} \cup \infty, S) \simeq \{f: \mathbb{N} \rightarrow S \mid \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \text{ 存在}\}.$$


容易证明, 投射有限集 $\mathbb{N} \cup \infty$ 是下图的形式极限 (很明显它是余滤极限):

$$\cdots \rightarrow \{2, 1, 0\} \rightarrow \{1, 0\} \rightarrow \{0\},$$

其中每个态射 $\{n+1, n, \dots, 0\} \rightarrow \{n, \dots, 0\}$ 将 $n+1$ 映射到 n , 其余元素不变. 注意 ∞ 这个元素在极限锥中被映射到了 $\cdots, 2, 1, 0$.

A.6 可表现范畴

可表现范畴在范畴论中具有重要的地位, 因为有如下粗略的类比:



介绍可表现范畴 (以及许多重要范畴论概念) 的一本很好的教科书是 [1].

可表现对象

当一个结构由一些基础的元素生成时, 我们总是认为生成元的数量越少越好. 例如一个环的生成元越少就越简单. 为了描述可表现对象的生成元的多少, 我们需要一些基数的概念. 所谓基数是指集合的同构类, 而基数的加法是集合的和 (不交并). \aleph_0 (读作 aleph 零) 是自然数集的基数.

定义 A.6.1 (正则基数)

正则基数 (regular cardinal) 是指满足如下条件的无限基数 λ : 对任意 $\alpha < \lambda$ 以及 α 个基数 $\lambda_i (i < \alpha)$, 有 $\sum_i \lambda_i < \lambda$. 简言之, 正则基数 λ 不能写成少于 λ 个小于 λ 的基数之和.

设 λ 为正则基数, 那么小于 λ 的集合构成的范畴具有较好的封闭性, 称之为一个宇宙 (但它尚未构成 Grothendieck 宇宙, 后者的要求更高). 在承认选择公理的前提下, 存在任意大的正则基数. 换言之, “小” 等价于 “小于某个正则基数”. “小于正则基数 λ ” 的性质可视为 “有限性” 的推广. 这里的小于都是指严格小于.

例 A.6.2

\aleph_0 是正则基数 (无限集不能写成有限个有限集之和), \aleph_1 是正则基数 (不可数集不能写成可数个可数集之和).

定义 A.6.3 (λ -小)

称一个范畴 “ λ -小” 是指其中对象和态射的数量都小于 λ . 若 I 是 λ -小范畴, 则称函子 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$ 为 λ -小的图.

定义 A.6.4 (λ -滤范畴, λ -滤余极限)

设 λ 为正则基数. 若一个范畴中任意 λ -小的图都存在余锥, 则称之为 λ -滤范畴 (λ -filtered category). 对偏序集而言, 这个条件即是说任意基数小于 λ 的子集都有上界, 称这样的偏序集为 λ -正向集 (λ -directed set). 以 λ -滤范畴为指标范畴的余极限称为 λ -滤余极限 (λ -filtered colimit).

注意, λ -滤范畴中对象的多少没有限制, 但我们默认谈论小余极限, 也即默认指标范畴的对象构成一个小集合 (从而是 κ -小的, κ 为某个正则基数).

如下是一个有广泛应用的命题, 尤其是 $\lambda = \aleph_0$ 的特例.

命题 A.6.5 (λ -滤范畴的等价刻画)

设 J 为小范畴, λ 为正则基数, 则 J 为 λ -滤范畴当且仅当 \mathbf{Set} 中任意 J -余极限与 λ -小极限交换.

证明. 设 J 为 λ -滤范畴, I 为 λ -小范畴, $X: I \times J \rightarrow \mathbf{Set}$ 为任意函子, 我们证明如下典范的映射为双射 (这个映射的存在不需要 I, J 满足任何条件):

$$\operatorname{colim}_j \lim_i X_{i,j} \rightarrow \lim_i \operatorname{colim}_j X_{i,j}. \quad (*)$$

任取 $\lim_i \operatorname{colim}_j X_{i,j}$ 的元素 $(x_{i,j(i)} \in X_{i,j(i)})_{i \in I}$. 由条件, 存在余锥 $(f_i: j(i) \rightarrow j')_{i \in I}$, 则 $(X(f_i)(x_{i,j(i)}))_{i \in I} \in X_{i,j'}$ 为 $\lim_i X_{i,j'}$ 的元素. 容易验证这是 $(*)$ 的逆.

另一方面, 设 J 为小范畴, 假设对任意 λ -小范畴 I 以及任意函子 $X: I \times J \rightarrow \mathbf{Set}$, $(*)$

总是双射. 对任意 λ -小范畴 I 以及任意函子 $f: I \rightarrow J$, 考虑

$$X: I^{\text{op}} \times J \rightarrow \mathbf{Set}, \quad X_{i,j} := \text{Hom}_J(f(i), j).$$

那么对固定的 $j \in J$, $\lim_i X_{i,j}$ 的元素等同于 J 中图表 f 上以 j 为顶点的余锥, 故 $\text{colim}_j \lim_i X_{i,j}$ 非空当且仅当图表 f 上有余锥. 又有对固定的 i , $\text{colim}_j X_{i,j} = 1$, 故 $\lim_i \text{colim}_j X_{i,j} = 1$. 这说明 J 为 λ -滤范畴. \square

使用 λ -小余极限和 λ -滤余极限可构造任意余极限. 具体地, 有如下结论.

命题 A.6.6

设 λ 为正则基数. 范畴 \mathcal{C} 中任意图 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$ 的余极限 (如果它存在) 可写为 X 的一族 λ -小的子图的有限余极限的 λ -滤余极限.

证明. 令 P 为 I 的所有 λ -小子范畴在包含关系下构成的偏序集. 那么

$$\text{colim}_{i \in I} X_i \simeq \text{colim}_{J \in P} \text{colim}_{j \in J} X_j.$$

\square

例 A.6.7

自然数的偏序集 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots$ 是 \aleph_0 -滤范畴, 因为其中任何有限子集都有上界.

定义 A.6.8 (λ -可表现对象)

设 λ 为正则基数. 称范畴 \mathcal{C} 的对象 c 为 λ -可表现对象 (λ -presentable object, 又称 λ -紧对象) 是指 $\text{Hom}(c, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持 λ -滤余极限¹⁷. 具体地, 对任意以 λ -滤范畴 I 为指标范畴的图 X_i , 态射 $c \rightarrow \text{colim}_i X_i$ 总穿过某个 $X_j \rightarrow \text{colim}_i X_i$.

称一个对象为可表现对象 (又称小对象) 是指存在正则基数 λ 使得它是 λ -可表现对象. 有限表现对象是指 \aleph_0 -可表现对象.

λ -可表现性是反映一个对象在某种意义上比较小的性质. 注意 λ 越小, 这个性质就越强; 对于 $\mu > \lambda$, λ -可表现对象一定是 μ -可表现对象.

命题 A.6.9 (小对象的小余极限仍是小对象)

设 I 是 λ -小范畴, $X: I \rightarrow \mathcal{C}$ 为图, 且图中每个对象 X_i 为 λ -可表现对象. 那么 $\text{colim}_i X_i$ 为 λ -可表现对象.

¹⁷ 此处以及下面使用的滤余极限均可替换为正向极限, 即以正向集为指标范畴的余极限. 可以证明, 一个范畴具有滤余极限等价于其有正向极限, 一个函子保持滤余极限等价于其保持正向极限, 见 [1] 1.A 节.

证明. 设 J 为 λ -滤范畴, $Y: J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图. 那么

$$\begin{aligned}
 & \text{Hom}(\text{colim}_i X_i, \text{colim}_j Y_j) \\
 & \simeq \lim_i \text{Hom}(X_i, \text{colim}_j Y_j) && (\text{余极限的定义}) \\
 & \simeq \lim_i \text{colim}_j \text{Hom}(X_i, Y_j) && (X_i \text{ 为 } \lambda\text{-可表现对象}) \\
 & \simeq \text{colim}_j \lim_i \text{Hom}(X_i, Y_j) && (\text{命题 A.6.5}) \\
 & \simeq \text{colim}_j \text{Hom}(\text{colim}_i X_i, Y_j). && (\text{余极限的定义})
 \end{aligned}$$

□

例 A.6.10 (\aleph_0 -可表现性与拓扑紧性的联系)

设 X 为拓扑空间. 容易说明, 范畴 $\text{Open}(X)$ 的对象 U 是 \aleph_0 -可表现对象当且仅当 U 作为拓扑空间是紧空间. 不幸的是, 紧空间不一定是拓扑空间范畴 \mathbf{Top} 的 \aleph_0 -可表现对象. 缺乏可表现对象是范畴 \mathbf{Top} 性质不好的原因之一.

例 A.6.11 (集合范畴中的 λ -可表现对象)

\mathbf{Set} 中的 λ -可表现对象即为基数小于 λ 的集合, 证明如下. 首先, 单元集显然是 λ -可表现对象; 由命题 A.6.9, 基数小于 λ 的集合是 λ -可表现对象.

另一方面, 注意到任意集合可表示为 λ -小集合的 λ -滤余极限: 对集合 S , 令

$$I := \{T \subset S \mid |T| < \lambda\},$$

则有

$$S = \text{colim}_{T \in I} T.$$

由 λ 为正则基数, 任何少于 λ 个 λ -小集合之和仍为 λ -小集合. 因此该余极限为 λ -滤余极限. 假设 S 是 λ -可表现对象, 则 $\text{colim}_{T \in I} \text{Hom}(S, T) \rightarrow \text{Hom}(S, S)$ 为同构, 故 id_S 穿过某个含入映射 $T \hookrightarrow S$, 这表明 $|S| < \lambda$.

例 A.6.12 (群范畴中的 λ -可表现对象)

群范畴 \mathbf{Grp} 的 λ -可表现对象即为少于 λ 个生成元和少于 λ 个关系所表现的群. (例如 $\lambda = \aleph_0$ 时, \mathbf{Grp} 的 λ -可表现对象又叫有限表现群.) 这一规律适用于任何代数理论 (参见定义 A.9.1, A.9.3 以及 [1] 3.A 节).

对任意群 G , 与上一例类似, 考虑

$$I := \{H \leq G \mid H \text{ 由少于 } \lambda \text{ 个元素生成}\},$$

那么 $G = \text{colim}_{H \in I} H$. 若 G 为 λ -可表现对象, 则 id_G 穿过某个同态 $H \hookrightarrow G$, G

可由少于 λ 个元素生成. 进一步, 设 F 为少于 λ 个元素生成的自由群, 且有满同态 $\varphi: F \rightarrow G$. 令

$$J := \{K = F/\sim \mid \sim \text{ 由 } \ker \varphi \text{ 中少于 } \lambda \text{ 个元素生成}\},$$

容易说明 $G = \operatorname{colim}_{K \in J} K$, 其中每个 K 到 G 有典范的满同态. 若 G 为 λ -可表现对象, 则 id_G 穿过某个同态 $K \rightarrow G$, 说明 G 可由少于 λ 个生成元和少于 λ 个关系所表现.

例 A.6.13 (可表函子是预层范畴的可表现对象)

预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的可表函子 $\mathfrak{y}(c)$ 是 \aleph_0 -可表现对象, 因为 $\operatorname{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\mathfrak{y}(c), -): \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持任意余极限.

定义 A.6.14 (λ -可表现范畴)

设 λ 为正则基数. 范畴 \mathcal{C} 称为 λ -可表现范畴¹⁸是指 \mathcal{C} 余完备, 且存在一族 λ -可表现对象构成的集合, 使得任何对象都可表示为这族对象的某个 λ -滤余极限. 称一个范畴为可表现范畴是指存在正则基数 λ 使得它是 λ -可表现范畴.

例 A.6.15 (群范畴是可表现范畴)

由于每个群都可表示为有限表现群的滤余极限 (例 A.6.12), 群范畴 \mathbf{Grp} 是可表现范畴.

命题 A.6.16

对于小范畴 \mathcal{C} , 预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是 \aleph_0 -可表现范畴.

证明. 所需结论是如下事实的推论.

- 可表函子是 \aleph_0 -可表现对象 (例 A.6.13);
- \aleph_0 -可表现对象的有限余极限是 \aleph_0 -可表现对象 (命题 A.6.9, $\lambda = \aleph_0$);
- 任意余极限都可写为先取有限余极限再取 \aleph_0 -滤余极限 (命题 A.6.6);
- 预层可写为可表函子的余极限 (命题 A.4.7).

¹⁸可表现范畴又叫局部可表现范畴 (locally presentable category), “局部”是为了强调可表现这一性质是形容范畴中的对象, 而非范畴这一整体.

□

注 A.6.17

可表现范畴的定义显示了它并不是一个关于“对偶”对称的概念, 即可表现范畴的对偶不一定是可表现范畴. 甚至可以证明 ([1] 1.64), 若 \mathcal{C} 与 \mathcal{C}^{op} 均为可表现范畴, 那么 \mathcal{C} 只能是完备格.

稠密子范畴**定义 A.6.18 (稠密子范畴)**

设 \mathcal{C} 为范畴, \mathcal{D} 为其全子范畴. 若对 \mathcal{C} 的任意对象 c , 由 c 出发的态射 $f: c \rightarrow c'$ 被 $\{fg \mid g: d \rightarrow c, d \in \mathcal{D}\}$ 唯一决定 (换言之, 所有由 \mathcal{D} 的对象到 c 的箭头构成某个余极限余锥), 则称 \mathcal{D} 为稠密子范畴.

注意这个概念与景的 J -稠密子范畴 (定义 3.9.24) 不同, 但精神上相似: 在直观上, \mathcal{D} 在 \mathcal{C} 中稠密就是说 \mathcal{C} 中的信息可完全由 \mathcal{D} 的对象出发的态射来“探测”. 这与注 3.3.2 提到的“探测”的想法亦相通; 命题 A.6.22 建立了 \mathcal{C} 与 $\widehat{\mathcal{D}}$ 之间的联系.

例 A.6.19 (米田嵌入是稠密子范畴)

设 \mathcal{C} 为小范畴. 通过米田嵌入 $y: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$, 可将 \mathcal{C} 视为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的稠密子范畴, 这是因为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象都可表示为可表函子的余极限 (命题 A.4.7).

例 A.6.20 (偏序集范畴的稠密子范畴)

在偏序集范畴 Pos (甚至小范畴的范畴 Cat) 中, 对象 $\{0 \leq 1\}$ 构成的全子范畴是稠密子范畴. 直观上, 这就是说一个偏序集完全由 $\{0 \leq 1\}$ 到它的全体态射决定.

例 A.6.21 (图范畴的稠密子范畴)

此处所谓图是指一个集合配备一个二元关系. 在图的范畴 Gra 中, 两个对象 \bullet 以及 $\bullet \rightarrow \bullet$ 构成稠密子范畴.

命题 A.6.22

设 $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ 为全子范畴, 且 \mathcal{D} 为小范畴. 考虑函子

$$y: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{D}}, \quad c \mapsto \text{Hom}(-, c)|_{\mathcal{D}^{\text{op}}},$$

则有

- y 全忠实当且仅当 $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ 是稠密子范畴;
- 对固定的正则基数 λ , y 保持 λ -滤余极限当且仅当 \mathcal{D} 的所有对象都是 \mathcal{C} 的 λ -可表现对象.

见 [1] 命题 1.26. 两个命题的证明都是直接展开定义验证.

命题 A.6.23

设范畴 \mathcal{C} 余完备, \mathcal{D} 为其稠密子范畴, 则命题 A.6.22 中的函子 y 将 \mathcal{C} 表示为 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的自反子范畴.

证明. 结合命题 A.6.22 与 A.4.11 即证. □

可表现范畴的性质与判定

命题 A.6.24

对于正则基数 λ , 范畴 \mathcal{C} 是 λ -可表现范畴, 当且仅当 \mathcal{C} 是某个预层范畴 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的自反子范畴 (\mathcal{D} 为小范畴), 且 \mathcal{C} 关于 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中的 λ -滤余极限封闭.

证明. 假设 \mathcal{C} 是 λ -可表现范畴, 由定义, \mathcal{C} 中有一族 λ -可表现对象构成一个稠密子范畴 \mathcal{D} , 且 \mathcal{D} 为小范畴. 由命题 A.6.23, 知 \mathcal{C} 为 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的自反子范畴.

另一方面, 假设 \mathcal{C} 是 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的自反子范畴, 且关于 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中的 λ -滤余极限封闭. 由余完备范畴的自反子范畴是余完备范畴 (命题 A.3.6), 知 \mathcal{C} 余完备. 此外,

- \mathcal{C} 的对象都可写为 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中可表函子在 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中的余极限 (命题 A.4.7),

从而

- \mathcal{C} 的对象都可写为 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的 λ -可表现对象在 $\widehat{\mathcal{D}}$ 中的 λ -滤余极限 (命题 A.6.6).

我们的目标是

- \mathcal{C} 的对象都可写为 \mathcal{C} 的 λ -可表现对象在 \mathcal{C} 中的 λ -滤余极限.

注意左伴随 $a: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{C}$ 保持余极限, 故只需证明

- $a: \widehat{\mathcal{D}} \rightarrow \mathcal{C}$ 保持 λ -可表现对象; 即对 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的任意 λ -可表现对象 d , $a(d)$ 是 \mathcal{C} 的 λ -可表现对象.

设 d 是 $\widehat{\mathcal{D}}$ 的 λ -可表现对象. 对任意 λ -滤范畴 I , 任意的图 $X: I \rightarrow \mathcal{C}$,

$$\begin{aligned}
 \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(d), \mathrm{colim}_i^{\mathcal{C}} X_i) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(d), \mathrm{colim}_i^{\widehat{\mathcal{D}}} X_i) && (\mathcal{C} \text{ 关于 } \widehat{\mathcal{D}} \text{ 中的 } \lambda\text{-滤余极限封闭}) \\
 &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(d, \mathrm{colim}_i X_i) && (\text{自反子范畴的性质}) \\
 &\simeq \mathrm{colim}_i \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(d, X_i) && (d \text{ 为 } \lambda\text{-可表现对象}) \\
 &\simeq \mathrm{colim}_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a(d), X_i). && (\text{自反子范畴的性质})
 \end{aligned}$$

这说明 $a(d)$ 为 λ -可表现对象, 结论得证. \square

命题 A.6.25

可表现范畴是完备范畴.

证明. 这是因为可表现范畴是某个预层范畴的自反子范畴 (命题 A.6.24), 而完备范畴的自反子范畴是完备范畴 (命题 A.3.6). \square

命题 A.6.26

- (1) 对于小范畴 \mathbf{A} 与 λ -可表现范畴 \mathcal{C} , 函子范畴 $\mathrm{Fun}(\mathbf{A}, \mathcal{C})$ 是 λ -可表现范畴 ([1] 推论 1.54).
- (2) 对于 λ -可表现范畴 \mathcal{C} 的对象 X , 俯范畴 \mathcal{C}/X 与仰范畴 $X \backslash \mathcal{C}$ 是 λ -可表现范畴 ([1] 命题 1.57).

可表现范畴的伴随函子定理

伴随函子定理是说在合适的条件下, 保持极限 (余极限) 的函子一定有左 (右) 伴随. 如下是可表现范畴中的两个结论; 注意其中有一些细节是极不平凡的.

命题 A.6.27 (可表现范畴的伴随函子定理)

设 $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是可表现范畴之间的函子.

- f 有右伴随当且仅当 f 保持余极限;
- f 有左伴随当且仅当 f 保持极限和 λ -滤余极限 (λ 为某个正则基数). (这是 [1] 1.66.)

两个结论不对称, 是因为可表现范畴的概念关于对偶不对称 (见注 A.6.17).

如下是偏序集中的两个结论.

命题 A.6.28 (偏序集的伴随函子定理)

设 $f: A \rightarrow B$ 是偏序集之间的函子 (即保序映射),

- 假设 A 有任意并, 则 f 有右伴随当且仅当 f 保持任意并;
- 假设 A 有任意交, 则 f 有左伴随当且仅当 f 保持任意交.

A.7 Kan 扩张

定义 A.7.1 (Kan 扩张)

设 $p: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 为函子. 对另一范畴 \mathcal{D} , 记 $p^*: \text{Fun}(\mathcal{C}', \mathcal{D}) \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 为与 p 的复合, 即 $h: \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}$ 对应 $p^*h: \mathcal{C} \xrightarrow{p} \mathcal{C}' \xrightarrow{h} \mathcal{D}$.

- 若 p^* 有左伴随 $p_!: \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}', \mathcal{D})$, 则称之为沿 p 的左 Kan 扩张;
- 若 p^* 有右伴随 $p_*: \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}', \mathcal{D})$, 则称之为沿 p 的右 Kan 扩张.

在上述定义中的伴随不是全局存在的情况下, 也可以谈论单个函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 沿 p 的左右 Kan 扩张.

定义 A.7.2 (单个函子的 Kan 扩张)

设 $p: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 为函子. 对函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$,

- 若存在 $p_!F: \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}$ 使得有自然同构

$$\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F, p^*-) \simeq \text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}', \mathcal{D})}(p_!F, -),$$

则称 $p_!F$ 为 F 沿 p 的左 Kan 扩张;


- 若存在 $p_*F: \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{D}$ 使得有自然同构

$$\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(p^*- , F) \simeq \text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}', \mathcal{D})}(- , p_*F),$$

则称 p_*F 为 F 沿 p 的右 Kan 扩张.

在范畴论文献中常见如下的图示. 左图表示对任意 $F \rightarrow p^*G$ 存在唯一的 $p_!F \rightarrow G$, 右

图表示对任意 $p^*G \rightarrow F$ 存在唯一的 $G \rightarrow p_*F$.



沿 p 的左右 Kan 扩张是 p^* 的左右伴随, 而伴随可以复合, 因此沿复合函子的左右 Kan 扩张是两个相应 Kan 扩张的复合. 这又称为 Kan 扩张的函子性. 极限和余极限的 “Fubini 定理” (A.7.5) 是 Kan 扩张函子性的应用.

例 A.7.3 (极限和余极限)

取定义 A.7.2 中的 C' 为终范畴 1 , 那么 $\text{Fun}(C', \mathcal{D}) \simeq \mathcal{D}$, 函子 $p^*: \mathcal{D} \rightarrow \text{Fun}(C, \mathcal{D})$ 将 \mathcal{D} 的对象 d 对应到常值函子 $\text{const}_d: C \rightarrow \mathcal{D}$.

对函子 $F: C \rightarrow \mathcal{D}$,

- F 沿 $C \rightarrow 1$ 的左 Kan 扩张是余极限 $\text{colim } F: 1 \rightarrow \mathcal{D}$, 因为

$$\text{Hom}_{\text{Fun}(C, \mathcal{D})}(F, \text{const}_d) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(\text{colim } F, d);$$

- F 沿 $C \rightarrow 1$ 的右 Kan 扩张是极限 $\lim F: 1 \rightarrow \mathcal{D}$, 因为

$$\text{Hom}_{\text{Fun}(C, \mathcal{D})}(\text{const}_d, F) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{D}}(d, \lim F).$$

沿 $p: C \rightarrow 1$ 的左右 Kan 扩张是余极限和极限, 那么一般地, 沿 $p: C \rightarrow C'$ 的左右 Kan 扩张可理解为沿 p 的每个 “纤维” 作余极限和极限. 这就是说 (余) 极限与左右 Kan 扩张的关系是一种 “绝对” 与 “相对” 的关系. 下面的命题具体描述了 Kan 扩张和 (余) 极限的关系.

命题 A.7.4 (Kan 扩张的一种具体表达式)

考虑函子 $p: C \rightarrow C'$, $F: C \rightarrow \mathcal{D}$.

- 若 \mathcal{D} 为余完备范畴 (具有所有余极限), 则 F 沿 p 的左 Kan 扩张 $p_!F$ 存在, 且

$$p_!F(c') \simeq \text{colim}_{p c \rightarrow c'} F(c);$$

- 若 \mathcal{D} 为完备范畴 (具有所有极限), 则 F 沿 p 的右 Kan 扩张 p_*F 存在, 且

$$p_*F(c') \simeq \lim_{c' \rightarrow p c} F(c).$$

例 A.7.5 (极限和余极限的 “Fubini 定理”)

考虑两个指标范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 函子 $F: \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{D}$ 的余极限有两种计算方法:

$$\begin{array}{ccc} \text{Fun}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xleftarrow{\pi_1^*} & \text{Fun}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D}) \\ \pi_2^* \uparrow & & \uparrow c_1^* \\ \text{Fun}(\mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xleftarrow{c_2^*} & \mathcal{D} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Fun}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(\pi_1)_!} & \text{Fun}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D}) \\ (\pi_2)_! \downarrow & & \downarrow (c_1)_! \\ \text{Fun}(\mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(c_2)_!} & \mathcal{D} \end{array}$$

- 先沿投影函子 $\pi_2: \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 左 Kan 扩张, 再沿 $\mathcal{C}_2 \rightarrow 1$ 左 Kan 扩张, 得到

$$\text{colim}_{c_1 \in \mathcal{C}_1, c_2 \in \mathcal{C}_2} F(c_1, c_2) \simeq \text{colim}_{c_2 \in \mathcal{C}_2} (\text{colim}_{c_1 \in \mathcal{C}_1} F(c_1, c_2));$$

- 先沿投影函子 $\pi_1: \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ 左 Kan 扩张, 再沿 $\mathcal{C}_1 \rightarrow 1$ 左 Kan 扩张, 得到

$$\text{colim}_{c_1 \in \mathcal{C}_1, c_2 \in \mathcal{C}_2} F(c_1, c_2) \simeq \text{colim}_{c_1 \in \mathcal{C}_1} (\text{colim}_{c_2 \in \mathcal{C}_2} F(c_1, c_2)).$$

这个结论就像 Fubini 定理, 又叫 “任意余极限与任意余极限交换”. 当然, 将以上所有余极限换成极限, 左 Kan 扩张换成右 Kan 扩张, 结论仍成立.

极限和余极限不一定交换, 但总有一个自然的态射. 注意到左下图总是交换的 (两种复合都得到 $\text{Fun}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D})$ 中的常值函子). 从而取两个竖直函子的右伴随可得右下图的自然变换

$$(\mathcal{C}_2)_!(\pi_2)_* \rightarrow (\mathcal{C}_1)_*(\mathcal{C}_1)^*(\mathcal{C}_2)_!(\pi_2)_* \rightarrow (\mathcal{C}_1)_*(\pi_1)_!(\pi_2)^*(\pi_2)_* \rightarrow (\mathcal{C}_1)_*(\pi_1)_!,$$

虽然它一般不是自然同构.

$$\begin{array}{ccc} \text{Fun}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(\pi_1)_!} & \text{Fun}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D}) \\ \pi_2^* \uparrow & & \uparrow c_1^* \\ \text{Fun}(\mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(c_2)_!} & \mathcal{D} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Fun}(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(\pi_1)_!} & \text{Fun}(\mathcal{C}_1, \mathcal{D}) \\ (\pi_2)_* \downarrow & \nearrow & \downarrow (c_1)_* \\ \text{Fun}(\mathcal{C}_2, \mathcal{D}) & \xrightarrow{(c_2)_!} & \mathcal{D} \end{array}$$

这就是说总有自然态射

$$\text{colim}_{c_2 \in \mathcal{C}_2} (\lim_{c_1 \in \mathcal{C}_1} F(c_1, c_2)) \rightarrow \lim_{c_1 \in \mathcal{C}_1} (\text{colim}_{c_2 \in \mathcal{C}_2} F(c_1, c_2)).$$

例 A.7.6 (沿米田嵌入的 Kan 扩张)

取定义 A.7.2 中的 \mathcal{C}' 为预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$, $p = \mathbf{y}: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 为米田嵌入. 设 \mathcal{D} 为余完备范畴. 命题 A.4.9 给出了任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 沿 \mathbf{y} 的唯一的左 Kan 扩张 $\mathbf{y}_! F: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{D}$, 命

题 A.4.11 给出了它的具体表达式

$$\mathfrak{L}_! F(X) = \operatorname{colim}_{\mathfrak{L}(c) \rightarrow X} F(c).$$

这与命题 A.7.4 相符.

例 A.7.7 (预层范畴之间的伴随)

对任意函子 $p: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ 存在三元伴随 (命题 3.8.29)

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{p_!} & \\ \widehat{\mathcal{C}} & \xleftarrow[p_*]{p^*} & \widehat{\mathcal{C}}' \\ & \xrightarrow{p_*} & \end{array}$$

展开定义, 得

- 对 $F \in \widehat{\mathcal{C}}$, $p_!(F)(c') = \operatorname{colim}_{c' \rightarrow pc} F(c)$;
- 对 $G \in \widehat{\mathcal{C}}'$, $p^*(G)(c) = G(pc)$;
- 对 $F \in \widehat{\mathcal{C}}$, $p_*(F)(c') = \lim_{pc \rightarrow c'} F(c)$.

此处指标范畴中是 \mathcal{C}' 中的态射, 并且此处的记号隐藏了一个对偶: $p_!$ 与 p_* 分别是沿 $p^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow (\mathcal{C}')^{\text{op}}$ 的左右 Kan 扩张. 不难发现以上的结果与命题 A.7.4 相符.

需要注意的是, 拓扑空间上预层的直像与逆像是本例的特殊情况, 但记号又有不同. 对于拓扑空间映射 $f: X \rightarrow Y$, 有函子 $f^{-1}: \operatorname{Open}(Y) \rightarrow \operatorname{Open}(X)$, 则

- $(f^{-1})_!$ 是拓扑空间上预层的逆像, 在定义 3.1.21 中又记为 $f^{\text{预}}$.
- $(f^{-1})^*$ 是拓扑空间上预层的直像, 在定义 3.1.15 中又记为 f_* .

A.8 单子论

定义 A.8.1 (单子和余单子)

范畴 \mathcal{C} 上的一个单子 (monad)¹⁹ (T, η, μ) 是一个自函子 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 以及两个自然变换 $\mu: T^2 \rightarrow T$, $\eta: \operatorname{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow T$, 满足自函子范畴 $\operatorname{End}(\mathcal{C})$ 中么半群的条件, 即如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{\mu T} & T^2 \\ T\mu \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 & \xleftarrow{T\eta} & T \\ & \searrow \operatorname{id}_T & \downarrow \mu & \swarrow \operatorname{id}_T & \\ & & T & & \end{array}$$

对偶地, 余单子 (comonad) (S, ϵ, δ) 是一个自函子 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 以及两个自然变换 $\epsilon: S \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}, \delta: S \rightarrow S^2$, 满足如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\delta} & S^2 \\ \delta \downarrow & & \downarrow \delta S \\ S^2 & \xrightarrow{S\delta} & S^3 \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & & S & & \\ & \swarrow \text{id}_S & \downarrow \delta & \searrow \text{id}_S & \\ \text{id}_{\mathcal{C}} S & \xleftarrow{\epsilon S} & S^2 & \xrightarrow{S\epsilon} & S \text{id}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

注 A.8.2 (单子与代数理论)

单子被某些作者称为代数理论 (algebraic theory). 后面我们将说明单子与代数理论 (定义 B.1.21) 的关系. Lawvere 理论 \mathbb{T} 可视为 \mathbf{Set} 上的单子 T, TX 的元素是以 X 中元素为变量的项.

命题-定义 A.8.3 (伴随产生单子和余单子)


一对伴随函子

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow[\text{ }]{G} \end{array} \mathcal{D}$$

确定了

- \mathcal{C} 上的一个单子 (T, η, μ) , 其中 $T = GF: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 单位即为伴随的单位 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$, 乘法为 $\mu: T^2 = GF GF \xrightarrow{G\epsilon F} GF = T$;
- \mathcal{D} 上的一个余单子 (S, ϵ, δ) , 其中 $S = FG: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$, 余单位即为伴随的余单位 $\epsilon: FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$, 余乘法为 $\delta: S = FG \xrightarrow{F\eta G} FGFG = S^2$.

证明. 下图描绘了验证 T 为单子所需的幺元律和结合律.



□

¹⁹在历史文献中可见单子的曾用名“三元组” (triple), 这个名字是无趣的.

注 A.8.4

一对伴随函子可视为一个 2-函子 $\text{Adj} \rightarrow \text{Cat}$ (定义 A.2.4). 进一步, 记 Mnd 为 Adj 中 \mathcal{C} 上的全子 2-范畴, 则一个单子等同于一个 2-函子 $\text{Mnd} \rightarrow \text{Cat}$, 这就是命题 A.8.3 中伴随产生的单子. 另外, $\text{Hom}(\mathcal{C}, \mathcal{C}) \simeq \Delta_+$ 中的对象 $[0]$ 是“游走的幺半群” (参见例 B.2.24), 而范畴 \mathcal{C} 上的单子是 $\text{End}(\mathcal{C})$ 中的幺半群, 因此对应一个函子 $\Delta_+ \rightarrow \text{End}(\mathcal{C})$, 这就是 2-函子 $\text{Mnd} \rightarrow \text{Cat}$ 在态射范畴上的作用.

定义 A.8.5 (单子的代数, 余单子的余代数)

设 (T, η, μ) 是范畴 \mathcal{C} 上的单子. 定义范畴 \mathcal{C} 上的 T -代数为 \mathcal{C} 的对象 X 配备一个态射 $h: TX \rightarrow X$, 满足如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} T^2X & \xrightarrow{Th} & TX \\ \mu_X \downarrow & & \downarrow h \\ TX & \xrightarrow{h} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & TX \\ & \searrow \text{id}_X & \downarrow h \\ & & X \end{array}$$

定义 T -代数的同态 $X \rightarrow Y$ 为交换图

$$\begin{array}{ccc} TX & \xrightarrow{Tf} & TY \\ h_X \downarrow & & \downarrow h_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

记 \mathcal{C} 上 T -代数的范畴为 \mathcal{C}^T , 这个范畴又称为 T 的 *Eilenberg-Moore* 范畴.

对偶地, 设 (S, ϵ, δ) 是范畴 \mathcal{C} 上的余单子, 定义 S -余代数 (coalgebra) 是 \mathcal{C} 的对象 X 配备一个态射 $h: X \rightarrow SX$, 满足如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & SX \\ h \downarrow & & \downarrow \delta_X \\ SX & \xrightarrow{Sh} & S^2X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & SX \\ & \searrow \text{id}_X & \downarrow \epsilon_X \\ & & X \end{array}$$

记 \mathcal{C} 上 S -余代数的范畴为 \mathcal{C}_S .

命题-定义 A.8.6 (自由 T -代数, 自由-遗忘伴随, 余自由 S -余代数, 遗忘-余自由伴随)

设 T 是范畴 \mathcal{C} 上的单子. 定义对象 X 上的自由 T -代数为 TX 配备态射 $\mu_X: TTX \rightarrow TX$. 该构造给出自由函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T$, 且为遗忘函子的左伴随:

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{自由}} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{遗忘}} \end{array} \mathcal{C}^T.$$

与之对偶, 设 S 是范畴 \mathcal{C} 上的余单子, 定义对象 X 上的余自由 S -余代数为 SX 配备态射 $\delta_X: SX \rightarrow SSX$. 该构造给出余自由函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_S$, 且为遗忘函子的右伴随:

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xleftarrow{\text{遗忘}} \\ \perp \\ \xrightarrow{\text{余自由}} \end{array} \mathcal{C}_S.$$

证明. 设 X 为 \mathcal{C} 的对象, 而 Y 为 T -代数, 配备 $h: TY \rightarrow Y$. 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 有如下交换图.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & & \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_Y & \searrow \text{id}_Y & \\ TX & \xrightarrow{Tf} & TY & \xrightarrow{h} & Y \\ \mu_X \uparrow & & \mu_Y \uparrow & & \uparrow h \\ TTX & \xrightarrow{TTf} & TTY & \xrightarrow{Th} & TY \end{array}$$

这说明 $h \circ Tf: TX \rightarrow Y$ 为 T -代数同态. 余下的检验留给读者. □

定义 A.8.7 (单子的 Kleisli 范畴)

对于范畴 \mathcal{C} 上的单子 T 以及两个态射 $f: X \rightarrow TY$, $g: Y \rightarrow TZ$, 可以指定一个“复合” $X \rightarrow TZ$:

$$X \xrightarrow{f} TY \xrightarrow{Tg} TTY \xrightarrow{\mu_Z} TZ.$$

称态射 $X \rightarrow TY$ 为 X 到 Y 的 *Kleisli* 态射, 那么 \mathcal{C} 原本的对象和 Kleisli 态射构成一个新的范畴, 称为单子 T 的 *Kleisli* 范畴 $\text{Kl}(T)$. 对象 X 在 $\text{Kl}(T)$ 中的恒等态射为 $\eta_X: X \rightarrow TX$.

注意到由自由-遗忘伴随, Kleisli 态射 $X \rightarrow TY$ 等同于 T -代数同态 $TX \rightarrow TY$, 因此 $\text{Kl}(T)$ 也可视为 T -代数范畴 \mathcal{C}^T 中自由 T -代数构成的全子范畴.


Kleisli 范畴的信息构成了单子的一种等价定义, 即一个自函子 T , 态射 $\eta_X: X \rightarrow TX$, 以及一种将态射 $X \rightarrow TY, Y \rightarrow TZ$ 复合为 $X \rightarrow TZ$ 的规则, 满足单位律与结合律. 这种定义体现了计算机科学中单子具有的另一种直观, TX 的元素是 X -取值的计算 (或 X -取值的程序). 见例 A.8.9, 例 A.8.11.

命题-定义 A.8.8 (比较函子)

在命题 A.8.3 中, 对于伴随产生的单子 $T = GF$, 存在 \mathcal{D} 到 T -代数范畴的比较函子 (comparison functor) $K: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$, 将对象 d 对应到 T -代数 Gd , 其 T -代数结构为

$$TGd = GFGd \xrightarrow{G\epsilon} Gd.$$

注意到 $KF: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T$ 为自由函子, 如左下图.



与之对偶, 存在 \mathcal{C} 到 S -余代数范畴的余比较函子 (cocomparison functor) $K^{\text{co}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}_S$, 将对象 c 对应到 S -余代数 Fc , 其 S -余代数结构为

$$Fc \xrightarrow{F\eta} FGFc = SFc.$$

注意到 $K^{\text{co}}G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_S$ 为余自由函子, 如右上图.

例 A.8.9 (可能单子)

集合范畴到自身的函子 $T: X \mapsto X + 1$ 是单子, 乘法 $X + 1 + 1 \rightarrow X + 1$ 将两个 1 映射到一个 1. 在函数式编程中这个函子称为可能单子 (maybe monad), $X + 1$ 中的 1 称为无 (nothing). $X + 1$ 的元素可能是 X 的元素, 也可能无.

可能单子上的代数为集合 X 配备一个映射 $X + 1 \rightarrow X$, 限制到 X 上为恒等; 这样的映射相当于一个带基点集合 (pointed set).

设想一台机器, 每输入一个 A 类型数据, 它可能输出一个 B 类型数据, 也可能报错 (例如输入不符合要求). 那么这台机器可视为一个函数 $A \rightarrow B + 1$, 其中 1 代表错误.

例 A.8.10 (函数单子)

设范畴 \mathcal{C} 的对象 S 可作指数 (定义 1.1.2), 则 \mathcal{C} 与 \mathcal{C}/S 之间有伴随 $S^* \dashv \Pi_S$ (命题 1.1.36). 这对伴随给出了单子 $T = (-)^S$. 单位 $\eta_X: X \rightarrow X^S$ 为“对角线”即“常值函数”; 乘法 $\mu_X = \Delta_S^*: X^{S \times S} \rightarrow X^S$ 为沿 S 的对角线的拉回.

例 A.8.11 (状态单子)

设范畴 \mathcal{C} 的对象 S 可作指数 (定义 1.1.2), 即有伴随 $(-) \times S \dashv (-)^S$. 这对伴随给出了单子 $T = (- \times S)^S$. 这个单子计算机科学中称为状态单子 (state monad).

设想一台机器, 每输入一个 A 类型数据, 它就输出一个 B 类型数据, 此外还会根据输入改变状态 (全局变量). 令 S 表示所有可能状态的集合, 那么这台机器可视为一个函数 $A \times S \rightarrow B \times S$, 也即一个函数 $A \rightarrow (B \times S)^S$.

例 A.8.12 (集合与 M -集合之间的自由-遗忘伴随)

设 M 是 (集合范畴 \mathbf{Set} 中的) 幺半群, 那么 $T: X \mapsto M \times X$ 给出了集合范畴上的一个单子, 乘法 $\mu: T^2 \rightarrow T$ 由 M 的乘法 $M \times M \rightarrow M$ 给出. 定义 A.8.1 中的交换图对应 M 的结合律和左右单位律.

记 \mathbf{BM} 为带有 M -作用的集合的范畴, 那么 \mathbf{Set} 与 \mathbf{BM} 之间有如下的伴随, 其中“自由”函子将集合 X 对应到 $M \times X$.

$$\mathbf{Set} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{自由}} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{遗忘}} \end{array} \mathbf{BM}$$

单子 T 正是这对伴随由命题 A.8.3 给出的单子“遗忘 \circ 自由”.

此时, 一个 T -代数 (X, h) 即为一个带有 M -作用的集合, $h: M \times X \rightarrow X$ 为 M -作用, 而定义 A.8.5 中的交换图则对应 M -作用的结合律和单位律. 因此, 比较函子 $K: \mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{Set}^T$ 是范畴的同构.

例 A.8.13 (集合与幺半群之间的自由-遗忘伴随, 词单子)

以 \mathbf{Mon} 表示幺半群范畴, 那么集合范畴 \mathbf{Set} 与 \mathbf{Mon} 之间存在伴随

$$\mathbf{Set} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{自由}} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{遗忘}} \end{array} \mathbf{Mon}.$$

这对伴随给出的单子 $T = \text{遗忘} \circ \text{自由}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 将集合 X 对应到 X 生成的自由幺半群的底层集合

$$TX = \coprod_{n \geq 0} X^n,$$

也即 X 上列表的集合. 自然变换 $\mu: T^2 \rightarrow T$ 将“列表的列表”拼接起来变为一个列表. 一个 T -代数 X 即为一个幺半群. 注意比较函子 $K: \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}^T$ 是等价. 在函数式编程中, 这个函子也称为词单子 (word monad).

例 A.8.14 (环的变换)

设 $A \rightarrow B$ 是交换环的同态, 则有伴随

$$\mathbf{AMod} \begin{array}{c} \xrightarrow{(-) \otimes_A B} \\ \perp \\ \xleftarrow{\text{Hom}_B(B, -)} \end{array} \mathbf{BMod}.$$

其中 $\text{Hom}_B(B, -)$ 相当于将 B -模通过同态 $A \rightarrow B$ 视为 A 模. 上述伴随是一般双模的张量-同态伴随的特例 (参考命题 3.8.24). 其对应的单子和余单子如下.

- $A\text{Mod}$ 上的单子 (T, η, μ) ,
 - $T = (-) \otimes_A B$ (作为 A -模的张量积),
 - $\eta_N: N \rightarrow N \otimes_A B, x \mapsto x \otimes 1$,
 - $\mu_N: N \otimes_A B \otimes_A B \rightarrow N \otimes_A B, x \otimes b \otimes b' \mapsto x \otimes bb'$, 注意这个态射来自 $\epsilon_{N \otimes_A B}$ ($N \otimes_A B$ 上的 B -模结构由右边的 B 给出), $y \otimes b' \mapsto yb'$;
- $B\text{Mod}$ 上的余单子 (S, ϵ, δ) ,
 - $S = (-) \otimes_A B$ (由右边的 B 给出 B 模结构),
 - $\epsilon_M: M \otimes_A B \rightarrow M, x \otimes b \mapsto xb$,
 - $\delta_M: M \otimes_A B \rightarrow M \otimes_A B \otimes_A B, x \otimes b \mapsto x \otimes 1 \otimes b$, 注意这个态射来自 $\eta_M: M \rightarrow M \otimes_A B$ (M 视为 A -模), $x \mapsto x \otimes 1$, 所以 δ_M 是 $x \otimes b \mapsto x \otimes 1 \otimes b$ 而不是 $x \otimes b \mapsto x \otimes b \otimes 1$.

关于这些函子的应用及推广, 见代数学著名教材 [30] 第 7 章.

例 A.8.15 (反变幂集函子与其对偶函子的伴随)

反变幂集函子是指 Set 上的幂对象函子 $P: \text{Set}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ (定义 1.1.26). 考虑其对偶 (即同一个函子, 不过所有箭头反向) $P^{\text{op}}: \text{Set} \rightarrow \text{Set}^{\text{op}}$. 自然同构 $\text{Hom}_{\text{Set}^{\text{op}}}(P^{\text{op}}Y, X) = \text{Hom}_{\text{Set}}(X, PY) \simeq \text{Hom}_{\text{Set}}(X \times Y, \Omega) \simeq \text{Hom}_{\text{Set}}(Y, PX)$ 表明有如下伴随.

$$\text{Set} \begin{array}{c} \xrightarrow{P^{\text{op}}} \\ \xleftarrow[\perp]{P} \end{array} \text{Set}^{\text{op}}$$

在代数-几何对偶 (参考 Stone 对偶, 命题 2.3.13) 之下, 集合作为“几何”对应的“代数”称为完备原子型 *Boole* 代数 (complete atomic Boolean algebra).

对于某些伴随产生的单子 T , 我们发现 T -代数的范畴恰好等价于伴随另一边的范畴; 因此这一对伴随可视为范畴 \mathcal{C} 与其上的 T -代数范畴 \mathcal{C}^T 之间的自由-遗忘伴随. 于是有如下的定义.

定义 A.8.16 (单子性伴随, 余单子性伴随)

设有一对伴随函子

$$\mathcal{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow[\perp]{G} \end{array} \mathcal{D},$$

它们确定了 \mathcal{C} 上的单子 $T = GF$ 和 \mathcal{D} 上的余单子 $S = FG$.

- 若比较函子 $K: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ 构成范畴等价, 则称这对伴随为单子性伴随 (monadic adjunction), 称右伴随 G 为单子性函子. 换言之, G 可视为 \mathcal{C} 上某个单子的代数范畴到 \mathcal{C} 的遗忘函子.
- 若比较函子 $K^{\text{co}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}_S$ 构成范畴等价, 则称这对伴随为余单子性伴随 (comonadic adjunction), 称左伴随 F 为余单子性函子. 换言之, F 可视为 \mathcal{D} 上某个余单子的余代数范畴到 \mathcal{D} 的遗忘函子.

例 A.8.17

自反子范畴的嵌入 $i: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 是单子性的; 也即 \mathcal{D} 的对象可视为单子 $ia: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 的代数.

例 A.8.18 (忠实平坦下降)

在例 A.8.14 中, 对于 B -模 M , 有时人们关心是否存在 (以及如何给出) A -模 N 使得 $M \simeq N \otimes_A B$. 所谓忠实平坦下降 (faithfully flat descent) 解答了这个问题的一部分情形. 这个定理是说, 若 B 是忠实平坦 A -代数 (即 $B \otimes_A -: A\text{Mod} \rightarrow A\text{Mod}$ 是忠实函子且保持有限极限), 则伴随是余单子性的. 这就是说, 只要 B -模 M 带有一个 S -余代数结构 $M \rightarrow SM \simeq M \otimes_A B$, 就能够给出 A -模 N 使得 $M \simeq N \otimes_A B$. 这个 S -余代数结构称为下降数据. 关于下降的概念, 见 A.11 节的讨论.

考虑一个最简单的例子, $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{C}$, 同态 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为实数域到复数域的嵌入. 余单子 S 将复线性空间 V 对应到复线性空间 $V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 后者的复结构来自 \mathbb{C} 上的复结构. 一个 S -余代数结构 $h: V \rightarrow V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 满足如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{h} & V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \\ h \downarrow & & \downarrow \delta_V \\ V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{h \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}} & V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{h} & V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \\ \text{id}_V \searrow & & \downarrow \epsilon_V \\ & & V \end{array}$$

记 $J: V \rightarrow V$ 为乘以 i 的变换. 将 h 表示为

$$h(v) = \Re v \otimes 1 + \Im v \otimes i,$$

其中 $\Re, \Im: V \rightarrow V$ 为 \mathbb{R} -线性变换. 由 $h(Jv) = ih(v)$, 得 $\Im v = -\Re Jv$. 此时上面的交换图给出

$$\begin{cases} \Re \Re v \otimes 1 \otimes 1 + \Re \Im v \otimes 1 \otimes i \\ + \Im \Re v \otimes i \otimes 1 + \Im \Im v \otimes i \otimes i = \Re v \otimes 1 \otimes 1 + \Im v \otimes 1 \otimes i, \\ v = \Re v + J \Im v, \end{cases}$$

前一个条件化为

$$\Re\Re = \Re, \quad \Re\Im = \Im, \quad \Im\Re = 0, \quad \Im\Im = 0.$$

因此 V 可写为 $W \oplus JW$, 其中 $W = \ker \Im$; 故有 $V \simeq W \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

A.9 万有代数

万有代数可视为群, 环, 模, Boole 代数等概念的共同推广, 又称等式理论 (equational theory), 是一阶理论最简单的例子. 本节介绍 William Lawvere 1963 年的博士论文 [21] 引入的研究万有代数的范畴论方法.

Lawvere 理论

定义 A.9.1 (Lawvere 理论)

一个 Lawvere 理论是一个保积函子 $\mathbb{N}^{\text{op}} \rightarrow \mathbb{T}$ (\mathbb{N} 是有限集 $0, 1, 2, \dots$ 构成的 \mathbf{Set} 的全子范畴), 在对象集上为双射. 我们将 \mathbb{N} 的对象 n 在这个函子下的像仍记为 n .

Lawvere 理论将一个代数理论的运算记录在范畴 T 的态射中, 态射 $n \rightarrow 1$ 为 n 元运算. 例如在群的理论中, 乘法是一个态射 $2 \rightarrow 1$, 而取逆是一个态射 $1 \rightarrow 1$.

Lawvere 理论对应的范畴 \mathbb{T} 是一种“语法范畴” (比较定义 5.1.1).

注意范畴 \mathbb{T} 中的对象 n 是 n 个 1 的乘积, 而不是和; 应该将对象 n 理解为 x^n , 其中 x 是该理论的一个抽象模型.

定义 A.9.2 (Lawvere 理论的模型)

对于 Lawvere 理论 \mathbb{T} 以及具有有限乘积的范畴 \mathcal{C} , 定义 \mathbb{T} 在范畴 \mathcal{C} 中的模型为保积函子

$$A: \mathbb{T} \rightarrow \mathcal{C},$$

而模型之间的同态为保积函子之间的自然变换. 称 $A(1)$ 为 A 的底集 (underlying set). 记 \mathbb{T} 在 \mathbf{Set} 中的模型的范畴为 $\mathbb{T}\mathbf{Mod}$.

定义 A.9.3 (代数理论的表现)

一个 (单类型) 代数理论的表现 (presentation of an algebraic theory) \mathcal{T} 是如下资料,

- 任意多个变量;
- 一些运算符号, 每一个运算符号对应一个固定的非负整数, 称为其元数 (ar-

ity²⁰);

- 一些公理, 其中每个公理形如 $s = t$, s, t 为项 (terms)²¹, 而项的归纳定义如下:
 - 每个变量是一项;
 - 若 f 是 n 元运算符号, t_1, \dots, t_n 各是一项, 则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是一项. (特别地, 每个零元运算是一项, 即一个常数.)

注 A.9.4

定义 A.9.3 中的“代数理论的表现”是定义 B.1.21 中“代数理论”的单类型情形. 后面我们将看到, 一个“代数理论的表现”表现了唯一确定的一个 Lawvere 理论 (定义 A.9.7); 但一个 Lawvere 理论的表现远远不是唯一的. 例如群的理论可以仅由一种运算 $(a, b) \mapsto a^{-1}b$ 表现, 又如 \mathbb{Z} -模和 Abel 群是同样的结构. 作为范畴的 Lawvere 理论包含了所有的运算, 因而是一种“坐标无关”式的概念. Lawvere 理论与其表现的关系正如一个群与其“生成元-关系”表现的关系, 只不过在范畴层级上高了一级.

定义 A.9.5 (通过 Lawvere 理论的表现定义其模型)

设 \mathcal{T} 是 Lawvere 理论的表现 (定义 A.9.3). 定义一个 \mathcal{T} -模型 M 为如下资料:

- 集合 M (称作该模型的底层集合),
- 对每个非负整数 n 以及 n 元运算符号 f , 一个映射 $\llbracket f \rrbracket: M^n \rightarrow M$;

满足所有的公理, 也即当 \mathcal{T} 中的变量取值为 M 的任何元素时, 公理 $s = t$ 的两端总是取相等的值. 其中, 一个项 t 的取值 $\llbracket t \rrbracket$ 归纳定义如下:

- 每个变量 x 可取 M 中任意的值, $\llbracket x \rrbracket \in M$;
- 若 f 是 n 元运算符号, t_1, \dots, t_n 各是一项, 则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 的取值是 $\llbracket f \rrbracket(\llbracket t_1 \rrbracket, \dots, \llbracket t_n \rrbracket)$. (特别地, 每个零元运算取 M 中一个固定的值.)

所有 \mathcal{T} -模型构成一个范畴 $\mathcal{T}\text{Mod}$, 其中的态射为保持所有运算的映射. 对于两个 Lawvere 理论的表现 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$, 若 $\mathcal{T}_1\text{Mod} \simeq \mathcal{T}_2\text{Mod}$, 则称 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 森田等价 (Morita equivalence).²²

设 \mathcal{C} 是任何具有有限乘积的范畴, 我们也可类似地定义 \mathcal{T} 在 \mathcal{C} 中的模型, 以及模型的范畴 $\mathcal{T}\text{Mod}(\mathcal{C})$.

²⁰元数 arity 来自一元 unary, 二元 binary 等词的词尾 -ary.

²¹为了严谨, 我们应该补充说明: 对每一条公理 $s = t$, 改变 s, t 中某个变量的名称仍是一条公理. 但这种事情是不重要的.

命题-定义 A.9.6 (有限生成自由模型)

设 \mathcal{T} 为代数理论的表现, $n \geq 0$. 记 $T(n)$ 为其中仅涉及 n 个变量 x_1, \dots, x_n 的项的集合. 在 $T(n)$ 上定义等价关系 \sim 由如下条件生成:

- 对于公理 $s = t$, 有 $s \sim t$;
- 对于 n 元运算符号 f , 若 $s_i \sim t_i (i = 1, \dots, n)$, 则有 $f(s_1, \dots, s_n) \sim f(t_1, \dots, t_n)$.

则商集 $F(n) := T(n)/\sim$ 是 n 个元素生成的自由 \mathcal{T} -模型, 也即对任意 \mathcal{T} -模型 M , 集合映射 $\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow M$ 唯一地延拓为 \mathcal{T} -模型态射 $F(n) \rightarrow M$.

由上述命题, 对任意 \mathcal{T} -模型 M 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}\mathrm{Mod}}(F(n), M) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}\mathrm{Mod}}(F(1), M)^n.$$

这表明 $F(n)$ 在范畴 $\mathcal{T}\mathrm{Mod}$ 中同构于 n 个 $F(1)$ 的和. 特别地, $F(0)$ 是 0 个对象的和, 也即 $\mathcal{T}\mathrm{Mod}$ 的始对象.

命题-定义 A.9.7 (Lawvere 理论与其表现的关系)

设 \mathcal{T} 是 Lawvere 理论的表现 (定义 A.9.3). 那么 $\mathcal{T}\mathrm{Mod}$ 中由有限生成自由模型构成的全子范畴的对偶范畴构成一个 Lawvere 理论 \mathbb{T} , 且有范畴等价

$$\mathcal{T}\mathrm{Mod} \simeq \mathbb{T}\mathrm{Mod}.$$

此时称 \mathcal{T} 为 \mathbb{T} 的一个表现.

证明. 首先证明 \mathbb{T} 为 Lawvere 理论. 前面提到 $F(n)$ 在 $\mathcal{T}\mathrm{Mod}$ 中同构于 n 个 $F(1)$ 的和, 因此 $F(n)$ 在 \mathbb{T} 中同构于 n 个 $F(1)$ 的积.

给定保积函子 $A: \mathbb{T} \rightarrow \mathbf{Set}$, 我们构造一个 \mathcal{T} -模型 M 如下. 令底层集合 $M = A(F(1))$. 对 \mathcal{T} 中每个 n 元运算符号 f , 有一个元素 $[f(x_1, \dots, x_n)] \in F(n)$ (方括号表示 \sim -等价类), 对应一个 \mathcal{T} -模型态射 $\bar{f}: F(1) \rightarrow F(n)$, 即对偶范畴 \mathbb{T} 中的态射 $F(n) \rightarrow F(1)$. 而 A 为保积函子, 故 $M^n \simeq A(F(n))$. 定义

$$[[f]] := A(\bar{f}): M^n \simeq A(F(n)) \rightarrow A(F(1)) = M.$$

下面说明 M 是 \mathcal{T} -模型. 对每条公理 $s = t$ (其中仅含有变量 x_1, \dots, x_n), 由 \sim 的定义有 $[s] = [t] \in F(n)$, 从而有 $\bar{s} = \bar{t}: F(1) \rightarrow F(n)$, $[[s]] = [[t]]: M^n \rightarrow M$.

²² 森田纪一 (1915-1995), 日本数学家, 研究代数和拓扑学. 代数上, 森田等价的观念最早是指两个环的模范畴的等价. 环上的模是 Lawvere 理论的特例, 故这里的森田等价可视为代数上森田等价的推广.

反之, 给定 \mathcal{T} -模型 M , 我们构造保积函子 $A: \mathbb{T} \rightarrow \mathbf{Set}$. 令 $A(F(n)) = M^n$, 由积的性质我们只需要指定态射 $F(n) \rightarrow F(1)$ 对应的映射 $M^n \rightarrow M$. 而态射 $F(n) \rightarrow F(1)$ 等同于变量 x_1, \dots, x_n 构成的一个项 (的等价类) $[t] \in F(n)$, 项的取值 $([x_1], \dots, [x_n]) \mapsto [t]$ 便给出了映射 $M^n \rightarrow M$. 由 $\llbracket - \rrbracket$ 的定义, 这确实给出了一个函子 $\mathbb{T} \rightarrow \mathbf{Set}$.

容易说明如上构造的函子性. 它们给出了范畴等价 $\mathcal{T}\mathbf{Mod} \simeq \mathbb{T}\mathbf{Mod}$. \square

例 A.9.8

一个 Lawvere 理论 \mathbb{T} 有一种极大的表现 \mathcal{T} , 即所有 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{T}}(n, 1)$ 的元素都是一个 n 元运算符号, 所有态射之间的等式都是一条公理. 很明显, 此时有 $\mathcal{T}\mathbf{Mod} \simeq \mathbb{T}\mathbf{Mod}$ (因为此时定义 A.9.5 所要求的正是保积函子的定义).

例 A.9.9 (群的 Lawvere 理论)

群的 Lawvere 理论 $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}}$ 由二元运算 \cdot , 一元运算 $(-)^{-1}$, 零元运算 e 以及三者满足的关系所表现. 定义 $F(n)$ 为 n 个元素生成的自由群, $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}}$ 为所有 $F(n)$ 在 \mathbf{Grp} 中构成的全子范畴的对偶范畴. 群范畴中 $F(n)$ 与 $F(m)$ 的余积 (群的自由积) 为 $F(n+m)$, 所以在 $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}}$ 中有 $F(n) \simeq F(1)^n$. 设 $A: \mathbb{T}_{\mathrm{Grp}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为保积函子, 记 $G = A(F(1))$, 我们可以具体写出 G 上的乘法映射:

$$G \times G \simeq A(F(2)) \xrightarrow{A(m)} A(F(1)) = G,$$

其中群同态 $F(1) \rightarrow F(2)$ 将 $F(1)$ 的生成元映射到 $F(2)$ 两个生成元的乘积.

例 A.9.10 (幺半群的 Lawvere 理论)

幺半群的 Lawvere 理论 $\mathbb{T}_{\mathrm{mon}}$ 由二元运算 \cdot , 零元运算 e 以及两者满足的关系所表现. 我们可以具体地写出其中的对象与态射: 对象为自然数, 对象 n 到 m 的态射形如 (t_1, \dots, t_m) , 其中每个 t_i 是符号 x_1, \dots, x_n 构成的一个序列 (可以为空, 可以重复).

注 A.9.11 (游走模型)

我们形象地称对象 $F(1)$ 为理论 \mathbb{T} 的游走模型 (walking model), 因为理论 \mathbb{T} 的任何模型都是 $F(1)$ 在相应范畴中的一个化身. 例如对于群的理论 $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}}$, 其在拓扑空间范畴 \mathbf{Top} 中的模型 $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}} \rightarrow \mathbf{Top}$ 即为拓扑群, 在光滑流形范畴 \mathbf{Man} 中的模型 $\mathbb{T}_{\mathrm{Grp}} \rightarrow \mathbf{Man}$ 即为 Lie 群. 一般地, 在一个理论的句法范畴中有这个理论的游走模型, 该理论在任何范畴中的模型都是游走模型的化身.

例 A.9.12 (格的 Lawvere 理论)

格的 Lawvere 理论 \mathbb{T}_{Lat} 由二元运算 \wedge, \vee 以及如下关系所表现:

$$\begin{aligned} x \wedge (y \wedge z) &= (x \wedge y) \wedge z, & x \vee (y \vee z) &= (x \vee y) \vee z, \\ x \wedge y &= y \wedge x, & x \vee y &= y \vee x, \\ x \wedge x &= x, & x \vee x &= x, \\ x \wedge (x \vee y) &= x, & x \vee (x \wedge y) &= x. \end{aligned}$$

例 A.9.13 (R -模的 Lawvere 理论)

固定一个 (\mathbf{Set} 中的) 环 R . R -模的 Lawvere 理论 $\mathbb{T}_{R\text{Mod}}$ 由二元运算 $+$, 每个元素 $r \in R$ 对应的一元运算 ρ_r 以及对应每两个元素 r, s 的如下关系所表现:

$$\begin{aligned} \rho_r(x + y) &= \rho_r(x) + \rho_r(y), \\ \rho_r(\rho_s(x)) &= \rho_{rs}(x), \\ \rho_{r+s}(x) &= \rho_r(x) + \rho_s(x). \end{aligned}$$

记 R^n 为 n 个元素生成的自由 R -模, 那么 $\mathbb{T}_{R\text{Mod}}$ 为所有 R^n 在 $R\text{Mod}$ 中构成的全子范畴的对偶范畴. $R\text{Mod}$ 中 R^n 与 R^m 的余积为 R^{n+m} , 所以在 $\mathbb{T}_{R\text{Mod}}$ 中有 $R^n \simeq (R^1)^n$. 设 $A: \mathbb{T}_{R\text{Mod}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为保积函子, 记 $M = A(R^1)$, 则 M 上的 R -模结构由如下资料给出:

$$\begin{aligned} +: M \times M &\simeq A(R^2) \xrightarrow{A(+)} A(R^1) \simeq M, \\ \times r: M &\simeq A(R^1) \xrightarrow{A(\rho_r)} A(R^1) \simeq M. \end{aligned}$$

例 A.9.14 (平凡的 Lawvere 理论)

$\mathbb{T} = \mathbf{N}^{\text{op}}$ 本身是一个 Lawvere 理论. \mathbb{T} 在 \mathcal{C} 中的模型等同于 \mathcal{C} 的对象. 该理论由 0 个运算符号和 0 个公理所表现. 由于我们一般以集合范畴中模型的名称来命名一个 Lawvere 理论, 平凡的 Lawvere 理论也可称作“集合的 Lawvere 理论”. \mathbf{N}^{op} 是一个对象生成的自由有限乘积范畴, 也即对任意具有有限乘积的范畴 \mathcal{C} , 其中的对象等同于保积函子 $\mathbf{N}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

例 A.9.15 (带基点集合的 Lawvere 理论)

考虑带基点有限集范畴 \mathbf{Fin}_* , 其对象形如 $n_+ = \{*, 1, \dots, n\}$, 其中 $*$ 为基点. 由于 n_+ 是 n 个 1_+ 的和, 其对偶范畴 $\mathbb{T} = \mathbf{Fin}_*^{\text{op}}$ 是一个 Lawvere 理论, 可称为“带基点集

合的 Lawvere 理论”。 \mathbb{T} 在范畴 \mathcal{C} 中的模型等同于 \mathcal{C} 的带基点对象，即终对象 1 发出的一个态射 $1 \rightarrow X$ 。该理论由一个 0 元运算符 $*$ (表示基点) 和 0 条公理所表现。

例 A.9.16 (子终对象的 Lawvere 理论)

“子终对象的 Lawvere 理论”由 0 个运算符和一个公理 $x = y$ 所表现。这个理论在 \mathbf{Set} 中的模型是满足“任何两个元素都相等”的集合，故只有空集 0 和单元集 1 。一般地，范畴 \mathcal{C} 中的模型是 \mathcal{C} 的对象 X ，满足 $X \times X$ 到 X 的两个投影是同一个态射，这等价于 $X \rightarrow 1$ 为单射，即 X 为子终对象 (定义 1.3.26)。这个 Lawvere 理论背后的范畴 \mathbb{T} 如下：

$$\mathrm{Hom}(n, m) = \begin{cases} 0 & n = 0, m > 0; \\ 1 & \text{其它情形.} \end{cases}$$

由于这个范畴中所有正整数互相同构，它也等价于两个对象的范畴 $\bullet \rightarrow \bullet$ 。

例 A.9.17 (光滑代数的 Lawvere 理论)

微分流形 \mathbb{R}^n ($n = 0, 1, 2, \dots$) 构成的范畴 \mathbf{CartSp} 是一个 Lawvere 理论。每个光滑映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 都对应这种代数结构中的一个 n 元运算。例如这种代数结构至少要包含加法与乘法 $+, \times: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ，包含所有实数 $\mathbb{R}^0 \rightarrow \mathbb{R}$ ，还包含如 \sin, \exp 等运算。

Lawvere 理论 \mathbf{CartSp} 的模型称作光滑代数。光滑流形上的函数代数 $C^\infty(M)$ 是最简单的光滑环，而一些更广义的几何对象上的“函数代数”也构成光滑环，如“无穷小线段上的函数代数” $\mathbb{R}[x]/(x^2)$ 等。

例 A.9.18 (Boole 代数的 Lawvere 理论)

考虑 $1, 2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$ 构成的 \mathbf{Set} 的满子范畴。它是 Boole 代数的 Lawvere 理论。通常的 Boole 代数的运算由 $\neg: 2 \rightarrow 2$, $\wedge, \vee: 2^2 \rightarrow 2$ 等态射定义。

模型的表现

给定一个 Lawvere 理论 \mathbb{T} ，我们描述如何用生成元和关系表现一个 \mathbb{T} -模型。以 $F(n)$ 表示 n 个元素生成的自由 \mathbb{T} -模型 (定义 A.9.6)。

定义 A.9.19 (有限表现模型)

设 $A: \mathbb{T} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是 \mathbb{T} -模型。若存在 m, n 使得 A 可表示为 $\mathbb{T}\mathbf{Mod}$ 中的余等化子

$$A \simeq \mathrm{coeq}(s, t: F(m) \rightrightarrows F(n)),$$

则称 A 为有限表现 \mathbb{T} -模型; 具体地, A 是可由 n 个生成元和 m 个关系表现的 \mathbb{T} -模型, 此处每个关系是指一个等式 $s_i = t_i$, $s_i, t_i \in F(n)$, $1 \leq i \leq m$.

有限表现群, 有限表现环, 有限表现 R -模, 有限表现 R -代数 (R 为环) 等等概念均为上述概念的特例.

命题 A.9.20 (有限表现的等价定义)

有限表现 \mathbb{T} -模型等价于范畴 $\mathbb{T}\text{Mod}$ 中的有限表现对象 (定义 A.6.8); 换言之, \mathbb{T} -模型 $A: \mathbb{T} \rightarrow \text{Set}$ 有限表现当且仅当 $\text{Hom}_{\mathbb{T}\text{Mod}}(A, -)$ 保持滤余极限.

证明.

- 设 $A \simeq \text{coeq}(s, t: F(m) \rightrightarrows F(n))$, 则有自然同构

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{T}\text{Mod}}(A, B) &\simeq \text{eq}(\text{Hom}_{\mathbb{T}\text{Mod}}(F(n), B) \rightrightarrows \text{Hom}_{\mathbb{T}\text{Mod}}(F(m), B)) \\ &\simeq \text{eq}(B^n \rightrightarrows B^m) \end{aligned}$$

而集合的滤余极限与有限极限交换 (命题 A.6.5), 故 $\text{Hom}(A, -)$ 保持滤余极限.

- 设 $\text{Hom}(A, -)$ 保持滤余极限. 与例 A.6.12 中的证明完全类似, 考虑

$$I := \{B \leq A \mid B \text{ 由有限个元素生成}\},$$

那么 $A = \text{colim}_{B \in I} B$, 从而 id_A 穿过某个同态 $B \hookrightarrow A$, A 可由有限个元素生成. 进一步, 设 F 为有限生成自由 \mathbb{T} -模型, 且有满同态 $\varphi: F \rightarrow A$ (这里是指底层集合上为满射). 令

$$J := \{K = F/\sim \mid \sim \text{ 由 } \ker \varphi \text{ 中有限个元素生成}\},$$

容易说明 $A = \text{colim}_{K \in J} K$, 其中每个 K 到 A 有典范的满同态. 那么 id_A 穿过某个同态 $K \rightarrow A$, 说明 A 可由有限个生成元和有限个关系所表现.

□

代数理论之间的态射

所有 Lawvere 理论构成一个范畴. 我们将看到 Lawvere 理论之间的态射体现了不同代数结构之间的关系.

定义 A.9.21 (Lawvere 理论之间的态射)

设 $\mathbb{T}_1, \mathbb{T}_2$ 为 Lawvere 理论. 定义 Lawvere 理论之间的态射 $\mathbb{T}_1 \rightarrow \mathbb{T}_2$ 为保持乘积且将 1 映射为 1 的函子. 如此所有 Lawvere 理论构成范畴 **Law**.

Lawvere 理论之间的态射 $f: \mathbb{T}_1 \rightarrow \mathbb{T}_2$ 可理解为将 \mathbb{T}_2 的游走模型视为 \mathbb{T}_1 -模型的方法. 由此我们可将任意范畴中的 \mathbb{T}_2 -模型转化为 \mathbb{T}_1 -模型. 特别地, 有函子 $f^*: \mathbb{T}_2\text{Mod} \rightarrow \mathbb{T}_1\text{Mod}$, 它正是与 f 的复合.

例 A.9.22 (常见的 Lawvere 理论态射)

- (1) 集合的 Lawvere 理论 \mathbb{N}^{op} 是 **Law** 的始对象, 对应遗忘函子 $\mathbb{T}\text{Mod} \rightarrow \text{Set}$.
- (2) 幺半群的 Lawvere 理论到群的 Lawvere 理论有态射 $\mathbb{T}_{\text{Mon}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Grp}}$, 对应遗忘函子 $\text{Grp} \rightarrow \text{Mon}$. 根据注 A.9.11, 我们称“游走的群是一个幺半群”. 既然游走的群是幺半群, 那么所有的群便都是幺半群.
- (3) Abel 群的 Lawvere 理论到环的 Lawvere 理论有态射 $\mathbb{T}_{\text{Ab}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Ring}}$, 对应遗忘函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Ab}$, “取加法群”. 根据注 A.9.11, 我们称“游走的环是一个 (加法) 群”.
- (4) 幺半群的 Lawvere 理论到环的 Lawvere 理论有态射 $\mathbb{T}_{\text{Mon}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Ring}}$, 对应遗忘函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Mon}$, “取乘法幺半群”.
- (5) 固定一个域 k , 由 k 上的结合代数 A 可得一个 Lie 代数, 其 Lie 括号为 $[a, b] = ab - ba$. 这给出了 k 上的 Lie 代数的 Lawvere 理论到 (结合) 代数的 Lawvere 理论的态射 $\mathbb{T}_{\text{Lie}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Alg}}$, 对应函子 $\text{Alg}_k \rightarrow \text{Lie}_k$.
- (6) 环同态 $f: R \rightarrow S$ 给出 Lawvere 理论的态射 $f: \mathbb{T}_{R\text{Mod}} \rightarrow \mathbb{T}_{S\text{Mod}}$ ($\mathbb{T}_{R\text{Mod}}$ 的定义见 A.9.13). 这对应“遗忘函子” $S\text{Mod} \rightarrow R\text{Mod}$.
- (7) \mathbb{R} -代数的 Lawvere 理论到光滑代数的 Lawvere 理论有态射 $\mathbb{T}_{\mathbb{R}\text{Alg}} \rightarrow \text{CartSp}$, 对应遗忘函子 $C^\infty\text{Alg} \rightarrow \mathbb{R}\text{Alg}$; “光滑代数至少是一个 \mathbb{R} -代数” (注 6.4.24).

命题 A.9.23

对于 Lawvere 理论之间的态射 $f: \mathbb{T}_1 \rightarrow \mathbb{T}_2$, 函子 $f^*: \mathbb{T}_2\text{Mod} \rightarrow \mathbb{T}_1\text{Mod}$ 有左伴随 $f_!: \mathbb{T}_1\text{Mod} \rightarrow \mathbb{T}_2\text{Mod}$.

证明. 回忆 $f^*: \text{Fun}(\mathbb{T}_2, \text{Set}) \rightarrow \text{Fun}(\mathbb{T}_1, \text{Set})$ 有左伴随

$$f_!: \text{Fun}(\mathbb{T}_1, \text{Set}) \rightarrow \text{Fun}(\mathbb{T}_2, \text{Set}),$$

它是沿 f 的左 Kan 扩张 (例 A.7.7),

$$f_!(A)(n) = \operatorname{colim}_{m \rightarrow n} A(m),$$

其中指标范畴由 \mathbb{T}_2 中的态射 $m \rightarrow n$ (m 跑遍 $0, 1, 2, \dots$) 构成. 我们要证明对于保积函子 $A: \mathbb{T}_1 \rightarrow \mathbf{Set}$, 有 $f_!(A)$ 也是保积函子. 注意由于 \mathbb{T}_2 的对象 n 是 n 个 1 的积, 故一个态射 $m \rightarrow n$ 等同于 n 个态射 $m \rightarrow 1$. 那么

$$\begin{aligned} f_!(A)(n) &\simeq \operatorname{colim}_{m \rightarrow n} A(m) \\ &\simeq \operatorname{colim}_{m \rightarrow 1, \dots, m \rightarrow 1} A(m) \\ &\simeq (\operatorname{colim}_{m \rightarrow 1} A(m))^n \simeq f_!(A)(1)^n. \end{aligned}$$

□

上述构造的直观是, $f_!(A)$ 的底层集合 (即 $f_!(A)(1)$) 由所有形如 $\varphi(a_1, \dots, a_m)$ 的项构成, 其中 a_1, \dots, a_m 是 A 的底层集合 (即 $A(1)$) 的元素, $\varphi: m \rightarrow 1$ 是理论 \mathbb{T}_2 中的 m 元运算.

例 A.9.24

对于例 A.9.22 提到的每个态射 f , 我们来描述 $f_!$.

- (1) $f: \mathbb{N}^{\text{op}} \rightarrow \mathbb{T}$, $f_!: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbb{T}\mathbf{Mod}$ 是“自由”函子.
- (2) $f: \mathbb{T}_{\text{Mon}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Grp}}$, $f_!: \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 给出么半群的“泛包络群”, 对于交换么半群它是所谓 Grothendieck 群.
- (3) $f: \mathbb{T}_{\text{Ab}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Ring}}$, $f_!: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ring}$ 给出 Abel 群 A 的张量代数 $TA = \bigoplus_{n \geq 0} A^{\otimes n}$.
- (4) $f: \mathbb{T}_{\text{Mon}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Ring}}$, $f_!: \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Ring}$ 给出么半群 G 的群代数 $\mathbb{Z}[G]$.
- (5) $f: \mathbb{T}_{\text{Lie}} \rightarrow \mathbb{T}_{\text{Alg}}$, $f_!: \mathbf{Lie}_k \rightarrow \mathbf{Alg}_k$ 给出 Lie 代数的泛包络代数 (universal enveloping algebra).
- (6) $f: \mathbb{T}_{R\text{Mod}} \rightarrow \mathbb{T}_{S\text{Mod}}$, $f_!: R\text{Mod} \rightarrow S\text{Mod}$ 是“环的变换” (见 A.8.14).
- (7) $f: \mathbb{T}_{\mathbb{R}\text{Alg}} \rightarrow \mathbf{CartSp}$, 此时 $f_!$ 没有简单的描述, 但有一些例子, 如 $f_!(\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]) \simeq C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 这是因为 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 n 个元素自由生成的光滑代数 (命题 6.4.28). 我们猜测对一般的 \mathbb{R} -代数 A , $f_!(A)$ 是 A 对应的几何对象上光滑函数的代数.

单子与代数理论

一个 Lawvere 理论 \mathbb{T} 的自由-遗忘伴随

$$\mathbb{T}\text{Mod} \begin{array}{c} \xleftarrow{\text{自由}} \\ \xrightarrow{\text{遗忘}} \end{array} \text{Set}$$

生成了 Set 上的单子 $T = \text{遗忘} \circ \text{自由}$,

$$TX = \text{colim}_{n \rightarrow 1} X^n.$$

且使得集合上的 \mathbb{T} -模型结构一一对应于 T -代数结构. 在这种意义上, 单子是 Lawvere 理论的推广.

- 对于 \mathbb{T} -模型 $A: \mathbb{T} \rightarrow \text{Set}$, 注意 “遗忘 $A = A(1)$ ”. 由 $\text{id}_{A(1)}$ 在伴随下给出态射 “自由 $A(1) \rightarrow A$ ”, 再遗忘, 得到映射

$$TA(1) = \text{遗忘} \circ \text{自由} A(1) \rightarrow \text{遗忘} A = A(1).$$

- 对于 T -代数 $(X, h: TX \rightarrow X)$, 定义 $A: \mathbb{T} \rightarrow \text{Set}$, 将对象 n 对应到 X^n , 态射 $\varphi: n \rightarrow 1$ 对应到

$$X^n \rightarrow \text{colim}_{n \rightarrow 1} X^n = TX \xrightarrow{h} X,$$

其中第一个箭头是余极限余锥中 φ 对应的箭头.

若 Lawvere 理论 \mathbb{T} 具有某个表现 \mathcal{T} , 那么单子 T 也可由自由模型的构造 (定义 A.9.6) 得出, 即所有项的集合商掉由公理可证的等价关系. 这与自由群的构造是完全类似的.

A.10 纤维范畴与索引范畴

纤维范畴是 “相对” 版本的范畴 (正如概形态射是相对版本的概形), 即一个底范畴的每个对象上有一个范畴 (“纤维”), 且纤维关于底范畴中的对象有某种函子性. 与纤维范畴相近的一个概念是索引范畴 (indexed category), 它明确定义了纤维的函子性. 纤维范畴与索引范畴之间通过 Grothendieck 构造相联系.

纤维范畴可用于描述逻辑或类型论. 底范畴的一个对象是一个语境, 而其上的纤维是这个语境中发生的事情.

给出索引范畴与纤维范畴的严格定义之前, 我们先看几个例子.

例 A.10.1 (谓词)

此处所说的谓词 (predicate) 是一个集合 X 以及一个子集 $U \hookrightarrow X$. 所有谓词

$(X, U \hookrightarrow X)$ 构成一个范畴 \mathbf{Pred} , 态射为交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

遗忘函子 $\mathbf{Pred} \rightarrow \mathbf{Set}, (X, U) \mapsto X$ 是一个纤维范畴, 集合 X 上的纤维是其所有子集构成的偏序集 PX . 对集合的映射 $f: X \rightarrow Y$, 有函子 (偏序集态射) $f^*: PY \rightarrow PX$. 另外, 投影 $\pi: X \times Y \rightarrow X$ 对应的函子 $\pi^*: PX \rightarrow P(X \times Y)$ 同时有左右伴随 $\exists \dashv \pi^* \dashv \forall$, 见注 1.3.22. 这体现了谓词逻辑的操作可以定义为纤维范畴 $\mathbf{Pred} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的纤维之间的结构. 谓词逻辑的另一个操作是概括 (comprehension), 即给定一个谓词, 取出满足该谓词的元素构成的子集. 在这里概括不过是函子 $(X, U) \mapsto U$. 这个函子是“真” $\top: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Pred}, X \mapsto (X, X)$ 的右伴随.

例 A.10.2 (集合族)

一个集合族 (family of sets) 不过是一个集合映射 $W \rightarrow X$. 所以集合族是谓词的某种推广. (谓词又可视为真值族.) 所有集合族构成一个范畴 \mathbf{Fam} , 态射为方块交换图. 遗忘函子 $\mathbf{Fam} \rightarrow \mathbf{Set}, (W \rightarrow X) \mapsto X$ 是一个纤维范畴, 集合 X 上的纤维 \mathbf{Fam}_X 同构于俯范畴 \mathbf{Set}/X , 也即 \mathbf{Set}^X . 集合的映射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导函子 $f^*: \mathbf{Set}/Y \rightarrow \mathbf{Set}/X$. 投影 $\pi: X \times Y \rightarrow X$ 对应的函子 $\pi^*: \mathbf{Set}/X \rightarrow \mathbf{Set}/(X \times Y)$ 同时有左右伴随 $\Sigma \dashv \pi^* \dashv \Pi$, 见命题 1.1.41.

例 A.10.3 (俯范畴)

考虑“箭头范畴” $\bullet \rightarrow \bullet$, 前面的例子 $\mathbf{Fam} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可推广为函子 $t: \mathcal{C}^\bullet \rightarrow \mathcal{C}$, 将一个箭头对应到它的终点. 此时对象 c 上的纤维正是俯范畴 \mathcal{C}/c , 当 \mathcal{C} 有拉回时, 对于态射 $f: c \rightarrow d$ 有函子 $f^*: \mathcal{C}/d \rightarrow \mathcal{C}/c$. 事实上, t 是纤维范畴当且仅当 \mathcal{C} 有拉回 (见 [15] 命题 1.1.6).

例 A.10.4 (对象族)

这是例 A.10.2 的另一种推广. 设 \mathcal{C} 为任意范畴, 定义其 (集合指标的) 对象族范畴 $\mathbf{Fam}(\mathcal{C})$ (category of set-indexed families) 如下:

- $\mathbf{Fam}(\mathcal{C})$ 的对象为 (I, X) , 其中 I 为集合 (视为离散范畴), $X: I \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子;
- 对象 (I, X) 到 (J, Y) 的态射为映射 $f: I \rightarrow J$ 以及一族态射 $X_i \rightarrow Y_{f(i)}$.

将对象族 (I, X) 对应到指标集 I 的遗忘函子 $\mathbf{Fam}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{Set}$ 是纤维范畴, 指标集 I

上的纤维 $\mathbf{Fam}(\mathcal{C})_I$ 同构于 $\mathbf{Fun}(I, \mathcal{C})$, 即以 I 为指标的对象族的范畴. 指标集的映射 $f: I \rightarrow J$ 诱导了函子 $\mathbf{Fam}(\mathcal{C})_J \rightarrow \mathbf{Fam}(\mathcal{C})_I$, 将 (J, Y) 对应到 $(I, Y \circ f)$.

这个例子说明纤维范畴表达了对象族的直观: \mathbf{Top} 上的纤维范畴的对象是“一族连续变化的对象”; 光滑流形范畴上纤维范畴的对象是“一族光滑变化的对象”, 等等等等.

例 A.10.6 表达了“向量丛是一族连续变化的向量空间”.

例 A.10.5 (符号表)

此处所谓的符号表 (signature) Σ 是由一族类型 A, B, \dots 以及一些函数符号 $f: A_1, \dots, A_n \rightarrow B$ (注意 A, B, f 只是形式的记号) 构成的, 参考定义 B.1.5, 但此处不考虑关系符号. 符号表之间的态射是类型集合之间的映射加上函数符号的合适的对应. 由此, 符号表构成一个范畴 \mathbf{Sign} , 有纤维范畴 $\mathbf{Sign} \rightarrow \mathbf{Set}$, 将符号表遗忘为其中类型的集合. 这个纤维范畴也是如下的拉回,

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Sign} & \longrightarrow & \mathbf{Fam} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Set} & \longrightarrow & \mathbf{Set} \end{array}$$

其中函子 $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 将集合 T 对应到 $\coprod_{n \geq 0} T^n \times T$.

设 Σ 为符号表, 定义 Σ 的模型 M 是将类型实现为具体的集合, 将函数符号实现为具体的函数的方法, 详见定义 B.2.1.

例 A.10.6 (空间上的向量丛)

考虑向量丛的范畴 \mathbf{VBun} , 其中

- 对象 (X, E) 为拓扑空间 X 搭配一个 X 上的向量丛 E ;
- 态射 $(X, E) \rightarrow (Y, F)$ 为连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 搭配向量丛同态 $E \rightarrow f^*F$.

典范的投影函子 $\pi: \mathbf{VBun} \rightarrow \mathbf{Top}, (X, E) \mapsto X$ 是一个纤维化, 对象 X 上的纤维为 X 上向量丛的范畴.

例 A.10.7 (环上的模)

考虑模的范畴 \mathbf{Mod} , 其中

- 对象 (R, M) 为环 R 搭配一个 R -模 M ;
- 态射 $(R, M) \rightarrow (S, N)$ 为环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 搭配 R -模同态 $M \rightarrow \varphi^*N$ (φ^*N

是 N 通过 φ 视为 R -模, 又称标量限制, restriction of scalars).

典范的投影函子 $\pi: \text{Mod} \rightarrow \text{Ring}, (R, M) \mapsto R$ 是一个纤维化, 对象 R 上的纤维为 R -模范畴 $R\text{Mod}$.

在上面的许多例子中我们看到这样的结构: 一个范畴 \mathcal{S} 的每个对象 i 上各自有一个范畴 $\mathcal{C}(i)$, 并且这些范畴之间沿着 \mathcal{S} 的态射存在着联系. 于是我们得到索引范畴的概念.

定义 A.10.8 (索引范畴)

设 \mathcal{S} 为范畴. 定义一个 \mathcal{S} -索引范畴 (\mathcal{S} -indexed category) 为一个 2-函子 $\mathcal{C}: \mathcal{S}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$, 其中 \mathcal{S} 视为局部离散 2-范畴 (例 A.1.8). \mathcal{S} -索引范畴构成一个 2-范畴 $\text{Cat}_{\mathcal{S}}$.

定义 A.10.9 (Grothendieck 构造)


设 $\mathcal{C}: \mathcal{S}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$ 是 \mathcal{S} -索引范畴. 对于 \mathcal{S} 的态射 $f: i \rightarrow j$, 记函子 $\mathcal{C}(f): \mathcal{C}(j) \rightarrow \mathcal{C}(i)$ 为 f^* , 则由 2-函子的定义 (A.1.10), 对 $f: i \rightarrow j, g: j \rightarrow k$, 有自然同构 $\gamma_{i,j,k}: (gf)^* \xrightarrow{\sim} f^*g^*$. 定义 \mathcal{C} 的 *Grothendieck* 范畴 $\mathbf{G}(\mathcal{C})$ 如下:

- 其对象 (i, A) 为 \mathcal{S} 的对象 i 搭配 $\mathcal{C}(i)$ 的对象 A ;
- 态射 $(f, \varphi): (i, A) \rightarrow (j, B)$ 为 \mathcal{S} 的态射 $f: i \rightarrow j$ 搭配 $\mathcal{C}(i)$ 的态射

$$\varphi: A \rightarrow f^*(B).$$

- 态射 $(f, \varphi): (i, A) \rightarrow (j, B)$,
 $(g, \psi): (j, B) \rightarrow (k, C)$ 的复合为

$$(gf, A \xrightarrow{\varphi} f^*B \xrightarrow{f^*(\psi)} f^*g^*C \xrightarrow{\gamma^{-1}} (gf)^*C): (i, A) \rightarrow (k, C).$$



γ 的融贯性保证了上述复合的结合律, 使得 $\mathbf{G}(\mathcal{C})$ 构成一个 1-范畴. $\mathbf{G}(\mathcal{C})$ 到 \mathcal{S} 有明显的投影函子 $(i, A) \mapsto i$, 这是一个纤维范畴. 将索引范畴对应到此纤维范畴的过程称为 *Grothendieck* 构造, 它是一个 2-函子

$$\mathbf{G}: \text{Cat}_{\mathcal{S}} \rightarrow \text{Cat}/\mathcal{S}.$$

例 A.10.10 (俯范畴作为索引范畴)


设范畴 \mathcal{C} 有拉回, 即对态射 $f: c_1 \rightarrow c_2$ 有俯范畴之间的函子 $f^*: \mathcal{C}/c_2 \rightarrow \mathcal{C}/c_1$. 进一步, 有 2-函子 $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$, 将对象 c 对应到俯范畴 \mathcal{C}/c . 其 Grothendieck 范畴为 $\mathcal{C} \rightarrow \bullet$, 即 \mathcal{C} 中的态射构成的范畴, 见例 A.10.3.

Grothendieck 范畴的直观是“纤维丛的全空间”. 在一个 Grothendieck 范畴 $G(\mathcal{C})$ 中, 与 (带联络的) 纤维丛相似地, 我们可以定义垂直和水平的态射: 态射 (id_i, φ) 是垂直的 (即“纤维方向”的), 而 (f, id_A) 是水平的. 很明显, 任何态射 $(f, \varphi): (i, A) \rightarrow (j, B)$ 都可分解为一个垂直态射 (id_i, φ) 后接一个水平态射 (f, id_{f^*B}) .

在几何学中, 一个纤维丛的联络等同于在全空间上对每个点指定一些水平方向. 有了联络, 就可在纤维之间作平行移动. 要在范畴之间做类似的事情, 就需要将水平态射的概念抽象到一般的“纤维范畴” $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$, 而这将解释纤维范畴定义的动机.

定义 A.10.11 (水平态射)

设 \mathcal{C}, \mathcal{S} 为 1-范畴, $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 为函子. 对于态射 $h: c' \rightarrow c$, 若以下条件成立, 则称之为 π -水平态射 (prone morphism, 又称 Cartesian morphism): 对任意态射 $k: c'' \rightarrow c$ 以及任意分解 $\pi(k) = \pi(h)x$, 存在唯一的态射 $\ell: c'' \rightarrow c'$ 满足 $k = h\ell$ 且 $x = \pi(\ell)$.



π -水平态射的一个直观为“拉回”, 如下例所示.

例 A.10.12 (向量丛范畴中的水平态射)

继续例 A.10.6, 考虑下图, 其中 $K \rightarrow L$, $E \rightarrow M$ 为向量丛.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & f^*E & \longrightarrow & E \\
 & \nearrow \exists! & \downarrow & & \downarrow \\
 K & & N & \xrightarrow{f} & M \\
 \downarrow & \nearrow & & \nearrow & \\
 L & & & &
 \end{array}$$

由拉回的泛性质, 存在唯一的向量丛态射 $K \rightarrow f^*E$ 使其交换. 这说明向量丛的拉回构成 $\pi: \mathbf{VBun} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的水平态射.

定义 A.10.13 (纤维范畴, Grothendieck 纤维化, Street 纤维化)

对于函子 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$, 若如下条件成立, 则称之为纤维范畴 (fibered category, 或称 *Grothendieck* 纤维化): 对 \mathcal{C} 的任意对象 c 以及 \mathcal{S} 中任意态射 $f: s \rightarrow \pi(c)$, 都存在 π -水平态射 $\tilde{f}: c' \rightarrow c$ 使得 $\pi(\tilde{f}) = f$.

若上面条件中的 $\pi(\tilde{f}) = f$ 改为较弱的条件 $\pi(\tilde{f}) \simeq f$ (在 $\mathcal{S}/\pi(c)$ 中), 则称之为 *Street* 纤维化²³.

若 $\pi^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}^{\text{op}}$ 为纤维化, 则称 π 为对偶纤维化 (opfibration). 既是纤维化又是对偶纤维化的函子称为双纤维化 (bifibration).

注 A.10.14 (水平提升的唯一性与分裂纤维化)

在纤维化的定义 (A.10.13) 中, 没有提到水平提升 \tilde{f} 是唯一的; 但由水平态射的定义, f 的任意两个水平提升 \tilde{f}_1, \tilde{f}_2 之间由唯一的同构相联系.

$$\begin{array}{ccc}
 c'' & \xrightarrow{\tilde{f}_2} & c \\
 \exists! \uparrow & \searrow \exists! & \downarrow \tilde{f}_1 \\
 c' & & \\
 s & \xrightarrow{f} & \pi(c)
 \end{array}$$

假设选择公理, 那么我们可以给每个 f 选择一个水平提升; 这额外的信息称为纤维化的分裂 (cleavage). 带有分裂的纤维化称作分裂纤维化 (cloven fibration, 或 split fibration).

²³Ross Street, 澳大利亚范畴学家.

例 A.10.15 (预层作为纤维范畴)

范畴 \mathcal{C} 上的预层 $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可视为索引范畴 (纤维范畴), 其纤维为离散范畴. 此时 Grothendieck 构造 (定义 A.10.9) 退化为 “元素的范畴” (定义 A.4.5).

命题-定义 A.10.16 (由纤维范畴给出索引范畴)

给定纤维范畴 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$, 我们构造相应的 2-函子 $\mathcal{S}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Cat}$.

- \mathcal{S} 的对象 X 对应范畴 $\mathcal{C}_X := \pi^{-1}(X)$.
- 对于 \mathcal{S} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$, 如下定义函子 $f^*: \mathcal{C}_Y \rightarrow \mathcal{C}_X$,
 - 对于 \mathcal{C}_Y 的对象 E , 由纤维范畴的定义, 存在 f 的水平提升 $\tilde{f}: E' \rightarrow E$, 令 $f^*(E) = E'$ (这一步或者需要选择公理, 或者需要 π 的一个分裂, 见注 A.10.14),
 - 对于 \mathcal{C}_Y 中的态射 $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$, 由水平态射的定义 (A.10.11), 下图中存在唯一的 $\varphi': f^*E_1 \rightarrow f^*E_2$.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & f^*E_2 & \longrightarrow & E_2 \\
 & \exists! \varphi' \nearrow & & & \nearrow \varphi \\
 f^*E_1 & \longrightarrow & E_1 & & \\
 & \Downarrow & & & \\
 & & X & \xrightarrow{f} & Y \\
 \text{id}_X \nearrow & & & & \nearrow \text{id}_Y \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & &
 \end{array}$$

定义 $f^*(\varphi) = \varphi'$. 唯一性保证了该构造确实定义了一个函子.

- 对于 \mathcal{S} 中的态射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 下图中存在唯一的同构 $f^*g^* \simeq (gf)^*$.

$$\begin{array}{ccccc}
 f^*g^*E & \longrightarrow & g^*E & \longrightarrow & E \\
 \exists! \uparrow \downarrow \exists! & & & \nearrow & \\
 (gf)^*E & & & & \\
 & \Downarrow & & & \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z
 \end{array}$$

由上述讨论, 以及 \mathcal{S} 是局部离散 2-范畴, 容易验证 2-函子的定义 (A.1.10) 要求的融贯性.

命题 A.10.17 (双纤维化产生伴随)

设 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 为双纤维化, 则 \mathcal{S} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 产生一对伴随

$$\mathcal{C}_X \begin{array}{c} \xrightarrow{f_!} \\ \xleftarrow[f^*]{\perp} \end{array} \mathcal{C}_Y$$

其中 f^* 是定义 A.10.16 中的 f^* , 而 $f_!$ 是纤维范畴 $\pi^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}^{\text{op}}$ 的相应构造.

证明. 这是由于自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_Y}(f_!-, -) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, -) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}_X}(-, f^*-).$$

□


命题 A.10.18

在命题 A.10.17 的对应下, 一对伴随等同于 $\{0 \rightarrow 1\}$ 上的一个双纤维化.

证明. 设有伴随 $\mathcal{C}_0 \begin{array}{c} \xrightarrow{G} \\ \xleftarrow[H]{\perp} \end{array} \mathcal{C}_1$, 考虑如下的范畴 \mathcal{C} ,

- 其对象类为 $\text{Ob } \mathcal{C} = \text{Ob } \mathcal{C}_0 \sqcup \text{Ob } \mathcal{C}_1$;
- 态射集为 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c') = \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(c, c') & c, c' \in \text{Ob } \mathcal{C}_i \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(Gc, c') \text{ 即 } \text{Hom}_{\mathcal{C}_0}(c, Hc') & c \in \text{Ob } \mathcal{C}_0, c' \in \text{Ob } \mathcal{C}_1 \\ \emptyset & c \in \text{Ob } \mathcal{C}_1, c' \in \text{Ob } \mathcal{C}_0 \end{cases}$

定义函子 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \{0 \rightarrow 1\}$, 将 \mathcal{C}_0 的对象映射到 0, \mathcal{C}_1 的对象映射到 1, \mathcal{C}_0 中的态射映射到 id_0 , \mathcal{C}_1 中的态射映射到 id_1 , 其余的态射映射到 $f: 0 \rightarrow 1$. 我们验证 π 是双纤维化.



如图, 对任意 $c \in \text{Ob } \mathcal{C}_0, c' \in \text{Ob } \mathcal{C}_1$,

- $\text{id}_{Gc} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(Gc, Gc)$ (即 $\eta_c \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_0}(c, HGc)$) 给出 $\tilde{\eta}_c \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, Gc)$;
- $\text{id}_{Hc'} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_0}(Hc', Hc')$ (即 $\varepsilon_{c'} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(GHc', c')$) 给出 $\tilde{\varepsilon}_{c'} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Hc', c')$.

任意态射 $k \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(c, c')$ 唯一地穿过 $\tilde{\eta}_c$ 与 $\tilde{\varepsilon}_{c'}$. 这说明 $\tilde{\eta}_c$ 为 π^{op} -水平态射, 而 $\tilde{\varepsilon}_{c'}$ 为 π -水平态射; 从而 π, π^{op} 均为纤维化. 很明显, 该双纤维化在命题 A.10.17 的对应下给出的伴随正是 $G \dashv H$. \square

注 A.10.19

事实上, 双纤维化 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 等同于 2-函子 $\mathcal{S}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}_{\text{Adj}}$ (Cat_{Adj} 的定义见 A.2.12).

例 A.10.20 (双纤维化产生的伴随的例子)

- 例 A.10.7 中的纤维化 $\text{Mod} \rightarrow \text{Ring}$ 是双纤维化. 环同态 $\varphi: A \rightarrow B$ 诱导了模范畴之间的伴随 $\varphi_! \dashv \varphi^*$, $\varphi_! = (-) \otimes_A B$, $\varphi^* = \text{Hom}_B(B, -)$ (见例 A.8.14).
- 设范畴 \mathcal{C} 具有拉回, 则例 A.10.3 提到的函子 $t: \mathcal{C}^{\bullet \rightarrow \bullet} \rightarrow \mathcal{C}$ 是双纤维化. \mathcal{C} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导了俯范畴之间的伴随 $\Sigma_f = f_! \dashv f^*$ (见例 1.1.33).

A.11 下降

粗略地说, 下降 (descent) 是许多场合出现的一种现象: 在一族变化的范畴 (即纤维范畴) \mathcal{C}_X 中, 对于某种态射 $f: Y \rightarrow X$, 为了给出 \mathcal{C}_X 中的一个对象 u , 只需要给出其“逆像” $f^*(u)$ 以及某种额外的信息, 有时称为“粘贴资料” (gluing datum) ξ . 称 $(f^*(u), \xi)$ 为一个下降资料 (descent datum, 复数 data). 当然 \mathcal{C}_X 的每个对象都给出一组下降资料, 从而有“比较函子” $\mathcal{C}_X \rightarrow \text{Des}(f)$, 但这个函子不一定是等价; 当比较函子为等价时称 f 为有效下降态射 (effective descent morphism). 当 Y 是 X 的某种覆盖时, 下降资料是层条件的类比, 下降的现象说明某些对象和态射可“局部地”定义.

例 A.11.1 (向量丛的下降)

设拓扑空间 X 有开覆盖 $\{U_i\}$; 令 $Y = \coprod_i U_i$, 所有 U_i 的嵌入给出了映射 $p: Y \rightarrow X$. 此时, 为了给出 X 上的一个向量丛 E , 只需要给出 Y 上的一个向量丛 F ($F = p^*(E)$), 也即每个 U_i 上的一个向量丛 F_i , 以及 U_i, U_j 相交之处的粘贴资料

$$\varphi_{ij}: F_i|_{U_i \cap U_j} \xrightarrow{\simeq} F_j|_{U_i \cap U_j},$$

满足 $\varphi_{ii} = \text{id}_{F_i}$, 以及交换图

$$\begin{array}{ccc} F_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k} & \xrightarrow{\varphi_{ik}} & F_k|_{U_i \cap U_j \cap U_k} \\ & \searrow \varphi_{ij} \quad \nearrow \varphi_{jk} & \\ & F_j|_{U_i \cap U_j \cap U_k} & \end{array}$$

上述粘贴资料可表示为更简洁的形式. 注意到

$$Y \times_X Y \simeq \coprod_{i,j} U_i \cap U_j, \quad Y \times_X Y \times_X Y \simeq \coprod_{i,j,k} U_i \cap U_j \cap U_k, \quad (*)$$

记 $\pi_\alpha: Y \times_X Y \rightarrow Y$ 为第 α 分量的投影 ($\alpha = 1, 2$), $\pi_{\alpha\beta}: Y \times_X Y \times_X Y \rightarrow Y \times_X Y$ 为第 α, β 分量的投影 ($1 \leq \alpha < \beta \leq 3$), $\Delta: Y \rightarrow Y \times_X Y$ 为对角映射; 这些映射满足如下的关系:

$$\pi_1 \pi_{13} = \pi_1 \pi_{12}, \quad \pi_1 \pi_{23} = \pi_2 \pi_{12}, \quad \pi_2 \pi_{13} = \pi_2 \pi_{23}, \quad \pi_1 \Delta = \pi_2 \Delta = \text{id}_Y.$$

在 (*) 的观点下, 这些映射可分别写为

$$\Delta = (U_i \rightarrow U_i \cap U_i)_i, \quad \pi_1 = (U_i \cap U_j \hookrightarrow U_i)_{i,j}, \quad \pi_{12} = (U_i \cap U_j \cap U_k \hookrightarrow U_i \cap U_j)_{i,j,k}.$$

故对于 $F = (F_i)_i$, 有 $\pi_1^* F = (F_i|_{U_i \cap U_j})_{i,j}$, $\pi_2^* F = (F_j|_{U_i \cap U_j})_{i,j}$, $\pi_{13}^* \pi_1^* F = \pi_{12}^* \pi_1^* F = (F_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k})_{i,j,k}$ 等等. 那么粘贴资料等同于 $Y \times_X Y$ 上的向量丛同构

$$\varphi: \pi_1^* F \xrightarrow{\simeq} \pi_2^* F,$$

满足 $\Delta^* \varphi = \text{id}_F$ 以及交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_{13}^* \pi_1^* F & \xrightarrow{\pi_{13}^*(\varphi)} & \pi_{13}^* \pi_2^* F \\ \parallel & & \parallel \\ \pi_{12}^* \pi_1^* F & \xrightarrow{\pi_{12}^*(\varphi)} & \pi_{12}^* \pi_2^* F \\ & \searrow \pi_{23}^*(\varphi) & \nearrow \pi_{23}^*(\varphi) \\ & \pi_{12}^* \pi_2^* F = \pi_{23}^* \pi_1^* F & \end{array}$$

注意到 $\pi_1^* F = F \times_Y (Y \times_X Y) \simeq F \times_X Y$, 类似地 $\pi_2^* F \simeq Y \times_X F$, $\pi_{13}^* \pi_1^* F \simeq F \times_X Y \times_X Y$ 等等; 故粘贴资料也可表示为一个同构 $\varphi: F \times_X Y \rightarrow Y \times_X F$, 满足交换图

$$\begin{array}{ccc} F \times_X Y \times_X Y & \xrightarrow{\pi_{13}^*(\varphi)} & Y \times_X Y \times_X F \\ & \searrow \pi_{12}^*(\varphi) \quad \nearrow \pi_{23}^*(\varphi) & \\ & Y \times_X F \times_X Y & \end{array}$$

例 A.11.2 (模的下降)

设环 R 的谱 $\text{Spec}(R)$ 有一个有限的开覆盖 $\{\text{Spec } R_{f_i}\}_{1 \leq i \leq n}$, 其中 $f_i \in R$ 生成了 R 的单位理想. (关于谱的开覆盖, 见例 2.2.10.) 令 $S = \prod_{i=1}^n R_{f_i}$, 则有典范的环同态 $R \rightarrow S$, 对应的仿射概形的态射 $\text{Spec } S \rightarrow \text{Spec } R$ 类似于例 A.11.1 的开覆盖. 一个

S -模 M 等同于一组 R_{f_i} -模 M_i . 此时, 为了给出一个 R -模, 只需要给出一个 S 模 M , 以及 $R_{f_i f_j}$ 上的粘贴资料

$$\varphi_{ij}: (M_i)_{f_j} \xrightarrow{\cong} (M_j)_{f_i},$$

满足 $\varphi_{ii} = \text{id}_{M_i}$, 以及交换图

$$\begin{array}{ccc} (M_i)_{f_j f_k} & \xrightarrow{\varphi_{ik}} & (M_k)_{f_i f_j} \\ & \searrow \varphi_{ij} & \nearrow \varphi_{jk} \\ & (M_j)_{f_i f_k} & \end{array}$$

(注. $(M_i)_{f_j}$ 是 M_i 关于 f_j 生成的乘法封闭子集 $\{1, f_j, f_j^2, \dots\}$ 的局部化, 见例 A.3.4. 这个局部化对应到开子空间 $\text{Spec } R_{f_i}$ 的限制. 对任意两个元素 f_i, f_j , 作为 $\text{Spec } R$ 的子空间有 $\text{Spec } R_{f_i} \cap \text{Spec } R_{f_j} = \text{Spec}(R_{f_i} \otimes_R R_{f_j}) = \text{Spec } R_{f_i f_j}$.)

上述粘贴资料可表示为更简洁的形式. 注意到

$$S \otimes_R S \simeq \prod_{i,j=1}^n R_{f_i} \otimes_R R_{f_j} \simeq \prod_{i,j=1}^n R_{f_i f_j}, \quad S \otimes_R S \otimes_R S \simeq \prod_{i,j,k=1}^n R_{f_i f_j f_k}, \quad (\star\star)$$

记 $\mu_\alpha: S \rightarrow S \otimes_R S$ 为第 α 分量的含入 ($\alpha = 1, 2$), $\mu_{\alpha\beta}: S \otimes_R S \rightarrow S \otimes_R S \otimes_R S$ 为第 α, β 分量的含入 ($1 \leq \alpha < \beta \leq 3$), $m: S \otimes_R S \rightarrow S$ 为乘法映射, 这些映射满足如下关系:

$$\mu_{12}\mu_1 = \mu_{13}\mu_1, \quad \mu_{12}\mu_2 = \mu_{23}\mu_1, \quad \mu_{23}\mu_2 = \mu_{13}\mu_2, \quad m\mu_1 = m\mu_2 = \text{id}_S.$$

在 $(\star\star)$ 的观点下, 这些映射的分量表达式为

$$m: (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \mapsto (a_{ii})_{1 \leq i \leq n}, \quad \mu_1: (a_i)_{1 \leq i \leq n} \mapsto (a_i)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

对于环同态 $f: A \rightarrow B$, 考虑函子 $f_! = (-) \otimes_A B: A\text{Mod} \rightarrow B\text{Mod}$. 故对于 $M = (M_i)_i$, 有 $(\mu_1)_! M \simeq M \otimes_S (S \otimes_R S) \simeq M \otimes_R S = ((M_i)_{f_j})_{i,j}$, $(\mu_{13})_!(\mu_1)_! M = (\mu_{12})_!(\mu_1)_! M = ((M_i)_{f_j f_k})_{i,j,k}$ 等等. 那么粘贴资料等同于 $S \otimes_R S$ 上的模同构

$$\varphi: (\mu_1)_! M \xrightarrow{\cong} (\mu_2)_! M,$$

满足 $m_! \varphi = \text{id}_M$ 以及交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & (\mu_{13})_!(\mu_1)_! M & \xrightarrow{(\mu_{13})_!(\varphi)} & (\mu_{13})_!(\mu_2)_! M \\ & \swarrow & & & \searrow \\ (\mu_{12})_!(\mu_1)_! M & & & & (\mu_{23})_!(\mu_2)_! M \\ & \searrow & & & \swarrow \\ & & (\mu_{12})_!(\mu_2)_! M = (\mu_{23})_!(\mu_1)_! M & & \end{array}$$

(左边的 \searrow 和 \swarrow 箭头均标有 $(\mu_{12})_!(\varphi)$ 和 $(\mu_{23})_!(\varphi)$)

也即一个 $S \otimes_R S$ -模同构

$$\varphi: M \otimes_R S \rightarrow S \otimes_R M,$$

满足

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_R S \otimes_R S & \xrightarrow{(\mu_{13})_!(\varphi)} & S \otimes_R S \otimes_R M \\ & \searrow (\mu_{12})_!(\varphi) \quad \nearrow (\mu_{23})_!(\varphi) & \\ & S \otimes_R M \otimes_R S & \end{array}$$

例 A.11.3 (“丛” 的下降)

考虑一个具有拉回的范畴 \mathcal{C} , 其中的态射 $p: P \rightarrow X$ 可理解为 X 上的丛. 考虑纤维范畴 $t: \mathcal{C}^\rightarrow \rightarrow \mathcal{C}$, $(P \rightarrow X) \mapsto X$ (又称“陪域纤维化”, codomain fibration), 其下降理论回答的问题是, 对于 $f: Y \rightarrow X$, 一个丛 $P \rightarrow Y$ 何时来自于一个丛 $\tilde{P} \rightarrow X$ 的拉回.

对于态射 $f: Y \rightarrow X$, 定义一组下降资料为如下资料,

- Y 上的丛 $p: P \rightarrow Y$;
- $Y \times_X Y$ 上的丛同构 $\varphi: \pi_1^* P \rightarrow \pi_2^* P$ (即 $\varphi: P \times_X Y \rightarrow Y \times_X P$);

满足 $Y \times_X Y \times_X Y$ 上的一个交换图.

由前两例的直观, 不难想象当 $Y \rightarrow X$ 是某种覆盖时, 由 Y 上的下降资料即可得到 X 上的丛. 可以证明当 \mathcal{C} 为意象时, 沿 $f: Y \rightarrow X$ 的下降成立仅仅需要 f 为满射, 且对于下降资料 $\varphi: P \times_X Y \rightarrow Y \times_X P$, 下降得到的 X 上的丛为

$$\tilde{P} := \text{coeq}(\pi_1, \pi_2 \varphi: P \times_X Y \rightrightarrows P) \rightarrow X.$$

定义 A.11.4 (用单子表达下降)

设 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 为双纤维化. 对于 \mathcal{S} 中的态射 $f: X \rightarrow Y$, 有伴随 $f_! \dashv f^*$ (定义 A.10.17). 定义下降资料的范畴 $\text{Des}_\pi(f)$ 为这对伴随对应的单子 $f^* f_!$ 的代数范畴, 也即

- $\text{Des}_\pi(f)$ 的对象为 \mathcal{C}_X 的对象 V 以及态射 $h: f^* f_! V \rightarrow V$,

第 B 章 形式逻辑和范畴逻辑基础

B.1 一阶逻辑	311
一阶语言的基本要件	313
一阶理论	317
B.2 一阶逻辑的范畴语义	324
一阶语言在范畴中的解释	324
一阶理论在范畴中的模型	328
提纲	328
教条	329
B.3 高阶逻辑	331
高阶语言的基本要件	331
B.4 类型论	334
命题是类型: Curry–Howard 同构	337
类型论的范畴语义	337
B.5 模态逻辑	338

Mathematicians are committed to rigorous reasoning, but they usually shy away from formal logic.

William M. Farmer, *The seven virtues of simple type theory*

B.1 一阶逻辑

我们即将引入的逻辑学中的若干基本概念可以视为“数学语言由什么构成”这个问题的一种完全形式化的回答。写出语言的形式定义之前,我们先从日常的数学语言中最熟悉的

例子开始, 对语言的每个成分建立感性的认知.

数学语言中最常见的成分是公式 (formula).

例 B.1.1 (公式)

$1 + 1 = 2$ 是一个公式, 其中

- $1, 2$ 是自然数, 即是类型 (type) \mathbb{N} 的项 (terms);
- 加号 $+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是一个函数符号 (function symbol);
- 将两个 1 放在一起得到 $(1, 1)$, 它的类型是 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$;
- 以 $+$ 作用于 $(1, 1)$, 得到 $1 + 1$, 类型为 \mathbb{N} ;
- 以 $=$ 连接类型 \mathbb{N} 的两个项 $1 + 1$ 与 2 , 得到公式 $1 + 1 = 2$.

公式中可以带有变量 (variables).

例 B.1.2 (带自由变量的公式)

$y = x^2$ 是一个带自由变量 (free variables) 的公式, 其中

- x, y 是类型 \mathbb{R} 的变量, 变量是项的一种, 所以 x, y 也是类型 \mathbb{R} 的项;
- 平方 $(-)^2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数符号, 以 $(-)^2$ 作用于 x 得到 x^2 , 它是类型 \mathbb{R} 的项, 带一个自由变量 x ;
- 以 $=$ 连接类型 \mathbb{R} 的两个项 y 与 x^2 , 得到公式 $y = x^2$.

对公式中的自由变量, 我们可使用“存在”和“任意”这两个量词 (quantifiers).

例 B.1.3 (带量词的公式)

$\neg \exists x \ x^2 = -1$ 是一个不含自由变量的公式, 其中

- x 是类型 \mathbb{R} 的变量, x^2 是类型 \mathbb{R} 的项, 带一个自由变量 x ;
- $x^2 = -1$ 是带一个自由变量 x 的公式;
- 量词 $\exists x$ 放在含自由变量 x 的公式前面, 得到不含自由变量的公式 $\exists x \ x^2 = -1$ (变量 x 在这里称为约束变量 (bound variable));
- 逻辑运算 \neg (“非”) 放在公式 $\exists x \ x^2 = -1$ 前面, 得到公式 $\neg \exists x \ x^2 = -1$.

例 B.1.4 (素数)

如下公式表达了“ p 是素数”:

$$\neg(p = 1) \wedge \forall x((\exists y \, x \cdot y = p) \Rightarrow (x = 1 \vee x = p)),$$

其中 x, y, p 是类型 \mathbb{N} 的变量, 整个公式有一个自由变量 p .

一阶语言的基本要件**符号表**

语言的形式化定义依赖于一个符号表 (signature).¹

定义 B.1.5 (符号表)

一个 (一阶) 符号表 Σ 由如下内容构成:

- 一族类型 (types), 每个类型可有任意多个变量 (variables)²;
- 一些函数符号 (function symbols), 每一个函数符号 f 具有固定的类型 A_1, \dots, A_n, B , 记作 $f: A_1 \cdots A_n \rightarrow B$, 非负整数 n 称为 f 的元数 (arity); (当 $n = 0$ 时, 函数符号 f 是“零元函数”, 也即类型 B 的常数, 不妨记作 $f \in B$.)
- 一些关系符号 (relation symbols), 又叫做谓词 (predicates), 每一个关系符号 R 具有固定的类型 A_1, \dots, A_n , 记作 $R \hookrightarrow A_1 \cdots A_n$, 非负整数 n 称为 R 的元数. (当 $n = 0$ 时, 关系符号是“零元关系”, 也即原子命题 (atomic proposition).)

注 B.1.6

如果我们在定义 B.1.5 中加入类型的有限积, 那么就不需要多元函数和多元关系; 但这样定义也有一些代价, 例如本来只有一个类型 G 的语言将会需要无穷多个类型 $1, G, G^2, \dots$.

另外, 在定义 B.1.5 中, 关系符号与函数符号被区分开了; 但在通常的数学语言中我们可以认为某类型 A 上的关系符号不过是 A 到“真值集合”类型 $\{\top, \perp\}$ 的函数符号. 在一般意象的内语言中, $\{\top, \perp\}$ 的角色由于对象分类子 Ω 扮演.

¹逻辑学中的 signature 似乎没有通行的中文译名. 由于它给出了语言中所用的符号的集合, 试译为符号表.

²要求一个类型有任意多个变量的目的是, 在任何场景我们都可以自由地声明一个此前从未出现的变量. 类型 X 的变量 x 不是 X 的元素, 只是一个形式上的符号, 不携带任何信息. 你可以想象 x 是“未定元”, 但这种说法不具有数学上的含义.

例 B.1.7 (初等算术)

初等算术的语言的符号表包括

- 类型 \mathbb{N} ;
- 常数 0, 一元函数符号 S (后继), 二元函数符号 $+, \times$ (加法, 乘法);
- 关系符号 $<$.

例 B.1.8 (Zermelo–Fraenkel 集合论)

Zermelo–Fraenkel (简称 ZF) 集合论的符号表包括

- 类型 S (“所有东西都是集合”);
- 二元关系符号 \in .

例 B.1.9 (群)

群的语言的符号表包括

- 类型 G ;
- 常数 1 (单位元), 一元函数符号 $(-)^{-1}: G \rightarrow G$ (逆), 二元函数符号 $\cdot: GG \rightarrow G$ (乘法);

没有关系符号³.

读者可试着写出环的符号表.

例 B.1.10 (小范畴)

小范畴的语言的符号表包括

- 类型 O (对象), M (态射);
- 一元函数符号 $s, t: M \rightarrow O$, (态射的起点与终点), 一元函数符号 $\text{id}: O \rightarrow M$ (对象的恒等态射);
- 三元关系符号 $C \hookrightarrow MMM$, $C(f, g, h)$ (“ h 等于 $f \circ g$ ”).

注意, 范畴中并非任意两个态射都能复合, 故表达复合关系只能使用三元关系符号, 而不能使用二元函数符号.

³或者说有一个关系符号 “=” 等号是默认存在的.

项, 公式

定义 B.1.11 (项)

设 Σ 为一符号表, 其上的项 (terms) 由如下条款归纳定义.

- 一个类型 A 的单独一个变量 x 是一项;
- 对于函数符号 $f: A_1 \cdots A_n \rightarrow B$, 若 x_1, \dots, x_n 分别是类型 A_1, \dots, A_n 的项, 则 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是类型 B 的项.

定义 B.1.12 (公式的形成规则)

语言中的公式 (formulae) 有如下形成规则 (formation rules), 同时我们归纳地定义公式中的自由变量 (free variables).

- (i) (关系) 对于关系符号 $R \hookrightarrow A_1 \cdots A_n$, 若 x_1, \dots, x_n 分别是类型 A_1, \dots, A_n 的项, 则 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是公式, 其中的自由变量是所有在某个 x_i 中出现的变量;
- (ii) (等式) 对于相同类型的项 x, y , $(x = y)$ 是公式, 其中的自由变量是所有出现在 x 或 y 中 (或两者兼有) 的变量;
- (iii) (真) \top 是公式, 其中没有自由变量;
- (iv) (且, 又叫合取, conjunction) 对于公式 ϕ, ψ , $(\phi \wedge \psi)$ 是公式, 其中自由变量是 ϕ 与 ψ 的自由变量的并;
- (v) (假) \perp 是公式, 其中没有自由变量;
- (vi) (或, 又叫析取, disjunction) 对于公式 ϕ, ψ , $(\phi \vee \psi)$ 是公式, 其中自由变量是 ϕ 与 ψ 的自由变量的并;
- (vii) (蕴含) 对于公式 ϕ, ψ , $(\phi \Rightarrow \psi)$ 是公式, 其中自由变量是 ϕ 与 ψ 的自由变量的并;
- (viii) (否定) 对于公式 ϕ , $\neg \phi$ 是公式, 其中自由变量即为 ϕ 的自由变量;
- (ix) (存在量词) 对于公式 ϕ 以及变量 x , $(\exists x \phi)$ 是公式, 其中的自由变量为 ϕ 的自由变量去掉 x (我们允许 ϕ 中不含 x);
- (x) (存在唯一) 对于公式 ϕ 以及变量 x , 引入一个记号 $\exists! x \phi$ 表示

$$(\exists x \phi) \wedge \forall x \forall x' (\phi \wedge \phi[x'/x] \Rightarrow x' = x),$$

其中 $\phi[x'/x]$ 为将公式 ϕ 中的自由变量 x 替换为 x' 所得的公式.

- (xi) (全称量词) 对于公式 ϕ 以及变量 x , $(\forall x \phi)$ 是公式, 其中的自由变量为 ϕ 的自由变量去掉 x ;
- (xii) (无穷析取) 对于公式 $\phi_i (i \in I)$, 若其中的自由变量有限, 则 $\bigvee_{i \in I} \phi_i$ 是公式 (包括 \perp), 其中的自由变量为 ϕ_i 的自由变量的并;
- (xiii) (无穷合取) 对于公式 $\phi_i (i \in I)$, 若其中的自由变量有限, 则 $\bigwedge_{i \in I} \phi_i$ 是公式 (包括 \top), 其中的自由变量为 ϕ_i 的自由变量的并.

注 B.1.13

在语法的层面, 项与公式是两种不同的东西; 但项与公式可以有相同的语义: Mitchell-Bénabou 语言 (4.1 节) 中的公式不过是 Ω 类型的项.

定义 B.1.14 (几类公式)

对于固定的符号表 Σ , 几类公式由如下形成规则定义.

- 原子公式 (atomic formulae) : 关系与等式.
- *Horn* 公式⁴ : 原子公式, 真, 二元合取 (有限合取).
- 常理公式 (regular formulae) : 原子公式, 真, 二元合取, 存在量词.
- 贯理公式 (coherent formulae) : 原子公式, 真, 二元合取, 存在量词, 假, 二元析取.
- 一阶公式 (first-order formulae) : 所有由有限规则 (定义 B.1.12 去掉最后两条) 构造的公式.
- 几何公式 (geometric formulae) : 原子公式, 真, 二元合取, 存在量词, 假, 以及无穷析取.
- 无限一阶公式 (infinitary first-order formulae) : 所有由定义 B.1.12 的规则构造的公式.

⁴ Alfred Horn (1918-2001), 美国数学家, 以格论与万有代数方面的工作闻名.

例 B.1.15

在环的语言中, “ x 幂零” 可表达为如下的几何公式 (使用无穷析取):

$$(x = 0) \vee (x \cdot x = 0) \vee (x \cdot x \cdot x = 0) \vee \cdots;$$

“ x 可逆” 可表达为如下的几何公式 (使用存在量词):

$$\exists y \, xy = 1.$$

但如下表达 “非零元都可逆” 的公式不是几何公式:

$$\neg(x = 0) \Rightarrow \exists y \, xy = 1,$$

因为使用了 “蕴涵”.

注 B.1.16

由有限规则定义的一类公式构成集合, 而后两类公式 (几何公式, 无限一阶公式) 只能说构成类.

由于几何公式可能涉及无穷析取, 它不再属于 (有限的) 一阶逻辑.

一阶理论**定义 B.1.17 (语境)**

语境 (context) 是一列有限个名称互不相同的变量 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$. 其中每个变量 x_i 有确定的类型 A_i , 这些类型可能相同也可能不同.

设 \vec{x} 是一个语境. 对于项 t (定义 B.1.11) 或公式 ϕ (定义 B.1.12), 若 \vec{x} 包含了其中的所有自由变量, 则称 \vec{x} 适合于 (is suitable for) 项 t 或公式 ϕ . 此时, 我们也以 $\vec{x}.\phi$, $\vec{x}.t$ 表示带语境的公式 (formula-in-context), 带语境的项 (term-in-context).

定义 B.1.18 (相继式)

符号表 Σ 上的一个相继式 (sequent) 是指一个形式的表达式

$$\phi \vdash_{\vec{x}} \psi,$$

意指 “在语境 \vec{x} 中, 若 ϕ , 则 ψ ”, 其中 ϕ, ψ 是符号表 Σ 上的公式, \vec{x} 是一个适合于 ϕ, ψ 的语境.

我们用 $\vdash_{\vec{x}} \psi$ 表示 $\top \vdash_{\vec{x}} \psi$.

注 B.1.19

在完整的一阶逻辑中不需要一般的相继式, 因为 $\phi \vdash_{(x_1, \dots, x_n)} \psi$ 可表示为 $\vdash \forall x_1 \cdots \forall x_n (\phi \Rightarrow \psi)$.

定义 B.1.20 (理论)

符号表 Σ 上的一个理论 (theory) \mathbb{T} 是若干条公理 (axioms) 的集合, 每个公理是 Σ 上的一个相继式.

定义 B.1.21 (几类不同的理论)

- 称理论 \mathbb{T} 为命题理论 (propositional theory), 是指其符号表中没有类型, 仅有零元关系符号.
- 称理论 \mathbb{T} 为代数理论 (algebraic theory), 是指其符号表中没有关系符号 (等号除外), 且仅包含形如 $\vdash_{\vec{x}} (s = t)$ 的公理. 这是定义 A.9.3.
- 称理论 \mathbb{T} 为 *Horn* (常理, 贯理, 几何, 一阶) 理论, 是指其公理只涉及 *Horn* (常理, 贯理, 几何, 一阶) 公式. 几类公式的定义见 B.1.14.
- 对于常理论 \mathbb{T} , 称其为本质代数 (essentially algebraic, 又称 Cartesian) 的理论, 是指 \mathbb{T} 的公理具有一个良序, 满足如下条件: 对每个公理 σ , 以 $\mathbb{T}_{<\sigma}$ 表示 σ 之前的公理构成的子集, 则 σ 涉及的所有存在性都是 $\mathbb{T}_{<\sigma}$ -可证的存在唯一性.

每种一阶逻辑都有配套的推理系统 (deduction system). 推理系统包含形如

$$\frac{\Gamma}{\sigma}$$

的推理规则, 表示由若干相继式 Γ 可以得到相继式 σ . 双横线 $\frac{\tau}{\sigma}$ 表示 $\frac{\tau}{\sigma}$ 与 $\frac{\sigma}{\tau}$ 两条规则.

首先是相继式演算 (sequent calculus) 的结构性规则 (structural rules). 这些规则在

定义 B.1.22 (相继式演算的结构性规则)

- 恒等公理 (identity axiom),

$$\frac{}{\phi \vdash_{\vec{x}} \phi}.$$

- 替换规则 (substitution rule), 记 $\phi[t/y]$ 为将公式 ϕ 中的自由变量 y 替换为同

类型的项 t 所得的公式, 那么有规则

$$\frac{\phi \vdash_{\vec{x}, y} \psi}{\phi[t/y] \vdash_{\vec{x}} \psi[t/y]}.$$

- 剪切规则 (cut rule),

$$\frac{\Gamma \vdash_{\vec{x}} \Delta, \phi \quad \phi, \Sigma \vdash_{\vec{x}} \Pi}{\Gamma, \Sigma \vdash_{\vec{x}} \Delta, \Pi}.$$

(这里公式 ϕ 被“剪掉”了.)

定义 B.1.23 (一阶逻辑的推理系统)

在结构性规则 (定义 B.1.22) 的基础上, 一阶逻辑的推理系统还可能包含如下公理与规则.

- 有限合取规则, 包含公理

$$\phi \vdash_{\vec{x}} \top \quad (\phi \wedge \psi) \vdash_{\vec{x}} \phi \quad (\phi \wedge \psi) \vdash_{\vec{x}} \psi$$

与推理规则

$$\frac{\phi \vdash_{\vec{x}} \psi \quad \phi \vdash_{\vec{x}} \chi}{\phi \vdash_{\vec{x}} (\psi \wedge \chi)}.$$

- 有限析取规则, 包含公理

$$\perp \vdash_{\vec{x}} \phi \quad \phi \vdash_{\vec{x}} (\phi \vee \psi) \quad \psi \vdash_{\vec{x}} (\phi \vee \psi)$$

与推理规则

$$\frac{\phi \vdash_{\vec{x}} \chi \quad \psi \vdash_{\vec{x}} \chi}{(\phi \vee \psi) \vdash_{\vec{x}} \chi}.$$

- 无限合取与析取规则, 其公理与推理规则与前两条类似.
- 蕴涵规则, 有公理

$$\frac{\phi \wedge \psi \vdash_{\vec{x}} \chi}{\psi \vdash_{\vec{x}} (\phi \Rightarrow \chi)}.$$

- 存在量词规则, 有公理

$$\frac{\phi \vdash_{\vec{x}, y} \psi}{(\exists y.\phi) \vdash_{\vec{x}} \psi},$$

其中 ψ 不含自由变量 y .

- 全称量词规则, 有公理

$$\frac{\phi \vdash_{\vec{x}, y} \psi}{\phi \vdash_{\vec{x}} (\forall y.\psi)}.$$

- 分配公理

$$\phi \wedge (\psi \vee \chi) \vdash_{\vec{x}} (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi).$$

- *Frobenius* 公理

$$\phi \wedge (\exists y.\psi) \vdash_{\vec{x}} \exists y.(\phi \wedge \psi).$$

- 排中律

$$\top \vdash_{\vec{x}} \phi \vee \neg\phi.$$

注 B.1.24

注意上述规则由逻辑连接词 (或量词) 的引入规则和消去规则构成. 所谓引入规则就是如何得到一个公式, 消去规则就是如何使用一个公式.

定义 B.1.25

在结构性规则的基础上, 几种逻辑有如下推理规则 (inference rules).

- 代数逻辑 (algebraic logic), 没有附加规则.
- *Horn* 逻辑, 有限合取规则.
- 常理逻辑 (regular logic), 有限合取规则, 存在量词规则, *Frobenius* 公理.
- 贯理逻辑 (coherent logic), 有限合取与析取规则, 存在量词规则, 分配公理, *Frobenius* 公理.
- 几何逻辑 (geometric logic), 有限合取规则, 无限析取规则, 存在量词规则, 无限分配公理, *Frobenius* 公理.
- 直觉主义一阶逻辑 (intuitionistic first-order logic), 除排中律以外的所有有限规则.
- 经典一阶逻辑 (classical first-order logic), 所有有限规则.

定义 B.1.26

称相继式 σ 在代数 (*Horn*, 常理, 贯理, ...) 理论 \mathbb{T} 下可证, 是指存在一个形如下图的树 (读者可自行补充树的严格定义),

$$\frac{\frac{\sigma_1}{\frac{\sigma_3}{\sigma}} \quad \sigma_2}{\sigma_4} \quad \sigma$$

其中上方无横线的相继式 (图中为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_4$) 为 \mathbb{T} 中的公理, 且每条横线的上方与下方均来自相应逻辑的某条推理规则.

例 B.1.27

在经典一阶逻辑中, 分配公理 $\phi \wedge (\psi \vee \chi) \vdash_{\vec{x}} (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$ 有如下的证明. 简便起见, 记 $p = (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$.

$$\frac{\frac{\phi \wedge \psi \vdash_{\vec{x}} p}{\psi \vdash_{\vec{x}} \phi \Rightarrow p} \quad \frac{\phi \wedge \chi \vdash_{\vec{x}} p}{\chi \vdash_{\vec{x}} \phi \Rightarrow p}}{\frac{\psi \vee \chi \vdash_{\vec{x}} \phi \Rightarrow p}{\phi \wedge (\psi \vee \chi) \vdash_{\vec{x}} p}}$$

其中四行使用的规则依次为: 有限析取规则, 蕴涵规则, 有限析取规则, 蕴涵规则. 然而在贯理逻辑 (定义 B.1.25) 中缺少蕴涵规则, 故需要分配公理. 类似地, 贯理逻辑也需要 Frobenius 公理.

例 B.1.28 (初等算术的理论)

继续例 B.1.7, 初等算术的一种理论有如下的公理:

- $\vdash_x \neg(Sx = 0)$;
- $Sx = Sy \vdash_{(x,y)} x = y$;
- $\neg(x = 0) \vdash_x \exists y.Sy = x$;
- \dots (略)

初等算术有许多不同但互相等价的公理系统.

例 B.1.29 (Zermelo–Fraenkel 集合论)

继续例 B.1.8, ZF 有如下的公理 (我们将 $\forall y.y \in x \Rightarrow \dots$ 简记为 $\forall y \in x. \dots$, 将 $\exists y.y \in x \wedge \dots$ 简记为 $\exists y \in x. \dots$, 将 $\forall z \in x.z \in y$ 简记为 $x \subset y$, 并且参考注 B.1.19 省略符号 $\vdash \dots$):

- (外延) $\forall x.\forall y.\forall z.(z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y$;
- (配对) $\forall x.\forall y.\exists z.\forall w.(w \in z \Leftrightarrow (w = x \vee w = y))$;

- (并) $\forall x. \exists y. \forall z. (z \in y \Leftrightarrow \exists w \in x. z \in w)$;
- (幂集) $\forall x. \exists y. \forall z. (z \in y \Leftrightarrow z \subset x)$;
- (无穷) $\exists x. \exists y \in x. \forall z \in x. \exists t \in x. z \subset t \wedge z \neq t$;
- (良基) $\forall x. \forall y \in x. \exists z \in x. \forall w \in x. (\neg w \in z)$;
- (分离公理模式) 对每个公式 ϕ (不含自由变量 y), 有一条公理 $\forall x. \exists y. \forall z. [z \in y \Leftrightarrow (z \in x \wedge \phi)]$;
- (替换公理模式) 对每个公式 ϕ (不含自由变量 w), 有一条公理 $\forall x. [(\forall y \in x. \exists! z. \phi) \Rightarrow \exists w. \forall y \in x. \Rightarrow \exists z \in w. \phi]$, 其中 $\exists! z. \phi$ 是指 $\exists z. \phi \wedge (\forall z'. \forall z''. (\phi \wedge \phi[z'/z]) \Rightarrow z' = z)$.

ZF 是一种经典一阶理论.

例 B.1.30 (群的理论)

继续例 B.1.9, 群的理论有如下的公理:

- $\vdash_{(x,y,z)} (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;
- $\vdash_x x^{-1} \cdot x = x \cdot x^{-1} = 1$;
- $\vdash_x 1 \cdot x = x \cdot 1 = x$.

群的理论是一种代数理论 (定义 B.1.21). 类似地, 读者可写出环的理论的公理. 环的理论也是一种代数理论. 推而广之, 每一种 Lawvere 理论 (A.9 节) 都可以视为这里定义的代数理论.

例 B.1.31 (环上的模的理论)

定义“环上的模”的理论: 其符号表包括两个类型 R, M , 常数 $0 \in M$, 二元函数 $\cdot: RM \rightarrow M, +: MM \rightarrow M, +: RR \rightarrow R, \cdot: RR \rightarrow R$. 有如下的公理,

- R 关于 $+, \cdot$ 构成环;
- M 关于 $+$ 构成交换群;
- $\vdash_{(r,x,y)} r \cdot (x + y) = r \cdot x + r \cdot y$, 其中 $r: R, x, y: M$;
- $\vdash_{(r,s,x)} r \cdot (s \cdot x) = (r \cdot s) \cdot x$, 其中 $r, s: R, x: M$.

“环上的模”的理论是一种代数理论. 注意该理论不同于 R -模的 Lawvere 理论 (定义 A.9.13); 它具有两个类型, 而 Lawvere 理论仅有一个类型.

例 B.1.32 (小范畴的理论)

继续例 B.1.10, 小范畴的理论有如下的公理:

- (首尾相接的两个态射可以复合) $s(f) = t(g) \vdash_{(f,g)} \exists h C(f, g, h)$,
- (复合唯一) $C(f, g, h) \wedge C(f, g, k) \vdash_{(f,g,h,k)} h = k$.

小范畴的理论是常理理论 (定义 B.1.21), 因为其公理只涉及原子公式, 二元合取, 以及存在量词. 由于复合的唯一性, 小范畴的理论是本质代数的 (定义 B.1.21).

例 B.1.33 (局部环的理论)

在代数中, 局部环⁵是指满足如下条件的环 R :

- $0 \neq 1$,
- 对任意 $x, y \in R$, 若 $x + y = 1$, 则 x 与 y 至少有一个可逆.

根据这种定义, 我们写出局部环的理论, 即环的理论加上两条公理

- $(0 = 1) \vdash \perp$,
- $x + y = 1 \vdash_{(x,y)} (\exists z. xz = 1) \vee (\exists z. yz = 1)$.

局部环的理论是一种贯理理论 (定义 B.1.21), 因为其公理只涉及原子公式, 假, 二元析取, 以及存在量词. 读者还可试着写出整环的理论, 并说明它也是一种贯理理论.

例 B.1.34 (域的理论)

域是指非零元均可逆的环. 在环的理论中加入公理

- $\vdash_x (x = 0) \vee (\exists y. xy = 1)$

就得到了一种域的理论⁶. 它也是一种贯理理论.

⁵局部环还有一种使用极大理想的定义, 但它难以用一阶理论表达. 使用极大理想的定义和本书中的定义在经典逻辑中是等价的.

⁶在构造主义数学中, 域有不只一种理论, 它们只是恰好在集合范畴 (Boole 意象) 中有相同的模型.

注 B.1.35

一阶逻辑能够表达的理论是有限制的. 例如挠群 (torsion group, 即所有元素都是有限阶元素的群) 没有一阶理论. 而在域的一阶理论中, 不存在一个公式表达“ x 是单位根”. 参见 [23] 第一讲. 另一个缺陷是一阶理论基本上不能确定一个唯一的结构, 例如初等算数的理论不能唯一地确定自然数集 \mathbb{N} , 而是不可避免地拥有无穷多个互不同构的模型.

B.2 一阶逻辑的范畴语义

一阶语言可在具有合适结构的范畴中获得解释 (interpretation), 又称范畴语义 (categorical semantics). 由此我们可以谈论这种语言上的理论在范畴中的模型. 人们最常谈论的“模型”是集合范畴 **Set** 中的模型, 例如, 不加修饰的“群”默认就是指 **Set** 中的群. 然而在不同范畴中获得解释的潜力往往是一个理论的意义和魅力所在.

一阶语言在范畴中的解释**定义 B.2.1 (范畴中的 Σ -结构)**

固定符号表 Σ (定义 B.1.5). 设范畴 \mathcal{C} 有有限乘积. 定义 \mathcal{C} 中的一个 Σ -结构 M 为如下信息:

- 对 Σ 中的每个类型 A , 指定 \mathcal{C} 的对象 MA ;
- 对 Σ 中的每个函数符号 $f: A_1 \cdots A_n \rightarrow B$, 指定 \mathcal{C} 的态射 $Mf: MA_1 \times \cdots \times MA_n \rightarrow MB$ (特别地, $n = 0$ 时, 对每个常数符号 $f \in B$, 指定一个整体元素 $Mf: 1 \rightarrow B$);
- 对 Σ 中的每个关系符号 $R \hookrightarrow A_1 \cdots A_n$, 指定 \mathcal{C} 中的子对象 $MR \hookrightarrow MA_1 \times \cdots \times MA_n$ (特别地, $n = 0$ 时, 对每个原子命题 p , 指定一个子终对象 $Mp \hookrightarrow 1$).

范畴 \mathcal{C} 中两个 Σ -结构之间的态射 $h: M \rightarrow N$ 是一族态射 $h_A: MA \rightarrow NA$, 满足合适的交换图. 所有 Σ -结构构成一个范畴 $\Sigma\text{-Str}(\mathcal{C})$.

命题 B.2.2

设 \mathcal{C}, \mathcal{D} 是具有有限乘积的范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是保持有限乘积与单射的函子. 那么 F 诱导了函子 $\Sigma\text{-Str}(F): \Sigma\text{-Str}(\mathcal{C}) \rightarrow \Sigma\text{-Str}(\mathcal{D})$.

定义 B.2.3 (Σ -结构对项的解释)

给定范畴 \mathcal{C} 中的一个 Σ -结构 M , 我们将 Σ 上的项 (定义 B.1.11) 解释为 M 中的态射. 具体地, 设 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是一个语境 (定义 B.1.17), $x_i: A_i$, $\vec{x}.t$ 是带语境的项, $t: B$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket_M$ 是如下定义的态射 $MA_1 \times \dots \times MA_n \rightarrow MB$:

- 若 $t = x_i$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket = \pi_i$ 是第 i 分量的投影;
- 若 $t = f(t_1, \dots, t_m)$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket = Mf \circ (\llbracket \vec{x}.t_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \vec{x}.t_m \rrbracket)$.

设 \vec{x} 是适合于项 t 的语境, 那么 \vec{x} 添加一个与 t 无关的变量 y 后仍是适合于 t 的语境. 根据上述定义, 两个带语境的项 $\vec{x}.t$ 与 $(\vec{x}, y).t$ 的解释不同 (因为定义域不同), 但仅仅相差一个投影. 一般的这种现象可总结为如下命题.

命题 B.2.4 (项的代换性质)

设 $\vec{y}.t$ 是符号表 Σ 上带语境的项, 在范畴 \mathcal{C} 中可解释, 其中 $\vec{y} = (y_1, \dots, y_m), y_i: B_i, t: C$. 设 $\vec{s} = (s_1, \dots, s_m), s_i: B_i$ 是任意的项, $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) (x_i: A_i)$ 是适合于 \vec{s} 的语境. 那么, 对 \mathcal{C} 上任意 Σ -结构 M , 有如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} MA_1 \times \dots \times MA_n & \xrightarrow{(\llbracket \vec{x}.s_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \vec{x}.s_m \rrbracket)} & MB_1 \times \dots \times MB_m \\ & \searrow \llbracket \vec{x}.t[\vec{s}/\vec{y}] \rrbracket & \downarrow \llbracket \vec{y}.t \rrbracket \\ & & MC \end{array}$$

这称为项的代换性质 (substitution property).

证明. 对 t 的“复杂度”归纳, 由定义直接验证. □

例 B.2.5 (弱化)

项的代换性质 (B.2.4) 的一个常见的特例是 $\vec{s} = \vec{y} \subset \vec{x}$ 的情形. 此时 $(\llbracket \vec{x}.s_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \vec{x}.s_m \rrbracket)$ 是一个投影映射 π , 性质 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket = \llbracket \vec{y}.t \rrbracket \circ \pi$ 称为项的弱化性质 (weakening property).

下面定义公式的解释所需的几种范畴.

定义 B.2.6 (常理范畴)

若一个范畴中存在有限极限和像 (定义 1.3.18), 且拉回保持像, 则称之为常理范畴 (regular category). 由命题 1.3.20, 常理范畴中态射 $f: X \rightarrow Y$ 的拉回 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow$

$\text{Sub}(X)$ 有左伴随 \exists_f . 常理范畴之间的常理函子 (regular functor) 是指保持有限极限与像的函子. 关于常理范畴与常理逻辑的进一步介绍见 [8] 以及 [17] A1.3 节.

定义 B.2.7 (贯理范畴)

若一个常理范畴中所有对象的子对象格都存在有限并, 且拉回保持有限并, 则称之为贯理范畴 (coherent category). 贯理范畴之间的贯理函子是指保持有限并的常理函子.

定义 B.2.8 (Heyting 范畴)

若一个贯理范畴中所有态射 $f: X \rightarrow Y$ 对子对象的拉回 $f^*: \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ 有右伴随 $\forall_f: \text{Sub}(X) \rightarrow \text{Sub}(Y)$, 则称之为 Heyting 范畴. Heyting 范畴之间的函子是保持所有 \forall_f 的贯理函子.

由第一章, 意象是常理范畴, 贯理范畴, Heyting 范畴.

定义 B.2.9 (几何范畴)

若一个常理范畴中所有对象的子对象格都存在任意并, 且被拉回保持, 则称之为几何范畴 (geometric category).

由偏序集的伴随函子定理 (A.6.28), 几何范畴一定是 Heyting 范畴.

意象不一定是几何范畴, 但 Grothendieck 意象一定是几何范畴.

由定义 2.1.1, 位格等同于构成几何范畴的偏序集.

定义 B.2.10 (Σ -结构对公式的解释)

设 M 是范畴 \mathcal{C} 中的 Σ -结构. 我们归纳地将 Σ 上的一个带语境的公式 $\vec{x}.\phi$ (其中 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $x_i: A_i$) 解释为一个子对象

$$\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M \hookrightarrow MA_1 \times \dots \times MA_n.$$

- (关系) 若 $\phi(\vec{x})$ 形如 $R(t_1, \dots, t_m)$, R 为类型 $B_1 \dots B_m$ 的关系符号, t_i 为公式, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M$ 为如下拉回.

$$\begin{array}{ccc} \llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M & \longrightarrow & MR \\ \downarrow & & \downarrow \\ MA_1 \times \dots \times MA_n & \xrightarrow{(\llbracket \vec{x}.t_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \vec{x}.t_m \rrbracket)} & MB_1 \times \dots \times MB_m \end{array}$$

- (等式) 若 $\phi(\vec{x})$ 形如 $(s = t)$, s, t 为类型 B 的项, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 为两个态射 $\llbracket \vec{x}.s \rrbracket, \llbracket \vec{x}.t \rrbracket: MA_1 \times \cdots \times MA_n \rightarrow MB$ 的等化子.
- (真) 若 $\phi = \top$, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是 $MA_1 \times \cdots \times MA_n$ 作为自身的子对象.
- (且) 若 $\phi = \psi \wedge \chi$, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是子对象 $\llbracket \vec{x}.\psi \rrbracket$ 与 $\llbracket \vec{x}.\chi \rrbracket$ 的交 (拉回).
- (假) 若 $\phi = \perp$, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是 $MA_1 \times \cdots \times MA_n$ 的子对象 \perp .
- (或) 若 $\phi = \psi \vee \chi$ 且 \mathcal{C} 是贯理范畴 (定义 B.2.7), 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是子对象 $\llbracket \vec{x}.\psi \rrbracket$ 与 $\llbracket \vec{x}.\chi \rrbracket$ 的并.
- (蕴涵) 若 $\phi = (\psi \Rightarrow \chi)$, 且 \mathcal{C} 是 *Heyting* 范畴, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是 $\llbracket \vec{x}.\psi \rrbracket \Rightarrow \llbracket \vec{x}.\chi \rrbracket$.
- (存在量词) 若 $\phi = \exists y.\psi$ 且 \mathcal{C} 是常理范畴, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket = \exists_\pi(\llbracket (\vec{x}, y).\psi \rrbracket)$, 其中 π 为 $MA_1 \times \cdots \times MA_n \times MB$ 到前 n 分量的投影.
- (全称量词) 若 $\phi = \forall y.\psi$ 且 \mathcal{C} 是 *Heyting* 范畴, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket = \forall_\pi(\llbracket (\vec{x}, y).\psi \rrbracket)$, 其中 π 同上.
- (无穷析取) 若 $\phi = \bigvee_i \psi_i$ 且 \mathcal{C} 是几何范畴, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是所有 $\llbracket \vec{x}.\psi_i \rrbracket$ 的并.
- (无穷合取) 若 $\phi = \bigwedge_i \psi_i$ 且 \mathcal{C} 具有子对象的任意交, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是所有 $\llbracket \vec{x}.\psi_i \rrbracket$ 的交.

回忆几类公式的定义 (B.1.14), 我们发现在常理范畴中可以解释常理公式, 在贯理范畴中可以解释贯理公式, 在几何范畴中可以解释几何公式, 凡此种种, 不一而足. 任何逻辑公式都有适当的范畴结构可以解释之.

命题 B.2.11 (公式的代换性质)

设 $\vec{y}.\phi$ 是符号表 Σ 上带语境的公式, 在范畴 \mathcal{C} 中可解释, 其中 $\vec{y} = (y_1, \dots, y_m), y_i: B_i$. 设 $\vec{s} = (s_1, \dots, s_m), s_i: B_i$ 是任意的项, $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)(x_i: A_i)$ 是适合于 \vec{s} 的语境. 那么, 对 \mathcal{C} 上任意 Σ -结构 M , 有如下拉回.

$$\begin{array}{ccc}
 \llbracket \vec{x}.\phi[\vec{s}/\vec{y}] \rrbracket & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \llbracket \vec{y}.\phi \rrbracket \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 MA_1 \times \cdots \times MA_n & \xrightarrow{(\llbracket \vec{x}.s_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \vec{x}.s_m \rrbracket)} & MB_1 \times \cdots \times MB_m
 \end{array}$$

证明. 对 ϕ 的“复杂度”归纳, 由定义直接验证. □

一阶理论在范畴中的模型

定义 B.2.12 (Σ -结构对相继式的满足)

设 M 是范畴 \mathcal{C} 上的 Σ -结构, $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$ 是一个相继式. 称 M 满足 $\phi \vdash_{\vec{x}} \psi$ (记作 $M \models (\phi \vdash_{\vec{x}} \psi)$) 是指 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket_M \leq \llbracket \vec{x}.\psi \rrbracket_M$.

定义 B.2.13 (一阶理论在范畴中的模型)

设 \mathbb{T} 是符号表 Σ 上的一阶理论, M 是范畴 \mathcal{C} 上的 Σ -结构, 且 \mathbb{T} 的公理在 \mathcal{C} 中可解释. 若 M 满足 \mathbb{T} 的所有公理 (定义 B.2.12), 则称 M 为 \mathbb{T} 在 \mathcal{C} 中的一个模型 (model). 记 \mathbb{T} 的模型在 $\Sigma\text{-Str}(\mathcal{C})$ 中构成的满子范畴为 $\mathbb{T}\text{-Mod}(\mathcal{C})$.

一阶逻辑的推理系统可以证明关于其模型的命题, 这个性质称为一阶逻辑的可靠性 (soundness).

命题 B.2.14 (可靠性)

设 \mathbb{T} 为符号表 Σ 上的 Horn (常理, 贯理, 几何, ...) 理论, M 为 \mathbb{T} 在合适的范畴 \mathcal{C} 中的模型, 则对任何 \mathbb{T} -可证 (定义 B.1.26) 的相继式 σ , 都有 $M \models \sigma$.

证明. 我们只需对定义 B.1.23 的每种规则 $\frac{\Gamma}{\sigma}$ 验证若 $M \models \Gamma$, 则 $M \models \sigma$. 这基本上是平凡的. 例如, 存在量词规则的可靠性正是由于存在量词的解释是拉回的左伴随 (定义 B.2.10). 又如, 分配公理的可靠性是由于相应的范畴中子对象的运算 $A \wedge -$ 保持二元并. \square

注 B.2.15

反之, 只要找到一个模型 M 不满足 σ , 就说明 σ 在理论 \mathbb{T} 中不可证.

提纲

提纲 (sketch) 是 Ehresmann 1966 年左右 (即 Lawvere 的博士论文 [21] 之后不久) 提出的另一种定义 “理论” 的方法.

定义 B.2.16 (提纲)

定义提纲 \mathcal{S} 为三元组 (\mathcal{T}, L, C) , 其中 \mathcal{T} 为范畴, L, C 分别为 \mathcal{T} 中若干个锥和余锥的集合. 提纲 $\mathcal{S} = (\mathcal{T}, L, C)$ 在范畴 \mathcal{C} 中的模型为函子 $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$, 满足 L 中的锥被对应到 \mathcal{C} 中的极限锥, C 中的锥被对应到 \mathcal{C} 中的余极限余锥. 模型之间的态射即自然变换. 记 \mathcal{S} 在 \mathcal{C} 中的模型的范畴为 $\mathcal{S}\text{Mod}$. 若 L, C 的元素本身为 \mathcal{T} 中的极限锥,

余极限余锥, 则称 \mathcal{S} 为正规提纲 (normal sketch).

另一种等价的定义是, 一个提纲为四元组 (G, D, L, C) , 其中 G 为有向图, D 为 G 中的若干图表的集合 (G 中的图表是指有向图的态射 $G' \rightarrow G$), L, C 分别为 G 中若干个锥和余锥的集合. 提纲 (G, D, L, C) 在范畴 \mathcal{C} 中的模型为有向图态射 $G \rightarrow \mathcal{C}$ (范畴可视为有向图), 使得 D 中的图表被对应到 \mathcal{C} 中的交换图, L 中的锥被对应到 \mathcal{C} 中的极限锥, C 中的锥被对应到 \mathcal{C} 中的余极限余锥. 因为 G, D 生成一个自由范畴 \mathcal{T} , 使得将 D 的元素变为交换图的有向图态射 $G \rightarrow \mathcal{C}$ 一一对应于函子 $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$, 故该定义与前面三元组的定义等价. 该定义的优势在于可以用较小的图表表现一个理论.

定义 B.2.17 (有限乘积提纲, 有限极限提纲)

对于提纲 $\mathcal{S} = (\mathcal{T}, L, C)$, 若 L 中元素均为有限的离散锥 (即仅有顶点出发的态射的锥), 而 C 为空, 则称 \mathcal{S} 为有限乘积提纲 (finite product sketch, FP sketch); 若 L 中元素均为有限锥, 而 C 为空, 则称 \mathcal{S} 为有限极限提纲 (finite limit sketch, FL sketch). Lawvere 理论可视为特殊的有限乘积提纲.

对于有限乘积提纲 \mathcal{S} , $\mathcal{S}\text{Mod}$ 等价于一个代数理论的模型的范畴.

定义 B.2.18 (常理提纲)

对于提纲 $\mathcal{S} = (\mathcal{T}, L, C)$, 若 L 中元素均为有限锥, 而 C 中的余锥均形如

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g & \downarrow \ell \\ & & Z \end{array} \quad (Z \text{ 为顶点}) \quad \text{且} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & \searrow k & \downarrow \ell \\ Y & \xrightarrow{\ell} & Z \end{array} \in L, \text{ 则称 } \mathcal{S} \text{ 为常理提纲 (regular sketch).}$$

定义 B.2.19 (贯理提纲)

对于提纲 $\mathcal{S} = (\mathcal{T}, L, C)$, 若 L 中元素均为有限锥, 而 C 中的余锥均为定义 B.2.18 中的余锥或为有限离散余锥, 则称 \mathcal{S} 为贯理提纲 (coherent sketch).

教条

一种理论 (如前面提到的常理, 贯理, 几何理论) 与一种有特定结构的范畴相对应; 这些范畴, 其间保持特定结构的函子, 以及这些函子之间的自然变换构成一个 2-范畴. 那么这个 2-范畴包含了这一种理论的全部信息. 于是我们抽象出下面的概念.

定义 B.2.20 (教条)

定义一个教条⁷ (doctrine) 为一个 2-范畴. 称该 2-范畴的对象为理论, 称两个理论 C_1, C_2 之间的态射 $C_1 \rightarrow C_2$ 为理论 C_1 在 C_2 中的模型. 理论 C_1 在 C_2 中的模型的范畴即为范畴 $\text{Hom}(C_1, C_2)$.

这个定义在数学上没有什么内容, 它只是反映出我们的一种观点.

注 B.2.21 (生成元-关系与无坐标表示)

以 2-范畴表示教条实际上是一种“无坐标”式的定义, 而形如 B.2.7 的定义则是“生成元-关系”式的定义. 二者的关系正是 Lawvere 理论 (A.9.1) 及其表现 (定义 A.9.3) 的关系, 只是在范畴层级上更上了一级.

例 B.2.22 (有限乘积范畴的教条)

具有有限乘积的范畴构成一个教条, 其中态射为保持有限乘积的函子. 群的理论 \mathbb{T}_{Grp} , 以及任何一个 Lawvere 理论 (作为语法范畴), 都是这个教条的对象. 群的理论在另一具有有限乘积的范畴 \mathcal{C} 中的一个模型 (也即 \mathcal{C} 中的一个群) 正是一个态射 $\mathbb{T}_{\text{Grp}} \rightarrow \mathcal{C}$.

例 B.2.23 (有限极限范畴的教条)

具有有限极限的范畴构成一个教条, 其中态射为保持有限极限的函子. 本质代数理论 (定义 B.1.21) 的语法范畴 (定义 5.1.1) 是这个教条的对象.

类似地, 常理范畴, 几何范畴等等与几种逻辑相关的几种范畴都构成教条.

下面是一个在前述框架之外的例子.

例 B.2.24 (么半范畴的教条)

么半范畴 (例 A.1.6) 构成一个教条, 其中态射为保持“ \otimes ”的函子. 该教条中的一个重要的理论是么半范畴中的么半群的理论. 定义么半范畴 \mathcal{M} 中的么半群为 \mathcal{M} 的对象 M 配备“乘法” $\mu: M \otimes M \rightarrow M$ 与“单位” $\eta: 1 \rightarrow M$, 满足么半群对应的交换图

⁷“教条”可能不是最好的翻译, 但由于本书其它地方不会使用这一概念, 此处姑且用之.

(但范畴论乘积改为 \otimes):

$$\begin{array}{ccc}
 & M \otimes (M \otimes M) & \xrightarrow{\mu} M \otimes M \\
 \nearrow \alpha & & \downarrow \mu \\
 (M \otimes M) \otimes M & & \\
 \downarrow \mu & & \\
 M \otimes M & \xrightarrow{\mu} & M
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 1 \otimes M & \xrightarrow{\eta} & M \otimes M & \xleftarrow{\eta} & M \otimes 1 \\
 & \searrow \lambda & \downarrow \mu & \swarrow \rho & \\
 & & M & &
 \end{array}$$

(α, λ, ρ 的含义见例 A.1.6.) 么半范畴中的么半群的理论是么半范畴 Δ_+ , 即有限全序集 $[-1], [0], [1], [2], \dots$ 与保序映射构成的范畴

$$\dots \quad [2] \begin{array}{c} \longleftarrow \\ \longleftrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} [1] \begin{array}{c} \longleftarrow \\ \longleftrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} [0] \longleftarrow [-1],$$

(注意 $[-1] = \emptyset, [n] = \{0 \leq 1 \leq \dots \leq n\}$) 其么半范畴结构满足 $[m] \otimes [n] = [m+n+1]$, 单位为 $[0]$. 么半范畴 Δ_+ 中的 $[0]$ 是游走的么半群 (walking monoid), 也即任何么半范畴 \mathcal{M} 中的么半群 M 等同于保持 \otimes 的函子 $\Delta_+ \rightarrow \mathcal{M}$, 且该函子将 $[0]$ 映射到 M .

B.3 高阶逻辑

高阶逻辑相比一阶逻辑拥有表达能力更强的语义, 如允许将存在量词和全称量词用于函数与子集. 相应地, 其范畴语义需要范畴上更多的结构.

高阶语言的基本要件

定义 B.3.1 (符号表)

高阶逻辑的一个符号表 Σ 由如下内容构成:

- 一族基本类型 (basic types);
- 一些函数符号 (function symbols);
- 一些关系符号 (relation symbols);

并且我们归纳地定义 Σ 上的类型:

- 每个基本类型都是一个类型;
- (零元积) 1 是一个类型;
- (二元积) 对任意两个类型 A, B , 有一个类型 $A \times B$;

- (函数类型) 对任意两个类型 A, B , 有一个类型 $[A \rightarrow B]$;
- (幂) 对任意类型 A , 有一个类型 PA ; 记 $\Omega = P1$;
- (列表) 对任意类型 A , 有一个类型 LA .

对每个函数符号 f 指定两个类型 A, B , 记 $f: A \rightarrow B$; 对每个关系符号 R 指定一个类型 A , 记 $R \hookrightarrow A$. 这里的 A, B 可以是基本类型, 也可以是由上述归纳规则定义的类型. 例如 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 时, $f: A \rightarrow B$ 是 n 元函数.

高阶逻辑比一阶逻辑多了函数类型, 幂以及列表的操作, 使得可以谈论“对任意子集 $A \subset X$ ”“对任意函数 $f: X \rightarrow Y$ ”之类.

定义 B.3.2 (项)

设 Σ 为高阶逻辑的符号表, 归纳定义 Σ 上的项.

- 一个类型 A 的单独一个变量 x 是一项;
- 对于函数符号 $f: A \rightarrow B$, 若有一项 $x: A$, 则有 $f(x): B$.
- (1, 引入法则) 类型 1 有一个项 \star ;
- (二元对, 引入法则) 对于 $s: A, t: B$, 有 $(s, t): A \times B$;
- (二元对, 消去法则) 对于 $t: A \times B$, 有 $\text{fst}(t): A, \text{snd}(t): B$, 分别代表取二元对的第一项和第二项;
- (函数, 引入法则) 对于类型 A 的变量 x 与 $t: B$ (其中 t 的自由变量可包含 x , 也可不包含 x), 有 $(\lambda x.t): [A \rightarrow B]$, 其自由变量为 t 的自由变量去掉 x ;
- (函数, 消去法则) 对于 $f: [A \rightarrow B]$ 以及 $t: A$, 有 $\text{app}(f, t): B$, 其自由变量为 f 与 t 的自由变量之并;
- (子集, 引入法则) 对公式 ϕ 以及 $x: A$, 有 $\{x \in A \mid \phi\}: PA$, 其自由变量为 ϕ 的自由变量去掉 x ;
- (列表, 引入法则) 对于类型 A , 有“空列表” $[: LA$; 对于 $s, t: LA$ 有“列表的拼接” $\text{cons}(s, t): LA$; 此外, 列表还有一个引入法则“迭代器” (iterator), 即递归构造列表的法则, 这里略去 (见 [17] D4.1.2).

其中没有提到子集的消去法则, 是因为子集的消去法则给出的是一个原子公式 (下面的定义 B.3.3), 而非一个项.

对于 Σ 中的函数符号 $f: A \rightarrow B$, 取类型 A 的变量 x , 由函数的引入法则 $\lambda x.f(x): [A \rightarrow B]$ 是类型 $[A \rightarrow B]$ 的一个常量 (因为按定义其自由变量是 $f(x)$ 的自由变量去掉 x , 也即没有自由变量).

定义 B.3.3 (原子公式)

设 Σ 为高阶逻辑的符号表, 定义下列公式为 Σ 上的原子公式.

- (关系) 对关系符号 $R \hookrightarrow A$ 与 $t: A$, 关系 $R(t)$ 为原子公式, 其中的自由变量为 t 的自由变量;
- (等式) 对 $s, t: A$, 等式 $s = t$ 为原子公式, 其中的自由变量为 s, t 的自由变量之并;
- (成员关系, 即“子集的消去法则”) 对 $t: A$ 与 $S: PA$, 成员关系 $t \in S$ 为原子公式, 其中的自由变量为 S, t 的自由变量之并.

相比一阶逻辑中的原子公式 (定义 B.1.14), 高阶逻辑多了成员关系.

定义 B.3.4 (公式)

高阶逻辑中的公式由原子公式以及定义 B.1.12 中的法则归纳定义.

定义 B.3.5 (Σ -结构)

设 Σ 为高阶逻辑的一个符号表, \mathcal{C} 为合适的范畴. 定义 \mathcal{C} 上的 Σ -结构 M 为如下资料:

- 对 Σ 中每个基本类型 A 指定 \mathcal{C} 的一个对象 MA (由此可归纳地对每个类型也指定一个对象, 如 1 对应终对象, $A \times B$ 对应 $MA \times MB$, $[A \rightarrow B]$ 对应指数对象 MB^{MA} , PA 对应幂对象 $P(MA)$);
- 对 Σ 中每个函数符号 $f: A \rightarrow B$ 指定一个态射 $Mf: MA \rightarrow MB$.
- 对 Σ 中每个关系符号 $R \hookrightarrow A$ 指定一个子对象 $MR \hookrightarrow MA$.

定义 B.3.6 (项的解释)

设 $\vec{x}.t$ 是带语境的项, 其中 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n), x_i: A_i$. 记 $A = A_1 \times \dots \times A_n$.

- (1, 引入法则) 若 $t = \star: 1$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket$ 是唯一的映射 $MA \rightarrow 1$.
- (二元对, 引入法则) 若 $t = (r, s): B_1 \times B_2$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket = (\llbracket \vec{x}.r \rrbracket, \llbracket \vec{x}.s \rrbracket): MA \rightarrow B_1 \times B_2$.

$MB_1 \times MB_2$.

- (二元对, 消去法则) 若 $t = \text{fst}(s)$, $s: B \times C$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket = \pi_1 \circ \llbracket \vec{x}.s \rrbracket: MA \rightarrow MB$, 对 snd 类似定义;
- (函数, 引入法则) 若 $t = (\lambda z.s): [B \rightarrow C]$, 变量 z 不出现在语境 \vec{x} 中, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket$ 是 $\llbracket (\vec{x}, z).s \rrbracket: MA \times MB \rightarrow MC$ 对应的态射 $MA \rightarrow MC^{MB}$.
- (函数, 消去法则) 若 $t = \text{app}(r, s)$, $r: [B \rightarrow C]$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket$ 是复合

$$MA \xrightarrow{(\llbracket \vec{x}.r \rrbracket, \llbracket \vec{x}.s \rrbracket)} MC^{MB} \times MB \xrightarrow{\text{ev}} MC.$$

- (子集, 引入法则) 若 $t = \{z \in B \mid \phi\}$, 则 $\llbracket \vec{x}.t \rrbracket$ 是 $\llbracket (\vec{x}, z), \phi \rrbracket \hookrightarrow MA \times MB$ 对应的态射 $MA \rightarrow P(MB)$.
- (列表, 引入法则) 略 (见 [17] D4.1.5).

定义 B.3.7 (公式的解释)

原子公式以及一般的公式的解释沿用定义 B.2.10, 只是添加如下对成员关系的解释:

- 若 $\phi = (t \in S)$, $t: B$, 则 $\llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket$ 是如下拉回,

$$\begin{array}{ccc} \llbracket \vec{x}.\phi \rrbracket & \longrightarrow & \in \\ \downarrow & & \downarrow \\ MA & \xrightarrow{(\llbracket \vec{x}.t \rrbracket, \llbracket \vec{x}.S \rrbracket)} & MB \times P(MB). \end{array}$$

B.4 类型论

A logic is always a logic over a type theory.

Bart Jacobs, *Categorical Logic and Type Theory*

Type theory can be used, like ZFC, for the formal encoding of all ordinary mathematics. Some things are more convenient in ZFC, others are more convenient in type theory.

Mike Shulman, *Avoiding large cardinals in category theory*

类型论是一种做数学的视角; 不同于一阶逻辑中的“类型”, 类型论中的一切对象, 包括函数, 命题, 甚至证明, 都有一个确定的类型. 仅仅通过检查一个对象的类型, 就能验证推理的正确性. 关于类型论的更详细介绍见 [14]. 本节的目的是介绍类型论与范畴论的联系. 由于“类型论”有许多变种和风味, 很难给它下一个精确而完整的定义. 我们从例子开始.

例 B.4.1 (简单类型论)

在简单类型论 (simple type theory, STT, 又称 *Church* 类型论, 简单类型 λ 演算, simply typed λ calculus, STLC⁸) 中, 可以见到如下的陈述:

- $n : \mathbb{N}$ (“ n 是类型 \mathbb{N} 的项”);
- $\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (“后继 succ 是函数类型 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 的项”);
- $n : \mathbb{N}, m : \mathbb{N} \vdash (n + m) : \mathbb{N}$ (“设有类型 \mathbb{N} 的项 n, m , 则可以构造类型 \mathbb{N} 的项 $n + m$ ”), 这里的符号 \vdash 与一阶逻辑中的符号 \vdash 含义不同, 它的左边 $n : \mathbb{N}, m : \mathbb{N}$ 是一列变量的声明, 称为语境;

简单类型论中没有类型依赖于某个变量, 而这是依值类型论的特点.

例 B.4.2 (依值类型论)

有些类型论包含如下的陈述.

- $n : \mathbb{N} \vdash n\text{Vect} : \text{Type}$ (“ n 维向量空间”是依赖于 $n : \mathbb{N}$ 的一族类型).
- $x : A \vdash b(x) : B(x)$ (“ $b(x) : B(x)$ 是依赖于 $x : A$ 的一个项”).

这种风味的类型论叫依值类型论 (dependent type theory, DTT). 它的核心思想是“类型是值”, 也即有一个类型的类型 Type , 而依值类型不过是一个类型到 Type 的函数.

⁸“简单类型论”在不同文献中有不同的含义, 并且现在的含义比 Church 1940 年提出它时稍有推广.

定义 B.4.3 (类型论, 粗略定义)

一般地, 一种类型论由如下要件组成:

- 类型的形成法则 (formulation rules), 即 (从已有类型) 构造新类型的方法;
- 项的引入法则 (introduction rules), 即构造一个类型的项的方法;
- 项的消去法则 (elimination rules), 即使用一个类型的项的方法;
- 计算法则 (computation rules), 以等式表示将消去法则作用于引入法则上的结果.

例 B.4.4 (Martin-Löf 类型论)

Martin-Löf 于 1972 年引入了一种构造主义的类型论. 其类型的形成法则有:

- (1 类型) 1 为类型;
- (等号类型) 对于类型 A 的项 a, b , 有 $I(a, b)$ 为类型 (这个类型也记作 $a =_A b$, 想象其中的项为 a, b 相等的证据);
- 对于类型值函数符号 F 以及合适类型的项 a_1, \dots, a_n , 有 $F(a_1, \dots, a_n)$ 为类型;
- (积类型, 和类型) 对于类型 A 的变量 x 以及依赖于 x 的类型 $B(x)$, 有 $\prod_{x:A} B(x)$ 以及 $\sum_{x:A} B(x)$ 为类型.

项的引入法则和消去法则:

- 对每个类型 A , 有类型 A 的变量 x ;
- 对于项值函数符号 f 以及合适类型的项 a_1, \dots, a_n , 有合适类型的项 $f(a_1, \dots, a_n)$;
- (1 类型引入) $*$ 是类型 1 的项;
- (积类型引入) 对于类型 A 的变量 x 以及依赖于 x 的项 $t(x) : B(x)$, 有 $\lambda x.t(x)$ 是类型 $\prod_{x:A} B(x)$ 的项.
- (积类型消去) 若 f 是类型 $\prod_{x:A} B(x)$ 的项, a 是类型 A 的项, 则 $f(a)$ 是类型 $B(a)$ 的项;
- (和类型引入) 对于类型 A 的项 a 以及类型 $B(a)$ 的项 b , 有 (a, b) 是类型 $\sum_{x:A} B(x)$ 的项;

- (和类型消去) 若 c 是类型 $\sum_{x:A} B(x)$ 的项, 则 $\pi_1(c)$ 是类型 A 的项, $\pi_2(c)$ 是类型 $B(\pi_1(c))$ 的项;
- (等号类型引入) 对于类型 A 的项 a , 有 $r(a)$ 是类型 $I(a, a)$ 的项, 称之为自反性 (reflexivity);
- (等号类型消去, 又叫 J -法则, 路径归纳) 若 a, b 是类型 A 的类型, c 是类型 $I(a, b)$ 的项, $C(x, y, z)$ 是依赖于 $x, y : A$ 以及 $z : I(x, y)$ 的项, d 是类型 $C(a, a, r(a))$ 的项, 则有 $J(a, b, c)$ 是 $C(a, b, c)$ 的项.

命题是类型: Curry–Howard 同构

类型论最重要的观点之一是命题是一种类型. 它导致了 Curry–Howard 同构, 建立了逻辑与计算之间的联系. 将命题 A 视为类型, 其元素是 A 成立的证据; 由此不难理解如下的对应. 例如, “ A 且 B ”成立的一个证据即是 A 成立的一个证据加上 B 成立的一个证据.

类型	命题
0 (空类型)	假
1	真
$A \times B$	A 且 B
$A + B$	A 或 B
B^A (又记为 $A \rightarrow B$)	A 蕴涵 B
$\prod_{x:A} P(x)$	$\forall x : A P(x)$
$\sum_{x:A} P(x)$	$\exists x : A P(x)$

进一步, 证明是一种计算, 证明一个命题即是构造对应类型的一个项. 例如证明 $A \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$ 对应于取值映射 $\text{ev} : A \times B^A \rightarrow B$. 更复杂的证明对应更复杂的计算. 要检查证明的正确性, 只需检查每一步得到的对象有正确的类型.

类型论的范畴语义

类型论的陈述可以解读为特定范畴中的图表. 我们以 $\llbracket - \rrbracket$ 表示类型论陈述的解读.

例 B.4.5 (依值类型论的范畴语义)

- (语境) 语境 Γ 解读为范畴 \mathcal{C} 中的对象 $\llbracket \Gamma \rrbracket$.
- 空语境解读为终对象.

- (语境上的类型) $\Gamma \vdash A : \mathbf{Type}$ 解读为俯范畴 $\mathcal{C}/\llbracket \Gamma \rrbracket$ 的对象

$$\begin{array}{c} \llbracket \Gamma, x : A \rrbracket \\ \downarrow \llbracket \Gamma \vdash A : \mathbf{Type} \rrbracket, \\ \llbracket \Gamma \rrbracket \end{array}$$

其中 Γ 的语境扩张 $\Gamma, x : A$ 解读为这个态射的定义域.

- (语境上的项) $\Gamma \vdash a : A$ 解读为 $\llbracket \Gamma \vdash A : \mathbf{Type} \rrbracket$ 的截面

$$\begin{array}{ccc} \llbracket \Gamma \rrbracket & \xrightarrow{\llbracket \Gamma \vdash a : A \rrbracket} & \llbracket \Gamma, x : A \rrbracket \\ & \searrow \text{id} & \swarrow \llbracket \Gamma \vdash A : \mathbf{Type} \rrbracket \\ & \llbracket \Gamma \rrbracket & \end{array} ;$$

特别地, 当 Γ 为空语境时, 项 $a : A$ 解读为 $\llbracket A \rrbracket$ 的整体元素 (定义 1.1.19).

- (变量代换) 设 $\Gamma, x : A \vdash B(x) : \mathbf{Type}$ (“ $B(x)$ 是依赖于 $x : A$ 的类型”), 且有 $\Gamma \vdash a : A$; 将变量 x 代换为项 $a : A$, 得到 $\Gamma \vdash B[a/x] : \mathbf{Type}$, 其解读为拉回

$$\begin{array}{ccc} \llbracket \Gamma, y : B[a/x] \rrbracket & \longrightarrow & \llbracket \Gamma, x : A, y : B(x) \rrbracket \\ \llbracket \Gamma \vdash B[a/x] : \mathbf{Type} \rrbracket \downarrow & & \downarrow \llbracket \Gamma, x : A \vdash B(x) : \mathbf{Type} \rrbracket \\ \llbracket \Gamma \rrbracket & \xrightarrow{\llbracket \Gamma \vdash a : A \rrbracket} & \llbracket \Gamma, x : A \rrbracket. \end{array}$$

B.5 模态逻辑

在形式逻辑中, 模态 (modality) 或模态算子 (modal operator) 是一种将命题变为命题的算子, 通常用 \Box , \Diamond , \bigcirc 等符号表示. 直觉上, 一个模态算子 \Box 的含义是

$$\Box p = “p \text{ 以某种方式成立}”.$$

模态的作用正如自然语言中的情态动词 (modal verb), 如 “可能” (can), “必须” (must), “将要” (would).

例 B.5.1 (可能性与必然性)

设 \Box 表示 “必然性”, \Diamond 表示 “可能性”. 如下是两者的一些性质:

- $\Box p \Rightarrow p$ (必然成立蕴涵实际上成立), $p \Rightarrow \Diamond p$ (实际上成立蕴涵可能成立);
- $\Box(p \wedge q) = \Box p \wedge \Box q$, $\Diamond(p \vee q) = \Diamond p \vee \Diamond q$;

- $\Box\Box p = \Box p, \Diamond\Diamond p = \Diamond p;$
- ...

可能性与必然性模态的一种实现方式是考虑“所有可能世界的集合”，或“所有可能观测结果的集合”。一个命题可能成立就是说存在一个可能世界使得该命题成立；一个命题必然成立就是说在任意可能世界中该命题都成立。考虑一个意象 \mathcal{C} 中对象 X 产生的三元伴随 (命题 1.1.41, 注 1.3.22)

$$\begin{array}{ccc} & -\Sigma_X & \longrightarrow \\ \mathcal{C}/X & \xleftarrow[\perp]{} & X^* - \mathcal{C}, \\ & -\Pi_X & \longrightarrow \end{array}$$

想象 X 为“所有可能世界的集合”，而 \mathcal{C}/X 的对象是在不同可能世界中变化的集合。令

$$\Diamond = X^*\Sigma_X, \quad \Box = X^*\Pi_X.$$

对于 $(f: Y \rightarrow X) \in \mathcal{C}/X$, $\Diamond Y$ 有元素当且仅当存在 $x \in X$ 使得 $f^{-1}(x)$ 有元素, 即 Y “可能”有元素; $\Box Y$ 有元素当且仅当对任意 $x \in X$, $f^{-1}(x)$ 都有元素, 即 Y “必然”有元素. 由命题 A.2.14, 可能性 \Diamond 是必然性 \Box 的左伴随.

术语和符号表

术语的翻译

如下是一些尚未广为流传的中文术语 (其中一部分是本人的翻译) 与外文的对应.

中文	外文	定义
贯理逻辑	coherent logic	B.1.21, B.1.25
语境	context	
教条	doctrine	B.2.20
位格	frame	2.1.1
联合满射族	jointly epimorphic/surjective family	3.4.30
位象	locale	2.1.3
内核	nucleus	2.2.12
常理逻辑	regular logic	B.1.21, B.1.25
景	site	3.4.16
提纲	sketch	B.2.16
清晰空间	sober space	2.1.15
语法范畴	syntactic category	
意象	topos	1.2.1
旋子	torsor	5.2.24

符号

如下是一些可能不通用, 或不广为人知的数学符号.

符号	含义
$\lceil - \rceil$	借用自然语言表达的内语言中的命题
$\llbracket - \rrbracket$	逻辑公式或类型论陈述在范畴语义中的解释
\square	Lawvere–Tierney 拓扑 (定义 4.3.6)
\hookrightarrow	米田嵌入 (定义 A.4.1)
$\hookrightarrow_{(\mathcal{C}, J)}$	景到层范畴的米田嵌入 (定义 3.5.6)

参考文献

- [1] Jiří Adámek and Jiří Rosický. *Locally Presentable and Accessible Categories*. Cambridge University Press, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09780511600579>.
- [2] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier. *Theorie de Topos et Cohomologie Etale des Schemas I, II, III*. Vol. 269, 270, 305. Lecture Notes in Mathematics. Springer, 1971.
- [3] Andrej Bauer. “Five stages of accepting constructive mathematics”. In: *Bull. Amer. Math. Soc.* (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.1090/bull/1556>. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=21qP0Reu4FI>.
- [4] Ingo Blechschmidt. *Using the internal language of toposes in algebraic geometry*. 2021. arXiv: 2111.03685 [math.AG].
- [5] Francis Borceux. *Handbook of Categorical Algebra 1*. Cambridge Univrsity Press, 1994.
- [6] Francis Borceux. *Handbook of Categorical Algebra 2*. Cambridge Univrsity Press, 1994.
- [7] Francis Borceux. *Handbook of Categorical Algebra 3*. Cambridge Univrsity Press, 1994.
- [8] Carsten Butz. “Regular Categories and Regular Logic”. In: 1998. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:115242756>.
- [9] Carsten Butz and Ieke Moerdijk. “Representing topoi by topological groupoids”. In: *Journal of Pure and Applied Algebra* 130.3 (1998), pp. 223–235. ISSN: 0022-4049. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-4049\(97\)00107-2](https://doi.org/10.1016/S0022-4049(97)00107-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022404997001072>.
- [10] Olivia Caramello. *Theories, Sites, Toposes*. Oxford University Press, 2018.
- [11] Felix Cherubini, Thierry Coquand, and Matthias Hutzler. *A Foundation for Synthetic Algebraic Geometry*. 2023. arXiv: 2307.00073 [math.AG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2307.00073>.
- [12] Thierry Coquand and Bas Spitters. “Constructive Gelfand duality for C*-algebras”. In: (2008). URL: <https://arxiv.org/abs/0808.1518>.

- [13] Pierre Deligne et al., eds. *Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians*. American Mathematical Society, 1999. URL: <http://www.math.ias.edu/qft>.
- [14] Trebor Huang. 类型论简史. <https://github.com/Trebor-Huang/history>. 2023.
- [15] Bart Jacobs. *Categorical Logic and Type Theory*. Elsevier, 1999.
- [16] Peter T. Johnstone. “On a Topological Topos”. In: *Proc. London Math. Soc.* (1979). DOI: <https://doi.org/10.1112/plms/s3-38.2.237>.
- [17] Peter T. Johnstone. *Sketches of an Elephant*. Oxford University Press, 2002.
- [18] André Joyal. *A crash course in topos theory : the big picture*. IHES. 2015. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ro8KoFFdtS4>.
- [19] André Joyal and Myles Tierney. “An extension of the Galois theory of Grothendieck”. In: *Mem. Amer. Math. Soc.* 51.309 (1984).
- [20] Saunders Mac Lane and Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic*. Springer New York, 1994.
- [21] William Lawvere. “Functorial Semantics of Algebraic Theories”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (1963).
- [22] Zhen Lin. *What is a Lawvere–Tierney topology?* Mathematics Stack Exchange. URL: <https://math.stackexchange.com/q/177894>.
- [23] Jacob Lurie. *Categorical Logic (278x)*. 2018. URL: <https://www.math.ias.edu/~lurie/278x.html>.
- [24] Jacob Lurie. *Higher Topos Theory*. Princeton University Press, 2009.
- [25] Ieke Moerdijk and Gonzalo E. Reyes. *Models for Smooth Infinitesimal Analysis*. Springer New York, NY, 1990.
- [26] nLab authors. *sheafification*. <https://ncatlab.org/nlab/show/sheafification>. Revision 35. Feb. 2024.
- [27] Frédéric Paugam. *Towards the Mathematics of Quantum Field Theory*. Springer Cham, 2014.
- [28] Urs Schreiber. *Higher Topos Theory in Physics*. 2023. URL: <https://ncatlab.org/schreiber/show/Higher+Topos+Theory+in+Physics>.
- [29] Alex Simpson. “Measure, randomness and sublocales”. In: *Annals of Pure and Applied Logic* 163.11 (2012). Kurt Goedel Research Prize Fellowships 2010, pp. 1642–1659. ISSN: 0168-0072. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apal.2011.12.014>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168007211001874>.

- [30] 李文威. 代数学方法: 卷二. 高等教育出版社 (尚未出版), 2023. URL: <https://www.wwli.asia/downloads/books/A1-jabr-2.pdf>.