



درد قفسه سینه به شکل‌های مختلفی، از یک درد شدید و تیز تا یک درد مبهم، حس می‌شود. گاهی درد قفسه سینه به شکل سوزش احساس می‌شود. در مواردی، درد از گردن به سمت فک و سپس به پشت یا پایین یک یا هر دو بازو گسترش می‌یابد.

هرچند که درد قفسه سینه همیشه نشانه‌ی حمله قلبی نیست، اما در اورژانس، معمولاً ابتدا حمله قلبی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا فوری‌ترین تهدید برای زندگی است. پزشک ممکن است علل ریوی تهدیدکننده حیات، مانند آمبولی ریه را نیز بررسی کند.

درد سینه (غالباً همراه با کمر درد خفیف) در ۱ تا ۴٪ موارد درمان‌های دیالیز اتفاق می‌افتد. «علت آن در اکثر موارد ناشناخته است. البته از علل آن می‌تواند کاهش فشار خون نیز باشد.

گاه‌ها آمبولی ریه دستکاری‌های ترومبوز و انسداد فستیول شریانی وریدی و گرافت ایجاد می‌شود. در این حالت خیلی سریع باید دیالیز را قطع نمود و اقداماتی جهت ثابت نگه‌داشتن وضعیت همودینامیک انجام داد. تدبیر درمانی کافی یا استراتژی پیشگیری کننده غیر از تعویض غشای صافی وجود ندارد.