

Cvičenia

Cvičenie 6.1. Pre každý uvedený prípad, rozhodnite, či symbol $x * y$ špecifikuje binárnu operáciu na množine A . Ak nie, tak vysvetlite prečo.

Binárna operácia „súčin“ je definovaná podmienkou

$$\forall (x \in A) \forall (y \in A) \exists! (z \in A) (z = x * y)$$

(a) $x * y = x - y$, $A = \mathbb{R}_+ = (0, \infty)$. Nie je binárna operácia, pretože pre $x, y \in A$ výsledok binárnej operácie $x * y \notin A$ (napr. pre $x < y$ dostaneme záporné $z = x - y$), čo je v protiklade s definíciou binárnej operácie, ktorá požaduje, aby aj jej výsledok patril do A .

(b) $x * y = x + y$, pre $A = \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Je binárna operácia. Takto definovaná binárna operácia vyhovuje podmienke, že výsledok musí patriť do A .

(c) $x * y = x^y$, $A = \mathbb{R}_+ = (0, \infty)$. Je binárna operácia, $x * y = x^y \in A$

(d) $x * y = \text{maximálny spoločný deliteľ } x \text{ a } y$, $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 24\}$. Je binárna operácia, jej výsledok vždy patrí do A .

(e) $x * y = x + y$, $A = \{\text{matice rovnakého typu}\}$. Je binárna operácia, pre každé dve matice $x, y \in A$ je splnená podmienka, aby ich súčet $(x + y) \in A$.

Cvičenie 6.2. Nech binárna operácia na množine \mathbb{R} obsahujúcej reálne čísla, je definovaná ako rozdiel, $x * y = x - y$. Rozhodnite, či táto operácia je

(a) asociatívna, nie je asociatívna, $x - (y - z) \neq (x - y) - z$.

(a) komutatívna, nie komutatívna, $(x - y) \neq (y - x)$.

(b) existuje jednotkový element, neexistuje jednotkový element 1, pre ktorý by platilo $1 * x = x * 1 = x$, potom by v tomto konkrétnom prípade muselo platiť $1 - x = x - 1 = x$, čo nemôže byť splnené.

Cvičenie 6.3. Nech A je konečná množina a nech pre túto množinu A je binárna operácia definovaná pomocou multiplikačnej tabuľky. Na základe čoho je možné rozhodnúť pomocou tejto tabuľky, či

(a) binárna operácia je komutatívna, potom multiplikačná tabuľka musí byť symetrická vzhľadom k diagonále tabuľky.

(b) existuje jednotkový element, potom existuje taký riadok a aj stĺpec s rovnakým indexom, že poradie ich elementov je totožné s indexovaním riadkov a stĺpcov.

				a		
				b		
				c		
a	b	c				

symetrická matica

↓

	a	b	c	d	e	f
a				a		
b				b		
c				c		
d	a	b	c	d	e	f
e				e		
f				f		

→
jednotkový element

Cvičenie 6.4. Nech $X = \mathcal{P}(A)$, kde $\mathcal{P}(A)$ je potenčná množina, binárna operácia nad touto množinou je definovaná ako prienik množín, $(\forall x, y \in \mathcal{P}(A))(x * y = x \cap y)$, rozhodnite, či


- (a) binárna operácia je komutatívna, **operácia prieniku je komutatívna**, $x \cap y = y \cap x$
- (b) čo je jednotkový element, jednotkový element vzhľadom k prieniku je **univerzálna množina U** ,
- (c) ktoré elementy majú inverzné elementy (ak existujú)? **Inverzný element neexistuje.**
Ak by sme postulovali komplement \bar{x} ako inverzný element vzhľadom k x , potom platí $x \cap \bar{x} = \bar{x} \cap x = \emptyset$, čo je však v kontradikcii s požiadavkou, aby platilo $x \cap \bar{x} = \bar{x} \cap x = U$ (pre inverzný prvok platí, že $x * x^{-1} = 1$, kde $1 \equiv U$).

Cvičenie 6.6. Nech $X = \mathcal{P}(A)$, binárna operácia nad touto množinou je definovaná ako symetrický rozdiel $(\forall x, y \in \mathcal{P}(A))(x * y = (x - y) \cup (y - x))$.


- (a) Dokážte, že operácia $*$ je binárna operácia,
- (b) Je táto operácia komutatívna?
- (c) Je táto operácia asociatívna?
- (d) Existuje jednotkový element v množine X ?
- (e) Ak existuje jednotkový element, existuje potom ku každému prvku $x \in \mathcal{P}(A)$ inverzný element $x^{-1} \in \mathcal{P}(A)$?

Riešenie:

Interpretácia symetrického rozdielu pomocou Vennovho diagramu má tvar



- (a) Symetrický rozdiel môže byť použitý ako binárna operácia nad $X = \mathcal{P}(A)$. Pre každé $x, y \in \mathcal{P}(A)$ platí, že $x * y \in \mathcal{P}(A)$.
- (b) Symetrický rozdiel je komutatívna operácia, alternatívna definícia je $x * y = (x \cup y) - (x \cap y)$.
- (c) Symetrický rozdiel je asociatívna operácia



Cvičenie 6.7. Nech množina $X = \{a, b, c, d\}$, binárna operácia pre túto množinu je definovaná pomocou multiplikačnej tabuľky

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	d	a	a
c	c	a	b	d
d	d	a	b	c

- (a) Je táto operácia asociatívna?
 (b) Je táto operácia komutatívna?

Riešenie:

(a) Nie je asociatívna operácia, kontrapríklad:

$$(c * b) * d = a * d = d$$

$$c * (b * d) = c * a = c$$

(b) Nie je komutatívna operácia, $c * d \neq d * c$

Cvičenie 6.8. Nech množina X obsahuje štvorcové matice majúce dva stĺpce a dva riadky a elementy sú reálne čísla.

- (a) Pre túto množinu definujeme binárnu operáciu ako súčet dvoch matíc,
 $(\forall x, y \in X)(x * y = x + y)$. Prečo takto špecifikovaná algebraická štruktúra $(X, +)$ je grupa?
 (b) Ak zameníme binárnu operáciu súčtu za súčin, ukážte takto špecifikovaná algebraická štruktúra nie je grupa.

Riešenie:

(a) Množina elementov X je definovaná ako množina štvorcových matíc typu $(2,2)$, operácia $'*'$ zachováva túto množinu a je asociatívna (súčet troch matíc je vždy asociatívna binárna operácia). Ako jednotkový element slúži matica, ktorá má nulové elementy

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

potom pre každú maticu $x \in X$ je splnená podmienka $x * e = e * x = x$. Pre každý element $x \in X$, ktorý je reprezentovaný maticou

$$x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

existuje inverzný element $x^{-1} \in X$ reprezentovaný maticou

$$x^{-1} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

pričom platí

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

To znamená, že binárna operácia je asociatívna, existuje jednotkový prvok a ku každému elementu existuje k nemu jediný inverzný element, čiže algebraická štruktúra $(X, +)$ je grupa.

(b) Binárna operácia $'*'$ sa definuje ako súčin matíc, je aj potom algebraická štruktúra $(X, +)$ grupa? Táto operácia je asociatívna, existuje jednotkový prvok

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Avšak nie pre každý prvok $x \in X$ existuje inverzný prvok. Existencia tohto inverzného prvku je viazaná s podmienkou regulárnosti matice

$$x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

musí platiť

$$ad - bc \neq 0$$

Ak elementy matice x nespĺňajú túto podmienku, potom inverzný element (inverzná matica) $x^{-1} \in X$ neexistuje. Napríklad k elementu $x' \in X$, ktorý je reprezentovaný maticou

$$x' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

neexistuje inverzný element. Algebraická štruktúra $(X, +)$ **nie je grupa**.

Cvičenie 6.9. Nech X je neprázdna množina a binárna operácia definovaná vzťahom $x * y = x$, pre každé $x, y \in X$.

(a) Dokážte, že algebraická štruktúra $(X, *)$ je pologrupa.

(b) Rozhodnite, či táto algebraická štruktúra je monoid.

Riešenie:

(a) K tomu, aby algebraická štruktúra $(X, *)$ bola pologrupou, binárna operácia $'*'$ musí byť asociatívna.

$$x * (y * z) = x * y = x$$

$$(x * y) * z = x * z = x$$

týmto sme dokázali asociatívnosť binárnej operácie, čiže algebraická štruktúra $(X, *)$ **je pologrupa**.

(b) Ak pologrupa $(X, *)$ má jednotkový element, potom je monoid. Nech $e \in X$ je hypotetický jednotkový element, potom z definície binárnej operácie vyplýva $x * e = x$ a $e * x = e$, to znamená, že nemôže existovať jednotkový element, ktorý by vyhovoval podmienke $x * e = e * x = x$. Algebraická štruktúra $(X, *)$ **nie je monoid**.

Cvičenie 6.10. Nech dve algebraické štruktúry $(X, *)$ a (Y, \circ) sú grupy. Definujte na karteziánskom súčine $X \times Y$ binárnu operáciu takto

$$(x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2) = (x_1 * x_2, y_1 \circ y_2)$$

pre každé $x_1, x_2 \in X$ a $y_1, y_2 \in Y$.

(a) Ukážte, že \bullet je binárna operácia na $X \times Y$.

(b) Ako je definovaný jednotkový element na $X \times Y$?

(c) Ako je definovaný inverzný element $(x, y)^{-1}$?

(d) Dokážte, že algebraická štruktúra $(X \times Y, \bullet)$ je grupa.

Riešenie:

(a) Musíme dokázať, že ak $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$, potom aj ich súčin

$(x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2) \in X \times Y$. Táto vlastnosť priamo vyplýva z predpokladu, že algebraické štruktúry $(X, *)$ a (Y, \circ) sú grupy. Súčin \bullet vyhovuje podmienke

$$(x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2) = \left(\underbrace{x_1 * x_2}_{\in X}, \underbrace{y_1 \circ y_2}_{\in Y} \right) \in X \times Y$$

Týmto sme dokázali, že súčin \bullet definovaný nad karteziánskym súčinom $X \times Y$ zachováva túto množinu, čiže **je binárna operácia**.

(b) Pretože algebraické štruktúry $(X, *)$ a (Y, \circ) sú grupy, potom množiny X a Y musia obsahovať jednotkové elementy $e_X \in X$ resp. $e_Y \in Y$, potom nad $X \times Y$ môžeme definovať jednotkový element $e = (e_X, e_Y) \in X \times Y$, ktorý vyhovuje dvom podmienkam

$$\begin{aligned} e \bullet (x, y) &= (e_X, e_Y) \bullet (x, y) = \left(\underbrace{e_X * x}_x, \underbrace{e_Y \circ y}_y \right) = (x, y) \\ (x, y) \bullet e &= (x, y) \bullet (e_X, e_Y) = \left(\underbrace{x * e_X}_x, \underbrace{y \circ e_Y}_y \right) = (x, y) \end{aligned}$$

Dokázali sme, že v rámci karteziánskeho súčinu $X \times Y$ **existuje jednotkový element**.

(c) Inverzný element vzhľadom k $(x, y) \in X \times Y$ je definovaný vzťahom $(x, y)^{-1} = (x^{-1}, y^{-1})$, potom musí platiť

$$\begin{aligned} (x, y) \bullet (x, y)^{-1} &= (x, y) \bullet (x^{-1}, y^{-1}) = \left(\underbrace{x * x^{-1}}_{e_X}, \underbrace{y \circ y^{-1}}_{e_Y} \right) = (e_X, e_Y) = e \\ (x, y)^{-1} \bullet (x, y) &= (x^{-1}, y^{-1}) \bullet (x, y) = \left(\underbrace{x^{-1} * x}_{e_X}, \underbrace{y^{-1} \circ y}_{e_Y} \right) = (e_X, e_Y) = e \end{aligned}$$

Dokázali sme, že pre každý $(x, y) \in X \times Y$ **existuje inverzný element**

$$(x, y)^{-1} = (x^{-1}, y^{-1}) \in X \times Y.$$

(d) Dôkazom vlastností (a), (b) a (c) sme dokázali, že algebraická štruktúra $(X \times Y, \bullet)$ **je grupa**.

Cvičenie 6.11. Nech $(\mathbb{N}, *)$ je algebraická štruktúra, kde \mathbb{N} je množina obsahujúca nezáporné celé čísla. Binárna operácia je definovaná takto

$$x * y = \max\{x, y\}$$

(a) Dokážte, že algebraická štruktúra $(\mathbb{N}, *)$ je pologrupa.

(b) Rozhodnite, či $(\mathbb{N}, *)$ je monoid.

Riešenie:

(a) K dôkazu, že algebraická štruktúra $(\mathbb{N}, *)$ je pologrupa musíme dokázať, že binárna operácia $'*'$ je asociatívna. K dôkazu asociatívnosti binárnej operácie použijeme metódu vymenovania prípadov (pozri kapitolu 1.4)

(a1) $x < y < z$

$$(x * y) * z = y * z = z$$

$$x * (y * z) = x * z = z$$

(a2) $x < z < y$

$$(x * y) * z = y * z = y$$

$$x * (y * z) = x * y = y$$

(a3) $y < x < z$

$$(x * y) * z = x * z = z$$

$$x * (y * z) = x * z = z$$

.....






Vo všetkých 6 prípadoch sme dostali vždy rovnosť $(x * y) * z = x * (y * z)$, z čoho vyplýva, že binárna operácia je asociatívna, t. j. algebraická štruktúra $(\mathbb{N}, *)$ je pologrupa.

(b) K tomu, aby sme dokázali, že algebraická štruktúra $(\mathbb{N}, *)$ je monoid, stačí dokázať, že existuje jednotkový element $e = 0$, ktorý patrí do množiny \mathbb{N}

$$x * e = \max\{x, 0\} = x$$

$$e * x = \max\{0, x\} = x$$

Cvičenie 6.12. Uvažujme neštvorcový obdĺžnik, ktorého vrcholy sú označené číslicami 1, 2, 3 a 4.



Tento obdĺžnik má štyri operácie symetrie

C_1 : rotácia o 0° stupňov okolo stredu obdĺžnika,

C_2 : rotácia o 180° stupňov okolo stredu obdĺžnika,

L_1 : reflexia priamkou L_1 a

L_2 : reflexia priamkou L_2 .

Pre lepšie pochopenie týchto elementov symetrie budem špecifikovať ich aplikácie na postupnosť (1,2,3,4)

$$C_1(1,2,3,4) = (1,2,3,4)$$

$$C_2(1,2,3,4) = (3,4,1,2)$$

$$L_1(1,2,3,4) = (2,1,4,3)$$

$$L_2(1,2,3,4) = (4,3,2,1)$$

Pre takto definované elementy môžeme zostrojiť ich kompozíciu (binárnu operáciu), napríklad

$$C_2 * L_1(1,2,3,4) = C_2(L_1(1,2,3,4)) = C_2(2,1,4,3) = (4,3,2,1) = L_2$$

(a) Zostavte multiplikačnú tabuľku pre kompozíciu dvoch operácií symetrie.

(b) Dokážte, že algebraická štruktúra $(A = \{C_1, C_2, L_1, L_2\}, *)$ je grupa.

Riešenie:

(a) Multiplikačná tabuľka má tvar

*	C_1	C_2	L_1	L_2
C_1	C_1	C_2	L_1	L_2
C_2	C_2	C_1	L_2	L_1
L_1	L_1	L_2	C_1	C_2
L_2	L_2	L_1	C_2	C_1

(b1) Binárna operácia $*$ je asociatívna. K dôkazu tejto vlastnosti by sme mali preskúmať 4^3 trojíc elementov z množiny $A = \{C_1, C_2, L_1, L_2\}$, či je splnená vlastnosť $(x * y) * z = x * (y * z)$.

Iný postup k dôkazu tejto vlastnosti je, že elementy z množiny $A = \{C_1, C_2, L_1, L_2\}$ môžeme formálne interpretovať ako permutácie nad 4 objektmi. Ako bolo ukázané v kapitole 6.2, súčin permutácií môže byť interpretovaný ako kompozícia 1-1-značných funkcií, ktorý je asociatívny.

(b2) V množine $A = \{C_1, C_2, L_1, L_2\}$ prvok $e = C_1$ môže byť interpretovaný ako jednotkový element, ktorý vyhovuje podmienke $\forall (x \in A)(e * x = x * e = x)$, splnenie tejto podmienky je jednoducho verifikované multiplikačnou tabuľkou, kde prvý riadok a prvý stĺpec je totožný s „indexovaním“ tabuľky.

(b3) Z tabuľky taktiež vyplýva, že ku každému $x \in A$ existuje práve jeden prvok $x^{-1} \in A$, ktorý vyhovuje podmienke $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$. Z multiplikačnej tabuľky vyplýva, že $\forall (x \in A)(x^{-1} = x)$.

Týmto sme dokázali, že algebraická štruktúra $(A = \{C_1, C_2, L_1, L_2\}, *)$ je grupa.

Cvičenie 6.13. Nech $(X, *)$ je komutatívny monoid. Ukážte, že množina idempotentných elementov $X' = \{x; (x \in X) \wedge (x * x = x)\}$ tvorí algebraickú štruktúru $(X', *)$, ktorá je submonoid.

Riešenie: Je potrebné dodefinovať pojem „submonoid“ v duchu teórie grúp. Nech algebraická štruktúra $(X, *)$ je monoid, potom ak pre neprázdnu podmnožinu $X' \subseteq X$ algebraická štruktúra $(X', *)$ je taktiež monoid, hovoríme, že $(X', *)$ je submonoid, $(X', *) \subseteq (X, *)$.

(A1) Musíme dokázať, že podmnožina $X' = \{x; (x \in X) \wedge (x * x = x)\}$ je uzavretá vzhľadom k binárnej operácii $*$. Nech $x, y \in X'$, potom

$$x * y = (x * x) * (y * y) = (x * y) * (x * y)$$

potom aj $x * y \in X'$. Pri dôkaze tejto vlastnosti bola použitá komutatívnosť binárnej operácie.

(A2) Existencia jednotkového elementu v podmnožine $X' = \{x; (x \in X) \wedge (x * x = x)\}$, ktorá obsahuje idempotentné elementy je zabezpečená tým, že jednotkový element $e \in X$ musí z definície byť idempotentný, $e * e = e$, čiže $e \in X'$.

Týmto sme dokázali, že algebraická štruktúra $(X', *)$ je submonoid.

Cvičenie 6.14. Nech algebraická štruktúra $(X, *)$ je grupa. Stred tejto štruktúry je definovaný ako podmnožina X , ktorá obsahuje elementy komutujúce so všetkými elementami X , $X_{center} = \{x; (x \in X) \wedge (\forall y (x * y = y * x))\}$. Dokážte, že algebraická štruktúra $(X_{center}, *)$ je podgrupa grupy $(X, *)$, $(X_{center}, *) \subseteq (X, *)$.

Riešenie:

(A1) Musíme dokázať, že množina $X_{center} = \{x; (x \in X) \wedge (\forall y (x * y = y * x))\}$ je uzavretá vzhľadom k binárnej operácii $*$. Nech $u, v \in X_{center}$, potom pre každé $y \in X$ by malo platiť

$$(u * v) * y = y * (u * v)$$

Táto vlastnosť je priamym dôsledkom, že $u, v \in X_{center}$

$$(u * v) * y = u * (v * y) = u * (y * v) = (u * y) * v = (y * u) * v = y * (u * v)$$

Týmto sme dokázali, že $(u * v) \in X_{center}$, t. j. podmnožina X_{center} je uzavretá vzhľadom k binárnej operácii $*$.

(A2) Množina X_{center} obsahuje jednotkový element, pretože $\forall (x \in X) (e * x = x * e = x)$, čiže $e \in X_{center}$.

(A3) Pre každé $x \in X_{center}$ existuje $x^{-1} \in X_{center}$, že $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$. Dôkaz budeme robiť sporom. Predpokladajme, že $x^{-1} \notin X_{center}$ a teda existuje také $y \in X$, pre ktoré platí $x^{-1} * y \neq y * x^{-1}$. Aplikujme na túto nerovnicu x .

$x * (x^{-1} * y) \neq x * (y * x^{-1})$. Keďže ide o grupu, platí asociatívnosť, teda

$$(x * x^{-1}) * y \neq x * (y * x^{-1})$$

$$e * y \neq x * (y * x^{-1})$$

$$y \neq x * (y * x^{-1})$$

Keďže platí aj to, že x komutuje so všetkými prvkami, môžeme ho presunúť

$$y \neq (y * x^{-1}) * x$$

$$y \neq y * (x^{-1} * x)$$

$$y \neq y * e$$

$$y \neq y$$

Týmto sme ukázali, že predpoklad viedol ku kontradikcii, a teda že $x^{-1} \in X_{center}$.

Týmto sme dokázali, že algebraická štruktúra $(X_{center}, *)$ je podgrupa.

Cvičenie 6.15. Nech X je množina, ktorá obsahuje matice $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, kde n je celé číslo.

(a) Ukážte, že algebraická štruktúra $(X, *)$, kde binárna operácia $*$ je priradená maticovému súčinu, je grupa.

(b) Dokážte, že zobrazenie $f : X \rightarrow \mathbb{Z}$, kde \mathbb{Z} je množina celých čísel, ktoré je definované

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = n$$

je izomorfizmus medzi $(X, *)$ a $(\mathbb{Z}, +)$.

Riešenie:

(a1) Množina X je uzavretá vzhľadom k maticovému súčinu

$$\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m+n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in X$$

(a2) Jednotkový element je matica

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a3) Pre každú maticu $x = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in X$ existuje inverzná matica $x^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in X$, ktorá

vyhovuje podmienke $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$.

Týmto sme dokázali, že algebraická štruktúra $(X, *)$ je grupa.

(b1) Nech $x = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a $y = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, kde $x * y = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, potom

$$f(x * y) = m + n = f(x) + f(y) = m + n$$

Týmto sme dokázali základnú vlastnosť pre izomorfizmus, existenciu zobrazenia f , ktoré zachováva súčin elementov, $f(x * y) = f(x) + f(y)$. Týmto sme aj dokázali, že grupy

$(X, *)$ a $(\mathbb{Z}, +)$ sú izomorfné.