



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Análise Matemática para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Teste 1 :: 2 de abril de 2024

Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere a função $f(x, y) = \sin \frac{1}{y} \ln \frac{1}{x}$. O domínio de f é

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0 \wedge -1 < x < 1\}$ | <input type="radio"/> $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ |
| <input type="radio"/> $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0 \wedge x > 0\}$ | <input type="radio"/> $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0 \wedge x \neq 0\}$ |

Questão 2. Seja $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(0, 0)\}$.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> D é aberto | <input type="radio"/> $(0, 0)$ é um ponto de isolado de D |
| <input type="radio"/> D é fechado | <input type="radio"/> $(0, 0)$ é um ponto de acumulação de D |

Questão 3. A superfície de nível 0 da função $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4y - z + 5$ é

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> um cone com vértice em $(0, 2, 1)$ | <input type="radio"/> uma esfera com centro em $(0, 2, 1)$ |
| <input type="radio"/> um parabolóide com vértice em $(0, 2, 1)$ | <input type="radio"/> um parabolóide hiperbólico |

Questão 4. Considere as funções $f(x, y) = \frac{1}{1 + y^2 - x}$ e $g(x, y, z) = z - \frac{1}{1 + y^2 - x}$. O ponto $(1, 1, 1)$ pertence ao

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> gráfico de g | <input type="radio"/> gráfico de f |
| <input type="radio"/> conjunto de nível 1 de g | <input type="radio"/> conjunto de nível 1 de f |

Questão 5. O valor do $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2}$ é

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> -1 |
| <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> não existe |

Questão 6. A função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^n}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ é contínua em $(0, 0)$ se

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="radio"/> $n = \frac{1}{2}$ | <input type="radio"/> $n = 1$ |
| <input type="radio"/> $n = \frac{3}{2}$ | <input type="radio"/> $n = 2$ |

Questão 7. A função $u(x, t) = \cos t \sin x$ satisfaz a equação

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}$ | <input type="radio"/> $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ |
| <input type="radio"/> $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial u}{\partial x}$ | <input type="radio"/> $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ |

Questão 8. Considere a função $f(x, y) = x^2 + \sin(xy)$. As direções segundo as quais a derivada direcional de f , no ponto $(1, 0)$, toma o valor 1, são dadas pelos vetores

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> $(1, 0)$ e $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ | <input type="radio"/> $(0, 1)$ e $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ |
| <input type="radio"/> $(0, 1)$ e $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$ | <input type="radio"/> $(1, 0)$ e $(0, 1)$ |

Questão 9. Se $z = u^2 v$, $u = \sin(x - y)$ e $v = e^{x+y}$, então $\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial z}{\partial y}(x, y)$ é

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> $2 \sin(x - y)e^{x+y} + \sin^2(x - y)$ | <input type="radio"/> $2 \cos^2(x - y)e^{x+y}$ |
| <input type="radio"/> $2 \sin(x - y)e^{x+y}$ | <input type="radio"/> $2 \sin^2(x - y)e^{x+y}$ |

Questão 10. Considere uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ derivável e tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y$. Qual das seguintes funções pode ser $\frac{\partial f}{\partial y}$?

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> $3x + 5y$ | <input type="radio"/> $3x + 2xy$ |
| <input type="radio"/> $2x + y^3$ | <input type="radio"/> não existe uma função nestas condições. |

Questão 11. Considere a função $f(x, y, z) = (y + 2z, 3x + 4y + 5z)$. Então $Jf(1, 0, 1)$ é

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ | <input type="radio"/> $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ |
| <input type="radio"/> $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ | <input type="radio"/> $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ |

Questão 12. O plano tangente à superfície $x^2 + y^2 - z^2 - 2x = 0$ no ponto $(2, 0, 0)$ é


- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> paralelo ao plano coordenado yOz | <input type="radio"/> paralelo ao plano coordenado xOy |
| <input type="radio"/> paralelo ao plano coordenado xOz | <input type="radio"/> perpendicular ao vetor $(1, 1, 1)$ |

Questão 13. Sejam $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável e $(0, 0) \in D$. Considere a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(t) = f(\sin t, e^t - 1)$. Se o plano definido pela equação $x + y - z = -1$ é tangente ao gráfico de f em $(0, 0)$, então

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> $f(0, 0) = 1$ e nada se sabe sobre $g'(0)$ | <input type="radio"/> $f(0, 0) = 1$ e $g'(0)$ não existe |
| <input type="radio"/> $f(0, 0) = 1$ e $g'(0) = 2$ | <input type="radio"/> $f(0, 0) = 1$ e $g'(0) = 0$ |

As respostas às questões deste grupo devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [3 valores] As circunferências centradas na origem representadas abaixo são as curvas de nível 1, 2, 3 e 4 de uma função derivável f .



- O gráfico de f pode ser uma semiesfera centrada na origem?
- Assinale no ponto $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ um representante de um vetor com a direção e sentido do gradiente de f em P .
- Indique se é verdade que $Df((0, 2); (1, 0)) > 0$.
- Sabendo que $\|\nabla f(-3, 0)\| = 1$ determine o plano tangente ao gráfico de f em $(-3, 0)$.

Questão 2. [4 valores] Considere a função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

- Justifique que f é uma função contínua em \mathbb{R}^2 .
- Determine $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para os quais existe $Df((0, 0); (u, v))$.
- Justifique que f não é uma função derivável na origem.