



การเลี้ยงสัตว์




แบบเพิงหมาแหงน

แบบเพิงหมาแหงนกลาย

แบบหน้าจั่ว




แบบจั่วสองชั้น



แบบจั่วสองชั้นกลาย

ชนิดของโรงเรียน


แบบเพิงหมาแหงน จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด เพราะไม่สลับซับซ้อน ลงทุนน้อย แต่มีข้อเสีย คือ ถ้าหันหน้าของโรงเรือนเข้าในแนวทางของลมมรสุม ฝนจะกลับเข้าไปในโรงเรือนได้ โรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากจะถูกฝนและแดดอยู่เป็นประจำ





เพิงหมาแหงน




แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้เพราะต้องพิถีพิถันในการจัดสร้างมากขึ้น รวมถึงความประณีตด้วย ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างจึงสูงกว่าแบบแรก แต่โรงเรือนแบบนี้มีข้อดีคือ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน




แบบจั่วสองชั้น ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าแบบแรก แต่มีข้อดีคือ อากาศภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วสองชั้นจะเป็นที่ระบายอากาศร้อนได้ดี ทำให้สัตว์เลี้ยงอยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียด



แบบหน้าจั่วกลาย โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน กันฝนได้มากขึ้น แต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน



แบบเพิงหมาแหงนกลายเป็น ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงนและแบบ
หน้าจั่ว ทั้งนี้เพราะมีการระบายอากาศร้อน กันฝน กันแดดได้ดีกว่าและข้อสำคัญคือค่า
ก่อสร้างจะถูกกว่าแบบหน้าจั่วกลายเป็น



การเลี้ยงไก่ไข่



วิธีทำโรงเรือนไก่ไข่ การเลือกสถานที่สร้างโรงเรือน ให้อยู่ห่างจากที่อยู่อาศัย และอยู่ปลายทิศทางลม น้ำไม่ท่วมขัง วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง มีความแข็งแรงทนทาน แบบโรงเรือนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ แบบที่เหมาะสม คือ แบบน้ำจั่ว



การเตรียมรับไก่ไข่มาเลี้ยง

1. ต้องทำความสะอาดเล้าไก่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงให้สะอาด ก่อนนำไก่เข้ามาเลี้ยง อย่างน้อย 7 วัน
2. ไก่ไข่ที่นำมาเลี้ยงควรเป็นไก่ ที่ได้รับการดูแลและบันทึกรายงานอย่างดี มีน้ำหนัก ตัวที่ได้ตามมาตรฐาน และได้รับการทำวัคซีนอย่างครบถ้วน
3. เมื่อรับไก่เข้ามาในเล้าแล้วควรให้ไก่อยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็เริ่มให้น้ำหลังจากนั้น ไก่ไข่อยู่ได้ประมาณ 3 ชั่วโมง ให้อาหารตามลำดับ



การเลี้ยงไก่ไข่ระยะให้ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่ในระยะให้ไข่ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเป็นระยะที่บ่งชี้ว่า ไก่จะให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด ระยะให้ไข่ของแม่ไก่จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 21 สัปดาห์



การให้แสงสว่าง

ต้องคำนึงถึงแสงธรรมชาติด้วยระยะเวลาของแสงธรรมชาติ จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ให้ยึดหลักว่าแม่ไก่ไข่ต้องการแสงสว่างนานติดต่อกันวันละ 14-16 ชั่วโมง ความเข้มของแสง 5 ลักซ์หรือหลอดไฟ 1 วัตต์ ต่อตารางเมตร





ความหนาแน่นของไก่

- บนพื้นดินปูแกลบควรเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 5 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร
- ควรพิจารณาเพิ่มลดความหนาแน่นตามสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล
- การให้น้ำให้ก่อนให้อาหาร และหลังจากกินอาหารไก่จะได้กินน้ำทันที
- เติมน้ำสะอาดทุกวัน และผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
- ทำความสะอาดกระป๋องน้ำวันละครั้ง
- ตรวจสอบระดับน้ำในกระป๋องน้ำเสมอ
- ปรับระดับกระป๋องน้ำให้สูงเท่าระดับหลังไก่



การให้อาหารไก่ไข่ ไก่ต้องการอาหารเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น

ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หายใจ เดิน วิ่ง และการกินอาหาร ใช้ในการสร้างกระดูก เนื้อ หนัง ขน เล็บ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใช้ในการสร้างไข่ และผลิตลูกไก่ ดังนั้น ไก่จะเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้กินอาหารเพียงพอ และได้กินอาหารดี โดย สม่ำเสมอทุกวัน



อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่

1. ให้หญ้าสด ใบกระถิน หรือผักสดให้ไก่กินทุกวัน
2. เพาะข้าวเปลือกหรือถั่วเขียวให้ไก่กิน โดยเพาะถั่วเขียวในกระป๋องนม และรดน้ำทุกวัน พอครบ 3 วัน นำให้ไก่กิน





หลักการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพไก่

1. ทำความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มอยู่เสมอ
2. ใช้เสื้อคลุมและรองเท้าบูตขณะปฏิบัติงานในฟาร์ม
3. ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ตามโปรแกรม
4. ให้อาหารไก่อย่างเพียงพอ
5. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำ
6. นำไก่ตาย หรือ ไช้แตกออกจากเล้าทันทีที่พบ
7. กลับแกลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อยๆ
8. เมื่อย้ายฝูงไก่ต้องพักเล้า และทำความสะอาดอย่างน้อย 2 สัปดาห์





การป้องกันโรคในสัตว์ปีก

โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่พื้นเมือง

อายุ	ชนิดวัคซีน		
	อหิวาต์เป็ดไก่	ฝีดาษไก่	วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลม
7-10 วัน			✓
3-4 สัปดาห์			✓
5 สัปดาห์		✓	
6-8 สัปดาห์			✓
8 สัปดาห์	✓		
11 สัปดาห์	✓		
ทุก 3 เดือน	✓		✓
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ / ใต้ผิวหนัง	แทงปีก	หยอดตา/จมูก

โปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดและห่าน

อายุ	ชนิดวัคซีน	
	กาฬโรคเป็ด	อหิวาต์เป็ด-ไก่
3-4 สัปดาห์	✓	
8 สัปดาห์		✓
10-12 สัปดาห์	✓	✓
ทุกๆ 3 เดือน		✓
ทุกๆ 6 เดือน	✓	
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใต้ผิวหนัง



ให้นักเรียนทำ Mind Mapping เรื่องการเลี้ยงปลา

1. ประวัติปลาในประเทศไทย

5. การผลิตและส่งออกปลา

การเลี้ยงปลา

2. ลักษณะของปลา

4. การเพาะเลี้ยงปลา

3. การผสมพันธุ์ของปลา



การเลี้ยงสุกร

ฟาร์มหรือโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกร ควรตั้งอยู่ในที่น้ำไม่ท่วม สามารถระบายน้ำได้ดี ห่างไกลจากชุมชน หรือ ตลาด ต่างๆ โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรต้องสามารถป้องกันแดด กันฝน และ กันลม ยิ่งถ้าช่วงในฤดูร้อนควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษ พื้นในคอกของสถานที่เลี้ยงควรเป็นพื้นคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการทำมาสะอาด



การให้อาหารสุกร

โดยสุกรนั้นเป็นสัตว์กระเพาะเดียว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อมากๆ ได้ดีเหมือนสัตว์กระเพาะรวมชนิดอื่นๆ ควรมีโภชนาการที่ครบถ้วน อาหารสำหรับสุกรขุนส่วนใหญ่จะนิยมใช้อาหารแบบสำเร็จรูป หรือ ผู้เพาะเลี้ยง เกษตรกรบางรายอาจผสมอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสุกรเอง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้หัวอาหารผสมรวมกับรำ, ปลายข้าว หรือวัสดุอื่น ๆ



การเลี้ยงดูแลสุกร

เกษตรกรควรเริ่มเลี้ยงสุกรขุน ตั้งแต่ระยะที่สุกรนั้นหย่านม โดยมีน้ำหนักที่ประมาณ 20 กิโลกรัม โดยใช้อาหารที่มีโปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ และให้สุกรกินเต็มที่ประมาณวันละ 1 – 2 กิโลกรัม จากนั้นเมื่อสุกรขุนมีน้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ก็จะเปลี่ยนอาหารโดยใช้อาหารที่มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์แทน และให้สุกรกินอาหารวันละ 2.5 – 3.5 กิโลกรัม จนถึงระยะที่จะส่งตลาดเมื่อสุกรมีน้ำหนัก ประมาณ 100 กิโลกรัม โดยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงสุกรนั้น จะต้องมีการให้น้ำสะอาดให้สุกรกินตลอดทั้งวัน



การตอนสุกรเพศผู้

เพื่อกำจัดกลิ่นเพศผู้ สามารถเลียงเพศผู้และเพศเมียในคอกเดียวกันได้ เพื่อให้สายพันธุ์เพศผู้ที่ไม่ดี
แพร่พันธุ์ต่อ นิยมตอนตั้งแต่ยังไม่หย่านม อายุประมาณ 2 สัปดาห์

