



ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



การเลี้ยงไก่

ภาคเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่ 10 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไก่ไข่

ประโยชน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเลี้ยงไก่ไข่ระบบเกษตรธรรมชาติ ” จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสานต่อให้ระบบการเลี้ยงไก่ในชุมชนยั่งยืน เป็นการจัดการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งคาดหวังจะสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน การพึ่งพาตนเองในด้านแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดี การสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน สิ่งสำคัญที่จำเป็นก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงและเศรษฐกิจของในชุมชน การใช้วัสดุที่ได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ แฝก หญ้าคา มาทำโรงเรือนเป็นต้น การผลิตอาหารไก่โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไพล ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชัน

วิธีทำโรงเรือนไก่ไข่

การเลือกสถานที่สร้างโรงเรือน ให้อยู่ห่างจากที่อยู่อาศัย และอยู่ปลายทิศทางลม น้ำ ไม่ท่วมขัง วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง มีความแข็งแรงทนทาน แบบโรงเรือนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ แบบที่เหมาะสม คือ แบบหน้าจั่ว



การเตรียมรับโกไข่มาเลี้ยง ต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. ต้องทำความสะอาดเล้าไก่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงให้สะอาด ก่อนนำโกไข่มาเลี้ยงอย่างน้อย 7 วัน
2. โกไข่ที่นำมาเลี้ยงควรเป็นไก่ ที่ได้รับการดูแลและบันทึกรายงานอย่างดี มีน้ำหนักตัวที่ได้ตามมาตรฐาน และได้รับการทำวัคซีนอย่างครบถ้วน
3. เมื่อรับโกไข่เข้ามาในเล้าแล้วควรให้โกไข่อยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็เริ่มให้น้ำ หลังจากนั้นโกไข่อยู่ได้ประมาณ 3 ชั่วโมง ให้อาหารตามลำดับ

การเลี้ยงโกไข่ระยะให้ไข่

การเลี้ยงโกไข่ในระยะให้ไข่ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเป็นระยะที่บ่งชี้ว่า โกไข่ให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด ระยะให้ไข่ของแม่โกไข่จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 21 สัปดาห์มีหลักสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ดังนี้

การให้แสงสว่าง

ต้องคำนึงถึงแสงธรรมชาติด้วยระยะเวลาของแสงธรรมชาติ จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ให้ยึดหลักว่าแม่โกไข่ต้องการแสงสว่างนานติดต่อกันวันละ 14-16 ชั่วโมง ความเข้มของแสง 5 ลักซ์ หรือหลอดไฟ 1 วัตต์ ต่อตารางเมตร

ความหนาแน่นของโก

- บนพื้นดินปูเกลบควรเลี้ยงโกไข่จำนวน 5 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร
 - ควรพิจารณาเพิ่มลดความหนาแน่นตามสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล
- การให้น้ำ
- ให้ก่อนให้อาหาร และหลังจากกินอาหารโกไข่จะได้กินน้ำทันที
 - เติมน้ำสะอาดทุกวัน และผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
 - ทำความสะอาดกระป๋องน้ำวันละครั้ง
 - ตรวจสอบระดับน้ำในกระป๋องน้ำเสมอ
 - ปรับระดับกระป๋องน้ำให้สูงเท่าระดับหลังโก
 - ตรวจสอบรอบๆ ถังน้ำบ่อยๆ ไม่มีการหกหล่นรั่วไหลของน้ำ

การให้อาหารไก่ไข่ ไก่ต้องการอาหารเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น

- ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หายใจ เดิน วิ่ง และการกินอาหาร
- ใช้ในการสร้างกระดูก เนื้อ หนัง ขน เล็บ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- ใช้ในการสร้างไข่ และผลิตลูกไก่
- ดังนั้น ไก่จะเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้กินอาหารเพียงพอ และได้กินอาหารดี โดย

สม่ำเสมอทุกวัน

อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่

1. ให้หญ้าสด ใบกระถิน หรือผักสดให้ไก่กินทุกวัน
2. เพาะข้าวเปลือกหรือถั่วเขียวให้ไก่กิน โดยเพาะถั่วเขียวในกระป๋องนม และรดน้ำ

ทุกวัน พอครบ 3 วัน นำให้ไก่กิน

หลักการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพไก่

1. ทำความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มอยู่เสมอ
2. ใช้เสื้อคลุมและรองเท้าบูตขณะปฏิบัติงานในฟาร์ม
3. ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ตามโปรแกรม
4. ให้อาหารไก่อย่างเพียงพอ
5. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำ
6. นำไก่ตาย หรือ ไข่แตกออกจากเล้าทันทีที่พบ
7. กลับกลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อยๆ
8. เมื่อย้ายฝูงไก่ต้องพักเล้า และทำความสะอาดอย่างน้อย 2 สัปดาห์



ไก่พื้นเมือง

ความต้องการสารอาหารของไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองต้องการเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตนั้น แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 5 หมู่

1. **โปรตีน** เป็นกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ไก่ต้องการนำไปใช้ในการสร้างเป็นโปรตีนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เป็นกล้ามเนื้อ อวัยวะภายในต่างๆ เม็ดเลือดแดงและผลผลิตไข่
2. **คาร์โบไฮเดรต** เป็นสารอาหารจำพวก แป้งและน้ำตาล ให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อการดำรงชีพการเจริญเติบโต
3. **ไขมัน** เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตแต่มากกว่า 2 เท่า ยังให้กรดไขมันบางชนิดที่จำเป็นร่างกายด้วย
4. **วิตามิน แร่ธาตุ** จำเป็นยิ่งแต่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยมาก หากขาดจะทำให้ไก่โตช้า และเป็นโรคขาดวิตามิน แร่ธาตุชนิดนั้นๆ
5. **น้ำ** จำเป็นและมีความสำคัญที่สุด เพราะถ้าไก่ขาดจะทำให้ไม่อยากกินอาหารและถึงตายได้ในที่สุด

วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง

1. **วัตถุดิบอาหารประเภทโปรตีน** โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นพวกที่ให้โปรตีนค่อนข้างสูงกว่าความต้องการสัตว์ ได้แก่

- ปลาป่น	มีโปรตีน	50 – 60 %
- กากถั่วเหลือง	มีโปรตีน	44 %
- ใบกระถิน	มีโปรตีน	12 – 23 %
- ใบมันสำปะหลัง	มีโปรตีน	25 – 27 %
- กากเมล็ดียงพารา	มีโปรตีน	16 %
- กากปาล์มน้ำมัน	มีโปรตีน	16 – 18 %

นอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ อีกหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งให้สารอาหารโปรตีนได้ ได้แก่ กากมะพร้าว กากเมล็ดฝ้าย กากเมล็ดงา กากถั่วลิสง เป็นต้น และยังมีอาหารธรรมชาติ ได้แก่ พวกหนอน แมลง ไล่เดือน เป็นต้น

หลักการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพไก่

1. ทำความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มอยู่เสมอ
2. ใช้เสื้อคลุมและรองเท้าบูตขณะปฏิบัติงานในฟาร์ม
3. ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ตามโปรแกรม
4. ให้อาหารไก่อย่างเพียงพอ
5. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำ
6. นำไก่ตาย หรือ ไข่แตกออกจากเล้าทันทีที่พบ
7. กลับกลบหรือวัสดุรองพื้นบ่อยๆ
8. เมื่อย้ายฝูงไก่ต้องพักเล้า และทำความสะอาดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2. วัตถุดิบอาหารประเภทแป้ง

ให้สารอาหารพวกแป้งและน้ำตาล เป็นส่วนใหญ่ ใช้เป็นแหล่งในการให้พลังงานแก่ร่างกาย วัตถุดิบประเภทนี้ ได้แก่

ปลายข้าว	ให้โปรตีน	8 %
รำข้าว	ให้โปรตีน	6 – 7 %
รำละเอียด	ให้โปรตีน	12 %
ข้าวเปลือก	ให้โปรตีน	6 %
ข้าวโพด	ให้โปรตีน	8 %
ข้าวฟ่าง	ให้โปรตีน	11 %
มันสำปะหลัง	ให้โปรตีน	2 %
ต้นสาคุ	ให้โปรตีน	1 – 2 %

3. วัตถุดิบอาหารประเภทพลังงานสูง

ใช้เป็นแหล่งให้พลังงานแต่เพียงอย่างเดียว โดยเสริมลงในสูตรอาหารเมื่อสูตรนั้นขาดพลังงานมาก ได้แก่ น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ น้ำตาลทราย และกากน้ำตาล

4. วัตถุดิบอาหารประเภทวิตามิน และแร่ธาตุ

ใช้เป็นแหล่งให้วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งจะมีส่วนผสมของสารอาหารเหล่านี้พอกับความต้องการของสัตว์ เช่น พรีเม็กซ์ (วิตามินรวม) ไคแคลเซียมฟอสเฟต (แร่ธาตุรวม) กระดูกป่น เปลือกหอยป่น หรือวิตามินแร่ธาตุบางส่วนได้จากแสงแดด หญ้า และผักสด

5. วัตถุประสงค์อาหารประเภทกรดอะมิโนสังเคราะห์

เป็นสารเคมีที่มีคุณค่าทางอาหารเท่ากับกรดอะมิโนชนิดนั้นๆ มักจะเสริมลงในสูตรอาหารในกรณีที่ขาดเฉพาะกรดอะมิโน เพียง 1 หรือ 2 ชนิด เท่านั้น ได้แก่ ไลซีน เมทไธโอนีน

ความต้องการสารอาหารต่างๆ ของไก่พื้นเมือง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

- 1. ลูกไก่เล็ก ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 6 สัปดาห์ ควรให้อาหารที่มีโปรตีน 21 %
- 2. ไก่รุ่น ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึงขายส่งตลาด มีโปรตีน 16 %
- 3. ไก่พ่อแม่พันธุ์ อายุ 23 สัปดาห์ ควรให้อาหารที่มีโปรตีนประมาณ 15 - 16 %

สูตรอาหารไก่พื้นเมืองระยะต่างๆ

♦ สูตร 1 อายุ 6 สัปดาห์ ถึงจำหน่าย

ลำดับ	วัตถุดิบอาหาร	จำนวน (กก.)
1	ปลายข้าวหรือข้าวโพด	68
2	รำละเอียด	15
3	ปลาป่น	5
4	กากถั่วเหลือง	10
5	เปลือกหอยป่น	1
6	ฟอสฟอรัส	1
รวม		100

♦ สูตร 2 อาหารสำเร็จรูปไก่พื้นเมือง

ลำดับ	หัวอาหาร/วัตถุดิบ (กก.)	สูตร 1 (กก.)	สูตร 2 (กก.)
1	หัวอาหารไก่พื้นเมือง	10	10
2	ปลายข้าวหรือข้าวโพด	20	20
3	รำละเอียด	10	20
รวม		40	50

เลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดี จะต้อง

1. สัตว์พันธุ์ดี
2. อาหารดี
3. โรงเรือนดี
4. การจัดการ (การเลี้ยงดู) ดี
5. การควบคุมป้องกันโรคดี
6. ตลาด



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ตำบลในเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองในชนบทหมู่บ้านต่างๆ มีหลากหลายพันธุ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่ฮู ไก่ตะเภา ไก่เบตง และไก่ชน โดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ไก่พื้นเมืองในหมู่บ้านจะเป็นสายพันธุ์ไก่ชน สังเกตได้จากแม่ไก่จะมีขนสีดำ หน้าดำและแข้งดำ หงอนหิน แต่จะมีพันธุ์บางส่วนที่มีสีเทา สีทอง แต่หงอนก็ยังเป็นหงอนหิน ซึ่งก็เป็นลักษณะหงอนของไก่ชนอยู่ดี เหตุที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชน เพราะว่าไก่ชนจะมีรูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตได้ดีและแม่พันธุ์ก็ไข่ดก เนื่องจากนักผสมพันธุ์ไก่ชนได้คัดเลือกลักษณะดีเด่นไว้อย่างต่อเนื่องนับร้อยปีมาแล้ว เกษตรกรเพื่อนบ้านจะขอซื้อขอยืมหรือขอไปขยายพันธุ์แบบเป็นความรู้จักมันคุ้นกันและกัน ก็ทำให้สายพันธุ์ศาสตร์พบว่าไก่พื้นเมืองในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติการเจริญเติบโตในระยะอายุ 4 เดือนแรก เฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก คือ เติบโตวันละประมาณ 9 - 10 กรัมเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าไก่พื้นเมืองเหล่านี้เป็นสายพันธุ์ไก่ชนจาก 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่การปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้เน้นในด้านการชนเก่งแต่เน้นในด้านการเจริญเติบโต และไข่ดกเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว สำหรับไก่ชนไทยแท้สีขนแยกได้หลากหลายถึง 17 สีขน เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ เหลืองเลา ประดู่เลา แสมดำ เป็นต้น

สายพันธุ์เหลืองหางขาว

สายพันธุ์เหลืองหางขาว เป็นสายพันธุ์ไก่ชนลักษณะปากสีขาวอมเหลือง หรือสีงาช้าง ปากสั้น อวบใหญ่คล้ายปากนกแก้ว และมีร่องน้ำชัดเจน กลางปากนูนเป็นสันข้างๆ เป็นร่องน้ำตาเป็นเหยี่ยว หัวตาแหลม ตาดำคว่ำ ตาดำเล็กและรี รอบๆ ตาดำสีขาวอมเหลือง หงอนหินด้านบนของหงอนบางเรียบปลายหงอนยาวเลยตา โคนหงอนโค้งติดกับศีรษะ ตุ่มหูสีแดงเดียวกับหงอนเล็กไม่หย่อนยานรัดรับกับใบหน้า เหนียงเล็กรัดติดคาง รูปใบหน้าแหลมยาว มีเนื้อแน่น ผิวหน้าเรียบมัน กะโหลกศีรษะหนาวยาว ลักษณะลำตัวอกแน่นกลมมีเนื้อเต็ม กระดูกอกยาวตรง หลังเป็นแผ่นกว้าง มีกล้ามเนื้อมาก หลังเรียบตรงไม่โค้งนูน ไหล่กว้างยกตั้งตรง คอใหญ่ กระดูกคอถี่ บั้นขาใหญ่ กลมมีเนื้อเต็ม เนื้อแน่น แข็งแรง ผิวหนังขาวอมเหลือง ขาวอมแดง สีขนลำตัวดำ จะมีแซมขาวบ้างที่หัว หัวปีก ข้องขา สร้อยคอเหลืองชัดเจน ยาวประป่า สร้อยหลังเป็นสีเดียวกับสร้อยคอเรียงกันเต็มแผ่นหลัง เริ่มจากโคนคอถึงโคนหาง เส้นขนละเอียดยาวระย้า สร้อยปีกสี

เดียวกับสร้อยคอ เห็นเด่นชัดจนยิ่งขาวและยาวมากๆ ยิ่งดี ขนหางควรพุ่งตรงและยาว ปลายหางโค้งตกลงเล็กน้อย ขาแข้งและเดือยขาวอมเหลืองสีเดียวกับสีปาก เกล็ดแข็งแน่นหนาเรียบ เดือยใหญ่แข็งแรง เล็บสีขาวอมเหลืองทุกเล็บและไม่มีสีดำปน เพศเมียลำตัวสีดำ หงอนและใบหน้าสีเดียวกับไก่ตัวผู้



สายพันธุ์ประตูหางดำ

ประตูหางดำเป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีปากสีดำ ปากอูมใหญ่ โดยปากใหญ่คล้ายปากนกแก้ว ปากบนจะมีร่องน้ำทั้งสองข้าง ระหว่างร่องน้ำทั้งสองข้างจะเป็นสันราง ตาสีประตูหรือแดงอมม่วงหรือตาออกสีดำ หรือตาสีแดงหงอนหินไม่มีจักเลย สร้อยคอมีประตูยาวประบ่า ปีกใหญ่ยาวสร้อยปีกสีเดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสีประตูยาวระย้าประกัน ขนลำตัว ขนปีกและหางพัดสีดำ กะลวยหางดำ โคนขาใหญ่ หน้าอกกว้างและยาวเนื้อเต็มแน่น ขาแข้ง เล็บและเดือยสีดำ เพศเมียสีเดียวกับเพศผู้แต่ไม่มีสร้อย



สายพันธุ์เขี้ยวกา

เขี้ยวกาหรือเขี้ยวหางดำ ลักษณะทั่วไป คล้ายๆกับประตูหางดำ ปากดำ หงอนหิน หน้าหงอนบาง กลางหงอนสูง ท้ายหงอนจะตกกดกระหม่อม สร้อยคอหลังและสร้อยหางสีเขี้ยว ขนปีและลำตัวเขี้ยว หางดำแข็งดำ และเล็บดำ



โรงเรียน อุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ลักษณะของโรงเรียนไก่พื้นเมือง โรงเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแน่นอน โรงเรียนอาจจะทำเป็นเพิงหมาแหงนกลาย แบบหน้าจั่วและอื่น ๆ การที่จะเลือกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน โรงเรียนสภาพของโรงเรียนไก่พื้นเมืองที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

- 1) สามารถป้องกันแดดกันฝนได้ดี
- 2) ภายในโรงเรียนควรโปร่ง ไม่อับทึบ ไม่ชื้น และระบายอากาศดีแต่ไม่ถึงกับมีลมโกรก
- 3) ควรสร้างโรงเรียนแบบประหยัด ใช้สิ่งก่อสร้างที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รักษาความสะดวกง่าย ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ทั่วถึง
- 4) ป้องกันศัตรูต่าง ๆ ได้ดี เช่น สุนัข แมว นก และหนู
- 5) ห่างจากที่พักพอสสมควร สะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงานดูแลไก่พื้นเมือง มีที่ให้ให้อาหารและน้ำ



วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง หลังจากที่ถูกเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างโรงเรียนแล้ว ส่วนประกอบอย่างอื่นที่ขาดไม่ได้ คือ อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้

1) ภาชนะใส่อาหาร ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่จะให้อาหารไก่พื้นเมืองโดยวิธีการโปรยหว่านลงบนลานหรือพื้นดิน แล้วปล่อยให้ไก่พื้นเมืองจิกกินเอง ทำให้ไก่พื้นเมืองตัวเล็ก ๆ ได้รับความอดอยากเพราะไก่พื้นเมืองที่ใหญ่กว่าจะแย่งจิกกินเสียจนหมดก่อน ดังนั้น ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรแยกไก่พื้นเมืองตัวใหญ่และตัวเล็กออกจากกัน จัดภาชนะใส่อาหารให้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้อาหารหกเรียกราดตัวไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองเองก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นดิน ภาชนะใส่อาหารไก่พื้นเมืองในชนบทควรเลือกใช้อุปกรณ์ราคาถูกจากวัสดุในท้องถิ่นที่ทำง่ายทนทานรักษาความสะอาดได้ง่าย เช่น กระบอกลไม้ไผ่ผ่าซีก หรือยางรถยนต์ผ่าซีกก็ได้ แต่ถ้ามีเงินทุนมากหน่อยก็อาจซื้อที่ให้อาหารไก่แบบแขวนถังกลมที่นิยมกัน สำหรับภาชนะใส่อาหารเลี้ยงลูกไก่พื้นเมืองในระยะ แรก ๆ ควรใช้ถาดหรือภาชนะตื้น ๆ และให้เพียงพอกับจำนวนไก่พื้นเมืองที่เลี้ยง เพราะตามธรรมชาติแล้ว ไก่พื้นเมืองจะกินอาหารพร้อม ๆ กัน

2) ภาชนะใส่น้ำ ควรจัดหามาให้ไก่พื้นเมืองได้กินน้ำตลอดเวลาภาชนะใส่น้ำนี้อาจใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก ถ้วย จาน อ่างดิน หรือจะซื้อภาชนะใส่น้ำแบบขวดสำเร็จรูปก็ได้

3) รังไข่ รังไข่เป็นสิ่งจำเป็นและต้องมีให้ครบตามจำนวนแม่ไก่พื้นเมือง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาแม่ไก่พื้นเมืองแย่งรังไข่กัน ขนาดของรังไข่ควรกว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุต สูง 8 นิ้ว แล้วใช้ฟางหุ้มแห้งรองเพื่อป้องกันไข่แตก รังไข่ที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป อาจจะใช้ขี้เถ้า ปุ๋ยคอก หรือตะกร้าเก่า ๆ ไปวางไว้ให้ไก่พื้นเมืองไข่ก็ได้ ที่สำคัญที่ตั้งของรังไข่ควรอยู่ในที่มืดซิด ไม่ถูกแดดและฝน มิฉะนั้นไข่ไก่พื้นเมืองจะเน่าเสีย ฟักไม่ออกเป็นตัวก็ได้ เมื่อมีการฟักไข่ไปครอกหนึ่ง ควรเปลี่ยนวัสดุรองไข่เสียทีหนึ่ง

4) คอนนอน ตามธรรมชาติไก่พื้นเมืองจะไม่นอนบนพื้นดิน แต่ชอบนอนบนต้นไม้อ้อหรือคอนไม้ ดังนั้น การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองควรมีคอนนอนให้ไก่พื้นเมืองไว้มุมใดมุมหนึ่งได้พักผ่อนในเวลากลางวัน ข้อสำคัญไม่ควรสร้างให้แคบจนเกินไป เพราะจะทำให้ไก่พื้นเมืองนอนแออัดหรือแย่งที่นอนกันได้

5) สุ่มหรือกรง ในกรณีที่ต้องการอนุบาลลูกไก่พื้นเมืองในระยะแรก เพื่อให้ลูกไก่พื้นเมืองมีความแข็งแรงพอที่จะวิ่งหรือเดินตามแม่ไก่พื้นเมืองนั้น ควรเตรียมสุ่มไว้ 1 - 2 ใบ เพื่อใช้ขังแม่ไก่พื้นเมืองและลูกไก่พื้นเมืองใน 1 - 2 สัปดาห์แรก หากจะใช้กรงควรทำเป็นกรงขนาดเล็กโดยยกให้สูงจากพื้นประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร

โรคและการป้องกันโรคไก่พื้นเมือง

หลักวิธีการสุขภาพที่ควรปฏิบัติไก่พื้นเมืองในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ผู้ที่เลี้ยงควรยึดหลัก "กันไว้ดีกว่าแก้" เพราะปัญหาโรคเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ประสบผลสำเร็จ ในปีหนึ่ง ๆ จะสูญเสียไก่พื้นเมืองจึงต้องมีการสุขภาพที่ดี และการให้วัคซีนป้องกันโรค ดังนี้

การสุขาภิบาลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้

- 1) ต้องดูแลทำความสะอาดโรงเรือนและภาชนะต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พยายามอย่าปล่อยให้โรงเรือนชื้นแฉะ
- 2) สร้างโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- 3) กำจัดแหล่งน้ำสกปรก รอบ ๆ บริเวณโรงเรือนและบริเวณใกล้เคียง
- 4) อาหารไก่ต้องมีคุณภาพ อาหารที่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าบูดเสีย
- 5) มีน้ำสะอาดให้ไก่กินตลอดเวลา
- 6) ถ้ามีไก่พื้นเมืองป่วยไม่มากนักให้กำจัดเสีย และจัดการเผาหรือฝังให้เรียบร้อย จะช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี
- 7) อย่าทิ้งซากไก่พื้นเมืองที่เป็นโรคลงแหล่งน้ำเป็นอันตรายเพราะเชื้อโรคจะแพร่ระบาด
- 8) ไก่พื้นเมืองที่ซื้อใหม่ ควรแยกเลี้ยงไว้ต่างหาก โดยกักขังไว้ประมาณ 15 วัน หากไม่เป็นโรคจึงนำมาเลี้ยงในบริเวณเดียวกันได้
- 9) เมื่อมีโรคระบาดไก่พื้นเมืองเกิดขึ้น ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่สามารถจะดูแลหรือป้องกันรักษาเองได้ ควรปรึกษาผู้รู้

การให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดไก่พื้นเมือง ควรปฏิบัติดังนี้

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง แม้ว่าจะมีการสุขาภิบาลที่ดี แต่โดยปกติสิ่งแวดล้อมจะมีเชื้อโรคอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ไก่พื้นเมืองเป็นโรคได้ทุกเวลา ดังนั้น ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงต้องสร้างความต้านทานโรค โดยการให้วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งควรให้ตั้งแต่ไก่พื้นเมืองอายุยังน้อยและสม่ำเสมอตามตารางที่กำหนด การให้วัคซีนจะให้ผลดีที่สุดต่อเมื่อ

- สุขภาพของไก่พื้นเมืองแข็งแรง ไม่เป็นโรค
- วัคซีนที่ใช้มีคุณภาพดี
- เครื่องมือที่ใช้กับวัคซีนสะอาด และผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคแล้ว
- ให้วัคซีนไก่พื้นเมืองครบตามขนาดที่กำหนด
- ให้วัคซีนอย่างสม่ำเสมอและพยายามให้วัคซีนไก่พื้นเมืองที่มีสุขภาพดีทุกตัวในฝูง
- การให้วัคซีนแต่ละชนิดควรเว้นระยะห่างกันประมาณ 5 - 7 วัน



ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดไก่อื่นเมือง

วัคซีน	อายุไก่อื่นเมือง	วิธีให้วัคซีน	ขนาดวัคซีน	ระยะป้องกันโรค
นิวคาสเซิล (ครั้งที่ 1 สเตรอนเอฟ.)	1-3 วัน	หยอดจมูกหรือตา	1-2 หยด	3 เดือน
ฝีดาษ (ครั้งที่ 1)	7 วัน	แทงปีก	1-2 ครั้ง	1-2 ปี
นิวคาสเซิล (ครั้งที่ 2 สเตรอนเอฟ.)	21 วัน	หยอดจมูกหรือตา	1-2 หยด	3 เดือน
นิวคาสเซิล (สเตรอนเอ็ม.พี.)	2 - 3 เดือน	แทงปีก	1-2 ครั้ง	6 เดือน
อหิวาต์	2-3 เดือน	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	1 ซี.ซี	3 เดือน
หลอดลมอักเสบ (ครั้งที่ 1)	14 วัน	หยอดจมูกหรือตา	1-2 หยด	3 เดือน
หลอดลมอักเสบ (ครั้งที่ 2)	28 วัน	หยอดจมูกหรือตา	1-2 หยด	3 เดือน



โรคระบาดไก่อื่นเมืองที่สำคัญและวิธีป้องกันรักษา

โรคนิวคาสเซิล (โรคห่า) ถ้าไก่อื่นเมืองเป็นโรคนี้แล้ว ไก่อื่นเมืองจะมีอาการทางระบบหายใจและระบบประสาท คือ ไก่อื่นเมืองจะหายใจดัง ชักกระตุก คอบิดเบี้ยว ขาปีกเป็นอัมพาต เดินเป็นวงกลม เบื่ออาหาร และภายใน 2-4 วัน ไก่อื่นเมืองอาจจะตายหมด เป็นได้ทั้งไก่อื่นเมืองตัวเล็กและตัวใหญ่

การป้องกัน ใช้วัคซีน สเตรอนเอฟ. หยอดจมูกหรือตาลูกไก่อื่นเมืองที่มีอยู่ 1 - 3 วัน ทำวัคซีน สเตรอนเอฟ. ซ้ำอีกเมื่อไก่อื่นเมืองมีอายุ 21 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน เมื่อไก่อื่นเมืองมีอายุ 2 - 3 เดือน ใช้วัคซีนสเตรอนเอ็ม.พี. แทงผนังปีก 1 - 2 ครั้ง สามารถป้องกันโรคได้ 6 เดือน

โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ ถ้าไก่อื่นเมืองเป็นโรคนี้แล้ว ไก่อื่นเมืองจะมีอาการทางระบบหายใจ หายใจไม่สะดวก อ้าปากหายใจ หายใจเสียงดังน้ำมูกไหล ตาแฉะ

การป้องกัน ทำวัคซีนหลอดลมอักเสบโดยหยอดจมูกหรือตา 1-2 หยดในลูกไก่พื้นเมืองเมื่อมีอายุ 14 วัน และทำวัคซีนหลอดลมอักเสบซ้ำอีกเมื่อลูกไก่พื้นเมืองมีอายุ 28 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน ข้อควรระวัง ห้ามใช้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ควรใช้วัคซีนชนิดนี้ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์

โรคฝีดาษ ถ้าไก่พื้นเมืองเป็นโรคนี้แล้ว ไก่พื้นเมืองจะมีเม็ดขึ้นตามใบหน้าหรือหงอน บางครั้งพบเม็ดสีเหลืองในบริเวณปากและลิ้น ไก่พื้นเมืองจะเจ็บปากและลิ้น กินอาหารไม่ได้ ถ้าเกิดมีโรคแทรกก็จะตายไปในที่สุด

วิธีป้องกัน ทำวัคซีนฝีดาษไก่โดยการแทงผนังปีก 1-2 ครั้ง กับลูกไก่พื้นเมืองที่มีอายุ 7 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 1 ปี

โรคคอหิวดำ จะพบมากในไก่พื้นเมืองที่มีอายุเกิน 2 เดือนขึ้นไปถ้าเป็นขั้นรุนแรง ไก่พื้นเมืองจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ถ้าเป็นชนิดธรรมดาไก่พื้นเมืองจะแสดงอาการตัวร้อนจัด หายใจไม่สะดวก หงอนเหี่ยวเปลี่ยนเป็น สีดำคล้ำ

การป้องกัน ทำวัคซีนคอหิวดำไก่พื้นเมืองโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ซี.ซี. กับไก่พื้นเมืองที่มีอายุ 2 เดือน การรักษา ช่วยได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะหรือซัลฟาควิน็อกซาลินละลายน้ำให้กิน

โรคพยาธิไก่พื้นเมืองที่สำคัญและวิธีป้องกันรักษา

พยาธิภายนอกไก่ มีหลายชนิด เช่น ไร เหา และหมัด ถ้าไก่พื้นเมืองเป็นโรคนี้แล้วพยาธิเหล่านี้จะคอยรบกวนไก่พื้นเมืองตลอดเวลาทำให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองตัวเมียจะทำให้ไข่ลดลง ฉะนั้นจึงควรกำจัดโรคนี้เสีย โดยมีวิธีการควบคุมและกำจัด ดังนี้

- 1) ก่อนนำไก่พื้นเมืองเข้าขังในโรงเรือน ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รางอาหาร รางน้ำ โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น มาลาไธออนและโรติโนน
- 2) ควรใช้วัสดุปูพื้นโรงเรือน เช่น แกลบที่ใหม่และไม่ชื้น เพราะบริเวณพื้นโรงเรือนมักจะมีไรไก่พื้นเมืองอาศัยอยู่มาก
- 3) ในขณะที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง เมื่อพบว่า มีไร เหา และหมัดเกิดขึ้นกับไก่พื้นเมือง ควรรีบกำจัดทันทีโดยใช้ยาตามคำแนะนำที่ฉลากยา
- 4) ใช้สมุนไพร เช่น โล่ตีน หรือยาฉุนละลายน้ำ นำไก่พื้นเมืองมาจุ่มฆ่าพยาธิก็ได้

พยาธิภายใน มีหลายชนิด เช่น พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลมและพยาธิเส้นด้าย ถ้าไก่พื้นเมืองเป็นโรคนี้แล้ว พยาธิเหล่านี้จะรบกวนไก่พื้นเมือง ทำให้แคระแกร็น เจริญเติบโตช้า และไข่ลด บางครั้งไก่พื้นเมืองอาจตายได้ สามารถกำจัดได้โดยใช้ยาเปปเปอร์ราซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ผสมกับอาหารให้ไก่กินทุก 1 - 2 เดือน

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประโยชน์

เกษตรกรมีเนื้อและไข่ไก่เป็นอาหารเพิ่มโปรตีน และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร

คุณสมบัติที่ดีของไก่พื้นเมือง

- (1) ไก่พื้นเมืองปล่อยเลี้ยงได้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงดูมาก
- (2) ไก่พื้นเมืองสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกเองได้ ในปีหนึ่งแม่ไก่จะไข่อย่างน้อยรุ่นๆ หนึ่งจะฟักออกประมาณ 8-10 ตัว ตลอดทั้งปีแม่ไก่จะให้ลูกประมาณ 30-40 ตัว ถ้าเลี้ยงไว้ 3-4 แม่ เกษตรกรจะมีไก่กินตลอดปี
- (3) รสชาติของไก่พื้นเมืองมีรสอร่อย เนื้อแน่น มีมันน้อย
- (4) สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้ ขายได้ราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ถ้าเกษตรกรสามารถขายไก่รุ่นได้เดือนละ 5 ตัว ในปีหนึ่งจะมีรายได้ถึง 2,400-3,000 บาท

การเตรียมการในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ควรจัดเตรียม ดังนี้

(1) โรงเรือนหรือเล้าไก่ มีหลังคา กันแดด กันฝนได้ สถานที่ตั้งควรให้ห่างจากตัวบ้านพอสมควร พื้นเล้าอาจปูด้วยแกลบหรือขี้เลื่อย เล้ากว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร เลี้ยงไก่ได้ประมาณ 30-40 ตัว รางน้ำ สำหรับใส่น้ำสะอาดให้ไก่กิน อาจใช้รางไม้ไผ่ผ่าครึ่งก็ได้ รางอาหาร สำหรับให้อาหารไก่ เพราะการให้ไก่จิกกินอาหารบนพื้นดินทำให้ไก่เป็นโรคพยาธิได้ง่าย รางใส่กรวด และเปลือกหอยป่นผสมเกลือป่น ไก่ทุกขนาดต้องกินกรวดและเปลือกหอย เพื่อนำไปสร้างกระดูก และเปลือกไข่ กรวดและเปลือกหอยต้องตั้งทิ้งไว้ให้กินตลอดเวลา รังไข่ ปกติแม่ไก่พื้นเมืองจะไข่ในรังไข่ ต้องมีจำนวน รังไข่เท่ากับจำนวนแม่ไก่ที่ไข่เพื่อไม่ให้ไก่แย่งกัน คอนนอน สำหรับให้ไก่นอน ควรจะพาดไ้มุมใดมุมหนึ่งของเล้า คอนนอนควรเป็นไม้กลมดีกว่าไม้เหลี่ยม ไก่จะจับคอนนอนได้ดี

(2) อาหารไก่พื้นเมือง นอกจากไก่จะหากินตามธรรมชาติแล้ว ต้องให้การเอาใจใส่เรื่องอาหารและน้ำให้เพียงพอ ดังนี้

- (2.1) ใส่น้ำสะอาดตั้งไว้ให้ไก่กินตลอดวัน และคอยเปลี่ยนน้ำทุก วัน
- (2.2) ให้อาหารผสมทุกเช้าเย็น เพิ่มเติมจากอาหารที่ไก่หากินได้ตามปกติ
- (2.3) ให้อาหารไก่หลาย ๆ ชนิดผสมกัน เช่น ปลายข้าว รำข้าว ข้าวโพดป่น ปลาป่น ข้าวเปลือก กากถั่ว กากมะพร้าว หัวอาหารไก่สำเร็จรูปชนิดเม็ดหรือชนิดผง

(2.4) มีเปลือกหอยปนผสมเกลือปนตั้งทิ้งไว้ให้ไถ่กินตลอดเวลา

(2.5) ให้หญาสด ใบกระถิน หรือผักสดให้ไถ่กินทุกวัน

(2.6) สังเกตความผิดปกติของไถ่ เช่น เบื่ออาหาร หงอยซึม หากพบให้รีบคัดแยก

ออกทันที เตรียมยารักษาและป้องกันส่วนที่เหลือโดยด่วน

(3) การฟักไข่ แม่ไถ่พื้นเมืองจะเริ่มให้ไข่ เมื่ออายุประมาณ 6 - 8 เดือน การไข่มีลักษณะเป็นชุด เฉลี่ยแล้วจะไข่ปีละประมาณ 4 ชุด ๆ ละประมาณ 10 - 12 ฟอง แม่ไถ่เมื่อไข่หมดชุดแล้วก็จะเริ่มฟักไข่ โดยใช้เวลาประมาณ 21 วัน

(4) การเลี้ยงแม่ไถ่และลูกไถ่ เมื่อลูกไถ่ออกจากไข่หมดแล้วควรให้แม่ไถ่เลี้ยงลูกเอง โดยการย้ายทั้งแม่และลูกไถ่มาขังในสุมหรือกรงบนพื้นดินที่แห้ง ระยะแรกควรมีอาหารสำหรับใส่รำ ปลาขี้ขาวหรือเศษข้าวสุกให้ลูกไถ่กิน และมีถ้วยหรืออ่างน้ำตื้นๆ ใส่ น้ำสะอาดให้กินตลอดเวลา เมื่อลูกไถ่อายุประมาณ 2 อาทิตย์ แข็งแรงดีแล้ว ปล่อยให้ลูกไถ่ไปหากินกับแม่ไถ่ โดยธรรมชาติ แม่ไถ่จะเลี้ยงลูกประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแยกจากลูกเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ลูกไถ่ระยะนี้เป็นช่วง มักจะมีการตายมากที่สุด ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เรื่องน้ำ อาหาร และการป้องกันโรค

(5) การคัดเลือกพันธุ์ไถ่ ควรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ต่อไป จะช่วยให้ไถ่ฝูงมีขนาดตัวโต ให้ไข่ตก เลี้ยงลูกดี ลูกรอดมาก และลูกไถ่โตเร็ว ทำให้ได้ผลตอบแทนสูง

(6) โรคที่สำคัญ ได้แก่ นิวคาสเซิล อหิวาต์ ฝีดาษ หลอดลมอักเสบ ใช้หวัดนก เพื่อลดการตายของไถ่ ควรให้วัคซีนตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์แนะนำ



ภาคใต้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม 63 หมู่ 7 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การเลี้ยงเปิด ไก่ (ไก่คอล่อน)

การเลี้ยงไก่ให้ถูกวิธี จะต้องเลี้ยงเปิด,ไก่ ให้มันพึ่งตนเองให้มากที่สุด แต่ผลที่ออกมาดีที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องเลี้ยงแบบใช้ภูมิปัญญาไทย มีรายละเอียดพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

อุปกรณ์

1. ไก่พื้นเมืองที่โตเร็วเนื้อมาก (ไก่คอล่อน)
2. อุปกรณ์สำหรับทำเล้าไก่

วิธีการเลี้ยง

1. ที่พักการเป็นอยู่ตลอดการนอนให้ทำแบบอัสจรรย์
2. รังไข่ให้ใช้ภูมิปัญญา คือ นำใบตะไคร้และใบสะเดามารองรัง (กำจัดตัวไร)
3. ให้อนุบาลลูกไก่อย่างน้อย 3 อาทิตย์
4. เลี้ยงปลวกให้ไก่กิน ให้ไก่ใช้วิธีชีวิตแบบดั้งเดิม

ประโยชน์

1. มีโรคน้อยโดยใชยาภูมิปัญญาไทย
2. ไก่พึ่งตนเองได้
3. ช่วยทำงานให้กับผู้เลี้ยงก่อน (ตามภูมิปัญญาไก่) ก่อนทดแทนเนื้อ
4. อยู่ตามภูมิประเทศได้ดีไม่มีโรค
5. รสชาติอร่อยดี เมื่อมีแกง

