

Análisis Factorial

Sisi Guevara García

1/6/2022

Análisis Factorial

Introducción

El análisis factorial es una técnica estadística cuya finalidad es la reducción de datos. Este método es usado para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones de error.

Matriz de trabajo

1.- Se trabajo con la matriz **statex77**, extraída del paquete *datos* que se encuentra precargado en R, es una matriz de datos cuantitativos y contiene informacione los de EU.

```
x<-as.data.frame(state.x77)
```

2.- Quitar los espacios de los nombres de las variables de las columnas 4 y 6 para no tener problemas.

```
colnames(x)[4]="Life.Exp"  
colnames(x)[6]="HS.Grad"
```

3.- Separa n (estados) y p (variables), para en una tener el número de individuos y en la otra el número de variables.

```
n<-dim(x)[1]  
p<-dim(x)[2]
```

Exploración de la matriz.

1.- Dimensión de la matriz. La matriz cuenta con 50 observaciones y 8 variables.

```
dim(x)
```

```
## [1] 50 8
```

2.-Tipo de variables.

```
str(x)
```

```
## 'data.frame':    50 obs. of  8 variables:
## $ Population: num  3615 365 2212 2110 21198 ...
## $ Income : num  3624 6315 4530 3378 5114 ...
## $ Illiteracy: num  2.1 1.5 1.8 1.9 1.1 0.7 1.1 0.9 1.3 2 ...
## $ Life.Exp : num  69 69.3 70.5 70.7 71.7 ...
## $ Murder : num  15.1 11.3 7.8 10.1 10.3 6.8 3.1 6.2 10.7 13.9 ...
## $ HS.Grad : num  41.3 66.7 58.1 39.9 62.6 63.9 56 54.6 52.6 40.6 ...
## $ Frost : num  20 152 15 65 20 166 139 103 11 60 ...
## $ Area : num  50708 566432 113417 51945 156361 ...
```

Como se mencionó, la matriz de datos es cuantitativa.

3.- Nombre de las variables.

```
colnames(x)
```

```
## [1] "Population" "Income"      "Illiteracy" "Life.Exp"   "Murder"
## [6] "HS.Grad"    "Frost"        "Area"
```

4.- Se buscan datos perdidos en la matriz.


```
anyNA(x)
```

```
## [1] FALSE
```

No se encuentran valores nulos en la matriz.

4.- Generación de un **scatter plot** para la visualización de variables originales.

```
pairs(x, col="blue", pch=19, main="matriz original")
```



Transformación de alguna variables. 1.- Aplicamos logaritmo para las columnas 1,3 y 8


```
x[,1]<-log(x[,1])
colnames(x)[1]<-"Log-Population"

x[,3]<-log(x[,3])
colnames(x)[3]<-"Log-Illiteracy"

x[,8]<-log(x[,8])
colnames(x)[8]<-"Log-Area"
```

2.-Grafico scatter para la visualización de la matriz original con 3 variables que se incluyeron.

```
pairs(x,col="blue", pch=19, main="Matriz original")
```



Nota: Como las variables tiene diferentes unidades de medida, se va a implementar la matriz de correlaciones para estimar la matriz de carga

Reduccion de la dimensionalidad

Análisis Factorial de componentes principales (PCFA)

1.- Calcular la matriz de medias y de correlaciones. ## Matriz de medias

```
mu<-colMeans(x)
mu
```

```
## Log-Population      Income Log-Illiteracy      Life.Exp      Murder
## 7.863443e+00  4.435800e+03  3.128251e-02  7.087860e+01  7.378000e+00
##      HS.Grad      Frost      Log-Area
## 5.310800e+01  1.044600e+02  1.066237e+01
```

Matriz de correlaciones.

```
R<-cor(x)
R
```

```
##           Log-Population      Income Log-Illiteracy   Life.Exp      Murder
## Log-Population    1.00000000  0.034963788    0.28371749 -0.1092630  0.3596542
## Income            0.03496379  1.000000000    -0.35147773  0.3402553 -0.2300776
## Log-Illiteracy    0.28371749 -0.351477726    1.00000000 -0.5699943  0.6947320
## Life.Exp          -0.10926301  0.340255339    -0.56999432  1.0000000 -0.7808458
## Murder            0.35965424 -0.230077610    0.69473198 -0.7808458  1.0000000
## HS.Grad           -0.32211720  0.619932323    -0.66880911  0.5822162 -0.4879710
## Frost             -0.45809012  0.226282179    -0.67656232  0.2620680 -0.5388834
## Log-Area          0.08541473 -0.007462068    -0.05830524 -0.1086351  0.2963133
##           HS.Grad      Frost      Log-Area
## Log-Population -0.3221172 -0.45809012  0.085414734
## Income          0.6199323  0.22628218 -0.007462068
## Log-Illiteracy -0.6688091 -0.67656232 -0.058305240
## Life.Exp        0.5822162  0.26206801 -0.108635052
## Murder          -0.4879710 -0.53888344  0.296313252
## HS.Grad         1.0000000  0.36677970  0.196743429
## Frost           0.3667797  1.00000000 -0.021211992
## Log-Area        0.1967434 -0.02121199  1.000000000
```

1.- Calcular los valores y vectores propios.

```
eR<-eigen(R)
```

2.- Valores propios

```
eigen.val<-eR$values
eigen.val
```

```
## [1] 3.6796976 1.3201021 1.1357357 0.7517550 0.6168266 0.2578511 0.1366186
## [8] 0.1014132
```

3.- Vectores propios

```
eigen.vec<-eR$vectors
eigen.vec
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
## [1,] -0.23393451 -0.41410075  0.50100922  0.2983839  0.58048485  0.0969034
## [2,]  0.27298977 -0.47608715  0.24689968 -0.6449631  0.09036625 -0.3002708
## [3,] -0.45555443  0.04116196  0.12258370 -0.1824471 -0.32684654 -0.6084112
## [4,]  0.39805075 -0.04655529  0.38842376  0.4191134 -0.26287696 -0.3565095
## [5,] -0.44229774 -0.27640285 -0.21639177 -0.2610739  0.02383706  0.1803894
## [6,]  0.41916283 -0.36311753 -0.06807465 -0.1363534 -0.34015424  0.3960855
## [7,]  0.36358674  0.21893783 -0.37542494 -0.1299519  0.59896253 -0.3507630
## [8,] -0.03545293 -0.58464797 -0.57421867  0.4270918 -0.06252285 -0.3012063
##           [,7]      [,8]
## [1,] -0.1777562 -0.23622413
## [2,]  0.3285840  0.12483849
## [3,] -0.3268997 -0.39825363
## [4,] -0.3013983  0.47519991
## [5,] -0.4562245  0.60970476
## [6,] -0.4808140 -0.40675672
## [7,] -0.4202943 -0.06001175
## [8,]  0.2162424 -0.05831177
```

4.- Calcular la proporcion de variabilidad

```
prop.var<-eigen.val/sum(eigen.val)
prop.var
```

```
## [1] 0.45996220 0.16501277 0.14196697 0.09396938 0.07710332 0.03223139 0.01707733
## [8] 0.01267665
```

5.- Calcular la proporcion de variabilidad acumulada

```
prop.var.acum<-cumsum(eigen.val)/sum(eigen.val)
prop.var.acum
```

```
## [1] 0.4599622 0.6249750 0.7669419 0.8609113 0.9380146 0.9702460 0.9873233
## [8] 1.0000000
```

Estimacion de la matriz de carga

Nota: Se estima la matriz de carga usando los autovalores y autovectores. Se aplica la rotación varimax

Se hace la primera estimación de Lamda mayúscula y se calcula multiplicando la matriz de los 3 primeros autovectores por la matriz diagonal formada por la raíz cuadrada de los primeros 3 autovalores.

```
L.est.1<-eigen.vec[,1:3] %*% diag(sqrt(eigen.val[1:3]))
L.est.1
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] -0.44874575 -0.47578394 0.53393005
## [2,] 0.52366367 -0.54700365 0.26312322
## [3,] -0.87386900 0.04729332 0.13063856
## [4,] 0.76356236 -0.05349003 0.41394671
## [5,] -0.84843932 -0.31757498 -0.23061066
## [6,] 0.80406070 -0.41720642 -0.07254777
## [7,] 0.69745163 0.25155014 -0.40009375
## [8,] -0.06800771 -0.67173536 -0.61195003
```

Rotación varimax

```
L.est.1.var<-varimax(L.est.1)
L.est.1.var
```

```
## $loadings
##
## Loadings:
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,]          0.840
## [2,] 0.785 -0.106 0.121
## [3,] -0.665          0.583
## [4,] 0.763 0.384 -0.168
```

```
## [5,] -0.573 -0.528 0.517
## [6,] 0.825 -0.202 -0.323
## [7,] 0.281 -0.794
## [8,] -0.906
##
##          [,1] [,2] [,3]
## SS loadings 2.744 1.300 2.091
## Proportion Var 0.343 0.163 0.261
## Cumulative Var 0.343 0.506 0.767
##
## $rotmat
##          [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.7824398 0.1724744 -0.5983649
## [2,] -0.5274231 0.6944049 -0.4895169
## [3,] 0.3310784 0.6986089 0.6342970
```

Estimación de la matriz de los errores

1.- Estimación de la matriz de perturbaciones

```
Psi.est.1<-diag(diag(R-as.matrix(L.est.1.var$loadings)%*% t(as.matrix(L.est.1.var$loadings))))
Psi.est.1
```

```
##          [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
## [1,] 0.2871756 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [2,] 0.0000000 0.3573295 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [3,] 0.0000000 0.0000000 0.2170499 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2427595 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [5,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1261156 0.0000000 0.0000000
## [6,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.174162 0.0000000
## [7,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2902087
## [8,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
##          [,8]
## [1,] 0.0000000
## [2,] 0.0000000
## [3,] 0.0000000
## [4,] 0.0000000
## [5,] 0.0000000
## [6,] 0.0000000
## [7,] 0.0000000
## [8,] 0.1696637
```

2.- Se utiliza el método Análisis de factor principal (PFA) para estimación de autovalores y autovectores.

```
RP<-R-Psi.est.1
RP
```

```
##          Log-Population      Income Log-Illiteracy  Life.Exp      Murder
## Log-Population      0.71282441 0.034963788      0.28371749 -0.1092630 0.3596542
## Income              0.03496379 0.642670461     -0.35147773 0.3402553 -0.2300776
## Log-Illiteracy      0.28371749 -0.351477726      0.78295012 -0.5699943 0.6947320
```

```
## Life.Exp      -0.10926301  0.340255339   -0.56999432  0.7572405 -0.7808458
## Murder        0.35965424 -0.230077610    0.69473198 -0.7808458  0.8738844
## HS.Grad       -0.32211720  0.619932323   -0.66880911  0.5822162 -0.4879710
## Frost         -0.45809012  0.226282179   -0.67656232  0.2620680 -0.5388834
## Log-Area      0.08541473 -0.007462068   -0.05830524 -0.1086351  0.2963133
##              HS.Grad      Frost      Log-Area
## Log-Population -0.3221172 -0.45809012  0.085414734
## Income         0.6199323  0.22628218 -0.007462068
## Log-Illiteracy -0.6688091 -0.67656232 -0.058305240
## Life.Exp       0.5822162  0.26206801 -0.108635052
## Murder         -0.4879710 -0.53888344  0.296313252
## HS.Grad        0.8258380  0.36677970  0.196743429
## Frost          0.3667797  0.70979126 -0.021211992
## Log-Area       0.1967434 -0.02121199  0.830336270
```

Calculo de la matriz de autovalores y autovectores.

```
eRP<-eigen(RP)
```

Autovalores

```
eigen.val.RP<-eRP$values
eigen.val.RP
```

```
## [1]  3.46137648  1.10522195  0.88152416  0.48705680  0.35360597  0.02813553
## [7] -0.06758176 -0.11380367
```

Autovectores

```
eigen.vec.RP<-eRP$vectors
eigen.val.RP
```

```
## [1]  3.46137648  1.10522195  0.88152416  0.48705680  0.35360597  0.02813553
## [7] -0.06758176 -0.11380367
```

Proporcion de variabilidad

```
prop.var.RP<-eigen.val.RP/ sum(eigen.val.RP)
prop.var.RP
```

```
## [1]  0.564152306  0.180134556  0.143675179  0.079382934  0.057632455
## [6]  0.004585668 -0.011014811 -0.018548286
```


Proporcion de variabilidad acumulada

```
prop.var.RP.acum<-cumsum(eigen.val.RP)/ sum(eigen.val.RP)
prop.var.RP.acum
```

```
## [1] 0.5641523 0.7442869 0.8879620 0.9673450 1.0249774 1.0295631 1.0185483
## [8] 1.0000000
```

Estimación de la matriz de cargas con rotación varimax

```
L.est.2<-eigen.vec.RP[,1:3] %%% diag(sqrt(eigen.val.RP[1:3]))
L.est.2
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] -0.42621819 -0.27609775 0.56228420
## [2,] 0.48528446 -0.36092954 0.32467098
## [3,] -0.84791581 0.08163995 0.10816670
## [4,] 0.73812189 0.02688907 0.36866093
## [5,] -0.84699944 -0.34227865 -0.12211117
## [6,] 0.78817342 -0.40399024 0.04935203
## [7,] 0.66112453 0.12457105 -0.40191996
## [8,] -0.06868291 -0.77165602 -0.36531090
```

Rotacion varimax

```
L.est.2.var<-varimax(L.est.2)
```

Estimación de la matriz de covarianzas de los errores.

```
Psi.est.2<-diag(diag(R-as.matrix(L.est.2.var$loadings)%% t(as.matrix(L.est.2.var$loadings))))
Psi.est.2
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]
## [1,] 0.4259446 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [2,] 0.0000000 0.5288176 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [3,] 0.0000000 0.0000000 0.2626737 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [4,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3185422 0.0000000 0.0000000 0.0000000
## [5,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1505261 0.0000000 0.0000000
## [6,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2131389 0.0000000
## [7,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3858568
## [8,] 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
##           [,8]
## [1,] 0.0000000
## [2,] 0.0000000
## [3,] 0.0000000
```

```
## [4,] 0.0000000
## [5,] 0.0000000
## [6,] 0.0000000
## [7,] 0.0000000
## [8,] 0.2663776
```

Obtencion de los scores de ambos métodos

PCFA

```
FS.est.1<-scale(x)%*% as.matrix(L.est.1.var$loadings)
FS.est.1
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## Alabama    -5.84072356 -1.3993671511  4.0008109
## Alaska      2.12443806 -3.6163397014 -1.3435941
## Arizona    -0.77245459 -1.1030150088  1.7864181
## Arkansas   -4.26961555 -0.1287634469  1.8680205
## California  1.57843978 -1.6386262821  3.0959757
## Colorado    3.35619481 -0.5747409714 -1.9955520
## Connecticut 2.96609993  2.5265114588 -1.0120520
## Delaware    0.15111765  2.2707877284 -1.3473631
## Florida    -0.91278118 -0.8518787165  3.2141818
## Georgia    -5.10406769 -1.5374188978  3.5972606
## Hawaii      1.68679592  2.0782245763  0.6972161
## Idaho       1.93931571  0.0374520725 -2.6403015
## Illinois    0.36572803 -0.9730363911  1.3246992
## Indiana     0.69870165  0.1740586327 -0.1660034
## Iowa        3.77325852  0.8634090197 -2.4308546
## Kansas      3.22079390  0.2206198504 -1.7333568
## Kentucky   -3.97957229 -0.1711842990  1.8581455
## Louisiana   -6.15095874 -1.1449716511  4.2193388
## Maine       0.38912287  0.9352663421 -2.8385772
## Maryland    0.54556931  0.6481615589  0.7313943
## Massachusetts 1.95531363  1.9508870989 -0.0699601
## Michigan    0.06109118 -0.8995742724  1.1610156
## Minnesota   3.83625590  0.7199310360 -2.2609012
## Mississippi -6.73875213 -1.1336057288  3.0124928
## Missouri    -0.63621057 -0.5673516660  0.5606479
## Montana     1.70022911 -0.7530855537 -2.9827203
## Nebraska    3.31393569  0.5702899251 -2.6630094
## Nevada      1.83953234 -2.1624547546 -2.8632403
## New Hampshire 1.76672303  1.8835104424 -3.2522623
## New Jersey  1.23076573  1.5154423999  0.6483326
## New Mexico  -2.42369795 -1.2184859435  0.1095350
## New York    -0.55160991 -0.8431042602  2.9025469
## North Carolina -4.53932589 -0.7126552652  2.8168209
## North Dakota 3.26810535  1.0664889529 -3.5180166
## Ohio        0.67643704 -0.0394642439  0.5816740
## Oklahoma    -0.43628926  0.0293430043  0.2108486
## Oregon      2.64633236 -0.0126633017 -0.6563722
```

```
## Pennsylvania -0.06313819 0.0425262164 0.8538298
## Rhode Island 0.25059508 4.0533333045 -1.3779994
## South Carolina -6.20030464 -0.7067780563 3.0142562
## South Dakota 2.51505516 0.8539599931 -3.9694575
## Tennessee -3.75602365 -0.3764569265 2.4225536
## Texas -2.74825842 -2.0176142597 4.0126966
## Utah 3.40911641 0.2638533973 -3.0642167
## Vermont 1.26368503 1.7670538099 -3.5748058
## Virginia -1.45435214 -0.4332714574 1.8388594
## Washington 2.95298764 0.0002978623 -0.1436737
## West Virginia -3.41599674 0.5649932020 0.5132111
## Wisconsin 2.58972274 0.8701285803 -1.5397225
## Wyoming 1.92267355 -0.8906222579 -3.6087703
```

PFA

```
FS.est.2<-scale(x)%*% as.matrix (L.est.2.var$loadings)
FS.est.2
```

```
##           [,1]           [,2]           [,3]
## Alabama -5.69766092 -1.133005866 3.9030908
## Alaska 1.77921500 -3.310049553 -1.2425530
## Arizona -0.80948635 -1.007423566 1.6833688
## Arkansas -4.04451164 -0.036340306 1.8899610
## California 1.28900772 -1.589528660 2.7938220
## Colorado 3.21256763 -0.645092519 -1.9103448
## Connecticut 2.85639977 2.291700954 -1.1152442
## Delaware 0.22491218 2.168332191 -1.3109174
## Florida -1.04778981 -0.760012075 2.9630979
## Georgia -5.04193484 -1.243399542 3.4848855
## Hawaii 1.64548810 1.848120424 0.5487863
## Idaho 1.99602286 -0.067186945 -2.4442739
## Illinois 0.17329771 -0.870927790 1.1838509
## Indiana 0.66348403 0.140717116 -0.1900850
## Iowa 3.70915552 0.657976435 -2.3698485
## Kansas 3.13617617 0.071725764 -1.6894853
## Kentucky -3.82119443 -0.051170443 1.8492550
## Louisiana -5.97309240 -0.880509145 4.1021292
## Maine 0.58567717 0.845398887 -2.6098620
## Maryland 0.40855637 0.650876372 0.5867974
## Massachusetts 1.91021424 1.761365924 -0.1964750
## Michigan -0.07208772 -0.823049544 1.0671998
## Minnesota 3.74953682 0.518054623 -2.2104937
## Mississippi -6.45121865 -0.852611917 3.0320154
## Missouri -0.64446964 -0.519762510 0.5472506
## Montana 1.72574501 -0.752576236 -2.7507980
## Nebraska 3.28773039 0.392513546 -2.5439122
## Nevada 1.69672312 -1.994626548 -2.6292009
## New Hampshire 1.87991014 1.704867403 -3.0632652
## New Jersey 1.10782292 1.425042094 0.4638907
## New Mexico -2.26112419 -1.086582245 0.2653217
## New York -0.72255151 -0.744949928 2.6624378
```

```
## North Carolina -4.42441540 -0.513264749 2.7372284
## North Dakota 3.22068093 0.897031063 -3.3556310
## Ohio 0.59453054 -0.051780182 0.4905274
## Oklahoma -0.36512462 0.000708499 0.2244101
## Oregon 2.56050584 -0.129810062 -0.6934180
## Pennsylvania -0.10451900 0.054229408 0.7553645
## Rhode Island 0.40356926 3.785456289 -1.3760426
## South Carolina -5.98815271 -0.435831413 2.9745853
## South Dakota 2.60764548 0.683975660 -3.7117087
## Tennessee -3.63769564 -0.249263663 2.3593673
## Texas -2.80670233 -1.827474308 3.8156526
## Utah 3.44131011 0.069209103 -2.8669774
## Vermont 1.44160727 1.580578146 -3.3086066
## Virginia -1.50774364 -0.328200587 1.7151967
## Washington 2.81601549 -0.109025242 -0.2503494
## West Virginia -3.18525955 0.632647668 0.5745805
## Wisconsin 2.55487697 0.699000994 -1.5141208
## Wyoming 1.92835024 -0.866073018 -3.3204601
```


Graficamos ambos scores

```
par(mfrow=c(2,1))
```

Factor I y II

```
pl1<-plot(FS.est.1[,1], FS.est.1[,2], xlab="primer factor",
          ylab="segundo factor", main="scores con factor I y II con PCFA",
          pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,1], FS.est.1[,2], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```


scores con factor I y II con PCFA



Factor I y III

```
pl2<-plot(FS.est.1[,1], FS.est.1[,3], xlab="Primer factor",
          ylab="Tercer factor", main="scores con factor I y III con PCFA",
          pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,1], FS.est.1[,3], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```

scores con factor I y III con PCFA



Factor II y III

```
p13<-plot(FS.est.1[,2], FS.est.1[,3], xlab="Segundo factor",
          ylab="Tercer factor", main="scores con factor II y III con PCFA",
          pch=19, col="blue")
text(FS.est.1[,2], FS.est.1[,3], labels = rownames(x), pos=4, col="blue")
```

scores con factor II y III con PCFA

