




# 第七章 数值积分

- 
- 积分简介
  - 组合梯形公式和辛普森公式
  - 递归公式和龙贝格积分
  - 自适应积分

# ■ 数值积分可用于计算无法解析求解的定积分的近似解


exm\_1.m

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{t^3}{e^t - 1} dt$$

```
f=@(t) t.^3./(exp(t)-1);  
S=quad(f,a,b,tol);
```

$x$	$\Phi(x)$
-----	-----------

1.0000000000000000	0.2248051900000000
2.0000000000000000	1.1763426000000000
3.0000000000000000	2.5522184500000000
4.0000000000000000	3.8770541700000000
5.0000000000000000	4.8998921600000000
6.0000000000000000	5.5858553800000000
7.0000000000000000	6.0031689600000000
8.0000000000000000	6.2396238000000000
9.0000000000000000	6.3665739000000000
10.0000000000000000	6.4319219000000000



## ■ 1.积分简介

- 定义：设  $a = x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_M = b$ ,  
称形如：

$$Q[f] = \sum_{k=0}^M w_k f(x_k)$$

且具有性质

$$\int_a^b f(x) dx = Q[f] + E[f]$$

的公式为数值积分或面积公式,  $E[f]$ 称为截断误差,  $\{x_k\}_{k=0}^M$  为节点,  $\{w_k\}_{k=0}^M$  称为权。

- 定义：面积公式的精度为  $n$ ，使得当次数  $i \leq n$  的多项式  $P_i(x)$ ，都满足  $E[P_i] = 0$ ，对某些次数为  $n + 1$  的多项式，有  $E[P_{n+1}] \neq 0$ 。

截断误差的一般形式为

$$E[f] = Kf^{(n+1)}(c)$$

$n$  为精度

- 基于多项式插值做面积公式推导，过  $M+1$  个等距点  $\{x_k, f(x_k)\}_{k=0}^M$ ，存在唯一的次数小于等于  $M$  的多项式  $P_M(x)$ ；用多项式来近似  $[a, b]$  区间上的函数  $f(x)$ ， $P_M(x)$  的积分近似  $f(x)$  的积分。
- 取  $x_0 = a, x_M = b$ ，得到闭型牛顿-科特斯公式

## ■ 闭型牛顿-科特斯公式

设等距节点  $x_k = x_0 + hk$ ,  $f_k = f(x_k)$ , 得到前4个闭型牛顿-科特斯公式面积公式:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f_0 + f_1) \quad (\text{梯形公式})$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2) \quad (\text{辛普森公式})$$

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx \approx \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3) \quad (\text{辛普森}\frac{3}{8}\text{公式})$$

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx \approx \frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4) \quad (\text{布尔公式})$$

$$h = (b - a) / n$$

## ■ 牛顿-科特斯公式精度

设  $f(x)$  充分可微, 则

### ■ 梯形公式精度为 $n=1$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx = \frac{h}{2}(f_0 + f_1) - \frac{h^3}{12} f^{(2)}(c)$$

### ■ 辛普森公式精度为 $n=3$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(c)$$

### ■ 辛普森 $\frac{3}{8}$ 公式精度为 $n=3$

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx = \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3) - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(c)$$

### ■ 布尔公式精度为 $n=5$

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx = \frac{2h}{45}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4) - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(c)$$



- 证明简述:
- 由拉格朗日多项式逼近函数

$$f(x) \approx P_M(x) = \sum_{k=0}^M f_k L_{M,k}(x)$$

可得到

$$\int_{x_0}^{x_M} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_M} P_M(x) dx = \sum_{k=0}^M \left( \int_{x_0}^{x_M} L_{M,k}(x) dx \right) f_k = \sum_{k=0}^M w_k f_k$$

计算权  $w_k$  时, 利用变量替换  $x = x_0 + ht$   $dx = hdt$   
再利用等距节点条件  $x_k = x_0 + hk$ , 对多项式进行积分可得结果。

- 例：考虑函数  $f(x) = 1 + e^{-x} \sin(4x)$  在区间  $[0, 1]$  上的积分。  
[exm\\_2.m](#)

- 梯形公式,  $h = 1$ ,  $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(0) + f(1)) = 0.86079$

- 辛普森公式,  $h = \frac{1}{2}$ ,  
 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1/2}{3} (f(0) + 4f(\frac{1}{2}) + f(1)) = 1.32128$

- 辛普森  $\frac{3}{8}$  公式,  $h = \frac{1}{3}$   
 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3 \cdot (1/3)}{8} (f(0) + 3f(\frac{1}{3}) + 3f(\frac{2}{3}) + f(1)) = 1.31440$

- 布尔公式,  $h = \frac{1}{4}$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{2 \cdot (1/4)}{45} (7f(0) + 32f(\frac{1}{4}) + 12f(\frac{2}{4}) + 32f(\frac{3}{4}) + 7f(1)) = 1.30859$$

- 准确值:  $\int_0^1 f(x) dx = 1.3082506046426$

## ■ 2.组合梯形公式和辛普森公式

- 曲线  $y = f(x)$  的面积可用区间  $\{[x_k, x_{k+1}]\}$  上的一系列梯形面积来近似。


$$f(x) = 2 + \sin(2\sqrt{x})$$

$$[1, 6], h=0.5$$

组合梯形:  $T=8.193854565$

精确值:  $\text{Int}_f=8.183479207$

组合辛普森  $S=8.183015494$



exm\_3.m

## ■ 组合梯形公式

- 设等距节点  $[x_k, x_{k+1}], k = 0, \dots, M$ ，将区间  $[a, b]$  划分为宽度为  $h = (b - a) / M$  的  $M$  个子区间  $x_k = a + kh$ ，则组合梯形公式为：

$$T(f, h) = \frac{h}{2} \sum_{k=1}^M (f(x_{k-1}) + f(x_k)) = \frac{h}{2} (f_0 + f_M) + h \sum_{k=1}^{M-1} f(x_k)$$

- 证明：在每个子区间  $[x_{k-1}, x_k], k = 1, \dots, M$  应用梯形公式，并利用区间积分的可加性，得

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^M \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^M \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k))$$

## ■ 组合辛普森公式

- 设  $x_k = a + kh$ ,  $k = 0, \dots, 2M$ , 将区间  $[a, b]$  划分为  $2M$  个宽度为  $h = (b - a) / 2M$  的等距子区间  $[x_k, x_{k+1}]$ , 则组合辛普森公式为:

$$\begin{aligned} S(f, h) &= \frac{h}{3} \sum_{k=1}^M (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})) \\ &= \frac{h}{3} (f(a) + f(b)) + \frac{2h}{3} \sum_{k=1}^{M-1} f(x_{2k}) + \frac{4h}{3} \sum_{k=1}^M f(x_{2k-1}) \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx S(f, h)$$

- 误差分析（利用拉格朗日多项式及误差界）
- 组合梯形公式的误差项为：

$$E_T(f, h) = \frac{-(b-a)f^{(2)}(c)h^2}{12} = O(h^2)$$

- 组合辛普森公式的误差项为：

$$E_S(f, h) = \frac{-(b-a)f^{(4)}(c)h^4}{180} = O(h^4)$$

- 例：对函数  $f(x) = 1/x$ ，在区间  $[2, 7]$ ，分别使  $E_T(f, h)$ 、 $E_S(f, h)$  小于  $5 \times 10^{-9}$ ，计算  $M$  和步长  $h$

- 组合梯形公式：
$$E_T(f, h) = \frac{-(b-a)f^{(2)}(c)h^2}{12}$$

$$|f^{(2)}(c)| \leq |f^{(2)}(2)| = |2/2^3| = \frac{1}{4}$$

$$|E_T(f, h)| = \frac{|-(b-a)f^{(2)}(c)h^2|}{12} \leq \frac{5h^2}{48}$$

- $h = (b-a)/M = 5/M,$

$$M \geq 22821.77 \sim 22822$$

$$h = 5/M = 0.000219086846$$

## ■ 组合辛普森:

$$E_s(f, h) = \frac{-(b-a)f^{(4)}(c)h^4}{180} = O(h^4)$$

$$|f^{(4)}(c)| \leq |f^{(4)}(2)| = |24 / 2^5| = \frac{3}{4}$$

$$|E_s(f, h)| = \frac{|-(b-a)f^{(4)}(c)h^4|}{180} \leq \frac{h^4}{48}$$

$$h = (b-a) / 2M = 5/2M$$

$$M \geq 112.95 \sim 113$$

exm\_4.m

$$h = 5/2M = 0.02212389381$$



### ■ 3.递归公式及龙贝格积分

- 用梯形公式的线性组合计算辛普森逼近;
- [连续梯形公式] 设  $J \geq 1$ , 点  $\{x_k = a + kh\}$ , 将  $[a, b]$  划分为  $2^J = 2M$  个宽度为  $(b-a)/2^J$  的子区间, 梯形公式  $T(f, h)$ 、 $T(f, 2h)$  满足关系:

$$T(f, h) = \frac{T(f, 2h)}{2} + h \sum_{k=1}^M f(x_{2k-1})$$

证明:

■ 记  $T(0) = \frac{h}{2}(f(a) + f(b))$ ，即步长为  $h = (b - a)$  的梯形公式；

■  $T(J) = T(f, h)$  为步长  $h = (b - a) / 2^J$  的梯形公式；  $J \geq 1$

■ 对偶节点  $x_0, x_2, \dots, x_{2M}$ ，使用步长为  $2h$  的组合梯形公式，有

$$T(J-1) = \frac{2h}{2}(f_0 + 2f_2 + \dots + 2f_{2M-2} + f_{2M})$$

■ 对全部节点  $x_0, x_1, \dots, x_{2M}$ ，使用步长为  $h$  的组合梯形公式，有

$$T(J) = \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + \dots + 2f_{2M-1} + f_{2M})$$

- 将下标中奇数项和偶数项分开，得到

$$T(J) = \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + \cdots + 2f_{2M-1} + f_{2M})$$

并由

$$= \frac{h}{2}(f_0 + 2f_2 + \cdots + 2f_{2M-2} + f_{2M}) + h \sum_{k=1}^M f_{2k-1}$$

$$T(J-1) = \frac{2h}{2}(f_0 + 2f_2 + \cdots + 2f_{2M-2} + f_{2M})$$

可得到

$$T(J) = \frac{T(J-1)}{2} + h \sum_{k=1}^M f(x_{2k-1})$$

- 而  $T(J) = T(f, h)$  ,  $T(J-1) = T(f, 2h)$

■ 例. 函数  $f(x) = 1/x$  , 区间  $[1, 5]$ 。

$$h = (b - a) = 4 \quad T(0) = \frac{4}{2}(f(1) + f(5))$$

$$J=1 \quad h = (b - a)/2 = 2 \quad T(1) = \frac{T(0)}{2} + 2(f(3))$$

$$J=2 \quad h = (b - a)/2^2 = 1 \quad T(2) = \frac{T(1)}{2} + 1(f(2) + f(4))$$

$$J=3 \quad h = (b - a)/2^3 = 1/2$$

$$T(3) = \frac{T(2)}{2} + \frac{1}{2}(f(1.5) + f(2.5) + f(3.5) + f(4.5))$$

注意:  $f_0 = f(1)$

■ 梯形公式与辛普森公式之间关系：

[递归辛普森公式]：记步长  $h = (b - a) / 2^J, 2^J = 2M$   
的辛普森公式为  $S(J) = S(f, h)$

$$S(f, h) = \frac{h}{3}(f(a) + f(b)) + \frac{2h}{3} \sum_{k=1}^{M-1} f(x_{2k}) + \frac{4h}{3} \sum_{k=1}^M f(x_{2k-1})$$

■ 则有

$$S(J) = \frac{4T(J) - T(J-1)}{3}$$

$$J = 1, 2, \dots$$

■ 证明：步长为  $h$  的梯形公式为

$$T(J) = \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + \cdots + 2f_{2M-1} + f_{2M})$$

步长为  $2h$  的梯形公式为

$$T(J-1) = \frac{2h}{2}(f_0 + 2f_2 + \cdots + 2f_{2M-2} + f_{2M})$$

$$4T(J) - T(J-1) = 2h(f_0 + 2f_1 + \cdots + 2f_{2M-1} + f_{2M})$$

$$- \frac{2h}{2}(f_0 + 2f_2 + \cdots + 2f_{2M-2} + f_{2M})$$

$$= h(f_0 + 4f_1 + 2f_2 \cdots + 4f_{2M-1} + f_{2M})$$

$$= h(f_0 + f_{2M}) + 2h \sum_{k=1}^{M-1} f_{2k} + 4h \sum_{k=1}^M f_{2k-1}$$

- 比较可得

$$S(J) = \frac{4T(J) - T(J-1)}{3}$$

## ■ 组合布尔公式

- 区间 $[a, b]$ ，宽度 $h = (b - a) / 4M$ 的4个等距子区间上，各自应用布尔公式，得到组合布尔公式：

$$B(f, h) = \frac{2h}{45} \sum_{k=1}^M (7f_{4k-4} + 32f_{4k-3} + 12f_{4k-2} + 32f_{4k-1} + 7f_{4k})$$

## ■ 递归布尔公式：

- $B(J)$  为区间 $[a, b]$ 上  $2^J, J \geq 2$  个子区间的布尔公式，与辛普森公式关系为

$$B(J) = \frac{16S(J) - S(J-1)}{15}, J = 2, 3, \dots$$



## ■ 龙贝格积分

### ■ 组合公式及其误差项

$$\int_a^b f(x)dx = T(f, h) + O(h^2) \quad (\text{组合梯形公式})$$

$$\int_a^b f(x)dx = S(f, h) + O(h^4) \quad (\text{组合辛普森公式})$$

$$\int_a^b f(x)dx = B(f, h) + O(h^6) \quad (\text{组合布尔公式})$$

- 推广： 设用步长  $h$  和  $2h$  得到逼近公式的两个结果， 则两个结果的代数运算得到改进， 误差项的阶由  $O(h^{2^N})$  提高到  $O(h^{2^{N+2}})$ ， 该过程称为龙贝格积分。

- [龙贝格积分的理查森改进]:

- 给定  $Q$  的两个逼近  $R(2h, K-1)$  和  $R(h, K-1)$

- 满足

$$Q = R(h, K-1) + c_1 h^{2K} + c_2 h^{2K+2} + \dots$$

$$Q = R(2h, K-1) + c_1 4^K h^{2K} + c_2 4^{K+1} h^{2K+2} + \dots$$

- 其改进的逼近形式为

$$Q = \frac{4^K R(h, K-1) - R(2h, K-1)}{4^K - 1} + O(h^{2K+2})$$

- 一般公式

- 定义 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 的面积公式序列

$$\{R(J,K):J \geq K\}_{J=0}^{\infty}$$

为:

$$R(J,0) = T(J), J \geq 0, \quad \text{连续梯形公式}$$

$$R(J,1) = S(J), J \geq 1, \quad \text{连续辛普森公式}$$

$$R(J,2) = B(J), J \geq 2, \quad \text{连续布尔公式}$$

- 则有一般形式:

$$R(J,K) = \frac{4^K R(J,K-1) - R(J-1,K-1)}{4^K - 1}, \quad J \geq K$$

- [龙贝格积分精度]: 设  $f \in C^{2K+2}[a,b]$ , 则龙贝格逼近的截断误差由公式

$$\int_a^b f(x)dx = R(J,K) + b_K h^{2K+2} f^{(2K+2)}(c_{J,K})$$

给出, 其中  $h = (b-a) / 2^J$ ,  $c_{J,K} \in [a,b]$   
 $= R(J,K) + O(h^{2K+2})$

## ■ 4. 自适应积分

- 采用变步长方法，基础是辛普森公式；

$$S(a_k, b_k) = \frac{h}{3} (f(a_k) + 4f(c_k) + f(b_k))$$

其中  $c_k = (a_k + b_k) / 2$

- 如果  $f \in C^4[a_k, b_k]$ ，则存在一个  $d_1 \in [a_k, b_k]$  使得

$$\int_{a_k}^{b_k} f(x) dx = S(a_k, b_k) - h^5 \frac{f^{(4)}(d_1)}{90}$$

## ■ 区间细分:

区间 $[a_k, b_k]$ 划分为相等的两个子区间 $[a_{k1}, b_{k1}]$   
 $[a_{k2}, b_{k2}]$ , 分别用辛普森公式, 得到:

$$S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) = \frac{h}{6}(f(a_{k1}) + 4f(c_{k1}) + f(b_{k1})) \\ + \frac{h}{6}(f(a_{k2}) + 4f(c_{k2}) + f(b_{k2}))$$

■ 其中  $c_{k1}$  是 $[a_{k1}, b_{k1}]$ 中点,  $c_{k2}$ 是 $[a_{k2}, b_{k2}]$ 中点。

如果 $f \in C^4[a_k, b_k]$ , 存在 $d_2 \in [a_k, b_k]$ ,

$$\int_{a_k}^{b_k} f(x)dx = S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) - \frac{h^5}{16} \frac{f^{(4)}(d_2)}{90}$$

■ 设  $f^{(4)}(d_1) \approx f^{(4)}(d_2)$  , 有

$$-h^5 \frac{f^{(4)}(d_2)}{90} \approx \frac{16}{15} (S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) - S(a_k, b_k))$$

■ 得到误差估计:

$$\left| \int_{a_k}^{b_k} f(x) dx - S(a_{k1}, b_{k1}) - S(a_{k2}, b_{k2}) \right|$$
$$\approx \frac{1}{15} |S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) - S(a_k, b_k)|$$

考虑到  $f^{(4)}(d_1) \approx f^{(4)}(d_2)$

将系数放大到  $\frac{1}{10}$

## ■ 精度测试:

■ 设对区间  $[a_k, b_k]$ , 指定容差  $\varepsilon_k > 0$

■ 如果  $\frac{1}{10} |S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) - S(a_k, b_k)| < \varepsilon_k$

则可推断  $\left| \int_{a_k}^{b_k} f(x) dx - S(a_{k1}, b_{k1}) - S(a_{k2}, b_{k2}) \right| < \varepsilon_k$

$$\begin{aligned} \text{取 } S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2}) &= \frac{h}{6} (f(a_{k1}) + 4f(c_{k1}) + f(b_{k1})) \\ &\quad + \frac{h}{6} (f(a_{k2}) + 4f(c_{k2}) + f(b_{k2})) \end{aligned}$$

逼近  $\int_{a_k}^{b_k} f(x) dx \approx S(a_{k1}, b_{k1}) + S(a_{k2}, b_{k2})$





## ■ （算法略）

- 通过不断的将区间细分，并作精度测试，并在细分的区间上误差衰减，算法将在有限步后停止。

## 思考题：

- 1.如果已知的数据点是偶数个，如何构造simpson算法。
- 2.如果已知的数据点之间步长不均匀。



- 作业:

- P252 #6 7.1.1

- P260 #2 #9 7.2.2

- P271 #1 (a) (c) 7.3.2