

Funktionen und Potenzen I

Dominik Biendara

12. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Potenzieren und Radizieren	2
1.1	Einführung in die Potenz- und Wurzelschreibweise	2
1.2	Die reellen Zahlen	4
1.3	Rechnen mit Wurzeln	7
1.4	Einfache Wurzelgleichungen	9
1.5	Potenzgesetze für natürliche und rationale Exponenten	12
2	Potenzfunktionen	16
2.1	Wiederholung Lineare Funktionen	16
2.2	Definition und Beispiele	18
2.3	Potenzfunktionen mit natürlichen Exponenten	18
2.4	Potenzfunktionen mit negativ-ganzzahligen Exponenten	19
2.5	Einfluss von Parametern auf Funktionsgraphen	20
2.6	Wichtige Eigenschaften von Funktionen	21

1 Potenzieren und Radizieren

1.1 Einführung in die Potenz- und Wurzelschreibweise

Die Mathematik dient dazu, uns einen strukturierten Überblick über die Wirklichkeit zu verschaffen und sie präzise einteilen und erfassen zu können. Eine der grundlegendsten Methoden, um beim Aufschreiben mathematischer Zusammenhänge Zeit zu sparen und Darstellungen übersichtlicher zu gestalten, ist das **Potenzieren**. Wenn man eine Zahl x wiederholt n -mal mit sich selbst multipliziert, schreibt man dies abkürzend als Potenz.

Das bedeutet anstatt

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n\text{-mal}}$$

zu schreiben kann man kurz

$$2^n$$

schreiben.

Definition 1.1 (Die Potenz). Eine Potenz ist eine „Kurzschreibweise“ für ein **produkt aus gleichen Faktoren**

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a_{n\text{-mal}}$$

Dabei nennt man die Zahl a die **Basis** und das hochgestellte n ist der **Exponent**.

Insbesondere gelten folgende wichtige Regeln:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

Beispiel 1.2.

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

$$(-15)^2 = (-15) \cdot (-15) = 225$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{27}{64}$$

$$(5x)^3 = 5x \cdot 5x \cdot 5x = 125x^3$$

Potenzen mit negativem Exponenten

Positive Exponenten kann man nutzen, um sehr große Zahlen darzustellen, wie beispielsweise

$$12.000.000 = 12 \cdot 10^6 = 1,2 \cdot 10^7$$

Andersherum kann man aber auch sehr kleine Zahlen mit negativem Exponenten darstellen

$$0,000.000.013 = 13 \cdot 10^{-9}$$

Definition 1.3 (Negative Exponenten). Negative Exponenten Setzen die Potenz in das **Reziproke** eines Bruchs.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Dabei ist wichtig, dass $a \neq 0$, weil dann für jede Potenz *durch Null dividiert werden würde*.

Beispiel 1.4.

$$10^{-3} = 0,001$$

$$(2)^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$(-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^3} = -\frac{1}{27}$$

$$\left(-\frac{13}{15}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{13}{15}\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{169}{225}\right)} = \frac{225}{169}$$

Das Umkehren des Potenzierens - Wurzeln ziehen

Doch wie lässt sich das bilden einer Potenz wieder umkehren? So wie die Subtraktion das Gegenstück zur Addition ist, gibt es auch für das Potenzieren eine sogenannte Umkehroperation: das **Radizieren** (Wurzelziehen).

Beispiel 1.5 (Einführungsbeispiel).

Ein Baumarkt verkauft Quadratplatten mit einer Fläche von 1125m^2 . Berechne die Seitenlänge des Quadrates.

Lösung: $A = 1125\text{m}^2 \rightarrow A = a^2 \rightarrow a = \sqrt{1125\text{m}^2} = 33,07\text{m}$

Definition 1.6 (Radizieren). Potenzieren kann man durch Radizieren (Wurzelziehen) umkehren.

Für alle nichtnegativen Zahlen b gilt:

$$\sqrt[n]{b} = a \iff a^n = b \quad (\forall n \geq 2, n \in \mathbb{Q})$$

Man bezeichnet dies als **n-te Wurzel von b**.

Beispiel 1.7. ¹

$$\sqrt[3]{8} = 2, \text{ weil } 2^3 = 8$$

$$\sqrt[5]{32} = 2, \text{ weil } 2^5 = 32$$

$$\sqrt[6]{1.000.000} = 10, \text{ weil } 10^6 = 1 \text{ Mio.}$$

$$\sqrt[2]{\frac{169}{256}} = \frac{13}{16}, \text{ weil } \left(\frac{13}{16}\right)^2 = \frac{169}{256}$$

1.2 Die reellen Zahlen**Ein einführendes Beispiel**

Ein Vater will einen Sandkasten für seine Zwillinge bauen. Er überlegt: „Ich möchte einen quadratischen Sandkasten bauen. Wenn ich die Größe zu 1 m^2 wähle, dann hat nur ein Kind platz zum spielen. Also muss ich die doppelte Fläche wählen“.

- a) Wie lang ist eine Seite des quadratischen Sandkastens
- b) Zeichne die Länge der Seite mal auf einem Zahlenstrahl ein. Versuche eine Möglichkeit zu finden, dies so genau wie möglich zeichnen. (*Hinweis: 1 m^2 - Kasten betrachten und den Zirkel nutzen*)

Lösung zu a) Berechnung der Seitenlänge

Wenn der neue Sandkasten die doppelte Fläche des alten (1 m^2) haben soll, beträgt seine Zielfläche $A = 2 \text{ m}^2$.

Für die Fläche eines quadratischen Sandkastens gilt $A = a^2$, wobei a die Seitenlänge ist. Um die Seitenlänge zu ermitteln, ziehen wir die Wurzel:

$$a^2 = 2 \text{ m}^2 \implies a = \sqrt{2} \text{ m} \approx 1,41 \text{ m}$$

Die Seite des quadratischen Sandkastens muss also exakt $\sqrt{2} \text{ m}$ lang sein.


Lösung zu b) Zeichnung auf dem Zahlenstrahl

Da sich $\sqrt{2}$ als irrationale Zahl nicht als exakter Dezimalbruch messen lässt², nutzen wir zur Konstruktion den Satz des Pythagoras ($a^2 + b^2 = c^2$). Wir betrachten ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 m (den ursprünglichen Kasten). Dessen Diagonale hat die Länge $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

1. Zeichne einen Zahlenstrahl.
2. Errichte bei der Markierung 1 eine Senkrechte der Länge 1 (das entspricht der Seite des 1 m^2 -Kastens).
3. Verbinde den Nullpunkt (0) mit der Spitze dieser Senkrechten. Diese Diagonale hat exakt die Länge $\sqrt{2}$.
4. Stich mit dem Zirkel in die 0 ein, nimm die Länge der Diagonalen in den Zirkel und ziehe einen Kreisbogen nach unten auf den Zahlenstrahl.
5. Der Schnittpunkt markiert die exakte Position von $\sqrt{2}$.

¹Die 2 bei der sogenannten **Quadratwurzel** muss nicht explizit hingeschrieben werden. Wenn keine Zahl bei der Wurzel angegeben ist, wird damit **immer die 2 gemeint**

²das werden wir gleich noch sehen warum das so ist



Zu welchem Zahlenbereich gehört $\sqrt{2}$

Satz 1.8. Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational, das heißt $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Beweis. Wir führen den Beweis durch Widerspruch.

Annahme: Wir nehmen an, dass $\sqrt{2}$ eine rationale Zahl ist. Dann lässt sich $\sqrt{2}$ als Bruch zweier natürlicher Zahlen p und q darstellen, wobei $q \neq 0$ gilt. Wir können zudem ohne Einschränkung annehmen, dass dieser Bruch vollständig gekürzt ist, die Zahlen p und q also **teilerfremd** sind. Es gilt:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

Wir quadrieren beide Seiten der Gleichung:

$$2 = \frac{p^2}{q^2}$$

Durch Multiplikation mit q^2 erhalten wir:

$$2q^2 = p^2$$

Da die linke Seite offensichtlich ein Vielfaches von 2 ist, muss p^2 eine gerade Zahl sein. Da das Quadrat einer ungeraden Zahl stets wieder ungerade ist, muss demnach auch p selbst eine gerade Zahl sein. Wir können p also darstellen als $p = 2k$ für eine natürliche Zahl k .

Wir setzen $p = 2k$ in unsere obige Gleichung ein:

$$\begin{aligned} 2q^2 &= (2k)^2 \\ 2q^2 &= 4k^2 \end{aligned}$$

Teilen wir nun beide Seiten durch 2, folgt:

$$q^2 = 2k^2$$

Mit demselben Argument wie zuvor sehen wir, dass q^2 gerade ist, weshalb auch q eine gerade Zahl sein muss.

Widerspruch: Wir haben nun geschlussfolgert, dass sowohl p als auch q gerade Zahlen sind. Das bedeutet, dass beide mindestens den gemeinsamen Teiler 2 besitzen. Dies steht jedoch im direkten Widerspruch zu unserer anfänglichen Annahme, dass der Bruch $\frac{p}{q}$ bereits vollständig gekürzt ist.

Da die Annahme zu einem logischen Widerspruch geführt hat, muss sie falsch gewesen sein. **Somit ist $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl.** $\square$

Wir haben im vorherigen Beweis gesehen, dass sich $\sqrt{2}$ unmöglich als Bruch darstellen lässt. Sie gehört also nicht zur Menge der rationalen Zahlen ($\mathbb{Q}$). Gleichzeitig haben wir aber bei der Konstruktion des Sandkastens (Aufgabe b) herausgefunden, dass $\sqrt{2}$ eine ganz konkrete, messbare Länge ist. Wir konnten sie mit dem Zirkel exakt auf dem Zahlenstrahl einzeichnen.

Das führt uns zu einer verblüffenden Erkenntnis: Obwohl es unendlich viele Brüche gibt und sie extrem dicht gedrängt auf dem Zahlenstrahl liegen, ist der Zahlenstrahl noch *löchrig*. Die Zahl $\sqrt{2}$ (und viele andere Zahlen wie beispielsweise π) fallen genau in diese Lücken.

Da wir in der Mathematik aber alle Längen und Punkte auf einem durchgehenden, lückenlosen Zahlenstrahl beschreiben wollen, müssen wir unseren Zahlenbereich erweitern. Wir nennen diese neuen, nicht als Bruch darstellbaren Zahlen **irrationale Zahlen** (abgeleitet vom lateinischen *ratio* = das Verhältnis / der Bruch; irrational bedeutet hier also anschaulich „nicht als Bruch darstellbar“).


Fassen wir nun unsere alten und diese neuen Zahlen zusammen, erhalten wir einen vollständigen Zahlenbereich.

Definition 1.9 (Reelle Zahlen $\mathbb{R}$). Die Menge der rationalen Zahlen ($\mathbb{Q}$) und die Menge der irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der **reellen Zahlen**. Sie wird mit dem Symbol $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Anschaulich bedeutet das für den Zahlenstrahl:

- Jede reelle Zahl entspricht genau einem Punkt auf dem Zahlenstrahl.
- Jeder Punkt auf dem Zahlenstrahl entspricht genau einer reellen Zahl.

Man sagt: Die reellen Zahlen füllen den Zahlenstrahl *lückenlos* aus.



Wie liest man dieses Diagramm?

Das Diagramm zeigt, wie die verschiedenen Zahlenmengen wie Schachteln ineinanderliegen:

- **Die Schnittmenge in der Mitte:** Die orangene und die gelbe Menge überschneiden sich. Wenn eine Zahl sowohl zu den ganzen Zahlen ($\mathbb{Z}$) als auch zu den positiven rationalen Zahlen ($\mathbb{Q}^+$) gehört, muss sie eine *positive, ganze Zahl* sein. Das sind exakt unsere natürlichen Zahlen ($\mathbb{N}$).

- **Die Null:** Die 0 ist zwar eine ganze Zahl, aber nicht positiv (sie hat kein Vorzeichen). Daher liegt sie im orangenen Bereich von $\mathbb{Z}$, aber *außerhalb* der natürlichen Zahlen.
- **Die rationalen Zahlen ($\mathbb{Q}$):** Das grüne Oval umschließt alles bisherige. Jede natürliche oder ganze Zahl lässt sich auch als Bruch schreiben (z. B. $3 = \frac{3}{1}$). Im reinen grünen Bereich finden wir zudem die negativen Brüche, die in keine der inneren Mengen passen.
- **Die reellen Zahlen ($\mathbb{R}$):** Die größte, blaue Menge umschließt alle Zahlen, die wir auf dem Zahlenstrahl finden können. Im blauen Randbereich – strikt getrennt von den rationalen Brüchen – schwimmen unsere neu entdeckten **irrationalen Zahlen** wie $\sqrt{2}$ oder π .

1.3 Rechnen mit Wurzeln

Nachdem wir nun wissen, was Wurzeln sind und dass sie uns in die Welt der reellen Zahlen führen, wollen wir uns ansehen, wie man mit ihnen rechnet. Da das Radizieren die Umkehroperation zum Potenzieren ist, gelten hier für die Multiplikation und Division ganz ähnliche, praktische Rechenregeln.

Satz 1.10 (Multiplikation von Wurzeln). *Für alle nichtnegativen reellen Zahlen a und b ($a, b \geq 0$) gilt:*

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

Man darf also zwei Wurzeln miteinander multiplizieren, indem man ihre Radikanden (die Zahlen unter der Wurzel) multipliziert und daraus die gemeinsame Wurzel zieht.

Beispiel 1.11.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{5x} \cdot \sqrt{5x} = \sqrt{25x^2} = 5x \quad (\text{für } x \geq 0)$$

Satz 1.12 (Division von Wurzeln). *Für alle nichtnegativen reellen Zahlen $a \geq 0$ und positive reelle Zahlen $b > 0$ gilt:*

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Man darf zwei Wurzeln durcheinander dividieren, indem man die Radikanden dividiert und daraus die gemeinsame Wurzel zieht. Das gilt natürlich auch, wenn die Division als Bruch geschrieben wird.

Beispiel 1.13.

$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6}$$

Achtung: Die häufigste Fehlerquelle!

Bei der Addition und Subtraktion gibt es **kein** solches Gesetz! Wurzeln dürfen **nicht** einfach addiert oder subtrahiert werden, indem man die Zahlen unter der Wurzel zusammenfasst.

Bemerkung. Für Addition und Subtraktion gilt im Allgemeinen:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

Man kann sich das ganz leicht an einem einfachen Zahlenbeispiel klarmachen. Wenn wir zuerst unter der Wurzel addieren, erhalten wir:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Ziehen wir aber die Wurzeln einzeln und addieren danach, kommt etwas anderes heraus:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

Da $5 \neq 7$, sieht man sofort, dass man die Wurzel bei Addition und Subtraktion nicht aufteilen darf!

Teilweises Radizieren

Oft haben wir es mit Wurzeln zu tun, die nicht glatt aufgehen, weil die Zahl unter der Wurzel (der Radikand) keine Quadratzahl ist (wie z. B. $\sqrt{12}$). In vielen Fällen können wir den Ausdruck aber trotzdem vereinfachen. Das nennt man **teilweises Radizieren** (oder auch „teilweise die Wurzel ziehen“).

Die Idee dahinter ist, das Wurzelgesetz für die Multiplikation einfach „rückwärts“ anzuwenden. Wir zerlegen die Zahl unter der Wurzel so in ein Produkt, dass einer der Faktoren eine **Quadratzahl** (4, 9, 16, 25, 36, ...) ist. Aus dieser Quadratzahl können wir dann die Wurzel ziehen.

Satz 1.14 (Teilweises Radizieren). *Lässt sich der Radikand in ein Produkt aus einer Quadratzahl a^2 und einem weiteren positiven Faktor b zerlegen, kann man die Wurzel teilweise ziehen:*

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = a \cdot \sqrt{b}$$

Oft lässt man das Malzeichen danach weg und schreibt kurz $a\sqrt{b}$.

Beispiel 1.15. Wir suchen nach der größtmöglichen Quadratzahl, durch die der Radikand teilbar ist:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{x^3} = \sqrt{x^2 \cdot x} = x\sqrt{x} \quad (\text{für } x \geq 0)$$

Bemerkung (Wofür braucht man das?). Wir haben im vorherigen Abschnitt gesehen, dass man Wurzeln **nicht** einfach addieren darf ($\sqrt{8} + \sqrt{18} \neq \sqrt{26}$).

Durch das teilweise Radizieren können wir aber manchmal „gleichnamige“ Wurzeln erzeugen. Diese lassen sich dann wie Variablen (z. B. $2x + 3x = 5x$) zusammenfassen:

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = \sqrt{4 \cdot 2} + \sqrt{9 \cdot 2} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

1.4 Einfache Wurzelgleichungen

Bisher kannten wir Gleichungen, bei denen die gesuchte Variable (meistens x) als normale Zahl oder als Bruch vorkam. Nun betreten wir neues Terrain: Die Variable x ist unter einer Wurzel „gefangen“.

Definition 1.16 (Wurzelgleichung). Eine **Wurzelgleichung** ist eine Gleichung, bei der die unbekannte Variable (z. B. x) unter einer Wurzel (dem Radikanden) steht.


Beispiele für Wurzelgleichungen:

$$\sqrt{x} = 4 \quad \text{oder} \quad 3\sqrt{2x-1} = 15$$

Grafische Bedeutung und Grundprinzip

Bevor wir anfangen zu rechnen, schauen wir uns an, was eine Gleichung wie $\sqrt{x} = 3$ eigentlich grafisch bedeutet.

Wir können uns die linke Seite der Gleichung als eine Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ vorstellen und die rechte Seite als eine waagerechte Linie $y = 3$. Das Lösen der Gleichung ist nichts anderes als die Suche nach dem **Schnittpunkt** dieser beiden Linien.



Um die Variable x aus ihrem „Gefängnis“ (der Wurzel) zu befreien, müssen wir die Umkehroperation zum Wurzelziehen anwenden: **Wir müssen quadrieren.**

Der 4-Schritte-Plan zum Lösen von Wurzelgleichungen

Wurzelgleichungen lassen sich sehr systematisch lösen, wenn man sich strikt an die folgende Reihenfolge hält:

Schritt 1: Wurzel isolieren: Bringe die Wurzel durch Äquivalenzumformungen (+, −, ·, :) alleine auf eine Seite der Gleichung.

Schritt 2: Quadrieren: Quadriere *beide Seiten* der Gleichung komplett. Dadurch verschwindet das Wurzelzeichen.

Schritt 3: Auflösen: Löse die entstandene Gleichung nach x auf.

Schritt 4: Probe machen (Zwingend erforderlich!): Setze das berechnete x in die *ursprüngliche* Gleichung ein. Nur wenn eine wahre Aussage herauskommt, ist es wirklich eine Lösung.

Beispiel 1.17 (Einfaches Vorrechnen). Löse die Gleichung $2\sqrt{x} - 4 = 6$.

$$\begin{array}{ll} 2\sqrt{x} - 4 = 6 & | + 4 \quad (\text{Schritt 1: Isolieren vorbereiten}) \\ 2\sqrt{x} = 10 & | : 2 \quad (\text{Schritt 1: Wurzel ganz alleine stellen}) \\ \sqrt{x} = 5 & | (\dots)^2 \quad (\text{Schritt 2: Beide Seiten quadrieren}) \\ x = 25 & (\text{Schritt 3: Aufgelöst!}) \end{array}$$

Schritt 4: Die Probe

Wir setzen $x = 25$ in die allererste Gleichung ein:

$$\begin{array}{ll} 2\sqrt{25} - 4 = 6 \\ 2 \cdot 5 - 4 = 6 \\ 10 - 4 = 6 \\ 6 = 6 & (\text{Wahre Aussage!}) \end{array}$$

Die Lösungsmenge ist somit $\mathbb{L} = \{25\}$.

Warum ist die Probe zwingend erforderlich?

Bisher war die Probe beim Gleichungslösen oft nur eine freiwillige Kontrolle für Klausuren, um Rechenfehler zu finden. Bei Wurzelgleichungen ist das anders: **Die Probe gehört zwingend zur Lösung dazu!**

Warum ist das so? Das Quadrieren ist **keine Äquivalenzumformung**. Das bedeutet: Beim Quadrieren können aus falschen Aussagen plötzlich wahre Aussagen werden. Man nennt dies auch die Erzeugung von „Scheinlösungen“.

Bemerkung (Die Gefahr beim Quadrieren). Jeder weiß, dass -3 und 3 nicht dasselbe sind:

$$-3 \neq 3$$

Wenn wir nun aber beide Seiten quadrieren, passiert Folgendes:

$$\begin{array}{l} (-3)^2 = 3^2 \\ 9 = 9 \end{array}$$

Plötzlich stimmt die Gleichung! Das Quadrieren ist wie ein Radiergummi für Minuszeichen. Es „vergisst“, ob die Zahl ursprünglich positiv oder negativ war.

Um zu verstehen, wie uns das bei Wurzelgleichungen in die Falle locken kann, betrachten wir folgendes Beispiel:

Beispiel 1.18 (Die Falle der Scheinlösung). Löse die Gleichung $\sqrt{x} + 7 = 3$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x} + 7 &= 3 & | -7 \\ \sqrt{x} &= -4 & | (\dots)^2 \\ x &= 16\end{aligned}$$

Hurra, $x = 16$! Wir sind fertig. Oder? Machen wir die **Probe**:

$$\begin{aligned}\sqrt{16} + 7 &= 3 \\ 4 + 7 &= 3 \\ 11 &= 3 & \textbf{(Falsche Aussage! Widerspruch!)}\end{aligned}$$


Die Gleichung hat in Wahrheit **keine Lösung** ($\mathbb{L} = \{\}$), obwohl wir beim Rechnen

$$x = 16$$

herausbekommen haben. Die 16 ist eine Scheinlösung, die nur durch das Quadrieren des Minuszeichens entstanden ist.

Grafische Erklärung der Scheinlösung:

Wenn wir uns $\sqrt{x} = -4$ grafisch ansehen, wird sofort klar, warum es keine Lösung geben kann. Die normale Wurzelfunktion verläuft immer oberhalb der x-Achse (sie ist immer positiv oder null). Die Linie $y = -4$ verläuft tief unten im Negativen. Die beiden Linien werden sich **niemals** treffen!



Weitere Übungsbeispiele

Zum Abschluss betrachten wir noch zwei komplexere Beispiele, bei denen unter der Wurzel nicht nur ein einfaches x steht, sondern ein ganzer Term. Das Prinzip bleibt aber exakt gleich!

Beispiel 1.19 (Gleichung mit linearem Term unter der Wurzel). Löse die Gleichung $\sqrt{3x - 2} = 4$.

$$\begin{aligned}\sqrt{3x - 2} &= 4 & | (\dots)^2 & \text{(Wurzel ist bereits isoliert!)} \\ 3x - 2 &= 16 & | +2 \\ 3x &= 18 & | :3 \\ x &= 6\end{aligned}$$

Probe:

$$\begin{aligned}\sqrt{3 \cdot 6 - 2} &= 4 \\ \sqrt{18 - 2} &= 4 \\ \sqrt{16} &= 4 \\ 4 &= 4 \quad (\text{Wahr!}) \implies \mathbb{L} = \{6\}\end{aligned}$$

Beispiel 1.20 (Zuerst isolieren, dann Klammer beachten). Löse die Gleichung $5 - \frac{1}{2}\sqrt{x+1} = 2$.

$$\begin{aligned}5 - \frac{1}{2}\sqrt{x+1} &= 2 & | -5 \\ -\frac{1}{2}\sqrt{x+1} &= -3 & | \cdot (-2) \quad (\text{Wurzel isolieren}) \\ \sqrt{x+1} &= 6 & | (\dots)^2 \\ x+1 &= 36 & | -1 \\ x &= 35\end{aligned}$$

Probe:

$$\begin{aligned}5 - \frac{1}{2}\sqrt{35+1} &= 2 \\ 5 - \frac{1}{2}\sqrt{36} &= 2 \\ 5 - \frac{1}{2} \cdot 6 &= 2 \\ 5 - 3 &= 2 \\ 2 &= 2 \quad (\text{Wahr!}) \implies \mathbb{L} = \{35\}\end{aligned}$$

1.5 Potenzgesetze für natürliche und rationale Exponenten

Wenn mathematische Terme lang und unübersichtlich werden, sind Potenzen unser bestes Werkzeug, um Ordnung zu schaffen. Damit wir aber Terme wie $x^3 \cdot x^5$ oder $\frac{a^7}{a^4}$ nicht jedes Mal mühsam ausschreiben müssen, nutzen wir die **Potenzgesetze**.

Diese Gesetze sind quasi die „Abkürzungen“ beim Rechnen. Wir unterteilen sie in drei große Familien, je nachdem, was bei den Potenzen gleich ist.

Potenzgesetze bei gleicher Basis

Wenn wir zwei Potenzen multiplizieren oder dividieren, die dieselbe Basis (die große Zahl unten) haben, können wir die Exponenten (die kleine Zahl oben) zusammenfassen.

Zur Veranschaulichung schauen wir uns an, was passiert, wenn wir $x^3 \cdot x^2$ ausschreiben:

$$x^3 \cdot x^2 = (x \cdot x \cdot x) \cdot (x \cdot x) = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x = x^5$$

Wir sehen: Wir haben insgesamt 5-mal das x dastehen. Wir hätten die Exponenten also auch einfach addieren können ($3 + 2 = 5$).

Satz 1.21 (Gleiche Basis). Für alle reellen Zahlen a ($a \neq 0$) und natürliche Zahlen m, n gilt:

1. Bei der Multiplikation werden die Exponenten addiert:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. Bei der Division werden die Exponenten subtrahiert:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Beispiel 1.22.

$$4^5 \cdot 4^2 = 4^{5+2} = 4^7$$

$$x^8 \cdot x^{-3} = x^{8+(-3)} = x^5$$

$$\frac{y^7}{y^3} = y^{7-3} = y^4$$

$$\frac{10^2}{10^5} = 10^{2-5} = 10^{-3} = 0,001 \quad (\text{vgl. negative Exponenten})$$

Potenzgesetze bei gleichem Exponenten

Manchmal ist nicht die Basis gleich, sondern der Exponent. Auch hier gibt es einen Trick. Wir schauen uns wieder die ausführliche Schreibweise für $2^3 \cdot 5^3$ an:

$$2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5)$$

Wenn wir die Zahlen schlau umsortieren, erhalten wir:

$$(2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3$$

Satz 1.23 (Gleicher Exponent). Für alle reellen Zahlen a, b ($b \neq 0$) und natürliche Zahlen n gilt:

1. Bei der Multiplikation werden die Basen multipliziert:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

2. Bei der Division werden die Basen dividiert:

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Beispiel 1.24.

$$3^4 \cdot x^4 = (3x)^4$$

$$0,5^5 \cdot 2^5 = (0,5 \cdot 2)^5 = 1^5 = 1$$

$$\frac{15^3}{5^3} = \left(\frac{15}{5}\right)^3 = 3^3 = 27$$

Potenzen potenzieren

Was passiert, wenn eine Potenz selbst noch einmal potenziert wird, also z. B. $(x^2)^3$? Schreiben wir es aus:

$$(x^2)^3 = x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^{2+2+2} = x^6$$

Auch hierfür gibt es eine direkte Regel:

Satz 1.25 (Potenz einer Potenz). *Für alle reellen Zahlen a und natürliche Zahlen m, n gilt: Eine Potenz wird potenziert, indem man die Exponenten **multipliziert**.*

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Beispiel 1.26.

$$(y^4)^2 = y^{4 \cdot 2} = y^8$$

$$(2^3)^{-1} = 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Rationale Exponenten: Brüche als Hochzahl

Bisher bestanden unsere Exponenten immer aus ganzen Zahlen (1, 2, 3 oder $-1, -2$). In der Mathematik weiten wir Konzepte aber gerne aus. Was bedeutet es, wenn ein Bruch im Exponenten steht? Was soll z. B. $9^{\frac{1}{2}}$ sein?

Um das herauszufinden, wenden wir unser Potenzgesetz für das Potenzieren von Potenzen an und quadrieren den Ausdruck einfach mal:

$$\left(9^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 9^{\frac{1}{2} \cdot 2} = 9^1 = 9$$

Welche Zahl ergibt quadriert 9? Genau, die Quadratwurzel aus 9 (also 3). Das bedeutet zwingend, dass $9^{\frac{1}{2}}$ exakt dasselbe sein muss wie $\sqrt{9}$.

Die geniale Erkenntnis lautet also: Jede Wurzel lässt sich als Potenz mit einem Bruch im Exponenten schreiben! Das ist extrem nützlich, weil wir dadurch alle oben gelernten Potenzgesetze plötzlich auch für Wurzeln verwenden können.

Definition 1.27 (Rationale Exponenten). Für jede positive reelle Zahl a sowie alle natürlichen Zahlen m, n ($n \geq 2$) gilt:

1. Die n -te Wurzel als Exponent:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Spezialfall für die Quadratwurzel: $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$

2. Allgemeiner Bruch als Exponent:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Tipp zum Merken: Die Wurzel bleibt unten! Der Nenner des Bruchs (unten) bestimmt den Grad der Wurzel. Der Zähler (oben) bleibt als normale Hochzahl bei der Basis stehen.

Beispiel 1.28 (Umwandeln und Rechnen).

$$16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3}$$

Durch die Potenzgesetze werden Wurzelrechnungen oft viel leichter:

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{3}{6} + \frac{2}{6}} = x^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{x^5}$$

Achtung: Wo die Potenzgesetze NICHT gelten!

Genauso wie es bei den Wurzeln keinen Trick für Addition und Subtraktion gibt, verhält es sich auch bei den Potenzen. **Es gibt kein Potenzgesetz für Strichrechnungen!**

Bemerkung (Der schlimmste Fehler in der Klausur). Potenzen dürfen bei Addition und Subtraktion **nicht** zusammengefasst werden.

$$a^n + b^n \neq (a + b)^n$$

$$x^2 + x^3 \neq x^5$$

Ein kurzes Zahlenbeispiel beweist das:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Würden wir stattdessen $(3 + 4)^2$ rechnen, bekämen wir $7^2 = 49$. Da $25 \neq 49$, sieht man sofort: Bei „Plus“ und „Minus“ bleiben die Potenzen genau so stehen, wie sie sind! (Ausnahme: Wenn Basis UND Exponent völlig identisch sind, kann man ausklammern: $2x^3 + 5x^3 = 7x^3$).

2 Potenzfunktionen

2.1 Wiederholung Lineare Funktionen

Bevor wir uns neuen Funktionsarten widmen, wollen wir das wichtigste Handwerkszeug aus den vergangenen Schuljahren auffrischen. Die einfachste Form einer Funktion ist die lineare Funktion, deren Graph eine gerade Linie darstellt.

Definition 2.1 (Lineare Funktion). Eine Funktion mit der Funktionsgleichung

$$f(x) = m \cdot x + n \quad (\text{oder } y = m \cdot x + n)$$

heißt **lineare Funktion**. Dabei ist:


- m : der **Anstieg** (oder die Steigung) der Geraden.
- n : der **y-Achsenabschnitt** (Schnittpunkt mit der y-Achse bei $P_y(0|n)$).

Graphen zeichnen

Das **Graphen zeichnen** einer linearen Funktion ist mit m und n sehr unkompliziert. Man beginnt immer auf der y-Achse beim y-Achsenabschnitt n . Von dort aus nutzt man das Steigungsdreieck, das durch m vorgegeben ist (als Bruch: Zähler nach oben/unten, Nenner nach rechts), um einen zweiten Punkt zu finden.

Beispiel 2.2. Zeichne den Graphen zu $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$.

1. Startpunkt auf der y-Achse bei $n = -1$ markieren, also $P_1(0|-1)$.
2. Von dort das Steigungsdreieck abtragen: 3 Einheiten nach rechts (Nenner), 2 Einheiten nach oben (Zähler). Das ergibt $P_2(3|1)$.
3. Eine Gerade durch beide Punkte ziehen.



Koordinaten von Funktionspunkten vervollständigen

Oft ist ein Punkt gegeben, bei dem eine Koordinate fehlt (entweder der x- oder der y-Wert), aber man weiß, dass er auf dem Graphen der Funktion liegt. Um die **Koordinaten von Funktionspunkten vervollständigen** zu können, setzt man den bekannten Wert einfach in die Funktionsgleichung ein und rechnet den fehlenden Wert aus.

Beispiel 2.3. Gegeben ist die Funktion $f(x) = -2x + 4$.

Fall 1: y-Koordinate gesucht

Der Punkt $P(3|y)$ liegt auf der Geraden. Wir setzen $x = 3$ ein:

$$y = -2 \cdot 3 + 4 = -6 + 4 = -2$$

Der vollständige Punkt lautet also $P(3|-2)$.

Fall 2: x-Koordinate gesucht

Der Punkt $Q(x|8)$ liegt auf der Geraden. Wir setzen $y = 8$ ein und stellen die Gleichung um:

$$\begin{array}{rcl} 8 & = & -2x + 4 \quad | -4 \\ 4 & = & -2x \quad | : (-2) \\ -2 & = & x \end{array}$$

Der vollständige Punkt lautet also $Q(-2|8)$.

Nullstellen berechnen

Ein besonders wichtiger Punkt auf jedem Graphen ist der Schnittpunkt mit der x-Achse. An dieser Stelle ist der y-Wert immer genau 0.

Definition 2.4 (Nullstelle). Die **Nullstelle** ist der x-Wert, bei dem der Graph die x-Achse schneidet. Um sie zu berechnen, setzt man den gesamten Funktionsterm gleich Null:

$$f(x) = 0$$

Beispiel 2.5. Berechne die Nullstelle der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x - 3$.

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2}x - 3 & = & 0 \quad | + 3 \\ \frac{1}{2}x & = & 3 \quad | \cdot 2 \\ x & = & 6 \end{array}$$

Die Nullstelle liegt bei $x = 6$. Der Schnittpunkt mit der x-Achse ist somit $S_x(6|0)$.

Weitere Geradengleichungen aufstellen

Manchmal ist die Funktionsgleichung nicht direkt gegeben, sondern man muss aus bestimmten geometrischen Bedingungen **weitere Geradengleichungen** herleiten. Die drei häufigsten Fälle sind:

- **Gerade aus zwei Punkten bestimmen:** Gegeben sind zwei Punkte $P_1(x_1|y_1)$ und $P_2(x_2|y_2)$. Zuerst berechnet man den Anstieg mit der Formel $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Danach setzt man m und die Koordinaten eines der beiden Punkte in die allgemeine Form $y = m \cdot x + n$ ein und löst nach dem fehlenden n auf.
- **parallele Geraden:** Zwei Geraden sind exakt dann parallel zueinander, wenn sie denselben Anstieg besitzen. Es gilt also: $m_1 = m_2$.
- **senkrechte (orthogonale) Geraden:** Zwei Geraden stehen im 90° -Winkel aufeinander, wenn das Produkt ihrer Anstiege -1 ergibt. Es gilt: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

2.2 Definition und Beispiele

Nachdem wir lineare Funktionen (Geraden) wiederholt haben, erweitern wir nun unseren Werkzeugkasten. In der Natur und Technik wachsen oder schrumpfen viele Dinge nicht gleichmäßig auf einer geraden Linie, sondern beschleunigt – zum Beispiel der Bremsweg eines Autos bei zunehmender Geschwindigkeit oder die Gravitationskraft zwischen zwei Planeten. Um solche Zusammenhänge zu beschreiben, benötigen wir Funktionen, bei denen das x in der Basis einer Potenz steht.

Definition 2.6 (Potenzfunktion). Eine Funktion der Form

$$f(x) = x^n \quad \text{mit } n \in \mathbb{Z} \text{ (Ganze Zahlen)}$$

heißt **Potenzfunktion**.

Je nachdem, ob der Exponent n positiv oder negativ, gerade oder ungerade ist, verändern sich die Form des Graphen und die Eigenschaften der Funktion grundlegend.

Beispiel 2.7.

- $f(x) = x^2$ (Positiver, gerader Exponent)
- $f(x) = x^3$ (Positiver, ungerader Exponent)
- $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ (Negativer, ungerader Exponent)
- $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ (Negativer, gerader Exponent)

2.3 Potenzfunktionen mit natürlichen Exponenten

Wir betrachten zunächst Potenzfunktionen mit positiven ganzen Zahlen als Exponenten ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$). Diese Funktionen nennt man auch **Parabeln** ($n \geq 2$). Man unterscheidet hier strikt zwischen geraden und ungeraden Exponenten.

Gerade Exponenten ($n = 2, 4, 6, \dots$)


Funktionen wie $f(x) = x^2$ oder $f(x) = x^4$ liefern für jeden x -Wert (egal ob positiv oder negativ) immer ein **positives Ergebnis** oder Null.

- **Verlauf:** U-förmig, der Graph öffnet sich nach oben.
- **Symmetrie:** Achsensymmetrisch zur y -Achse ($f(-x) = f(x)$).
- **Gemeinsame Punkte:** Alle diese Graphen verlaufen durch die Punkte $(0|0)$, $(1|1)$ und $(-1|1)$.
- **Vergleich:** Je größer der Exponent n , desto „flacher“ verläuft der Graph zwischen -1 und 1 und desto „steiler“ steigt er außerhalb dieses Bereichs an.

Ungerade Exponenten ($n = 3, 5, 7, \dots$)

Funktionen wie $f(x) = x^3$ oder $f(x) = x^5$ behalten das Vorzeichen des x -Wertes bei. Setzt man eine negative Zahl ein, ist das Ergebnis auch negativ.

- **Verlauf:** S-förmig, der Graph verläuft vom 3. in den 1. Quadranten.
- **Symmetrie:** Punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ($f(-x) = -f(x)$).
- **Gemeinsame Punkte:** Alle Graphen verlaufen durch $(0|0)$, $(1|1)$ und $(-1|-1)$.




2.4 Potenzfunktionen mit negativ-ganzzahligen Exponenten

Wenn der Exponent negativ ist ($n = -1, -2, -3, \dots$), wandert das x in den Nenner eines Bruchs: $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. Diese Funktionen nennt man **Hyperbeln**.

Hier tritt eine Besonderheit auf: Man darf **nicht durch Null teilen**. Der Wert $x = 0$ darf also in diese Funktionen nicht eingesetzt werden (Definitionslücke). An dieser Stelle besitzt der Graph eine senkrechte **Asymptote** (Polstelle), an die er sich unendlich nah anschmiegt, sie aber nie berührt.

Auch hier unterscheiden wir wieder zwischen geraden und ungeraden Exponenten:

- **Gerade negative Exponenten ($x^{-2}, x^{-4}, \dots$):**
Da x im Nenner hoch einer geraden Zahl genommen wird, ist das Ergebnis immer positiv. Der Graph verläuft im 1. und 2. Quadranten und ist **achsensymmetrisch** zur y -Achse.
- **Ungerade negative Exponenten ($x^{-1}, x^{-3}, \dots$):**
Das Vorzeichen bleibt erhalten. Der Graph verläuft im 1. (positiv) und 3. Quadranten (negativ) und ist **punktsymmetrisch** zum Ursprung.



2.5 Einfluss von Parametern auf Funktionsgraphen

Bisher haben wir nur die reinen „Normal-Graphen“ wie $f(x) = x^2$ oder $f(x) = x^3$ betrachtet. In der Realität liegen diese Graphen jedoch selten perfekt im Ursprung des Koordinatensystems. Wir können die Graphen verschieben, stauchen, strecken und spiegeln.

Dafür fügen wir Parameter (a , c und d) in die Funktionsgleichung ein. Die allgemeine Formel für transformierte Potenzfunktionen lautet:

Definition 2.8 (Allgemeine Potenzfunktion mit Parametern).

$$g(x) = a \cdot (x - c)^n + d$$

1. Der Parameter d : Verschiebung in y-Richtung

Wird an die Funktion ganz hinten eine Zahl d addiert oder subtrahiert, verschiebt sich der gesamte Graph entlang der y-Achse nach oben oder unten.

- $d > 0$: Verschiebung nach **oben** (z. B. $x^3 + 2$).
- $d < 0$: Verschiebung nach **unten** (z. B. $x^3 - 4$).

2. Der Parameter c : Verschiebung in x-Richtung

Wird eine Zahl c direkt vom x abgezogen *bevor* potenziert wird (also mit in der Klammer), verschiebt sich der Graph entlang der x-Achse nach links oder rechts. **Achtung, hier muss man umdenken!**

- $(x - 3)^3$: Das Minus in der Klammer bewirkt eine Verschiebung um 3 Einheiten nach **rechts**.
- $(x + 2)^3$: Das Plus in der Klammer bewirkt eine Verschiebung um 2 Einheiten nach **links**.

3. Der Parameter a : Streckung, Stauchung und Spiegelung

Der Faktor a ganz vorne multipliziert alle y-Werte. Er bestimmt, wie „steil“ oder „flach“ der Graph verläuft.

- $a > 1$ oder $a < -1$: Der Graph wird **gestreckt** (er wird schmaler/steiler).
- $-1 < a < 1$ (z. B. $a = 0,5$): Der Graph wird **gestaucht** (er wird breiter/flacher).
- a ist negativ (z. B. $a = -2$): Der Graph wird zusätzlich an der x-Achse **gespiegelt** (er dreht sich um).


Beispiel mit allen Parametern gleichzeitig

Betrachten wir als Zusammenfassung die Funktion:

$$g(x) = -0,5 \cdot (x - 2)^3 + 3$$

Ausgehend von der Normalfunktion $f(x) = x^3$ lesen wir die Parameter Schritt für Schritt ab:

1. **Verschiebung:** $c = 2$ und $d = 3$. Der Wendepunkt (ehemals im Ursprung $(0|0)$) verschiebt sich um 2 Einheiten nach rechts und 3 nach oben. Der neue charakteristische Punkt liegt bei $W(2|3)$.
2. **Spiegelung:** Das Minus bei $-0,5$ spiegelt den Graphen an der x-Achse (er fällt nun, statt zu steigen).
3. **Stauchung:** Die 0,5 staucht den Graphen in y-Richtung, er verläuft also etwas flacher als der normale x^3 -Graph.



2.6 Wichtige Eigenschaften von Funktionen

Um sich einen vollständigen Überblick über eine Funktion und ihren Graphen zu verschaffen, reicht es oft nicht, nur einige Wertepaare zu berechnen. Man untersucht stattdessen ganz gezielt verschiedene charakteristische Eigenschaften. Diese helfen dabei, den Graphen exakt zu skizzieren und das Verhalten der Funktion in extremen Bereichen vorherzusagen.

Definitionsbereich und Wertebereich

Bevor man anfängt zu rechnen, muss immer erst geklärt werden, welche Zahlen für die jeweilige Funktion überhaupt erlaubt sind.

Definition 2.9 (Definitionsbereich $\mathbb{D}$ und Wertebereich $\mathbb{W}$). Der **Definitionsbereich** ($\mathbb{D}$) gibt an, welche x -Werte man in eine Funktionsgleichung einsetzen darf.

Der **Wertebereich** ($\mathbb{W}$) umfasst alle y -Werte, die als Ergebnis herauskommen können, wenn man alle erlaubten x -Werte in die Funktion einsetzt.

Bei ganzrationalen Funktionen (wie $f(x) = x^2$ oder $f(x) = x^3$) ist der Definitionsbereich meist ganz $\mathbb{R}$. Bei gebrochenrationalen Funktionen (wie $f(x) = \frac{1}{x}$) muss man aufpassen, da man nicht durch Null teilen darf. Die Null muss hier aus dem Definitionsbereich ausgeschlossen werden ($\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$).

Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen

Ein Graph kann die x -Achse und die y -Achse schneiden. Diese Punkte sind in Sachaufgaben oft besonders wichtig (sie markieren beispielsweise den Startwert oder den Zeitpunkt, an dem ein Bestand aufgebraucht ist).

- **Schnittpunkt mit der y -Achse (S_y):** Man berechnet den Funktionswert an der Stelle $x = 0$, setzt also die Null in die Funktion ein: $f(0)$. Eine Funktion hat (sofern 0 im Definitionsbereich liegt) immer genau einen solchen Schnittpunkt.
- **Schnittpunkte mit der x -Achse (Nullstellen):** Man sucht die x -Werte, für die der Funktionswert Null wird. Man setzt den Funktionsterm also gleich Null: $f(x) = 0$. Eine Funktion kann keine, eine oder auch unendlich viele Nullstellen haben.

Polstellen und achsenparallele Asymptoten

Definition 2.10 (Polstellen und Asymptoten). Eine **Polstelle** ist eine Definitionslücke einer Funktion, an der die Funktionswerte ins Unendliche ($+\infty$ oder $-\infty$) streben. Dies tritt häufig bei Brüchen auf, wenn der Nenner null wird, während der Zähler ungleich null bleibt. Die senkrechte Hilfslinie an dieser Stelle nennt man **senkrechte Asymptote**.

Eine **waagerechte Asymptote** beschreibt das Verhalten der Funktion für extrem große oder extrem kleine x -Werte ($x \rightarrow \infty$ oder $x \rightarrow -\infty$). Der Graph schmiegt sich dieser waagerechten Linie immer weiter an.

Symmetrie

Die Symmetrie eines Graphen erleichtert das Zeichnen und Rechnen enorm, da man im Grunde nur eine Hälfte der Funktion betrachten muss und den Rest durch Spiegelung erhält. Man prüft rechnerisch zwei Hauptfälle:

- **Achsensymmetrie zur y -Achse:** Es gilt $f(-x) = f(x)$. Der Graph verhält sich links der y -Achse exakt wie ein Spiegelbild der rechten Seite. (Typisch für Potenzfunktionen mit ausschließlich geraden Exponenten).
- **Punktsymmetrie zum Ursprung:** Es gilt $f(-x) = -f(x)$. Der Graph wird durch eine Drehung um 180° um den Ursprung auf sich selbst abgebildet. (Typisch für Potenzfunktionen mit ausschließlich ungeraden Exponenten).

Lokale Extrema (Hoch- und Tiefpunkte)

Definition 2.11 (Lokale Extrema). Ein **Hochpunkt** (lokales Maximum) ist ein Punkt auf dem Graphen, in dessen unmittelbarer Umgebung es keine höheren y -Werte gibt.

Ein **Tiefpunkt** (lokales Minimum) ist ein Punkt, in dessen Umgebung es keine tieferen y -Werte gibt.

Zusammen fasst man Hoch- und Tiefpunkte unter dem Begriff der **Extrema** zusammen. Sie markieren die Stellen, an denen der Graph seine Steigungsrichtung ändert – an einem Hochpunkt geht der Graph von einer Steigung in ein Gefälle über, an einem Tiefpunkt ist es genau umgekehrt.