

# Чисельні методи математичної фізики

Риженко А. І.\*

22 вересня 2019 р.

## Зміст

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Проекційні методи. Метод моментів. Метод Бубнова-Гальоркіна | 1 |
| 2 | Виділення самоспряженого оператора. Узагальнений розв'язок  | 3 |

## 1 Проекційні методи. Метод моментів. Метод Бубнова-Гальоркіна

Розглянемо рівняння

$$Au = f, \quad (1.1)$$

де  $A : E \rightarrow F$  — лінійний, діє на парі лінійних нормованих просторів,  $D(A) \subseteq E$ ,  $R(A) \subseteq F$ .

Розглянемо послідовність підпросторів  $E_n \subseteq D(A)$ ,  $F_n \subseteq F$ . Введемо лінійні *оператори проектування*  $P_n : F \rightarrow F_n$  такі, що  $P_n^2 = P_n$ . Тоді можна розглянути послідовність рівнянь

$$P_n(Au_n - f) = 0, \quad (1.2)$$

із розв'язками  $u_n \in E_n$ . Враховуючи лінійність операторів проектування маємо  $P_n(Au_n) = P_nf$ . Зрозуміло, що у залежності від вибору  $E_n, F_n, P_n$  отримаємо різні *проекційні розв'язки*  $u_n$ .

Нехай надалі  $E, F$  — гільбертові простори.

**Означення 1.1.** Розглянемо лінійно незалежні системи функцій  $\{\varphi_i\} \in D(A)$  і  $\{\psi_i\} \in F$ . Система  $\{\varphi_i\}$  називається *координатною*, а система  $\{\psi_i\}$  — *проекційною*.

У якості  $E_n$  візьмемо  $\mathcal{L}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ , а в якості  $F_n$  —  $\mathcal{L}(\psi_1, \dots, \psi_n)$ .

---

\*Риженко Андрій Іванович, [rai-ku@ukr.net](mailto:rai-ku@ukr.net)

### Твердження 1.2

Тоді для виконання умови  $P_n^2 = P_n$  достатньо, аби  $P_n|_{F_n}$  був тотожнім оператором.

*Доведення.* Справді, тоді  $P_n f = f_n \in F_n$  і  $P_n^2 f = P_n f_n = f_n$ . □

Розв'язок задачі (1.2) будемо шукати у вигляді

$$u_n = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i. \quad (1.3)$$

### Лема 1.3

Для довільного елементу  $\psi \in F$  рівність

$$P_n \psi = 0 \quad (1.4)$$

та система рівностей

$$(\psi, \psi_j) = 0, \quad j = \overline{1, n} \quad (1.5)$$

рівносильні.

*Доведення.* Нехай виконується (1.4), тоді маємо

$$(\psi, \psi_j) = (\psi, P_n \psi_j) = (P_n \psi, \psi_j) \stackrel{(1.4)}{=} (0, \psi_j) = 0,$$

тому виконується (1.5).

В інший бік: нехай виконується (1.5), тоді

$$\begin{aligned} (P_n \psi, P_n \psi) &= \left( P_n \psi, \sum_{j=1}^n a_j \psi_j \right) = \left( \psi, \sum_{j=1}^n a_j P_n \psi_j \right) = \\ &= \left( \psi, \sum_{j=1}^n a_j \psi_j \right) = \sum_{j=1}^n \overline{a_j} (\psi, \psi_j) \stackrel{(1.5)}{=} 0. \end{aligned}$$

□

**Зауваження 1.4** — Тут ми скористалися самоспряженістю оператора проектування, хоча і не довели її.

**Вправа 1.5.** Доведіть, що  $P_n$  — самоспряжений оператор.

**Розв'язання.** Нехай  $x = \psi_x + f_x$ ,  $y = \psi_y + f_y$  де  $\psi_x, \psi_y \in F_n$  а  $f_x, f_y \in F_n^\perp$ , тоді

$$(P_n x, y) = (\psi_x, \psi_y + f_y) = (\psi_x, \psi_y) = (\psi_x + f_x, \psi_y) = (x, P_n y).$$

**Зауваження 1.6** — Тут ми скористалися тим, що  $F = F_n \oplus F_n^\perp$ . Це, взагалі кажучи, не так, якщо  $F_n$  нескінченновимірний, але ми не оперуємо з такими просторами, тому все законно.

Таким чином, ми можемо знайти розв’язок

$$(Au_n - f, \psi_j) = 0, \quad j = \overline{1, n}. \quad (1.6)$$

Розв’язок шукаємо у вигляді (1.3) і підставляємо в (1.6):

$$\sum_{i=1}^n c_i (A\varphi_i, \psi_j) = (f, \psi_j), \quad j = \overline{1, n}. \quad (1.7)$$

Це і є метод моментів.

#### Алгоритм 1.7.

- 1) Обираємо повну систему лінійно-незалежних функцій  $\{\varphi_i\} \in D(A)$ ;
- 2) Обираємо замкнену систему лінійно-незалежних функцій  $\{\psi_i\} \in F$ ;
- 3) Шукаємо розв’язки у вигляді  $u_n = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i$ , отримуємо СЛАР (1.7).

**Зауваження 1.8** — Якщо  $\psi_j = \varphi_j$ , то отримуємо метод Бубнова-Гальоркіна. Для нього система має вигляд

$$(Au_n - f, \psi_j) = 0,$$

або, у розгорнутому вигляді,

$$\sum_{i=1}^n c_i (A\varphi_i, \varphi_j) = (f, \varphi_j), \quad j = \overline{1, n}. \quad (1.8)$$

**Зауваження 1.9** — У книжці Ляшка, Макарова, і Скоробагатько “Методы вычис...” наведена загальна теорема про збіжність.

## 2 Виділення самоспряженого оператора. Узагальнений розв’язок

Для ситуації, коли

$$A = A_0 + B, \quad (2.1)$$

де  $A_0$  — самоспряжений додатновизначений оператор введемо розглянемо рівняння

$$[u, v] + (Bu, v) = (f, v), \quad \forall v \in H_{A_0}, \quad (2.2)$$

де

**Означення 2.1.**  $H_{A_0}$  — енергетичний простір зі скалярним добутком

$$[u, v] = (A_0 u, v)$$

і породженню ним нормою

$$\|u\|_{A_0} = |[u]| = \sqrt{[u, u]}.$$

**Зауваження 2.2** — Енергетичний простір у чомусь ідеологічно схожий на слабкий топологічний простір.

Тоді алгоритм Бубнова-Гальоркіна набуває вигляду

- 1) Обираємо повну систему лінійно-незалежних функцій  $\{\varphi_i\} \in H_{A_0}$ ;
- 2)  $H_n = \mathcal{L}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ ;
- 3) Шукаємо розв'язки у вигляді  $u_n = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i$ .

У такій ситуації маємо

$$[u_n, \varphi_j] + (B u_n, \varphi_j) = (f, \varphi_j), \quad (2.3)$$

тобто

$$L \vec{c} = \vec{f}, \quad (2.4)$$

де

$$L_{ij} = [\varphi_i, \varphi_j] + (B \varphi_i, \varphi_j), \quad \vec{f} = (f, \varphi_j), \quad i, j = \overline{1, n}.$$

**Означення 2.3.** Послідовність просторів  $E_n$  називається *гранично щільною* в  $E$ , якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\varphi, u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{u_n \in E_n} \|\varphi - u_n\| = 0, \quad \forall \varphi \in E. \quad (2.5)$$

**Означення 2.4.** Оператор  $A$  називається *майже всюди неперервним*, якщо  $A = A_1 + A_2$ , де  $\|A_2\| \leq \varepsilon$ , а  $A_1 u = \sum_{i=1}^n (u, \varphi_i) \psi_i$ .

### Теорема 2.5

Нехай (1.1) має єдиний розв'язок,  $A_0^{-1} B$  є майже всюди неперервним, а  $H_n$  — гранично щільною в  $H_{A_0}$ , тоді алгоритм Бубнова-Гальоркіна генерує єдиний розв'язок задачі (2.4), причому послідовність цих розв'язків збігається до розв'язку задачі (1.1) у просторі  $H_{A_0}$ .

### Приклад 2.6

Розглянемо найпростіше диференціальне рівняння

$$-(ku')' - pu' + qu = f, \quad a < x < b \quad (2.6)$$

з крайовими умовами першого роду

$$u(a) = u(b) = 0. \quad (2.7)$$

Його класичний двічі неперервно диференційовний (з  $C^2([a, b])$ ) розв'язок існує за умов  $k(x) \geq k_0 > 0$ ,  $k \in C^1((a, b))$ ,  $p, q, f \in C(a, b)$ .

Розглянемо тепер системи функцій  $\varphi_i, \psi_i$ :

$$1) \quad \varphi_i = (x - a)^i (b - x);$$

$$2) \quad \varphi_i = \sin\left(\frac{x - a}{b - a} i\pi\right);$$

$$\text{і } \psi_i = x^{i-1}, \quad i = \overline{1, n}.$$

Тоді у класичному методі моментів будемо мати

$$(u, v) = \int_a^b u(x)v(x) dx,$$

і

$$\sum_{i=1}^n c_i \int_a^b (-(k\varphi'_i)' - p\varphi'_i + q\varphi_i)\psi_j dx = \int_a^b f\psi_j dx, \quad j = \overline{1, n}. \quad (2.8)$$

**Зауваження 2.7** — У методі Бубнова-Гальоркіна матимемо

$$\sum_{i=1}^n c_i \int_a^b (-(k\varphi'_i)' - p\varphi'_i + q\varphi_i)\varphi_j dx = \int_a^b f\varphi_j dx, \quad j = \overline{1, n}.$$

### Приклад 2.8

Нехай  $f \in L_2$  ( $p, q, k' \in L_2$ ), тоді отримуємо  $W_2^2((a, b))$ .

### Приклад 2.9

Нехай  $f \in W_2^{-1}$ , тоді  $u \in W_2^1((a, b))$ , а  $D(A) = \{u \in W_2^1([a, b]), u(a) = u(b) = 0\}$ .

**Зауваження 2.10** — Оскільки тепер функція має лише першу похідну, то необхідно переписати (2.8):

$$\sum_{i=1}^n c_i \int_a^b (k\varphi'_i\varphi'_j - p\varphi'_i\varphi_j + q\varphi_i\varphi_j) dx - k\varphi'_i\varphi_j|_{x=a} + k\varphi'_i\varphi_j|_{x=b} = \int_a^b f\varphi_j dx.$$

**Зауваження 2.11** — Якщо  $f \in W_2^{-1}$ , то  $f = f_0 - \frac{df_1}{dx}$ , де  $f_0, f_1 \in L_2$ , тому базисними функціями для цієї ситуації можна взяти “штафетини”:




Рис. 1: “штафетина” від  $x_{i-1}$  до  $x_i$ .