

# ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

Скибицький Нікіта

31 грудня 2018 р.

У ваших руках конспект лекцій з нормативного курсу “Диференціальні рівняння” прочитаного проф., д.ф.-м.н. Хусаїновим Денисом Ях’евичем на другому курсі спеціальності “прикладна математика” факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка восени 2017-го та навесні 2018-го року.

Конспект у компактній формі відображає матеріал курсу, допомагає сформулювати загальне уявлення про предмет вивчення, правильно зорієнтуватися в даній галузі знань. Конспект лекцій з названої дисципліни сприятиме більш успішному вивченню дисципліни, причому більшою мірою для студентів заочної форми, екстернату, дистанційного та індивідуального навчання.

Комп’ютерний набір та верстка – Скибицький Нікіта Максимович.

## Зміст

<b>1</b>	<b>Диференціальні рівняння першого порядку</b>	<b>4</b>
1.1	Рівняння зі змінними, що розділяються . . . . .	5
1.1.1	Загальна теорія . . . . .	5
1.1.2	Рівняння, що зводяться до рівнянь зі змінними, що розділяються . . . . .	6
1.1.3	Вправи для самостійної роботи . . . . .	7
1.2	Однорідні рівняння . . . . .	9
1.2.1	Загальна теорія . . . . .	9
1.2.2	Рівняння, що зводяться до однорідних . . . . .	10
1.2.3	Вправи для самостійної роботи . . . . .	11
1.3	Лінійні рівняння першого порядку . . . . .	15
1.3.1	Загальна теорія . . . . .	15
1.3.2	Рівняння Бернуллі . . . . .	16
1.3.3	Рівняння Рікатті . . . . .	17
1.3.4	Вправи для самостійної роботи . . . . .	17

## Вступ

Наведемо декілька основних визначень теорії диференціальних рівнянь, що будуть використовуватися надалі.

**Визначення.** Рівняння, що містять похідні від шуканої функції та можуть містити шукану функцію та незалежну змінну, називаються диференціальними рівняннями.

**Визначення.** Якщо в диференціальному рівнянні невідомі функції є функціями однієї змінної

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

то диференціальне рівняння називається звичайним.

**Визначення.** Якщо невідома функція, що входить в диференціальне рівняння, є функцією двох або більшої кількості незалежних змінних

$$F\left(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^k z}{\partial x^\ell \partial y^{k-\ell}}, \dots, \frac{\partial^n z}{\partial y^n}\right) = 0$$

то диференціальне рівняння називається рівнянням в частинних похідних.

**Визначення.** Порядком диференціального рівняння називається максимальний порядок похідної від невідомої функції, що входить в диференціальне рівняння.

**Визначення.** Розв'язком диференціального рівняння називається функція, що має необхідну ступінь гладкості, і яка при підстановці в диференціальне рівняння обертає його в тотожність.

**Визначення.** Процес знаходження розв'язку диференціального рівняння називається інтегруванням диференціального рівняння.

## 1 Диференціальні рівняння першого порядку

Рівняння першого порядку, що розв'язане відносно похідної, має вигляд

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (1.0.1)$$

Диференціальне рівняння становить зв'язок між координатами точки та кутовим коефіцієнтом дотичної  $\frac{dy}{dx}$  до графіку розв'язку в цій же точці. Якщо знати  $x$  та  $y$ , то можна обчислити  $f(x, y)$  тобто  $\frac{dy}{dx}$ . Таким чином, диференціальне рівняння визначає поле напрямків, і задача інтегрування рівнянь зводиться до знаходження кривих, що зветься інтегральними кривими, напрям дотичних до яких в кожній точці співпадає з напрямом поля.

## 1.1 Рівняння зі змінними, що розділяються

### 1.1.1 Загальна теорія

Рівняння вигляду

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y), \quad (1.1.1)$$

або більш загального вигляду

$$f_1(x) \cdot f_2(y) \cdot dx + g_1(x) \cdot g_2(y) \cdot dy = 0 \quad (1.1.2)$$

називаються рівняннями зі змінними, що розділяються. Розділимо його на  $f_2(y) \cdot g_1(x)$  і одержимо

$$\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot dx + \frac{g_2(y)}{f_2(y)} \cdot dy = 0. \quad (1.1.3)$$

Взявши інтеграли, отримаємо

$$\int \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot dx + \int \frac{g_2(y)}{f_2(y)} \cdot dy = C, \quad (1.1.4)$$

або

$$\Phi(x, y) = C. \quad (1.1.5)$$

**Визначення.** Кінцеве рівняння (1.1.5), що визначає розв'язок диференціального рівняння як неявну функцію від  $x$ , називається інтегралом розглянутого рівняння.

**Визначення.** Рівняння (1.1.5), що визначає всі без винятку розв'язки даного диференціального рівняння, називається загальним інтегралом.

Бувають випадки (в основному), що невизначені інтеграли з (1.1.3) не можна записати в елементарних функціях. Незважаючи на це, задача інтегрування вважається виконаною. Кажуть, що диференціальне рівняння розв'язане в квадратурах.

Можливо, що загальний інтеграл розв'язується відносно  $y$ :

$$y = y(x, C). \quad (1.1.6)$$

Тоді, завдяки вибору  $C$ , можна одержати всі розв'язки.

**Визначення.** Залежність (1.1.6), що тотожно задовольняє вихідному диференціальному рівнянню, де  $C$  – довільна стала, називається загальним розв'язком диференціального рівняння.

Геометрично загальний розв'язок являє собою сім'ю кривих, що не перетинаються, які заповнюють деяку область. Іноді треба виділити одну криву сім'ї, що проходить через задану точку  $M(x_0, y_0)$ .

**Визначення.** Знаходження розв'язку  $y = y(x)$ , що проходить через задану точку  $M(x_0, y_0)$ , називається розв'язком задачі Коші.

**Визначення.** Розв'язок, який записаний у вигляді  $y = y(x, x_0, y_0)$  і задовольняє умові  $y(x, x_0, y_0) = y_0$ , називається розв'язком у формі Коші.

### 1.1.2 Рівняння, що зводяться до рівнянь зі змінними, що розділяються

Розглянемо рівняння вигляду

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \quad (1.1.7)$$

де  $a, b, c$  – сталі.

Зробимо заміну  $ax + by + c = z$ . Тоді  $a \cdot dx + b \cdot dy = dz$  і  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{b} \cdot \left(\frac{dz}{dx} - a\right)$ .

Підставивши в вихідне рівняння, одержимо

$$\frac{1}{b} \cdot \left(\frac{dz}{dx} - a\right) = f(z), \quad (1.1.8)$$

або

$$\frac{dz}{dx} = a + b \cdot f(z), \quad (1.1.9)$$

Розділивши змінні, запишемо

$$\frac{dz}{a + b \cdot f(z)} - dx = 0 \quad (1.1.10)$$

і

$$\int \frac{dz}{a + b \cdot f(z)} - x = C. \quad (1.1.11)$$

Загальний інтеграл має вигляд  $\Phi(ax + by + c, x) = C$ .

### 1.1.3 Вправи для самостійної роботи

Рівняння зі змінними, що розділяються можуть бути записані у вигляді  $y' = f(x) \cdot g(y)$  або  $f_1(x) \cdot f_2(y) \cdot dx + g_1(x) \cdot g_2(y) \cdot dy$ . Для розв'язків такого рівняння необхідно обидві частини помножити або розділити на такий вираз, щоб в одну частину входило тільки  $x$ , а в другу – тільки  $y$ . Тоді обидві частини рівняння можна проінтегрувати. Якщо ділити на вираз, що містить  $x$  та  $y$ , може бути загублений розв'язок, що обертає цей вираз в нуль.

**Приклад 1.1.** Розв'язати рівняння

$$x^2 y^2 y' + y = 1. \quad (1.1.12)$$

**Розв'язок.** Підставивши  $y = \frac{dy}{dx}$  в задане рівняння, отримаємо

$$x^2 y^2 \cdot \frac{dy}{dx} + y = 1. \quad (1.1.13)$$

Помножимо обидві частини рівняння на  $dx$  і розділимо на  $x^2 \cdot (y - 1)$ . Перевіримо, що  $y = 1$  при цьому є розв'язком, а  $x = 0$  цим розв'язком не є:

$$\frac{y^2}{y - 1} \cdot dy = -\frac{dx}{x^2}. \quad (1.1.14)$$

Проінтегруємо обидві частини рівняння:

$$\int \frac{y^2}{y - 1} \cdot dy = - \int \frac{dx}{x^2}. \quad (1.1.15)$$

$$\frac{y^2}{2} + y + \ln |y - 1| = \frac{1}{x} + C \quad (1.1.16)$$

**Приклад 1.2.** Розв'язати рівняння

$$y' = \sqrt{4x + 2y - 1}. \quad (1.1.17)$$

**Розв'язок.** Введемо заміну змінних  $z = 4x + 2y - 1$ . Тоді  $x' = 4 + 2y'$ . Рівняння перетвориться до вигляду  $z' - 4 = 2\sqrt{z}$ ;  $z' = 4 + 2\sqrt{z}$ ;  $\frac{dz}{2 + \sqrt{z}} = 2 dx$ . Проінтегруємо обидві частини рівняння:

$$\int \frac{dz}{2 + \sqrt{z}} = \int 2 dx \quad (1.1.18)$$

Обчислимо інтеграл, що стоїть зліва. При обчисленні будемо використовувати таку заміну:

$$\sqrt{z} = t, \quad dz = 2t dt, \quad 2 + \sqrt{z} = 2 + t,$$

$$\begin{aligned}\int \frac{dz}{2 + \sqrt{z}} &= \int \frac{2t dt}{2 + t} = 2 \int \frac{t + 2 - 2}{t + 2} \cdot dt = \\ &= 2t - 4 \ln |2 + t| = 2\sqrt{z} - 4 \ln (2 + \sqrt{z}). \quad (1.1.19)\end{aligned}$$

Після інтегрування отримаємо  $2\sqrt{z} - 4 \ln (2 + \sqrt{z}) = 2x + 2C$ . Зробимо обернену заміну:  $z = 4x + 2y - 1$ ;

$$\sqrt{4x + 2y - 1} - 2 \ln (2 + \sqrt{4x + 2y - 1}) = x + C. \quad (1.1.20)$$

Розв'язати рівняння:

**Задача 1.1.**

$$xy \cdot dx + (x + 1) \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.8.**

$$3y^2 y' + 15x = 2xy^3;$$

**Задача 1.2.**

$$x \cdot (1 + y) \cdot dx = y \cdot (1 + x^2) \cdot dy;$$

**Задача 1.9.**

$$y' = \cos(y - x);$$

**Задача 1.3.**

$$y' = 10^{x+y};$$

**Задача 1.10.**

$$y' - y = 2x - 3;$$

**Задача 1.4.**

$$y' - xy^2 = 2xy;$$

**Задача 1.11.**

$$xy' + y = y^2;$$

**Задача 1.5.**

$$\sqrt{y^2 + 1} dx = xy \cdot dy;$$

**Задача 1.12.**

$$e^{-y} \cdot (1 + y') = 1;$$

**Задача 1.6.**

$$y' = x \tan(y);$$

**Задача 1.13.**

$$2x^2 y y' + y^2 = 2;$$

**Задача 1.7.**

$$yy' + x = 1;$$

**Задача 1.14.**

$$y' - xy^3 = 2xy^2.$$

Знайти частинні розв'язки, що задовольняють заданим початковим умовам:

**Задача 1.15.**

$$(x^2 - 1) \cdot y' + 2xy^2 = 0, \quad y(0) = 1;$$



**Задача 1.16.**

$$y' \cdot \cot(x) + y = 2, \quad y(0) = -1;$$

**Задача 1.17.**

$$y' = 3\sqrt[3]{y^2}, \quad y(2) = 0.$$

## 1.2 Однорідні рівняння

### 1.2.1 Загальна теорія

Нехай рівняння має вигляд

$$M(x, y) \cdot dx + N(x, y) \cdot dy = 0. \quad (1.2.1)$$

Якщо функції  $M(x, y)$  та  $N(x, y)$  однорідні одного ступеня, то рівняння називається однорідним. Нехай функції  $M(x, y)$  та  $N(x, y)$  однорідні ступеня  $k$ , тобто

$$M(tx, ty) = t^k \cdot M(x, y), \quad N(tx, ty) = t^k \cdot N(x, y). \quad (1.2.2)$$

Робимо заміну  $y = ux$ ,  $dy = u dx + x du$ . Після підстановки одержуємо

$$M(x, ux) \cdot dx + N(x, ux) \cdot (u dx + x du) = 0, \quad (1.2.3)$$

або

$$x^k M(1, u) \cdot dx + x^k N(1, u) \cdot (u dx + x du) = 0. \quad (1.2.4)$$

Скоротивши на  $x^k$  і розкривши скобки, запишемо

$$M(1, u) \cdot dx + N(1, u) \cdot u dx + N(1, u) \cdot x du = 0. \quad (1.2.5)$$

Згрупувавши, одержимо рівняння зі змінними, що розділяються

$$(M(1, u) + N(1, u) \cdot u) dx + N(1, u) \cdot x du = 0, \quad (1.2.6)$$

або

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{N(1, u) \cdot du}{M(1, u) + N(1, u) \cdot u} = C. \quad (1.2.7)$$

Взявши інтеграли та замінивши  $u = y/x$ , отримаємо загальний інтеграл  $\Phi(x, y/x) = C$ .

### 1.2.2 Рівняння, що зводяться до однорідних

Нехай маємо рівняння вигляду

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right). \quad (1.2.8)$$

Розглянемо два випадки

1.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0. \quad (1.2.9)$$

Тоді система алгебраїчних рівнянь

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0, \end{cases} \quad (1.2.10)$$

має єдиний розв'язок  $(x_0, y_0)$ . Проведемо заміну  $x = x_1 + x_0$ ,  $y = y_1 + y_0$  та отримаємо

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx_1} &= f\left(\frac{a_1 \cdot (x_1 + x_0) + b_1 \cdot (y_1 + y_0) + c_1}{a_2 \cdot (x_1 + x_0) + b_2 \cdot (y_1 + y_0) + c_2}\right) = \\ &= f\left(\frac{a_1x_1 + b_1y_1 + (a_1x_0 + b_1y_0 + c_1)}{a_2x_1 + b_2y_1 + (a_2x_0 + b_2y_0 + c_2)}\right) \end{aligned} \quad (1.2.11)$$

Оскільки  $(x_0, y_0)$  – розв'язок (1.2.10), то (1.2.8) прийме вигляд

$$\frac{dy_1}{dx_1} = f\left(\frac{a_1x_1 + b_1y_1}{a_2x_1 + b_2y_1}\right) \quad (1.2.12)$$

і є однорідним нульового ступеня. Робимо заміну  $y_1 = ux_1$ ,  $dy_1 = u \cdot dx_1 + x_1 \cdot du$ .

Підставимо в (1.2.12)

$$u + x_1 \cdot \frac{du}{dx_1} = f\left(\frac{a_1x_1 + b_1ux_1}{a_2x_1 + b_2ux_1}\right). \quad (1.2.13)$$

Одержимо

$$x_1 \cdot du + \left(u - f\left(\frac{a_1x_1 + b_1ux_1}{a_2x_1 + b_2ux_1}\right)\right) dx_1 = 0. \quad (1.2.14)$$

Розділивши змінні, маємо

$$\int \frac{du}{u - f\left(\frac{a_1x_1+b_1ux_1}{a_2x_1+b_2ux_1}\right)} + \ln(x_1) = C. \quad (1.2.15)$$

І загальний інтеграл диференціального рівняння має вигляд  $\Phi(u, x_1) = C$ . Повернувшись до вихідних змінних, запишемо

$$\Phi\left(\frac{y-y_0}{x-x_0}, x-x_0\right) = C. \quad (1.2.16)$$

2. Нехай

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0, \quad (1.2.17)$$

тобто коефіцієнти строк лінійно залежні і

$$a_1x + b_1y = \alpha \cdot (a_2x + b_2y). \quad (1.2.18)$$

Робимо заміну  $a_2x + b_2y = z$ . Звідси  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{b_2} \cdot \left(\frac{dz}{dx} - a_2\right)$ .

Підставивши в диференціальне рівняння, одержимо

$$\frac{1}{b_2} \cdot \left(\frac{dz}{dx} - a_2\right) = f\left(\frac{\alpha z + c_1}{z + c_2}\right), \quad (1.2.19)$$

або

$$\frac{dz}{dx} = a_2 + b_2 \cdot f\left(\frac{\alpha z + c_1}{z + c_2}\right), \quad (1.2.20)$$

Розділивши змінні, отримаємо

$$\int \frac{dz}{a_2 + b_2 \cdot f\left(\frac{\alpha z + c_1}{z + c_2}\right)} - x = C, \quad (1.2.21)$$

Загальний інтеграл має вигляд  $\Phi(a_2x + b_2y, x) = C$

### 1.2.3 Вправи для самостійної роботи

Однорідні рівняння можуть бути записані у вигляді  $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$  або

$$M(x, y) \cdot dy + N(x, y) \cdot dx = 0,$$

де  $M(x, y)$  і  $N(x, y)$  – однорідні функції одного й того ж ступеня. Для того, щоб розв'язати однорідне рівняння, необхідно провести заміну  $y = ux$ ,  $dy = u dx + x du$ , в результаті якої отримаємо рівняння зі змінними, що розділяються.

**Приклад 1.3.** Розв'язати рівняння  $x dy = (x + y) dy$ .

**Розв'язок.** Дане рівняння однорідне, оскільки  $x$  та  $x + y$  є однорідними функціями першого ступеня.

Проведемо заміну:  $y = ux$ . Тоді  $dy = u dx + x du$ . Підставивши  $y$  та  $dy$  в задане рівняння, отримаємо

$$x \cdot (x du + u dx) = (x + xu) dx, \quad (1.2.22)$$

$$x^2 du = x dx \quad (1.2.23)$$

Розв'яжемо це рівняння зі змінними, що розділяються:

$$du = \frac{dx}{x}, \quad (1.2.24)$$

$$u = \ln |x| + C. \quad (1.2.25)$$

Повернувшись до вихідних змінних  $u = y/x$ , отримаємо  $y = x \cdot (\ln |x| + C)$ . Крім того розв'язком є  $x = 0$ , що було загублене при поділенні рівняння на  $x$ .

Розв'язати рівняння:

**Задача 1.18.**

$$(x + 2y) \cdot dx - x dy = 0;$$

**Задача 1.19.**

$$(x - y) \cdot dx + (x + y) \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.20.**

$$y^2 + x^2 y' = xy y';$$

**Задача 1.21.**

$$(x^2 + y^2) \cdot y' = 2xy;$$

**Задача 1.22.**

$$xy' - y = x \cdot \tan\left(\frac{y}{x}\right);$$

**Задача 1.23.**

$$xy' = y - xe^{y/x};$$

**Задача 1.24.**

$$xy' - y = (x + y) \cdot \ln\left(\frac{x + y}{x}\right);$$

**Задача 1.25.**

$$(3x + y) \cdot dx - (2x + 3y) \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.26.**

$$xy' = y \cos\left(\ln\left(\frac{y}{x}\right)\right);$$

**Задача 1.27.**

$$(y + \sqrt{xy}) \cdot dx = x dy;$$

**Задача 1.28.**

$$xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y;$$

**Задача 1.29.**

$$x^2 y' = y \cdot (x + y);$$

**Задача 1.30.**

$$y \cdot (-y + xy') = \sqrt{x^4 + y^4};$$

**Задача 1.31.**

$$x \, dy - y \, dx = \sqrt{x^2 + y^2} \, dx;$$

**Задача 1.32.**

$$(y^2 - 2xy) \cdot dx + x^2 \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.33.**

$$2x^3 y' = y \cdot (2x^2 - y^2);$$

**Задача 1.34.**

$$(x - y \cos(y/x)) \, dx + x \cos(y/x) \, dy = 0;$$

**Задача 1.35.**

$$y'(xy - x^2) = y^2;$$

**Задача 1.36.**

$$2xyy' = x^2 + y^2;$$

**Задача 1.37.**

$$(6x + 3y) \cdot dx = (7x - 2y) \cdot dy;$$

Знайти частинні розв'язки, що задовольняють задані початкові умови:

**Задача 1.46.**

$$xy' = 4\sqrt{2x^2 + y^2} + y, \quad y(1) = 2;$$

**Задача 1.47.**

$$(2y^2 + 3x^2) \cdot xy' = 3y^3 + 6yx^2, \quad y(2) = 1;$$

**Задача 1.48.**

$$y'(x^2 - 2xy) = x^2 + xy - y^2, \quad y(3) = 0;$$

**Задача 1.38.**

$$y^2 x \, dx = y \cdot (xy - 2y^2) \cdot dy;$$

**Задача 1.39.**

$$x^2 y \, dx = y \cdot (xy - 2y^2) \cdot dy;$$

**Задача 1.40.**

$$2y^3 = xy' \cdot (2y^2 - x^2);$$

**Задача 1.41.**

$$(x + \sqrt{xy}) \cdot dy = y \, dx;$$

**Задача 1.42.**

$$y = \left( \sqrt{y^2 - x^2} + x \right) y';$$

**Задача 1.43.**

$$(3x - 2y) \cdot dx - (2x + y) \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.44.**

$$(7x + 6y) \cdot dx - (x + 3y) \cdot dy = 0;$$

**Задача 1.45.**

$$xy' = y + x \cdot \cot\left(\frac{y}{x}\right).$$

**Задача 1.49.**

$$2y' = \frac{y^2}{x^2} + 8 \cdot \frac{y}{x} + 8, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.50.**

$$y'(x^2 - 4xy) = x^2 + xy - 3y^2, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.51.**

$$xy' = 3\sqrt{2x^2 + y^2} + y, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.52.**

$$(2y^2 + 7x^2) \cdot xy' = 3y^3 + 14yx^2, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.53.**

$$2y' = \frac{y^2}{x^2} + 6 \cdot \frac{y}{x} + 3, \quad y(3) = 1;$$

**Задача 1.54.**

$$x^2y' = y^2 + 4xy + 2x^2, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.55.**

$$xy' = \sqrt{2x^2 + y^2} + y, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.56.**

$$xy' = 3\sqrt{x^2 + y^2} + y, \quad y(3) = 4;$$

**Задача 1.57.**

$$xy' = 2\sqrt{x^2 + y^2} + y, \quad y(4) = 3;$$

**Задача 1.58.**

$$2y' = \frac{y^2}{x^2} + 8 \cdot \frac{y}{x} + 8, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.59.**

$$y' = \frac{x + 2y}{2x - y}, \quad y(3) = 8.$$

## 1.3 Лінійні рівняння першого порядку

### 1.3.1 Загальна теорія

Рівняння, що є лінійним відносно невідомої функції та її похідної, називається лінійним диференціальним рівнянням. Його загальний вигляд такий:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x). \quad (1.3.1)$$

Якщо  $q(x) \equiv 0$ , тобто рівняння має вигляд

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = 0, \quad (1.3.2)$$

то воно зветься однорідним. Однорідне рівняння є рівнянням зі змінними, що розділяються і розв'язується таким чином:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= -p(x) \cdot dx, \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int p(x) \cdot dx, \\ \ln y &= - \int p(x) \cdot dx + \ln C. \end{aligned}$$

Нарешті  $y = C \cdot \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\}$ .

Розв'язок неоднорідного рівняння будемо шукати методом варіації довільних сталих (методом невизначених множників Лагранжа). Він складається в тому, що розв'язок неоднорідного рівняння шукається в такому ж вигляді, як і розв'язок однорідного, але  $C$  вважається невідомою функцією від  $x$ , тобто  $C = C(x)$  і  $y = C(x) \cdot \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\}$ .

Для знаходження  $C(x)$  підставимо  $y$  у рівняння

$$\begin{aligned} \frac{dC(x)}{dx} \cdot \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\} &= -C(x) \cdot p(x) \cdot \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\} + \\ &+ p(x) \cdot C(x) \cdot \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\} = q(x). \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

Звідси

$$dC(x) = q(x) \cdot \exp \left\{ \int p(x) \cdot dx \right\} \cdot dx. \quad (1.3.4)$$

Проінтегрувавши, одержимо

$$C(x) = \int q(x) \cdot \exp \left\{ \int p(x) \cdot dx \right\} \cdot dx + C. \quad (1.3.5)$$

І загальний розв'язок неоднорідного рівняння має вигляд

$$y = \exp \left\{ - \int p(x) \cdot dx \right\} \cdot \left( \int q(x) \cdot \exp \left\{ \int p(x) \cdot dx \right\} \cdot dx + C \right). \quad (1.3.6)$$

Якщо використовувати початкові умови  $y(x_0) = y_0$ , то розв'язок можна записати у формі Коші:

$$y(x, x_0, y_0) = \exp \left\{ - \int_{x_0}^x p(t) \cdot dt \right\} \cdot \left( \int_{x_0}^x q(t) \cdot \exp \left\{ \int_t^x p(\xi) \cdot d\xi \right\} \cdot dt + y_0 \right). \quad (1.3.7)$$

### 1.3.2 Рівняння Бернуллі

Рівняння вигляду

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x) \cdot y^m, \quad m \neq 1 \quad (1.3.8)$$

називається рівнянням Бернуллі. Розділимо на  $y^m$  і одержимо

$$y^{-m} \cdot \frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y^{1-m} = q(x). \quad (1.3.9)$$

Зробимо заміну:  $y^{1-m} = z$ ,  $(1-m) \cdot y^{-m} \cdot \frac{dy}{dx} = dz$ .

Підставивши в рівняння, отримаємо

$$\frac{1}{1-m} \cdot \frac{dz}{dx} + p(x) \cdot z = q(x). \quad (1.3.10)$$

Одержали лінійне диференціальне рівняння. Його розв'язок має вигляд

$$z = \exp \left\{ -(1-m) \cdot \int p(x) dx \right\} \cdot \left( (1-m) \cdot \int q(x) \cdot \exp \left\{ (1-m) \cdot \int p(x) dx \right\} + C \right). \quad (1.3.11)$$



### 1.3.3 Рівняння Рікатті

Рівняння вигляду

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y + r(x) \cdot y^2 = q(x) \quad (1.3.12)$$

називається рівнянням Рікатті. В загальному випадку рівняння Рікатті не інтегрується. Відомі лише деякі частинні випадки рівнянь Рікатті, що інтегруються в квадратурах. Розглянемо один з них. Нехай відомий один частинний розв'язок  $y = y_1(x)$ . Робимо заміну  $y = y_1(x) + z$  і одержуємо

$$\frac{dy_1(x)}{dx} + \frac{dz}{dx} + p(x) \cdot (y_1(x) + z) + r(x) \cdot (y_1(x) + z)^2 = q(x). \quad (1.3.13)$$

Оскільки  $y_1(x)$  – частинний розв'язок, то

$$\frac{dy_1(x)}{dx} + p(x) \cdot y_1 + r(x) \cdot y_1^2 = q(x). \quad (1.3.14)$$

Розкривши в (1.3.13) скобки і використовуючи (1.3.14), одержуємо

$$\frac{dz}{dx} + p(x) \cdot z + 2r(x) \cdot y_1(x) \cdot z + r(x) \cdot z^2 = 0. \quad (1.3.15)$$

Перепишемо одержане рівняння у вигляді

$$\frac{dz}{dx} + (p(x) + 2r(x) \cdot y_1(x)) \cdot z = -r(x) \cdot z^2, \quad (1.3.16)$$

це рівняння Бернуллі з  $m = 2$ .

### 1.3.4 Вправи для самостійної роботи

**Приклад 1.4.** Розв'язати рівняння

$$y' - y \cdot \tan x = \cos x.$$

**Розв'язок.** Використовуючи вигляд загального розв'язку, отримаємо

$$y = \exp \left\{ \int \tan x \, dx \right\} \cdot \left( \int \exp \left\{ - \int \tan x \, dx \right\} \cdot \cos x \, dx + C \right).$$

Оскільки  $\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x|$ , то отримаємо

$$y = e^{-\ln |\cos x|} \cdot \left( \int e^{\ln |\cos x|} \cdot \cos x \, dx + C \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\cos x} \cdot \left( \int \cos^2 x \, dx + C \right) = \\
&= \frac{1}{\cos x} \cdot \left( \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C \right).
\end{aligned}$$

Або

$$y = \frac{C}{\cos x} + \frac{x}{2 \cos x} + \frac{\sin x}{2}.$$

**Приклад 1.5.** Знайти частинний розв'язок рівняння

$$y' - \frac{y}{x} = x^2,$$

що задовольняє початковій умові  $y(2) = 2$ .

**Розв'язок.** Використовуючи вигляд загального розв'язку, отримаємо

$$\begin{aligned}
y &= \exp \left\{ \int \frac{1}{x} \, dx \right\} \cdot \left( \int \exp \left\{ - \int \frac{1}{x} \, dx \right\} \cdot x^2 \, dx + C \right) = \\
&= e^{\ln |x|} \cdot \left( \int e^{-\ln |x|} \cdot x^2 \, dx + C \right) = \\
&= x \cdot \left( \int x \, dx + C \right) = \\
&= x \cdot \left( \frac{x^2}{2} + C \right).
\end{aligned}$$

Таким чином

$$y = Cx + \frac{x^3}{2}.$$

Підставивши початкові умови  $y(2) = 2$ , одержимо  $2 = 2C + 4$ . Звідси  $C = -1$  і частинний розв'язок має вигляд

$$y_{\text{част.}} = \frac{x^3}{2} - x.$$

Розв'язати рівняння:

**Задача 1.60.**

$$xy' + (x+1) \cdot y = 3x^2 e^{-x};$$

**Задача 1.62.**

$$y' = 2x \cdot (x^2 + y);$$

**Задача 1.61.**

$$(2x+1) \cdot y' = 4x + 2y;$$

**Задача 1.63.**

$$x^2 y' + xy + 1 = 0;$$

**Задача 1.64.**

$$y' + y \cdot \tan x = \sec x;$$

**Задача 1.65.**

$$x \cdot (y' - y) = e^x;$$

**Задача 1.66.**

$$(xy' - 1) \cdot \ln x = 2y;$$

**Задача 1.67.**

$$(y + x^2) \cdot dx = x \cdot dy;$$

**Задача 1.68.**

$$(2e^x - y) \cdot dx = dy;$$

**Задача 1.69.**

$$\sin^2 y + x \cdot \cot y = \frac{1}{y^2};$$

**Задача 1.70.**

$$(x + y^2) \cdot y' = y;$$

**Задача 1.71.**

$$(3e^y - x) \cdot y' = 1;$$

**Задача 1.72.**

$$y = x \cdot (y' - x \cdot \cos x).$$

Знайти частинні розв'язки рівняння з заданими початковими умовами:

**Задача 1.73.**

$$y' - \frac{y}{x} = -\frac{\ln x}{x}, \quad y(1) = 1;$$

**Задача 1.74.**

$$y' - \frac{2xy}{1+x^2} = 1+x^2, \quad y(1) = 3;$$

**Задача 1.75.**

$$y' - \frac{2y}{x+1} = e^x \cdot (x+1)^2, \quad y(0) = 1;$$

**Задача 1.76.**

$$xy' + 2y = x64, \quad y(1) = -\frac{5}{8};$$

**Задача 1.77.**

$$y' - \frac{y}{x} = x \cdot \sin x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1;$$

**Задача 1.78.**

$$y' + \frac{y}{x} = \sin x, \quad y(\pi) = \frac{1}{\pi};$$

**Задача 1.79.**

$$(13y^3 - x) \cdot y' = 4y, \quad y(5) = 1;$$

**Задача 1.80.**

$$2 \cdot (x + \ln^2 y - \ln y) \cdot y' = y, \quad y(2) = 1.$$

Розв'язати рівняння Бернуллі:

**Задача 1.81.**

$$y' + xy = (1 + x) \cdot e^{-x} \cdot y^2;$$

**Задача 1.82.**

$$xy' + y = 2y^2 \cdot \ln x;$$

**Задача 1.83.**

$$2 \cdot (2xy' + y) = xy^2;$$

Розв'язати рівняння Рікатті:

**Задача 1.86.**

$$x^2 \cdot y' + xy + x^2 y^2 = 4;$$

**Задача 1.87.**

$$3y' + y^2 + \frac{2}{x} = 0;$$

**Задача 1.88.**

$$xy' - (2x + 1) \cdot y + y^2 = 5 - x^2;$$

**Задача 1.84.**

$$3 \cdot (xy' + y) = y^2 \cdot \ln x;$$

**Задача 1.85.**

$$2 \cdot (y' + y) = xy^2.$$

**Задача 1.89.**

$$y' - 2xy + y^2 = 5 - x^2;$$

**Задача 1.90.**

$$y' + 2y \cdot e^x - y^2 = e^{2x} + e^x.$$