

# 12 Слабка топологія і слабка збіжність

Ми розглянули поняття сильної топології і сильної збіжності в нормованому просторі  $E$ , а також сильної топології і сильної збіжності в спряженому просторі  $E^*$ . Ці топології та поняття збіжності спиралися на поняття норми.

Розглянемо відповідні поняття слабкої топології і слабкої збіжності в нормованих просторах  $E$  і  $E^*$ .

## §12.1 Слабка топологія

**Означення 12.1.** Слабкою топологією в просторі  $E^*$  називається топологія, визначена локальною базою нуля, тобто сукупністю множин

$$U_{f_1, f_2, \dots, f_n; \varepsilon} = \{x \in L : |f_i(x)| < \varepsilon, i = 1, 2, \dots, n\},$$

де  $f_1, f_2, \dots, f_n$  — скінченна сукупність неперервних функціоналів, а  $\varepsilon$  — довільне додатне число.

### Лема 12.1

Слабка топологія слабкіша за вихідну топологію простору  $L$ .

*Доведення.* Розглянемо скінчену сукупність неперервних функціоналів  $f_1, f_2, \dots, f_n$  і довільне додатне число  $\varepsilon$ .

Тоді внаслідок неперервності функціоналів  $f_1, f_2, \dots, f_n$  множина  $U_{f_1, f_2, \dots, f_n; \varepsilon}$  є відкритою в вихідній топології простору  $L$ , оскільки прообразом відкритої множини при неперервному відображенні є відкрита множина, і містить нуль, тобто є околom нуля, оскільки ці функціонали є лінійними.

Перетин двох таких околів сам містить множину точок, в яких скінченна кількість функціоналів за модулем менше  $\varepsilon$ , отже, виконується критерій локальної бази.

Оскільки нова топологія є лише частиною локальної бази нуля в вихідній топології, вона є слабкішою.  $\square$

**Зауваження 12.1** — Слабка топологія є найменшою з усіх топологій, в яких є неперервними всі лінійні функціонали, неперервні у природній топології простору.

**Зауваження 12.2** — У нормованому просторі слабка топологія задовольняє аксіому  $T_2$ , але може не задовольняти першу аксіому зліченності, отже, вона не описується за допомогою збіжних послідовностей.

## §12.2 Слабка збіжність

**Означення 12.2.** Послідовність називається **слабко збіжною**, якщо вона є збіжною в слабкій топології.

### Лема 12.2

Послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  елементів лінійного топологічного простору  $L$  є слабко збіжною до  $x_0 \in L$  тоді і лише тоді, коли для будь-якого неперервного лінійного функціонала  $f$  на  $L$  числова послідовність  $f(x_n)$  збігається до  $f(x_0)$ .

*Доведення.* Необхідність. Без обмеження загальності, розглянемо випадок  $x_0 = 0$ . Якщо для будь-якого околу  $U_{f_1, \dots, f_k; \varepsilon}$  в слабкій топології існує таке число  $N$ , що  $x_n \in U_{f_1, \dots, f_k; \varepsilon}$  для всіх  $n \geq N$ , то ця умова виконується і для околу  $U_{f; \varepsilon}$ , де  $f \in L^*$  — довільний фіксований функціонал, а це означає, що  $f(x_n) \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

Достатність. Припустимо, що  $f(x_n) \rightarrow 0$  для будь-якого  $f \in L^*$ . Тоді ця умова виконується і для всіх функціоналів  $f_i \in L^*$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ , що визначають довільний окіл в слабкій топології:

$$U_{f_1, f_2, \dots, f_k; \varepsilon} = \{x \in L : |f_i(x)| < \varepsilon, i = 1, 2, \dots, k\}.$$

Виберемо числа  $N_i$  так, щоб  $|f_i(x_n)| < \varepsilon$  при  $n \geq N_i$  і покладемо  $N = \max_{i=1, \dots, k} N_i$ . Отже, при всіх  $n \geq N$  виконується умова  $x_n \in U$ . Це означає, що послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  збігається в слабкій топології.  $\square$

### Лема 12.3

Будь-яка сильно збіжна послідовність є слабко збіжною, але не навпаки.

*Доведення.* Відповідно до леми 12.1, слабка топологія слабкіша за вихідну топологію лінійного топологічного простору, тому будь-яка послідовність, що збігається в сильній топології, буде збігатися і в слабкій.

Обернене твердження є невірним, тому що, наприклад, в просторі  $\ell_2$  послідовність ортів  $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$  слабко збігається до нуля, але не збігається до нуля сильно.  $\square$

Розглянемо поняття слабкої збіжності в нормованому просторі  $E$ .

### Теорема 12.1

Якщо послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  слабко збігається в нормованому просторі  $E$ , то існує така константа  $C$ , що

$$\|x_n\| \leq C$$

тобто будь-яка слабко збіжна послідовність в нормованому просторі є обмеженою.

*Доведення.* Розглянемо в просторі  $E^*$  множини

$$A_{k,n} = \{f \in E^* : |f(x_n)| \leq k\}, \quad k, n = 1, 2, \dots$$

Оскільки при фіксованому  $x_n$  функціонали  $\varphi_{x_n}(f) = f(x_n)$  є неперервними (лема 11.2), множини  $A_{k,n}$  є замкненими.

Дійсно,

$$f_m \rightarrow f, f_m \in A_{k,n} \implies \varphi_{x_n}(f_m) = f_m(x_n) \leq k \implies f(x_n) \leq k.$$

Отже, множина

$$A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{k,n}$$

є замкнутою.

Оскільки послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  збігається слабо, послідовність  $\varphi_{x_n}(f)$  є обмеженою для кожного  $f \in E^*$ .

Дійсно,

$$x_n \rightharpoonup x \implies \varphi_{x_n}(f) = f(x_n) \rightarrow f(x) \implies \exists k > 0 : |f(x_n)| \leq k.$$

Отже, будь-який функціонал  $f \in E^*$  належить деякій множині  $A_k$ , тобто

$$E^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Оскільки простір  $E^*$  є повним (теорема 11.3), то за теоремою Бера хоча б одна з множин  $A_k$ , наприклад,  $A_{k_0}$  повинна бути щільною в деякій кулі  $S(f_0, \varepsilon)$ . Оскільки множина  $A_{k_0}$  замкнутою, це означає, що

$$S(f_0, \varepsilon) \subset \bar{A}_{k_0} = A_{k_0}.$$

Звідси випливає, що послідовність  $\{\varphi_{x_n}(f)\}_{n=1}^{\infty}$  є обмеженою на кулі  $S(f_0, \varepsilon)$ , а значить, на будь-якій кулі в просторі  $E^*$ , оскільки  $E^*$  є лінійним топологічним простором. Зокрема, це стосується одиничної кулі. Таким чином, послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  є обмеженою як послідовність елементів з  $E^{**}$ . Оскільки природне відображення  $\pi : E \rightarrow E^{**}$  є ізометричним, це означає обмеженість послідовності  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  в просторі  $E$ .  $\square$

### Теорема 12.2

Послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  елементів нормованого простору  $E$  слабо збігається до  $x \in E$ , якщо

1. значення  $\|x_n\|$  є обмеженими в сукупності деякою константою  $M$ ;
2.  $f(x_n) \rightarrow f(x)$  для будь-яких функціоналів  $f$ , що належать множині, лінійні комбінації елементів якого скрізь щільними в  $E^*$ .

*Доведення.* Із умови 2) і властивостей операцій над лінійними функціоналами випливає, що якщо  $\varphi$  — лінійна комбінація функціоналів  $f$ , то

$$\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x).$$

Нехай  $\varphi$  — довільний елемент з  $E^*$  і  $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$  — сильно збіжна до  $\varphi$  послідовність лінійних комбінацій із функціоналів  $f$ , тобто  $\|\varphi_k - \varphi\| \rightarrow 0$  (вона завжди існує внаслідок щільності). Покажемо, що  $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ .

Нехай  $M$  задовольняє умову

$$\|x_n\| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots, \quad \|x\| \leq M.$$

Оскільки  $\varphi_k \rightarrow \varphi$ , то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} : \forall k \geq K : \|\varphi - \varphi_k\| < \varepsilon.$$

З цього випливає, що

$$\begin{aligned} |\varphi(x_n) - \varphi(x)| &\leq |\varphi(x_n) - \varphi_k(x_n)| + |\varphi_k(x_n) - \varphi_k(x)| + |\varphi_k(x) - \varphi(x)| \leq \\ &\|\varphi - \varphi_k\|M + |\varphi_k(x_n) - \varphi_k(x)| + \|\varphi - \varphi_k\|M \leq \varepsilon M + |\varphi_k(x_n) - \varphi_k(x)| + \varepsilon M. \end{aligned}$$

За умовою теореми,  $\varphi_k(x_n) \rightarrow \varphi_k(x)$  при  $n \rightarrow \infty$ . Отже,

$$\varphi(x_n) - \varphi(x) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty, \quad \forall \varphi \in E^*.$$

□

## §12.3 Види топології у спряженому просторі

Розглянемо поняття слабкої топології в спряженому просторі  $E^*$ . Спочатку згадаємо, що із означення 11.3 сильної топології в спряженому просторі випливає, що цю топологію можна задати за допомогою локальної бази нуля. Наведемо її еквівалентне формулювання.

**Означення 12.3.** **Сильною топологією** в спряженому просторі  $E^*$  називається топологія, визначена локальною базою нуля, тобто сукупністю множин

$$B_{\varepsilon, A} = \{f \in E^* : |f(x)| < \varepsilon, x \in A \subset E\},$$

де  $A$  — довільна обмежена множина в  $E$ , а  $\varepsilon$  — довільне додатне число.

**Зауваження 12.3** — Оскільки будь-яка скінченна множина є обмеженою, то слабка топологія в  $E^*$  є слабкішою, ніж сильна топологія цього простору.

**Означення 12.4.** Послідовність  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  називається **слабко збіжною**, якщо вона є збіжною в слабкій топології  $E^*$ , інакше кажучи,  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  для кожного  $x \in E$ .

**Зауваження 12.4** — В спряженому просторі сильно збіжна послідовність є одночасно слабко збіжною, але не навпаки.

В спряженому просторі мають місце теореми, аналогічні теоремам 12.1 і 12.2.

### Теорема 12.3

Якщо послідовність лінійних функціоналів  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  слабко збігається на банаховому просторі  $E$ , то існує така константа  $C$ , що

$$\|f_n\| \leq C,$$

тобто будь-яка слабко збіжна послідовність простору, спряженого до банахова простору, є обмеженою.

**Теорема 12.4**

Послідовність лінійних функціоналів  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  елементів спряженого простору  $E^*$  слабо збігається до  $f \in E$ , якщо

1. послідовність  $\|f_n\|$  є обмеженою, тобто

$$\exists C \in \mathbb{R} : \|f_n\| \leq C, \quad n = 1, 2, \dots;$$

2.  $\varphi_x(f_n) \rightarrow \varphi_x(f)$  для будь-яких елементів  $x$ , що належать множині, лінійні комбінації елементів якої скрізь щільними в  $E$ .

**Зауваження 12.5** — Простір  $E^*$  лінійних неперервних функціоналів, заданих на просторі  $E$ , можна тлумачити і як простір, спряжений до простору  $E$ , і як основний простір, спряжений до якого є простір  $E^{**}$ . Відповідно, слабку топологію в просторі  $E^*$  можна ввести або за означенням 12.4 (через скінченні множини елементів простору  $E$ ), або як в основному просторі відповідно до означення 12.1 (через функціонали із простору  $E^{**}$ ). Для рефлексивних просторів це одне й теж, а для нереклексивних просторів ми таким чином отримуємо різні слабкі топології.

**Означення 12.5.** Топологія в спряженому просторі  $E^*$ , що вводиться за допомогою простору  $E^{**}$  (як в означенні 12.1), називається **слабкою** і позначається як  $\sigma(E^*, E^{**})$ .

**Означення 12.6.** Топологія в спряженому просторі  $E^*$ , що вводиться за допомогою простору  $E$  (як в означенні 12.4), називається  **$\star$ -слабкою** і позначається як  $\sigma(E^*, E)$ .

**Зауваження 12.6** — Очевидно, що  $\star$ -слабка топологія в  $E^*$  є більш слабкою, ніж слабка топологія простору  $E$ , тобто в слабкій топології не менше відкритих множин, ніж в  $\star$ -слабкій топології.

## §12.4 Література

- [1] **Садовничий В. А.** Теория операторов / В. А. Садовничий — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986 (стр. 114–117).
- [2] **Колмогоров А. Н.** Элементы теории функций и функционального анализа. 5-е изд. / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин — М.: Наука, 1981 (стр. 192–202).